



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

## Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

## À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <http://books.google.com>

Sci 895.55

Pound

OCT 31 1908



**Harvard College Library**

BOUGHT WITH THE INCOME

FROM THE BEQUEST OF

**PROF. JOHN FARRAR, LL.D.,**


AND HIS WIDOW,

**ELIZA FARRAR,**

FOR

"BOOKS IN THE DEPARTMENT OF MATHEMATICS,  
ASTRONOMY, AND NATURAL PHILOSOPHY."

SCIENCE CENTER LIBRARY













# FORMULARIO MATEMATICO



# FORMULARIO MATHEMATICO

EDITO PER

**G. PEANO**

professore de Analysis infinitesimalis in Universitate de Torino

---

EDITIO V

(Tomo V de Formulario completo)



TORINO

FRATRES BOCCA EDITORES

---

1908




1825-20

Sci 895.55

~~~~~  
IURE SERVATO  
~~~~~

Stampato coi tipi della « Rivista di Matematica »  
dalla Tipografia Cooperativa - Torino.

Little of V.



# FORMULARIO MATHEMATICO

EDITO PER

**G. PEANO**

professore de Analysi infinitesimale in Universitate de Torino

EDITIO V

1.3

(Tomo V de Formulario completo)



TORINO

FRATRES BOCCA EDITORES

1908

PRAEFATIONE





## PRÆFATIONE.

Omni progressu de Mathematica responde ad introductione de signos ideographico vel symbolos.

Symbolos plus antiquo, hodie adoptato, es cifras Indo-Arabico, 0, 1, 2... 9, facto Europæo in anno 1200 circa.

Utilitate plus evidente de cifras es brevitare in scriptura.

In secundo loco, cifras reduce vocabulario. Nam numeratione per cifras introduce nullo novo symbolo pro vocabulos « decem, viginti... centum, mille... » que es expresso per symbolos præcedente.

Systema de cifras Indo-Arabo-Europæo resulta ex systema de cifras Græco, per tres operatione:

a) Variatione de signos  $\alpha \beta \gamma \dots \vartheta$ , in 1 2 3 ... 9, quod es indifferente;

b) additione fundamentale de symbolo 0, que nos lege per vocabulo Arabo « zero »;

c) suppressione de  $\iota \kappa \lambda \dots \varrho \sigma \dots$   
que resulta expresso per 10 20 30 ... 100 200 ...  
ut combinatione de symbolos præcedente. (\*)

Inter duo systema symbolico, illo que contine minore numero de symbolos es, in generale, plus perfectio.

Sed utilitate fundamentale de cifras es facilitate in calculos.

Archimede, per cifras Græco, post magno labore, calcula duo cifra decimale de  $\pi$ . Usu de cifras nostro duce Aryabhata, mathematico Indo de anno 500, ad calculo de 4 cifra, et mathematicos Europæo, in anno 1600 circa, ad calculo de 15 et 32 cifra decimale de  $\pi$ . (\*\*)

Rationes de utilitate nunc exposito pro cifras, subsiste pro omni systema symbolico.

---

(\*) Vide Formul. t. 3, p. 76.

(\*\*) Vide Formul. t. 5, p. 255; cifras successivo es calculato per evolutione in serie.

Signos  $+$ ,  $-$  (a. 1500),  $\times$  (a. 1600),  $=$  (a. 1550),  $>$  (a. 1650),  $e$ ,  $\pi$  (a. 1700),  $\Sigma$ ,  $\Pi$  (a. 1800), constitue calculo algebrico, et nos non pote concipe Algebra sine signos præcedente.

In realitate, magno parte de Algebra elementare es scripto in libros VII, VIII, IX, X de Euclide. (\*)

Introductione de symbolos moderno redde libros de Euclide multo plus breve, elimina enorme vocabulario, mortuo in Algebra moderno; redde theorias præcedente plus facile, et permette constructione de numero novo theoria.

Algebra moderno exprime ideas et in symbolos, et in lingua commune. Si nos fixa correspondentia univoco inter symbolos et vocabulos, per ex., si nos lege singulo symbolo

$$2 + 3 = 5 \quad (1)$$

per duo plus tres æqua quinque (2),

tunc propositione symbolico (1) pote es lecto per (2). Vocabulos (2) es symbolos phonetico æquivalente ad symbolos graphico (1).

Sed, in tractatos commune, systema de vocabulos es multo plus numero que systema de symbolos. Introducto p. ex., signos  $+$  (plus), et  $\times$  (multiplicato per), Algebra habe constructo nullo symbolo speciale pro « summa, additione, termine, producto, factore, coefficiente... », et alio vocabulo, que in aliquo tractato es multo numero et inutile. Suppressione de isto vocabulos supprime in idem tempore definitione de illos et obscuritate in definitione. Libro fi plus facile et plus præciso.

Non solo plure vocabulo adoptato in tractatos responde ad nullo symbolo, sed sæpe non pote es repræsentato per symbolo, nam vocabulo repræsentat nullo ente reale. Per ex. post definitiones conveniente, resulta  $2/3 = 4/6$ . Nunc  $2/3$  es fractione irreductibile,  $4/6$  es reductibile; ergo expressione « fractione irreductibile » habe forma de classe de fractiones, sed non es classe de fractiones, nam non satisfac proprietate fundamentale de æqualitate (Formul. p. 8, p. 16).

(\*) Libros VII, VIII, IX de Euclide es traducto in symbolos in Rām. t. 1 p. 10, et libro X in t. 2 p. 7; et es transcripto in presente Formul., in paucis lineis. Vide, in Bibliographia, citatione de Euclide relativo ad pag. 40-121.

Nos habet  $2+3=5$ ; primo membro est binomium, secundo est monomium; ergo ista vocabula indicant pseudosubstantia.

Nos habet  $2^4=4^2$ , exponente in primo membro est 4, in secundo est 2, ergo vocabulum « exponente » non indicat ens reale. In generale, vocabulum relativo ad proprietates formales non potest esse transformatum in symbolum.

Si lingua communis, pro repræsentatione de symbolis, habet vocabula in excessu, sæpe deficit vocabulum proprium.

P. ex., symbolum graphico *D* (*Cauchy*), *S* (*Leibniz*), et symbolum phonetico correspondens « derivata, integrale », habet formam de litteris de alphabeto, et de vocabulis de lingua communis; sed habet valorem ideologicum respondens in modo exacto ad nullum vocabulum de lingua vulgari; valorem de vocabulo mathematico, « derivata, integrale », non resultat ex etymologia, sed ex definitione scripta in libris de Calculo.

In anno 1800 circa incipit constructio de Calculo geometrico, hodie satis diffusum in libris de theoria et de applicationibus, et si non omni libro adoptat illud. (\*) Si nos consideramus ut symbolum, vocabulum « recta, plano, sphaera, cylindrus... » et innumero alio de Geometria antiquo et moderno, nos non construimus Calculum geometricum. Illud resultat per introductionem de novo ente, hodie vocatum « vectore », quod respondens in modo exacto ad nullum vocabulum de Geometria præcedente, et quod reddit non necessarium et sæpe inutile totum nomenclaturam de Geometria.

Theoria de vectoribus exigit nullum studium anteriorem de Geometria, ut usus de cifris moderno non exigit studium anteriorem de cifris græco.

Hodie existit aliquo varietate in notationes et in nomenclaturam de Calculo geometrico, ut iam in calculo algebrico. Ratione principale est in differente systema de operationibus considerato.

Per ex. existit plures operationes distributivas super vectores, et omni potest esse vocatum productum, distinctum per nomen « interno, alterno, quaternione... ». Ratione secundario est quod plures Auctores putant licitum introductionem de symbolo novo, sine studio de

---

(\*) Vide Formul. pag. 167.



notationes jam vigente. Diffusione de studio comparativo de notationes parallelo es facturo uniformitate. (\*)

Ultimo in tempore, et non minus interessante de præcedentes, es Calculo logico. Incepto ab LEIBNIZ, (\*\*) et secuto per BOOLE, SCHRÖDER, et plure alio, Calculo logico stude proprietates de ideas repræsentato in Formulario per signos  $\wedge \vee = \supset \dots$

Ad theoria præcedente me adde distinctione inter symbolos  $\epsilon$ , pro propositione individuale, et  $\supset$ , pro propositione universale, distinctione jam facto ab Logicos scholastico, et non ab Auctores de Algebra de Logica. Me supprime numero symbolo de nullo aut paucio utilitate, et da forma commodo ad symbolos que remane.

Combinatione de signos de Logica-Mathematica cum signos plus diffuso de Arithmetica, Algebra, Calculo infinitesimale, Calculo geometrico, da expressione symbolico completo de omni theoria de Mathematica.

Me habe reducto in symbolos aliquo theoria in:

*Arithmetices principia, nova methodo exposita*, Torino a. 1889.

*Principii di Geometria, logicamente esposti*, Torino a. 1889.

Plure Auctore, in *Rivista de Mathematica*, a. 1891 et sequentes, applica idem methodo ad analysi de vario theoria.

Tunc me publica *Formulario Mathematico*, que es collectione de propositiones, expresso per solo symbolos.

Introductione, *Notations de Logique mathématique*, a. 1894, contine formulas de Logica-Mathematica.

*Formulaire Mathématique*, tome I, a. 1895, es composito in collaboratione cum professores F. CASTELLANO in Torino (formulas de Algebra); G. VAILATI in Roma (indicationes historico de Logica-Mathematica); C. BURALI-FORTI in Torino (formulas de Arithmetica et theoria de magnitudines); G. VIVANTI (theoria de classes), R. BETTAZZI (limites), F. GIUDICE (serie), G. FANO (numeros algebrico). Tomo II a. 1897-99, III a. 1901, IV a. 1903 reproduce theorias de Arithmetica, et de Algebra, cum numero additione de plure collaboratore, citato in præfatione ad

(\*) Vide C. Burali-Forti e R. Marcolongo, *Per l'unificazione delle notazioni rettoriali*. Palermo R. a. 1907-08.

(\*\*) Vide Formul. t. 5, p. 16, et in modo speciale t. 3.

tomo IV, et reduce in symbolos Geometria, et elementos de Calculo infinitesimal. Me mentiona in modo speciale labore de D.r G. VACCA, in Sina, et de Prof. A. PADOA, in Cagliari.

Symbolos de logica produce brevitatem. Formulario, post plures propositiones scripto per symbolos, reproduce formam originalem. Vide pag. 40, 41, 42, 54, 58, 59, 112, 122, 124, 174, 175, 215, 224, 226...

Resulta quod scriptura in symbolis est circa decem vice plus brevis quam scriptura per linguam communem. Publicatione in lingua vulgare de Formulario amplo ut praesente, est in praxi quasi impossibile, ut publicatione de tabula de logarithmos in lingua communem, aut in cifras Romano.

Systema de symbolis logico est multo minus numerosum quam systema de vocabulis aequivalente in lingua communem. Symbolos  $= \supset \varepsilon \mathfrak{I}$  exprime ideas « es, habet, omni, aliquo, nullo, si, tunc, existit, coexistit, compatibile, independente, possibile, necessario, sufficiente, verum, falsum, contrarium, contradictorium, datum, fixum, determinatum, arbitrium, constante, variabile, aequale, diversum, aequalitate, aequatione, identitate, generale, particulare, universale, pertinet, continetur... ». (\*)

Si ad omni symbolum de Logica responde in lingua communem plures expressiones approximatae, viceversa non existit vocabulum cum valore exacto de symbolo.

Ita vocabulum « es » responde ad symbolos  $\varepsilon, =, \supset, \mathfrak{I}$ :

(7 est un numero primo)  $= (7 \varepsilon N_p)$ .

(13 est la somma di due quadrati)  $= (13 \varepsilon N_1^2 + N_1^2)$ .

(Ogni multiplo di 4 est un multiplo di 2)  $= (Tutti i multipli di 4 sono multipli di 2) = (4N_1 \supset 2N_1)$ .

(13 est la somma di 4 e 9)  $= (13 = 4 + 9)$ .

(I multipli comuni a 4 e a 6 sono i multipli di 12)  $= (4N_1 \wedge 6N_1 = 12N_1)$ .

(Sons quadrati somme di due quadrati)  $= [\mathfrak{I} N_1^2 \wedge (N_1^2 + N_1^2)]$ .

Vocabulum « et » habet valore de  $\wedge$  aut de  $\cup$ :

(I numeri multipli di 4 et multipli di 6 sono multipli di 12)  $= (4N_1 \wedge 6N_1 \supset 12N_1)$ .

(\*) Vide RdM. t. 7, pag. 160-172.

(I multipli di 4 e i multipli di 6 sono multipli di 2) =  
 $(4N_1 \cup 6N_1 \supset 2N_1)$ .

Vocabulo « existe » responde ad  $\mathfrak{I}$  aut ad  $\varepsilon$ . (Vide pag. 341).

In generale, valore de symbolos de Mathematica non es dato per lingua commune; illo resulta ex definitiones nominale, aut ex systema de propositiones primitivo.

Sed utilitate fundamentale de symbolos de Logica es in rigore et præcissione. Nam illos reduce ratiocinio ad calculo algebrico et multo plus simplice. LEIBNIZ dice:

« Itaque profertur hic calculus quidam novus et mirificus, qui in omnibus nostris ratiocinationibus locum habet, et qui non minus accurate procedit quam Arithmetica aut Algebra. Quo adhibito semper terminari possunt controversiæ quantum ex datis eas determinari possibile est, manu tantum ad cal-  
 « lamum admoto, ut sufficiat duos disputantes omissis verborum concertationibus sibi invicem dicere: *calculemus*, ita enim perinde ac si duo Arithmetici disputarent de quodam calculi errore ».

Juxta opinione universale, Mathematica excelle inter scientias, pro exactitudine et veritate absoluto de propositiones. Ita propositiones:  $2 + 3 = 5$ ,  $3+1,7 > \pi > 3+10/71$ , ... dato valore de singulo symbolo, es vero in modo absoluto; non existe plus vero et minus vero. Propositiones præcedente es jam expresso in symbolos.

In propositiones hodie scripto in parte aut toto, per lingua commune, sæpe vocabulos habe valore de symbolos. Tunc reductione totale in symbolos non es difficile. Ideographia redde evidente, in modo mechanico, que definitiones es justo, que demonstrationes es rigoroso.

Per exemplo, es regula fundamentale pro definitiones, que symbolo que nos defini, debe es expresso per symbolos præcedente. Tunc, si nos considera per ex. definitione de numero primo, pag. 58, nos vide illo expresso per  $- 1 + \times N_1$ , signos introducto in pag. 10 29 29 32 37, ubi plure inter ce signos es definito per signos præcedente, et ita porro, usque ad decompositione in ideas primitivo, determinato per propositiones primitivo.

In punctos obscuro et incerto, introductione de symbolos es impossibile, ante quam nos habe eliminato omni obscuritate et dubio.

Punctos obscuro, in libros commune, non es raro. In generale, quæstiones tractato in modo differente ab differente Auctores, non habe stabilitate et claritudine perfecto.

In Arithmetica et Algebra, ipso introductione de numeros naturale, negativo, fracto, irrationale, imaginario, es, in plure libro, obscuro. Nos vide definitiones, ubi vocabulo noto es explicato per vocabulos minus noto. Es dato ut definitione, propositione in se contradictorio; etc. (\*)

In Geometria, objectos primo « puncto, linea, superficie, recta, plano » es sæpe definito per vocabulos minus claro. Analysis de principios de Geometria, enumeratione de ideas non definibile, et de propositiones non demonstrabile, es facto, et ne pote es facto, que per ideographia. (\*\*)

Historia de Calculo infinitesimale, scientia mirabile in theoria et in applicationes, contine numeroso exemplo de definitiones non præciso, de demonstrationes incompleto.

EULERO, in *Introductio in analysin infinitorum*, a. 1748, et in alio libros, institue Calculo super ideas de infinitesimo et de limite.

Definitiones de Eulero non satisfac LAGRANGE, que publica *Théorie des fonctions analytiques*, a. 1813, ubi principios es « dégagés de toute considération d'infiniment petits, d'évanouissans, de limites », et funda theoria super Algebra de serie.

Tunc CAUCHY in libro de a. 1821, dice: « Les raisons de cette espece s'accordent peu avec l'exactitude si vantée des sciences mathématiques », et affer magno rigore in theoria de series.

---

(\*) Vide RdM. t. 8, p. 85, etc. Plure theoria exacto jam es dato ab differente Auctores citato in Formulario. Tunc ideographia es utile per distinctione de tractatione exacto ab inexacto.

(\*\*): M. Pieri, *Della Geometria elementare, come sistema ipotetico deduttivo*, Mem. Ac. Torino, a. 1898-99, t. 49, p. 173, reduce ideas non definito in Geometria ad duo: puncto et motu. Omni reductione facto ante et post scripto de Prof. Pieri, contine numero eccessivo de ideas non definito.

Sed ABEL in a. 1826 (Œuvres p. 219) dice: « Si l'on fait subir au raisonnement dont on se sert en général quand il s'agit des séries infinies, un examen plus exact, on trouvera qu'il est, à tout prendre, peu satisfaisant ».

Et ita porro.

Sed rigore non procedit per gradu, usque ad infinito. Libros de uno generatione non destruit, sed completa, libros de generatione præcedente. Solutione de aliquo puncto obscuro non est dato per magno libro, sed per aliquo novo combinatione de ideas noto.

Definitione rigoroso de vocabulo *limite* (et æquivalentes, *infinitesimo*, *evanescente*...) id est, suo expressione per solo ideas de algebra elementare, est dato in anno 1871 circa (vide pag. 232). Principios de Calculo infinitesimali accipit formam stabilem per opera de WEIERSTRASS, G. CANTOR, DINI, DARBOUX, et plures alios. Introductione de ideographia non ducit ad novitates multo importantes. Propositiones fiunt plus facile et plus clare; conditiones non necessario sunt suppressæ; hypothesi tacito et necessario, debet esse scripto in modo explicito.

Tamen me cita aliquo resultatu.

Idea de *limite*, secundo libros moderni, indicata in Formulario per symbolo «  $\lim$  », est plus restrictiva quæ idea de limite, secundo Cauchy, indicata per symbolo «  $Lm$  », quæ occurrat in plure questione (vide p. 211, 214, 215, 224, ...).

Necessitate de convergentia de omni serie, quæ occurrat in calculo, est nimis restrictiva. Serie de Taylor potest esse considerata ut serie asymptotica (p. 298, 303).

Definitione de integrale non exigit considerationem de « limite de functione » (symbolo:  $\lim$ ), sed solo de « limite superiori de classe » (symbolo:  $l'$ ; vide p. 339).

Idem, pro arcu de curva (p. 370).

Demonstratione de integrabilitate de æquationes differentiales (p. 416), non potest, in praxi, esse dato in modo completo per linguam communem. Etc.

In puro campo de logica, ideographia ducit ad regulas pro definitionibus in Mathematica; ad analysi in formas simplices de ratiociniis mathematico, quæ non est reductibile ad solo syllo-

gismo; ad studio de independentia de aliquo systema de propositiones primitivo.

Præsentē editione, vel tomo V de Formulario, contine, in parte I, Logica-Mathematica, reducto ad symbolos, et ad regulas de ratiocinio, que occurre in theorias sequente.

Ergo tomo V es intelligibile sine auxilio de tomos præcedente. Theoria plus amplo de Logica-Mathematica es in tomos II et III.

Arithmetica (parte II), et Algebra (parte III), habe pauco explicatione in lingua commune. Expositione plus diffuso es in meo libro:

*Aritmetica generale e Algebra elementare.* Torino, Paravia, a. 1902.

Calculo differentiale et integrale, in parte elementare, nunc es exposito in modo satis completo.

D.r PAGLIERO adde « Theoria de curvas » (p. 389-407).

Formulario contine historia de omni symbolo, formas que illo habe apud differente auctores, et in diverso tempore, et rationes historico et logico pro symbolo adoptato.

De omni propositione importante es scripto historia. Bibliographia, composito per D.r VACCA, tomo IV de Formulario, et posito in correspondentia cum tomo V per D.r PAGLIERO, es compendio breve, sed præciso, de historia de Mathematica.

Formulario, satis completo pro mathematica de seculos præterito, es multo incompleto pro auctores moderno et vivente. Nam reductione in symbolos de aliquo theoria exige analysi de omni idea, enunciatione de omni hypotesi, quod es longo et sæpe difficile. Plure theoria moderno non es satis rigoroso.

Formulario non contine omni propositione jam reducto in symbolos; existe numeroso alio applicatione de Logica-Mathematica ad differente quæstiones, per plure Auctore, que adopta symbolos, vel methodos de Logica-Mathematica. Nam symbolos graphico es utile, quasi necessario in longo theoria; sed pote es expresso per symbolos phonetico, putato plus commodo ad publico profano.

Lectore pote stude progressu de Logica - Mathematica, in scriptos infra citato :



***Bibliographia de Logica-Mathematica post anno 1900.***

RdM. t. 7, p. 3-5, contine bibliographia de 67 scriptos, ante anno 1900.

\* indica que propositiones es scripto in ideographia.

Max. Bôcher, *The fundamental conceptions and methods of mathematics*, AmericanB. a. 1904, t. 11 p. 115-135.

C. Burali-Forti, *Sur les différentes méthodes logiques pour la définition du nombre réel*, Congrès intern. de Phil., Paris, a. 1900, p. 289-307.

— *Sur l'égalité, et sur l'introduction des éléments dérivés dans la science*, Enseign. math., a. 1901, p. 246-261.

— *\*Teoria generale delle grandezze e dei numeri*, TorinoA. a. 1904.

S. Catania, *Trattato di aritmetica ed algebra*, Catania, 2.a ed., 1908.

— *Aritmetica razionale*, Catania, a. 1908.

M. Cipolla, *\*Theoria de congruentias intra numeros integro*, RdM. a.1905.

— *\*Specimen de calculo arithmetico integrale*, RdM. a.1908.

L. Couturat, *\*Les principes des mathématiques*. RMM., a. 1904-05.

— *Sur l'utilité de la logique algorithmique*. Comptes rendus II Congrès intern. de philos., Genève, a. 1904.

— *L'Algèbre de la logique*. Paris, a. 1905.

— *\*Les définitions mathématiques*. Enseign. math., p. 27, a. 1905.

— *\*Définitions et démonstrations mathématiques*. Enseign. math., a. 1905.

— *La philosophie des mathématiques de Kant*. RMM.

— *Pour la logistique*. RMM., a. 1906.

E. Huntington, *A complete set of postulates for the theory of absolute continuous magnitude*, AmericanT. a. 1902, t.3 p. 264-184.

— *Two definitions of an Abelian group by independent postulates*, id. 1903.

— *Complete sets of postulates for the theory of real quantities*, id. 1903.

— *Set of independent postulates for the algebra of logic*, Americ.T. a.1904.

— *\*A set of postulates for the real algebra ...*, id. 1905.

— *Note on the definitions of abstract groups ...*, id. 1905.

— *A set of postulates for ordinary complex algebra*, id. 1905.

— *The continuum as a type of order ...*, Ann. of M. a. 1905.

— *The fundamental laws of addition and multiplication in elementary algebra*, id. a. 1906.

— et plure alio.

P. H. Jourdain, *\*De infinito in mathematica*. RdM., t. 8, p. 121, a. 1905.

E. H. Moore, *On the projective axioms of geometry*. AmericanT., a. 1902.

— *\*On a form of general analysis with application to differential and integral equations*, IV Congr. intern. mat., Roma 1908.

- A. Padoa, *Essai d'une théorie algébrique des nombres entiers...* Congrès international de philosophie, Paris, a. 1900, p. 309-365.
- *Un nuevo sistema de definiciones para la geometría Euclídea*, a. 1900.
  - *\*Numeri interi relativi*, RdM. t. 7, p. 73, a. 1901.
  - *\*Théorie des nombres entiers absolus*, RdM. t. 8 p. 45 a. 1902.
  - *Le problème N. 2 de M. David Hilbert*, Enseign. math., a. 1903.
  - *Un nuovo sistema di definizioni per la geometria euclidea*, LazzeriP. 1903.
  - *\*Che cos'è una relazione?* TorinoA., a. 1906.
  - *\*Ideografia logica*, Ateneo Veneto, a. 1906.
- G. Pagliero, *\*Applicationes de calculo infinitesimali*, Torino, Paravia, 1907.
- G. Peano, *Les définitions mathématiques*, Congrès de phil., Paris 1900.
- *Definicje w matematyce*, Prz. Krygowski, Warszawa 1902.
  - *\*La geometria basata sulle idee di punto e di distanza*, TorinoA. 1902.
  - *\*Aritmetica generale e algebra elementare*, Torino, Paravia 1902.
  - *\*Sulle differenze finite*, Roma Lincei, 1907.
  - *\*Super theorem de Cantor-Bernstein*, RdM. t.8, a. 1906.
- M. Pieri, *Sur la géométrie envisagée comme un système purement logique*. Congrès intern. de philos., p. 367-404, Paris, a. 1900.
- *La geometria delle rette*, TorinoA., a. 1901.
  - *Circa il teorema fondamentale di Staudt*, TorinoA., a. 1904.
  - *Nuovi principii di geometria proiettiva complessa*, TorinoM., a. 1905.
  - *Breve aggiunta ...*, TorinoA., a. 1905.
  - *\*Sur la compatibilité des axiomes de l'arithmétique*, RMM. a. 1906.
  - *\*Sopra una definizione aritmetica degli irrazionali*, Accad. Gioenia di Catania, a. 1906.
  - *Uno sguardo al nuovo indirizzo logico-matematico delle scienze deduttive*. Discorso letto inaugurandosi l'anno accademico 1906-07 nella R. Università di Catania.
- B. Russell, *\*Sur la logique des relations...* RdM. t. 7, p. 115, a. 1901.
- *\*Théorie générale des séries bien ordonnées*, RdM. t. 8, p. 12, a. 1902.
  - *The principles of mathematics*, Cambridge, a. 1903.
- O. Veblen, *A system of axioms for geometry*, AmericanT., a. 1904.
- *The foundations of geometry*, The popular science monthly, a. 1906.
- A. N. Whitehead, *Memoir on the Algebra of symbolic Logic*, Am.J. t. 23, pag. 139, 297, a. 1901.
- *\*On cardinal numbers*, Am.J. t. 24, p. 307, a. 1903.
  - *\*The logic of relations, logical substitution groups, and cardinal numbers*, Am.J. t. 25, p. 157, a. 1903.
  - *\*On mathematical concepts of the material world*. LondonT., t. 205, p. 465-525, a. 1906.
  - *The axioms of projective geometry*, Cambridge, a. 1906.
  - *The axioms of descriptive geometry*, Cambridge, a. 1907.
- Wilson, *The foundations of mathematics*, AmericanB., p. 74, a. 1904.

Præsente tomo de Formulario, de principale vocabulos mathematico, da extensione in linguas moderno, et etymologia, id es, suo origine, que in generale es in Latino-Græco, aut in Indo-Europæo; es dato analysi de vocabulos composito.

Resulta que vocabulos de Mathematica, et in generale, de omni scientia, es internationale, vel commune ad linguas de Europa, ab Italo ad Anglo, ab Hispano ad Russo.

Notas et explicationes, in editiones præcedente scripto in Latino scholastico, in Italo, et in Franco, nunc es scripto in *Latino sine flexione*. Omni elemento es Latino. Vocabulos es reducto ad thema. Non existe grammatica. Vide RdM. t.8 p.74.

Omni vocabulo adoptato in Formulario es commune ad Anglo Franco Hispano et Italo, excepto circa 10 vocabulo, que es minus internationale. Sæpe vocabulo es Germano et Russo.

*Latino sine flexione*, non solo es hodie plus intellecto que omni lingua nationale, sed, sine vinculo de grammatica, habe majore libertate pro elige forma plus præciso.

Pro scribe in *Latino sine flexione*, et in omni systema intelligibile sine studio, nos debe cognosce vocabulario internationale. Vocabulario plus commodo es :

HÈMME, *Das lateinische Sprachmaterial im Wortschatze der deutschen, französischen und englischen Sprache*, 1904.

Me spera de publica, inter pauco tempore, studio plus amplo de isto interessante problema.

Torino, Junio 1908.

G. PEANO.

# TABULA

Numero indica pagina

## *Signos de forma speciale.*

=	« æqua ».	3*	...
⊃	« tunc ».	3* 4*	...
∴	« ∴ ( ) [] »	3*	...
;	« ; »	5* 6*	
!	« ! »	79* 136 143	
'	« ' »	77* 135 139	
^	« et »	3* 4*	...
^	« aut »	10* 33 36-39 42 51 57	
		136 140 142	...
-	« non »	10* 27 31 37-43 140	
∧	« nihil »	12* 46 116 135 143	
		15* 77* 120... 211... 280...	
0 1 2 ... X		27* 29*	
+	« plus »	27* 29* 84* 96* 10	
		135* 144* 149* 168* 169* 18	
-	« minus »	44* 100* 165*	
±		112	
×		32* 84* 96* 106* 136* 172*	
/	« diviso »	45* 97* 149* 185	
↑	« elevato »	34* 108* 136*	
> ≡		37* 92* 98* 110 128 135*	
!	« factoriale »	52* 61 260 358	
∩	« producto logico »	82* 211 4	
∪	« summa »	82* 372	
...	« intervallo »	38* 46 120 12	
—		118* 179* 289 344	
∞	« infinito »	106* 115 141 214	
√	« radice »	108* 153* 257 282	
√*		generico 153* 257	
-1	« functione inverso »	81* 28	

## *Literas Graeco.*

α	« producto alterno »	188* 32	
		378 381 383 385	
β	« mantissa »	103* 219 352	
γ		408	
Δ	« differentia »	130* 134 275*	
δ ∇	« classe derivata »	141* 21	
		238 331 373	

- componente 180\* 451  
 constante, functione 216\* 289  
 continuo, functione 238\* 279 347  
 cont<sub>1</sub> cont<sub>2</sub> cont<sub>3</sub> 458  
 cos(inu) 183\* 250\*. V. sin.  
 crescente, functione 216\* 289 346  
 curvatura 318\* 450 451  
 Cx « numero complexo » 144\*  
     235 238 284 312 409 439  
 Derivata) 275\* 284\* 296\* 305\* 330\*  
     334\* 348 414 416 435 448  
 decrescente, functione 216\*  
 Dg « derivata generale » 414  
 d, distantia) 176\* 179 334  
 dt « denominatore » 103\* 129 271  
 D(e)rm(inante) 146\* 150 258 293  
     305 323 327 442 452  
 D(vr) « maximo divisore commune »  
     54\* 57\* 93\* 100\* 104 111\* 127  
     129 148  
 e « numero de Neper » 241\* 268  
     272 282 297 322 358 394 434  
 E « entier » 102\* 115 119 127 352  
 E « existe » 12\* 36 58 77 135 214  
 ex terno, classe 142\* 331  
 f « præfunctione » 73\* 117 120  
     128 130 211 339  
 J « post-functione » 73  
 F « functione definita » 79\* 82 136  
     144 146 148 275 442  
 Fe « fractio continuo » 270\*  
 gradu 309\* 366  
 Homographia) 452\*  
 Homot(hetia) 183\* 331 444  
     i « unitate imaginario » 152\*  
 I « indice » 198\* 200\* 269 314 454  
 idem 75\* 446  
 imag « coefficiente de i » 152\* 250  
     261  
 Imag « parte imaginario » 186\* 317  
 in(terno, classe) 142\* 286 331 441  
 infn « transfinito » 136  
 integro, functione 308\* 366  
 Interpolante, functione 306\* 327  
 Inter(vallo) 142\* 282 328 339  
 Invar(iante) 151\* 249 453  
 K « conjugato » 152\* 186\*  
 l « limite supero » 105\* 116 213  
     339 374\*  
 l, « limite infero » 105\*  
 Lm « limes » 211\* 219 224 230\* 237  
     302 331 413\*  
 lim(ite) 214\* 232\* 237\* 275 294  
     296 330 436  
 lineare, functione 148\* 330 452  
 Logarithmo 119\* 291 298  
 log (naturale) 242\* 245 261\* 283  
     292 353 362 390 394  
 log\* 261  
 Longitudo 142\* 339 372\* 373 377  
 long 375  
 max(imo) 46\* 286 299 335  
 Medio, classe 133\* 145\* 312 347  
     415 442  
 minimo 47\* 120\* 340 361  
 mlt, m « min. multiplo commune »  
     53\* 100 104 129 148  
 modulo, m 94\* 114 145\* 149\*  
     152 176\* 277 352 360 370  
 Motor 182\* 270  
 mp 63\* 127 129  
 N<sub>0</sub> « numero » 27\* 136\* ...  
 N<sub>1</sub> « naturale » 37\* ...  
 n « relativo » 83\* ...  
 Np « numero primo » 58\* 93 127  
     219 226 249  
 nt « numeratore » 103\* 127 132 271  
 num(ero de) 46\* 52 127  
 Num 135\* 141 226 373 376  
 Oscillatione de functione 374\* 441  
 ord(ine de numero) 51\* 103 119 123  
 p, pnt « puncto » 165\* ...  
 p<sub>1</sub> p<sub>2</sub> 180  
 p<sup>2</sup> p<sup>3</sup> p<sup>4</sup> 190  
 plan(o) 180\* 199\* 237 315 332  
 plan(N)ormale 314\* 323  
 plan(O)sculatore 315\* 323  
 posit(ione) 200  
 prob(abilitate) 143  
 proj(ectio) 180\* 314

Q(uantitate positivo) 106* ...	sgn « signo » 94* 146* 219 352 361
$Q_0 = Q \cup \emptyset$	sim(ile, functio) 75* 82
q(uantitate) 112* ...	sin(u) 183* 199* 250* 265 285 291
q' « numero imaginario » 152* 236	326 358-365 391 396 434
250 285	sin <sup>-1</sup> 261* 361
quot(o) 48* 102	Subst(itutione) 148* 179 249 327
R(ationale positivo) 95* ...	Sym(metria) 181* 270
r(azionale relativo) 100* ...	T(angente, vectore) 316*-319
Rc « radio de curvatura » 316* 390	Tang(ente, figura) 331* 335 450
rep « functio reciproco » 75* 82 225	tang(ente, functione) 253* 285 360
real(e, parte) 152* 186* 250	tang <sup>-1</sup> 261* 285 293 297 353
recta 180* 199* 237 313	Transl(atione) 181* 270
rectaT(angente) 313* 321 332 389	U(nitate) 179* 183 186* 334
rectaN(ormale principale) 316* 322	unit(ate complexo) 145
rectaB(inormale) 316*	v(ectore) 168-208 237 284 312-326
rest(o) 49* 103 123	331-336 370-407 443-447 450-459
S S' S, « integrale » 341* 348* 354*	v <sup>2</sup> v <sup>3</sup> 188* 189* 193*
374* 429-438 439* 443* 451	Variab(ilitate) 80* 186 275
s' s, 339*	Volum(en) 379*-386 444
S(u)b(stitutione) 150* 152	

### *Indice alphabetico, et abbreviationes.*

e indica *etymologia* de vocabulo. Vide Tabula de signos, et Form. t.4 p.393.

a. = anno	area 377e
absoluto = mod, A 156e 185	argumento 261
abstractione (definitione per) 15	arithmetica 65e
acceleratione 311e	assoc(iativo) 6 11 21e 30 33 170 193
acuto (angulo) 208e	asymptoto 393e
acyclico 458	asteroide 402e
additione 66e	axi 316e
aequatione 19e	barycentro 171 203e 446
» de primo gradu 101	basi 34 68e
» » 2.0 » 112 113	binomio 125 226
» » 3.0 » 114 262	binormale 316 319
» characteristico 151 327	calculo, Vide: differentiale, integrale
» differentiale 323 416	cardioide 400 403 405e
» » lineare 323 326 327 431 432	catenaria 395e 398
algebra 154e	caustica 403
alterno (producto) 188 208e	centro de gravitate 203e 446
angulo 206e 264	» curvatura 316
apparente (litera) 7 216 231	characteristica 159e 196
approximatione 290	chorda 205e 370
arcu = Arc, arc 370e	cifra 29 51 66e



- cissoide 405e  
 classe 4 20e  
 » clauso. condensato, perfectio 160e  
 cochleoido 400e  
 combinatione 52 127  
 comm(utativo) 6 10 11 21e 30 32  
     98 108 121 140 170 172 193 217  
     233 246 364 438  
 complexo (numero) = Cx 161e  
 componente 203e  
 conchoide 406e  
 condensato 160 287 296  
 conjugato = K 162e  
 cono 208e 382 447  
 continuo 238e 458  
 convergente, serie 221e 228  
 convergentia æquabile 234 295  
 convexo 145 458  
 coordinata 178 184 195 205e 321  
     322 332 378 383 389  
 correspondentia 73 154e  
 curva de luce 397  
 curvatura 316e 318  
 cycloide 401e  
 cylindro 207e 382 383  
 decrescente, functione 216e  
 deductione 19e  
 D(e.finitione) 14 23e  
 Dfp, definitione possibile 14  
 D(e.m.onstratione) 15 24e  
 denominatore 103 157e  
 derivata =  $\delta$ , D 159e 275  
 determinante = Dtrm 161e  
 differentia =  $-$ ,  $\Delta$  70e  
 differentiale 278e 343  
     » exacto 459  
 dihedro 206e 265  
 directrice 389  
 distantia = dist 203e  
 distrib(utivo) 6 9 11 12 21e 32 34  
     38 47 53 54 82 94 108 120 140  
     170 172 191 218 222 233 269 279  
 divergente, serie 221  
 divergentia de functione 456  
 divisione 70e  
 divisore, maximo commune 54  
 eccentricitate de ellipsi 434  
 elim(inatione) 12 211 223 230  
 ellipsi 327 336 392e 434  
 ellipsoide (Wallis a. 1655) 445  
 energia 311e 336  
 epicycloide 403e  
 errore, V. approximatione, interpo-  
     latione, quadratura.  
 evolvente 402e  
 existe 12 23e 341  
 esponente 34 68e  
 exponentiale, functione 282  
     » linea 326 394  
 export(atione) 8  
 factore 32 68e  
 factoriale = ! 52  
 figura 377 384  
     » tangente 331  
 figurato, numero 52  
 fluxu 457  
 foco 336 389-392  
 formula de binomio 125  
     » Newton 226  
     » Moivre 251  
     » Taylor 299 366  
     » quadratura 366  
     » Simpson 368  
 fortia 196 198 311e 315  
 fractione = R, r,  $\eta$  157e  
     » continuo = Fc 270  
 functione = f, j, F, Funct 154e  
 Geometria 202e  
 geodætica 451e  
 gradiente 334 455  
 gradu 265 309e  
 gravitate 203e 324 446  
 helice 407e  
 hodographo 311e 312  
 homographia 452  
 homothetia 183 204e 331  
 hyperbola 393e  
 H(y)p(othesi) 3 20e  
 imaginario = i, q', imag 162e  
 import(atione) 8

---

inclinatione 276  
 indicatrice 319  
 indice 6 198 200 208e  
 Induct(ione) 27 65e  
 infinito =  $\infty$ , infn 158e  
 infinitesimo 299  
 integro =  $N_0$ , n, E. 157e 30e  
 integrale = S. 342  
     » Euleriano 357  
     » elliptico 434  
     » multiplo 439  
     » de linea et superficie 4  
 interno = in  
     » , producto 172  
 interpolatione 297 306e  
 intervallo =  $-$ , Intv. 158e  
 invariante 151 162e  
 inversione 407  
 labore 172 456  
 emniscata 400  
 linace de Pascal 404e  
 limes limite =  $l'$ ,  $l$ ,  $\lambda$ ,  $\delta$ ,  $L.m.$   
     158e 216e  
 lineare, functione 161e  
 logarithmo 159e  
     » integrale 359  
 logica 3 21e  
 longore 142 372e  
 mantissa 159e  
 massa 171 196 311e  
 majore 37 69e  
 maximo 46 54 70e  
 medio 133 134 159e 298 434  
 minimo 47 53 70e  
 minore 36 69e  
 minus 44 69e  
 modulo 94 156e  
 momento 190 192 198 447  
 motu 182 204e 324 325 436  
 multiplicatione 32 67e  
 multiplo, minimo commune  
 nabla 334  
 negatione 10  
 negativo, numero 83 156e  
 normale 180 204e 314 316

- reale 106 112 152 162e  
 reciproco 75 155e  
 recta 180 203e  
 relativo 83 155e  
 residuo quadratico 93  
 resto 48 70e  
 risultante 169  
 rotatione 268 456  
 scalare 153 172 186e 453  
 segmento 179 205e  
 serie 220e. Vide 2.  
 signo 94 157e  
 simile 75 154e  
 sinu 183 199 204e 250  
   » hyperbolico 260 283  
 sinusoide 396e  
 sinusspirale 400  
 solenoide 459e  
 sphæra 208e 319 331 382 385  
 spira 398e 399  
 substitutione = <sup>1</sup>, Subst. 24e  
 subtangente, subnormale 321 322  
 subtractione 69e  
 summa = +, Σ. 67e  
 syll(ogismo) 5 20e  
 symmetria 181 204e  
 t. = tomo  
 tangente 253 313e 316-322 331 397  
 tetrahedro 190 267 381  
 T(he)s(i) 3 20e  
 torsione 319e  
 tractrice 396e  
 transfinito, numero 136  
 translatione 181 204e  
 transp(orta) 10 11 12  
 triangulo plano 265 446  
   » sphærico 266 445  
 trigonometria 265  
 unitate = 1, unit, i, U. 161e  
 variabile 5 73 80 155e  
 variatione 82 335 371 448  
 vettore 167 202e 454  
 velocitate 269 284e  
 volumen 379e  
 zero 27 65e

*Publicationes periodico citato per abbreviatione in Formulario.*

- AErud. = Acta Eruditorum, Lipsiae a.1682-1757  
 AJ. = American Journal of Mathematics, Baltimore a.1878...  
 AM. = Acta Mathematica, Stockholm a.1882...  
 AmericanB. = Bulletin of the American Math. Society, New-York.  
 AmericanT. = Transactions of the American Mathematical Society, New-York a.1900...  
 Amsterdam Ak. = Versl. d. k. Akad. v. W. te Amsterdam  
 AnnN. = Nouvelles annales de Mathématiques, Paris, a.1840...  
 Annali di Matem. = Annali di Matematica pura ed applicata (Tortolini, ecc). Roma a.1845...  
 Ann(als) of M(athematics), Harvard University, Cambridge U. S. A.  
 BBonc. = Bullettino di bibliografia etc., di B. Boncompagni, Roma a.1868-87  
 BD. = Bulletin des Sciences mathématiques, par Darboux, Paris a.1870...  
 BelgiqueM. = Mémoires publiés par l'Académie R. des sciences de Belgique a.1818...  
 BerlinM. = Mémoires de l'Académie de Berlin, a. 1745 ...

Berolinensia) Misc(ellanea)

BM = Bibliotheca mathematica, pa

BsF. = Bulletin de la Société math

Cambridge Journ = Cambridge Ma

CorrM. = Correspondance Mathéma

Petersbourg a.1843.

CorrN. = Nouvelle correspondance

CR. = Comptes rendus de l'Acadé

DarbouxB = BD.

Encyklopädie der Mathematischen

Formul(aire mathématique), vide p

GergonneA. = Annales de Mathém

IdM. = Intermédiaire des Mathéma

JdM. = Journal de Mathématiques

JfM. = Journal für die reine und

JP. = Journal de l'École Polytech

LazzeriP. = Periodico di Matemati

LinceiR. = Rendiconti della R. Acc

LondonT. = Philosophical Transacti

LondonP. = Proceedings of the R.

LoriaB. = Bollettino di bibliograf

MA. = Mathematische Annalen, I

Mathesis, Recueil Math. publié pa

Mm. = The Messenger of mathem

MünchenA. = Abhandlungen der

senschaften zu München a.1

Monh. = Monatshefte für Mathem

NapoliR. = Rendiconti della Acca

ParisM. = Mémoires de l'Acad. d

ParisSE. = Mémoires présentés par

de Paris (Savants Etrangers)

PetrC. = Commentarii Academiæ

PetrNC. = Novi Commentarii Aca

PetrA. = Acta Academiæ Scienti

PetrNA. = Nova Acta Ac. Sc. Po

PetrB. = Bulletin de l'Ac. des Sc

QJ. = Quarterly Journal of Math

RdM. = Rivista di Matematica,

= Revue de Mathématique

RMM. = Revue de Métaphysique

TorinoA. = Atti della R. Accaden

TorinoM. = Memorie

WarszawaP. = Prace Matematycz

ZeuthenT. = Tidsskrift for Math

Zm. = Zeitschrift für Mathemat

## BIBLIOGRAPHIA

ABEL Niels Henrik, *Œuvres*, Christiania a.1881.

n. Findö (Christiansand, Norge) a.1802, m. Froland (Norge) a.1829.

pag. 4, 125, 222, 223, 226, 228, 234, 236, xii

ABŪ'LWĒFA n. Bouzdjan (Persia) a.940 : astronomo in Bagdad :

traduce operas de Diophanto in arabo : m. Bagdad a.998. 251, 266

Adams 132, 242, 408.

AHAMESU = filio de luna auctore, aut copista, de papyro « Rhind », conservato in British Museum, publicato per

EISENLOHR, *Ein Mathematisches Handbuch der alten Aegypter*, Leipzig a.1877.

Ce papyro, que representa quasi toto scientia mathematica de antiquo Agypto que ad nos perveni, videre de a.—1700; putare copia de tractato de a.—2200. 95, 254

ALBATEGNIO = AL BATTĀNI n. Battān (Mesopotamia) a. 850 ca.

astronomo in Raqqa et in Bagdad : m. Tikrit a.929. 266

ALQĀCHĀNĪ, medico, vocato El-Kasi, astronomo ad observatorio de Samarqand : m. a.1436ca.

— *La clé du calcul*, trad. par Woepcke, d'une copie datée

a.1589, *Annali di Matem.* a.1864 t.6 p.225. 121, 122

ALCHODSCHANDĪ Muhammed, astronomo arabo a.992. 40

Ampère, a. 1775-1836 306

ANTHONISZ A. a.1527—1607

255

APOLLONIO PERGAEO = Ἀπολλώνιος ὁ Περγαῖος a.—250 ca., nato in Perga (Pamphilia) : stude in Alexandria (Egypto) sub discipulos de Euclide : post —200 reside in Pergamo. Magno parte de suo opera es. perduto.

— *Quæ Græce extant*, Edid. Heiberg, Lipsiæ a.1891-93.

174, 175, 390, 391

Appell 198

ARBOGAST L. F. A., *Du calcul des dérivations*, a.1800.

a.1759 n.Mutzig, prof. ad Universitate de Strassburg : a.1803

m.Strassburg. 278, 304

ARCHIMEDE = Ἀρχιμήδης, a.—286 n. Syracusa, filio de astronomo

Pheidias, parente de rege Hierone : stude in Alexandria (Egypto) sub successores de Euclide : a.—216 necato per milite romano, post captu de Syracusa pro defensu de que illo inveni machinas de bello.

— *Opera omnia*, Edid. Heiberg, Lipsiæ a.1880.

122, 172, 215, 252, 255, 342, 351, 383, 385, 390, 392, 399, 446 v

Argand 94.

ARISTOTELE = Ἀριστοτέλης,  
a.—383 n.Stagira (Macedon  
schola peripathetico: a.—321

ARYABHATA, *Leçons de calc*  
n. a.476: a.500-550 doce in  
Arzelà 429 Ascoli

BACHET, C. G. a.1587 ca. n.Br  
ad Milano, postea membro de  
— *Commentaria in Dioph*  
Barrieu 104

BERNOULLI Daniel a. 1700 d  
a.1725-33 prof. in Acad. de  
a.1782 d.76 m.Basilea.

BERNOULLI Jacobo a.1654 d  
migra in Helvetia verso fin  
de religione. a.1687 post itin  
tate de Basilea. Cum suo fratri  
niz. a.1705 d.228 m.Basilea.

— Opera, Genevæ a.1744.  
122, 124, 132, 133, 256, 310

BERNOULLI Johanne a.1667  
1705, prof. in Groningen; p  
fratre: a.1748 d.1 m.Basilea

— Opera, a.1742.  
126, 129, 218, 223, 226, 248  
396, 398, 400, 432, 451

BERNOULLI Johanne II, a.1  
prof. de math. in loco de

BERTRAND Joseph, a.1822  
a.1844-95 prof. ad Polytech

BINET Jacques, a.1786 d.33  
France: a.1856 d.133 m.Pa  
Bikmore 61 Bliss 429

BOLZANO Bernard, *Rein c*  
a.1781 n.Prag: prof. de p  
m.Prag.

BOMBELLI Rafael, *L'Algel*

BONNET Ossian a.1819 n. :  
a.1892 m.Paris.

- BOOLE George, *The laws of thought*, London a.1854.  
 a.1815 d.306 n. Lincoln (Angl.): prof. ad Queen's College de Cork: a.1864  
 d.343 m. Ballintemple (Cork). 16, 148
- Boorman 242
- BORCHARDT C. W., *Gesammelte Werke*, Berlin a.1888.  
 a.1817 n.Berlin: a.1848 prof. ad Univ.: a.1880 m.Berlin 384
- BRAHMAGUPTA, n. a.598, mathematico et astronomo indiano.  
 — Journ. Asiatique a.1878, trad. par Rodet. 112
- BURALI-FORTI, a.1861 d.225 n.Arezzo: prof. ad Accad. Militare, Torino.  
 17, 31, 82, 201, 456, viii, xiv
- Burckhardt 62.
- Caluso (Valperga di), Torino a.1737-1815. 359
- CANTOR Georg, a.1845 d.62 n.Petroburgo: prof. ad Universitate de  
 Halle a. S. 61, 135, 137, 138, 141, 372, 373, 414
- Carnot a.1753-1823 172, 175 Castellano viii Castiglioni 405
- Cataldi 270 Catania xiv
- CATALAN Eugène Charles a.1814, d.150 n.Bruges: a.1894, d.45 m.Liège  
 222, 223
- CAUCHY Augustin, a.1789 d.233 n.Paris: a.1810-13 ingeniero navale ad  
 Cherbourg: a.1814-30 prof. ad Èc. pol. et ad Sorbonne: a.1831-33 prof.  
 de physica sublime ad Torino: 1833-38 præceptore de duca de Bourgogne:  
 a.1839-48 vive privato in Paris: a.1849-57 prof. ad Sorbonne: a.1857 d.142  
 m.Sceaux (Paris).  
 52, 64, 88, 90, 93, 94, 118, 120, 133, 147, 151-153, 188, 215, 217, 218,  
 222, 224, 225, 229, 234, 236, 239, 244, 248, 266, 278, 293, 303, 304,  
 307, 343, 347, 354, 356, 362, 364, 412, 417, 429, 433, 435, 438, xi  
 — a.1821 = *Analyse Algèbrique*. Paris a.1821 = *Œuvres* s.2 t.3  
 — *Œuvres*, Paris a. 1882-1900
- CAVALIERI Bonaventura, a.1598 n.Milano: a.1615 ingredi in ordine  
 de jesuatos: a.1601 stude in Pisa, discipulo de Galileo: a.1629 prof. in  
 Bologna: a.1647 d.335 m.Bologna.  
 288, 342, 352, 368, 381, 382, 444, 445  
 — a.1635 = *Geometria indivisibilibus continuorum nova qua-*  
*dam ratione promota*. Bononiae a.1635  
 — a.1639 = *Centuria di varii problemi* etc., Bologna
- CAYLEY Arthur, a.1821 d.228 n.Richmond (Surrey): a.1838-42 stude in  
 Trinity College, Cambridge: a.1849-63 notario in London: a.1863-1895  
 prof. de mathematica ad Univ. de Cambridge: a.1895 d.26 m.Cam-  
 bridge. 148, 151, 185, 195, 196, 198, 271  
 — *Mathematical Papers* Cambridge a.1889-98

- CESÀRO Ernesto, a.1859-1906, prof. ad Universitate de Napoli.  
126, 127, 219, 240, 299, 398
- Charles 182 Chelini 189
- CHUQUET Nicolas, « parisien, Bachelier en medecine ». 3
- Cipolla xiv Clausen 132, 256 Clifford 456 Coqué 433
- COTES Roger, a.1682 d.183 n.apud Leicester: a.1699-1707 stude in Trinity College, Cambridge: discipulo de Newton, editore de 2<sup>o</sup> editione de suos *Principia*: a.1707 prof. de astron.: a.1716 d.157 m. Cambridge.
- *Logometria* a.1714, London T. t.29 p.4-60.
- *Harmonia mensurarum*, éd. Smith, Cantabrigiæ a.1722.  
242, 249, 257, 261, 265, 360, 368
- CRAMER Gabriel, a.1704 d. 213 n.Genève: prof. de Math. ad Acad. de Genève: a.1752 d.4 m.Genève. 147
- *Introduction à l'analyse des courbes algebriques*, a.1750.
- Conturat 16, 17, xiv.
- DAHSE Zacharias, a.1824 d.175 n.Hamburg: calculatore prodigio.  
62, 256, 263
- DARBOUX Gaston, a.1842 d.226 n.Nimes: prof. ad Coll. de France et ad Sorbonne. 118, 296, 343
- Daker 336 D'Arcais 226, 303 Davis 62
- DEGEN C. F., a.1766 d.305 n.Braunschweig: prof. ad Univ. de Kôbenhavn: a.1825 d.98 m.Kôbenhavn. 90
- de LAGNY Thomas Fantet a.1660—1734. 174, 256
- DE LA GOUPILIERE 400
- DE LAMBRE J. B. Jos., a.1747 d.262 n.Amiens: prof. de astron. ad Collège de France: a.1822 d.231 m.Paris. 263, 266
- DE L'HOSPITAL G. F., a.1661 n.Paris: a.1704 m.Paris. 294, 391
- DE MORGAN Augustus, a.1806 d.150 ca. n.Madura (Madras): a.1828-67 prof. ad Univ. de London: a.1871 d.78 m.London. 5, 16, 34
- DESCARTES René, a.1596 d.90 n.Lahaye (Touraine): ex patre deputato de Bretania: a.1604-12 stude in collegio de la Flèche sub Jesuitas: a.1617 fi militare sub Nederlandia: post a.1619 visita plure regione de Europa: a.1629 habita apud Amsterdam: a.1649 vocato ad Stockholm per Regina de Sverige: a.1650 d.42 m.Stockholm.
- *Œuvres*, ed. Ch. Adam et P. Tannery, Paris a.1897...  
34, 195, 313, 332, 406
- DINI Ulisse, a.1845 n.Pisa: a.1866 prof. ad Universitate de Pisa.  
226, 234, 295
- DIOCLE a. +550 ca. 405
- DIOPHANTO, *Διοφάντου Ἀλεξανδρέως Ἀριθμητικόν*.  
vive inter +200 et +400. 52, 85, 89, 101, 113



DIRICHLET (Lejeune) Gustav, Werke, Berlin, a.1889.

a.1805 d.44 n.Düren (Aachen): a.1822-27 in Paris: a.1827-29 prof. ad Univ. de Breslau: a. 1831 de Berlin; a.1855 de Göttingen: a.1859 d.125 m.Göttingen. 60, 225, 226, 347, 352, 362, 364, 436

Dickson 31 Dixon 126 Du Bois-Reymond 373, 375, 441

EISENSTEIN Ferd. *Mathematische Abhandlungen*, Berlin, a.1847.

a.1823 d.106 n.Berlin: a.1847 Privato docente in Universitate de Berlin: a.1852 d.285 m. Berlin. 218, 230, 235

EUCLIDE = *Ἐυκλείδης*, a.—300 ca. doce in Alexandria (Ægypto).

— *Opera omnia*, edid. Heiberg, Lipsiæ, a.1883-88.

40, 42, 53-56, 58-60, 86, 88, 95, 96, 98, 99, 109, 112, 121, 166, 167, 173, 174, 176, 177, 179, 215, 257, 264, 265, 313, 342, 351, 382, vi

EULER (Eulero) Leonhard, a.1707 d.105 n.Basilea: discipulo de Jacobo Bernoulli: a.1727-41 membro de Acad. de Petroburgo: a.1741-65 præsidente de Acad. de Berlin: a.1766 revocato in Russia; fi cæco: a.1783 d.250 m.Petroburgo.

3, 42, 52, 56, 60, 61, 64, 86, 88, 90, 118, 125, 126, 129, 130, 132, 152, 175, 182, 184, 226, 228, 230, 242, 243, 245, 248-252, 254, 258-264, 271, 272, 355, 357, 358, 361-365, 408, 417, 434, 447, 449, xi.

— a.1748 = *Introductio in analysin infinitorum*, Lausannæ.

— a.1768 = *Institutiones Calculi integralis*, Petropolis.

Eutocio, a. +500 ca. 393 Fano viii

FERMAT Pierre, a.1608 n.Beaumont de Lomagne (Toulouse): deputato de Toulouse: a.1665 d.12 m.Toulouse.

— *Œuvres*, Paris a.1891. 40, 42, 43, 59, 60, 122, 128, 352, 355

FOURIER J-B. Joseph, *Théorie analytique de la chaleur*, Paris, a.1822.

a.1768 d.81 n.Auxerre: filio de sartore: a.1796 prof. ad Ec. pol. in Paris; seque Bonaparte in Ægypto: a.1802-15 præfecto de l'Isère: a.1830 d.136 m.Paris. 244, 435

Frenet 319 Fréquet 384

FRÉNICLE B., a.1605 n.Paris: consiliario de Rege: a.1675 m. 127

FRESNEL Augustin, a.1788 d.131 n.Broglie (Eure): a.1804-06 disce in Ec. pol.: ingeniero de pontos et stratas: a.1827 d.195 m.Ville d'Avray (Paris). 364

Frobenius 151 Fuchs 433

GAUSS Karl Friedrich, a.1777 d.120 n.Braunschweig: a.1791-95 stude in Collegium Carolinum de Braunschweig: a.1795-98 in Göttingen: a.1807 prof. ad Univ. et directore de observatorio in Göttingen: a.1855 d.54 m.Göttingen. 64, 127, 146, 148, 152, 153, 251, 257,

— Werke, a.1863... 258, 408, 434, 457

- GALILEI Galileo n. Pisa a.1564, m. Arcetri (Firenze) a. 1642.  
325, 401, 447
- GERGONNE J., a. 1771 d.170 n.Nancy: prof. ad Nîmes et ad Montpellier.  
4, 255
- GENOCCHI Angelo, a.1817 d.64 n.Piacenza: a.1846 prof. de jure romano  
ad facultate de Piacenza: a.1848 in Torino: a.1857 prof. de calculo  
infinitesimale ad Univ. de Torino: a.1889 d.64 m.Torino. 132, 299
- GERMAIN Sophie, a.1776 d.92 n.Paris: a.1831 d.188 m.Paris. 61
- GIRARD Albert, de Nederlandiā: m. a.1633 60, 63, 154, 445  
— a.1629 = *Invention nouvelle en l'algebre*, Amsterdam.
- Giudice viii Glaisher 62, 127, 258, 408 Goldbach 61
- Gordan 245, 257 Goursat 296, 435
- GRASSMANN Hermann, Werke, a.1894,  
a.1809 d.105 n.Stettin: a.1827-30 stude Theologia in Berlin: a.1836  
prof. de math. in Scholas secundario de Stettin: a.1877 d.265 m.Stettin.  
148, 167, 173, 188, 195. 198, 200, 201, 288, 330, 455, 456
- Green, a. 1793-1841 334
- GREGORIUS a S. Vinc. S. J. n. Bruges 1574, m. Gand 1667 353, 393
- GREGORY (Gregorio) James, a.1638 d.300 ca. n.Aberdeen (Scotia):  
pertine ad familia de mathematicos; nepote de Alex. Anderson disci-  
pulo de Vieta: stude in Padova; a.1669 prof. ad Univ. de St.Andrews  
et postea de Edinburgh: a.1675 d.270ca. m.Edinburgh.  
— *Exercitationes geometricæ*, Londini a.1668. 246, 264, 368
- Grienberger 256 Gudermann 250 Guilmin 105
- Hagen 222 Halphen 182
- HAMILTON William Rowan, a.1805 d.216 n.Dublin: a.1824 prof. ad Uni-  
versitate et direttore de observatorio de Dublin: a.1865 d.245 m.Dunsink.  
153, 167, 173, 179, 185, 186, 188, 198, 200, 334, 453, 455, 456
- HARRIOT Thomas, a.1560 n.Oxford: a.1585 seque Sir Walter Raleigh in  
Virginia; publica statistica de ce provincia: veni in Anglia, pension-  
nario de conte de Northumberland: a.1621 d.183 m.London.  
— *Artis Analyticæ praxis*, Londini a.1631. 40, 41, 445
- Hartmann 392 Hatzidakis 126 Haussner 61 Heaviside 456 Heine 239
- HERIGONE Pierre, *Cursus Mathematicus*, Paris a.1636-46. 124
- HERMITE Charles, a.1822 n.Dieuze (Meurthe): a.1842 stude in école  
pol.: prof. ad école pol. et ad Sorbonne: a.1901 m.Paris. 245
- HERONE = *Heron* a. —150. 265, 378
- Hilbert 240 Huntington 31, xiv Hurwitz 336
- HUYGENS Christiano, Haag 1629-1695 390, 396

- IBN ALBANNA, Granata a.1275 122
- JACOBI K. G., Werke Berlin a.1881-91.  
 a.1804 d.345 n.Postdam: a.1824-42 prof. ad Univ. de Berlin et de  
 Königsberg; visita Italia: a.1851 d.49 m.Berlin.  
 230, 251, 278, 328, 330, 442, 455
- Jensen 249 Jones 250, 254, 262
- Jordan 371, 372, 435, 441 Jourdain 423, xiv
- Kämpfe 363 Keill 392
- KEPLER Johann (Keplero), a.1571 d.361 n. Weil (Wurtemberg): in  
 juventute servo in taberna de suo patre: a.1593 professore de mathe-  
 matica ad Graetz in Styria: a.1599-1601 auxilia Tycho Brahe in  
 suo labores astronomico in Praga; succede ad illo ut astronomo de  
 imperatore Rodulpho II: a.1630 d.319 m.Ratisbona.
- Opera ed. Fritsch. 310, 342, 359, 381, 386, 391, 392, 444
- Königs 199, 269 Kochanski 255 Koralek 248
- KRAMP Christiaan, a.1760 d.192 n.Strassburg: prof. ad Univ. de Strass-  
 burg: a.1826 d.133 m.Strassburg. 52
- KRONECKER Leopold, Werke, a.1878.  
 a.1823 d.341, n.Liegnitz (Schlesien): discipulo de Kummer: a.1891  
 d.363 m.Berlin 94
- KUMMER E. E. a.1810 d.29 n.Sorau (Saxe): a.1828-31 stude in Halle:  
 a.1842 prof. ad Univ. de Breslau: a.1855 in Berlin: a.1893, d.134,  
 m.Berlin 127
- Lacroix 417 Lagny 174, 256
- LAGRANGE Joseph Louis, a.1736 d.25 n.Torino: a.1755 prof. adjuncto  
 ab Schola de artilleria de Torino: a.1766-87 succede ad Euler ut præ-  
 sidente de Acad. de Scientias de Berlin: post morte de Federico II  
 vocato ad Acad. de Scientias de Paris: prof. ad Polytechnico: a.1813  
 d.100 m.Paris.
- *Œuvres*, Paris a.1867-92. In ce editione, notationes de Lagrange es  
 modificato.  
 62, 90, 91, 120, 126, 129, 151, 199, 250, 271, 278, 300, 307, 310, 366,  
 434, 441, 442, xi
- Laguerre 148, 151, 359, 362
- LAMBERT Johann Heinrich, n. a.1728 d.239, m. a.1777. d.268.  
 16, 226, 242, 245, 257
- LAMÉ Gabriel, n.a.1795 d.234: m.a.1870 d.121 Paris. 91, 334
- LAPLACE Pierre Simon, a.1749 — 1827. 147, 310, 334, 362-364
- LE BESGUE Victor Amédée, a.1791 d.275 n.Grandvilliers (Oise): a.1838  
 prof. ad Univ. de Bordeaux: a.1875 d.163 m.Bordeaux.
- *Exercices d'analyse numérique*, a.1859. 53, 56
- Lebesgue, n. a.1875 240, 371, 375, 376, 384

- LEGENDRE A. M., a.1752 d.261 n. Paris: a.1775-80 prof. ab Schola militare in Paris: a.1783 membro de Academia de Scientias: a.1824 perde functione pro politica: a.1833 d.10 m. Paris.  
43, 60, 87, 93, 102, 127, 174, 219, 251, 257, 310, 357, 358
- LEIBNIZ Gottfried Wilhelm (LEIBNITIO), a.1646 d.174 n.Leipzig, a.1716 d.319 m.Hannover.
- *MathS.* = *Mathematische Schriften*, ed. Gerhardt, a.1848-63.
- *PhilS.* = *Die philosophischen Schriften*, a.1875-90  
3, 4, 16, 17, 56, 61, 62, 92, 94, 129, 146, 223, 224, 256, 258, 263, 264, 277, 336, 342, 343, 395, 431, vii
- LEONARDO PISANO, de filiis Bonaccii, filio de notario de mercatantes de Pisa: habita longo tempore in Bugia de Barberia; postea i in Egypto et in Oriente. 59, 112, 272
- *Liber abbaci*, a.1202. (ed. Boncompagni, Roma, a.1857.)  
Leverrier 250 Levi-Civita 310
- LINDEMANN F., prof. ad Universitate de München. 29, 257
- LIOUVILLE Joseph, a.1809 d.83 n.: prof. ad Sorbonne: a.1882 d.251 m. Paris. 63, 242
- Lionnet 127 Lipschitz 429
- LORIA Gino, a.1862 n.Mantova, prof. ad Universitate de Genova. 154, 398, 401
- LUCAS Édouard, *Théorie des nombres*, Paris, a. 1891.  
a.1842 d.94 n.Amiens: a.1891 d.281 m.Paris. 53, 57, 61, 62, 64
- Ludolpho a Ceulen 256 Lüröth 239 Machin 256, 262
- MACLAURIN Colin, a.1698 d.45ca. n.Kilmoddan (Inverary): a.1717 prof. in Aberdeen: a.1725-46 prof. ab Univ. de Edinburgh: a.1746 d.165 m.York, ubi fuge revolutione. 41, 303, 304, 355
- *A treatise of Fluxions* a.1742.
- MANSION Paul, a.1844 d.154 n.Marchin les-Huy: a.1867 prof. ad Univ. de Gand, editore de « Mathesis ». 148, 222
- Marcolongo, n. a. 1862, prof. Univ. Napoli. 456, viii
- MASCHERONI Lorenzo, a.1750 d.134 n.Castagnetto (Bergamo): abbate professore in lycæo de Bergamo, postea prof. in Univ. de Pavia: a.1800, d.212 m.Paris. 255, 359, 408
- Maxwell 455, 457, 459
- MERCATOR Nicolao (Kaufmann), a.1620ca. n.Cismar (Holstein): stude in Kopenhagen: a.1160ca. visita London, postea habita in Francia: a.1187 d.40ca. m.Paris.
- *Logarithmo-technia*, Londini a.1668. 131, 246, 293
- MERTENS F. C. J., a.1840 d.80 n.Wreschen (Posen): a.1865 prof. ad Univ. de Krakau. 60, 225

- METIO Adriano, a.1571 — 1635. 255  
 Mie 429 Minkowski 384
- MÖBIUS August F., a.1790 d.321 n.Schulpforta: prof. ad Univ. et direttore de osservatorio de Leipzig: a.1819 d.270 m.Lieipzig.  
 — *Werke*, Leipzig a.1885. 14, 172, 190, 195
- Moigno 433 Moivre 144 Monge 316 Moore 240, xiv  
 Mozzi 182 Muir 126
- NEPER John (Napier, Nepero), a.1550 n.Merchistoncastle (Edinburgh) visita Europa, post 1571 habita semper suo castello; puritano, membro de synodos presbyteriano: a.1618 d.104 m.Merchistoncastle (Edinburgh).  
 — *Mirifici logarithmorum canonis descriptio* a.1614. 119, 242, 266, 267
- NEWTON Isaac, a.1643 d.5 n.Woolsthorpe: a.1660 stude in Trinity-College, Cambridge: a.1669-1701 prof. in Cambridge ubi succede ad suo magistro Barrow: a.1699 direttore de Monetas in London: a.1701 deputato: a.1727 d.89 m.London. 3, 226, 227, 244, 252, 264, 278, 306, 325, 326, 327, 369
- NICOLE François, a.1683 d.357 n.Paris: membro de Acad. de Scientias - a.1758 d.18 m.Paris. 128
- Nicolai 408 Nicomede a. —100 407 Oltramare 93  
 Osborn 127 Osgood 429, 437 Ostrogradski 457
- OUGHTRED Guilielmo, a.1574 n.Eton: a.1660 m.Albury. 32, 250
- PACIUOLO Luca, a.1440ca. n.Borgo San Sepolcro: doce in Napoli, Milano, Firenze, Roma, Venezia: a.1515ca. m. 82
- PADOA Alessandro, a.1868 d.288 n.Venezia, prof. ad R. Istituto Tecnico de Cagliari. 79, 103, ix, xiv
- PAGLIERO Giuliano 389-407, xiii, xv
- PAPPO = Πάππος, a.300ca. Suo opera es specie de encyclopædia de mathematica apud Græcos. 98, 389, 391
- Parseval 434
- PASCAL Blaise, a.1623 d.170 n.Clermont-Ferrand: a.1662 d.231 m.Paris.  
 — *Œuvres*, Paris a.1889. 52, 123, 125, 126, 401, 404
- Peacock 264 Peirce 148, 255 Perry 291 Pervouchine 60
- Picard 433 Pieri xi, xiv Pierpont 441
- PLANA Giovanni, a.1781 d.312 n.Voghera: a.1811 prof. Torino, Univ.: a.1813 direttore de osservatorio: a.1864 d.20 m.Torino. 355
- Plücker 196 Poincaré 299
- POINSOT Louis, a.1777 d.3 n.Paris: a.1809-10 prof. ad École polytechnique: a.1859 d.339 m.Paris. 189, 196-198, 336
- PRINGSHEIM Alfred, a.1850 d.245 n.Ohlau (Schlesien): a.1877 prof. ad Univ. de München. 105, 225, 229, 304, 347

- Poussin (de la Vallée) 374 375 429 Proth
- PTOLEMÆO Claudio = *Πτολεμαῖος Κλαυδῖος*
- PYTHAGORA = *Πυθαγόρας* n.Samos a.—570  
a.—490 doce in Crotona ubi funda schola:  
Raabe 133
- RECORDE Robert, n. Wales a.1500ca.: medi  
ford: a.1558 m. London
- REGIOMONTANO (JOANNES DE REGIO MONTANO)  
n.Königsberg: a.1476 d.188 m.Roma.  
— *De Triangulis... libri quinque*, Norimbergae  
Resal 269 Riccati 260 Richardson 43
- RIEMANN Bernhard, *Werke*, Leipzig, a.1826  
a.1826 d.260 n.Breselenz (Hannover): prof.  
d.201 m.Selasca (Lago Maggiore).  
Rimondini 369 Roberval a. 1602-1675 3
- ROLLE Michel, a.1652 n.Ambert, Auvergne:  
Romano Adriano 256 Rouché 310 Russell
- de SAINT-VENANT, a.1797 n.Portoiseau (Melle)  
pol.; ingeniero: a.1886 m.St. Ouen (Vendôme)  
Sarasa 353 Scheffer 371 Schlömilch  
Schröder a.1841-1902 16 Schwarz 307  
Seelhoff 60 Seidel 248 Serret 271  
Sibirani 384 Simpson a.1710-1761 368  
Sharp 256 Smith a. 1827-1883, prof. Oxford  
Specht 255
- STAUDT K. G., a.1798 d.24 n.Rothenburg: a.1807  
de Erlangen: a.1867 d.152 m.Erlangen.  
Steiner 336
- STEWART Matthew, a.1717 n.Rothsay, Scotland  
burgh, Univ.: a 1785 d.23 m.Edinburgh.  
— *Propositiones geometricae more ratiocinandi*
- STIELTJES Thomas Jean, *Essai sur la théorie des courbes*  
a.1856 d.364 n.Zwolle (Over-Yssel, Nederland)  
observatorio de Leyden: a.1885 prof. ad  
a.1894 d.365 m.Toulouse.
- STIFEL Michael, a.1487ca. n.Esslingen (Württemberg)  
seque Luther ad Wittemberg: a.1559 prof.  
d.109 m.Jena.
- STIRLING James, a.1696ca. n.St. Ninians  
Leadhills.  
— *Methodus differentialis*, Londini a.1704

- Stokes 457      Stolz 250      Störmer 262      Sturm 336
- SYLVESTER J. J. a.1814, n.London: a.1897, m.London.      127, 151  
J. Tannery 226, 234      P. Tannery 43, 89
- TARTAGLIA Nicolò, n.Brescia a.1506ca.: doce mathematica in Venezia:  
a.1557 d.347 m.Venezia.      114, 125
- TAYLOR Brook, a.1685 d.230 n.Edmonton (Middlesex): stude in Cam-  
bridge: a.1731 d.363 m.London.      303, 304  
— *Methodus incrementorum directa et inversa*, Londini a.1715.
- TCHEBYCHEF P. L., a.1821 d.147 n.Borowsk (Moscov): a.1859 prof. Pe-  
troburgo, Univ.: a.1894 d.343 m. Petroburgo.  
— Œuvres, St. Petersbourg a.1899 t.1      61, 219, 249
- THALETE = Θαλῆς, n.Mileto (Asia Minore) a.—640ca.: stude in Ægypto  
funda schola ionico: m. a.—548ca.      175
- Thibaut 256      Thomæ 343, 350      Tinseau 315
- TORRICELLI Evangelista, a.1608 n.Piancaldoli: stude in Roma sub B.  
Castelli, discipulo de Galileo: a.1647 d.298 m.Firenze.      355
- TSCHU SCHI KIH, a. 1303. Vide JfM. a.1856 t.52, p.87.      125  
Vacca ix      Vailati viii
- VANDERMONDE C. A., a.1735 n.Paris: a.1796 d.1 m.Paris.      125, 147  
Veblen xv      Vetzig 336
- VEGA Georg, a.1756 — 1802.  
— *Thesaurus logarithmorum* a.1794.      242, 256, 263
- VIETA FRANCISCO, a.1540ca. n.Fontenay-le-Comte: protestante: a.1580  
Magistro de requisitiones de Rege: a.1603 d.347 m.Paris.  
3, 113, 251, 255, 256, 262
- VIVANTI Giulio, a.1859 d.144 n.Mantova prof. ad Universitate de Messina.  
Vitali 376      Vivanti 141, viii
- VIVIANI Vincenzo a.1622 d.95 n. Firenze: discipulo de Galileo et de  
Torricelli: ingeni-ero et mathematico de Granduca de Toscana: a.1703  
d.265 m. Firenze      445
- WALLIS John, a.1616 d.327 n.Ashford (Kent): stude Theologia in Cam-  
bridge: a.1649 prof. Oxford, Univ.: a.1703 d.301 m.Oxford.  
— *Opera Mathematica*, Oxoniæ, a.1695.  
103, 124, 126, 129, 215, 259, 272, 342, 355-357, 397, 399, 401, 406
- WARING Edward, a.1736ca. n.Shrewsbury: a.1760 prof. Cambridge,  
Univ.: a.1798 d.227 m.Plealey (Shrewsbury).      62, 306
- Weber 258

**WEIERSTRASS Karl, Werke a.1894.**

a.1815 d.303 n.Ostenfelde (Kreis Münster): a.1834-38 stude jure in Bonn: a.1838-40 stude *privatim* mathematica in Munster sub Gudemann: a.1856 prof. Berlin, Univ.: a.1897 d.50 m.Berlin.

94, 105, 153, 229, 234-236, 238, 288

**WESSEL Caspar, a.1745 d.159 n.Jonsrud (Vestby-Sogn): agrimensore geometra: a.1818 d.84 m.Köbenhavn.**

— *Essai sur la représentation analytique de la direction*, Copenhague, a.1897. (traduct. de l'original de l'a.1797). 167, 185

Whitehead xv Wilson 62, xv Wren 401

Zehfuss 103 Zermelo 423

## Abbreviationes in Bibliographia.

n. = nato. m. = mortuo.

Nomen proprio de Auctore Europæo es scripto secundo forma adoptato per auctore.

Nomen de urbe habe forma nationale.

## CORRECTIONES

indicato per Doctores Chionio, Korselt, Pagliero, Pensa, Sannia.

+ indica linea ab summo ad imo; —indica linea ab imo ad summo.

pag. 3, linea —9: in loco de  $(pq)r$  lege  $(pq)\supset r$ .

4 —3

$a \subset b$   $a \supset b$ .

8 —3

$beN_1 + a$   $beN_1 \times a$

28 —12

0 et  $N_0$  0 et +

44 +6

$\S_1 P \cdot 1$   $\S_1 P^2 \cdot 2$

45 Prop. 1·8

$a \times b \cdot c$   $a \times c/b$

linea —1

$\S -$   $\S /$

51 §ord P·4

$\leq \leq$   $\leq \Rightarrow$

82 P1·1

$x \varepsilon \cap u$   $x \varepsilon \cup u$

P1·2

$\cap u \cap v$   $\cup u \cup v$

P1·6, dele.

95 linea 15, 16, 17

$N_0$   $N_1$

104 P2·1

$\cup$   $\cap$

113 P·3


$x = \dots y = \dots$   $2x = \dots 2y = \dots$

120 linea —15

$\Sigma f, a \cdots b$   $\Sigma(f, u)$



126	P16·7	1.0 membro	$\Sigma[(-1)^r C(n,r)/(n+r+1) r,0\cdots n]$
130	P1·2	$a \times f$	$c \times f$
144	P·2	$m$	$n$
	P·3 linea 3	NumCls'	Cls'
145	P4·0	$\Delta$	$\nabla$
205	N. 381	(297)	(301)
	N. 386	(298)	(302)
207	N. 421	(363)	(403)
217	P9·3, adde Hp $\alpha \varepsilon Q f N_0$		
221	linea +16	P4·2	P4·1
	—4	$n > h/p$	$n > p/h$
223	+1	P·3	P·5
227	—10	P25·4	P24·4
246	+17	P3·1	P5·3
	+18	$\S \text{lim } 41\cdot1$	$\S \text{lim } 31\cdot1$
	+24	$\S \text{lim } 25\cdot4$	$\S \text{lim } 25\cdot1$
228	+5	$\S \Sigma 15\cdot4$	$\S \Sigma 14\cdot4$
	+21	$\S q 12\cdot4$	$\S q 13\cdot4$
237	+5	$\Delta$	$\nabla$
248	+10	P4·1	P6·1
263	P6·2 Hp ut in P·3.		
291	linea +4	$<h$	$<mh$
	+14	$1+Q$	$q$
295	P28 adde Hp : $\Sigma[f(x,n) n, N_0] \varepsilon q$ . Vide pag. 364 P40.		
332	linea —16	$Q, 0$	$Q, x$
358	P25·8, adde Hp $m+n \varepsilon N_0$		
383	+10	$r^3$	$(2r)^3$
386	—6	$r^2h$	$rh^2$
394	linea —4, —6, pag. 395 lin. —4, —5, pag. 397 lin. +6, +7, —6		
		$\mu$	$\mu\theta$
412	+15	$\S 30$ P4·1	pag. 423
431	+17	$e \nabla S$	$e \nabla S$
	—10	$-hx$	$+hx$
438	+2, adde Hp : $f \varepsilon$ cont.		
449	—11	$1-x$	$b-x$
	—9	$h0=h1=0$	$ha=hb=0$
		$h'q$	$g'q$
	—8	$x(1-x)$	$(x-a)(b-x)$



---

**Revista de Mathematica** per G. Peano — Tomo 1,  
anno 1891, L. 8 - Tomo 2, anno 1892, L. 8 -  
Tomo 3, anno 1893, L. 8 - Tomo 4, anno 1894,  
L. 8 - Tomo 5, anno 1895, L. 8 - Tomo 6, anno  
1896-99, L. 8 - Tomo 7, anno 1900-1901, L. 8 -  
Tomo 8, anno 1902-1907, L. 8.

**Formulaire Mathématique.** — Introduction, a. 1894, L. 2 -  
Tome 1, a. 1895, L. 6 - Tome 2, a. 1899, L. 8 -  
Tome 3, a. 1901, L. 8 - Tome 4, a. 1903, L. 10.

**Formulario Mathematico.** — Tomo 5, L. 20.

---

*Apud* **Fratres Bocca**, Librarios-Editores, TORINO

---

Sci 895.55

# FORMULARIO MATHEMATICO

EDITO PER

**G. PEANO**

Professore de Analysis infinitesimalis in Universitate de Torino

*Formulaire de mathématiques*  
=

EDITIO V

(Tomo V de Formulario completo)

*part*



TORINO

Apud FRATRES BOCCA

LIBRARIOS EDITORES

1905

(Fasciculo 1)



I

# LOGICA-MATHEMATICA

Formul. t. 5

1.





T

# I. LOGICA

§1

Signo = vale « æqua »,   
  $a, b, \dots x, y, z$  indica obj  
 Nos pote scribe primo propos

$$\cdot 1 \quad x=x$$

Lege: «  $x$  æqua  $x$  ». Numero

Signo  $\supset$  vale « tunc ».

Puncto . :  $\therefore$  :: etc.

formula in partes.

$$\cdot 2 \quad x=y \supset y=r$$

Duo puncto divide propositi  
hypothesi », abbreviato in Hp  
parte  $y=x$  es « thesi », abbrevi

Signo  $\wedge$  vale « et ». Nos

$$\cdot 3 \quad x=y \wedge y=z \supset$$

« si  $x=y$ , et si  $y=z$ , tunc  $x=z$  »

Tres puncto divide propositio  
parte, que forma hypothesi, sig

Nos conveni, in P-3 (lege:  $pq \supset r$  vale  $(pq)r$ , et  $p \supset qr$  vale

Signo de æqualitate habet form  
de Vieta ad Leibniz. Forma  $=$ ,  
es hodie commune in Mathemat

Chuquet, Leibniz, Newt  
partes per lineam horizontalem sup  
hodie in plure tractato pro indi  
cum valore actuale, es introduc

Uso de punctos, indicato per





§2 Cls  $\varepsilon$ 

Cls significa « classe ».

Si  $a$  es Cls,  $x \varepsilon a$  vale «  $x$  es  $a$  », vel «  $x$  es individuo de classe  $a$  ».

Si  $a$  et  $b$  es classe,  $a \supset b$  vale « omni  $a$  es  $b$  » vel «  $b$  contine  $a$  » vel « si aliquo objecto es  $a$ , tunc illo es  $b$  ».

Si  $a$  et  $b$  es Cls,  $a \wedge b$ , vel  $ab$ , es classe commune ad  $a$  et ad  $b$ ; id es,  $ab$  es classe de objecto, que es  $a$  et es  $b$ .

In lingua familiare, nomen commune et adjectivo indica classe; « plurale » saepe indica relatione  $\supset$ :

« homines sunt mortales »      vale      « homo  $\supset$  mortale ».

Omni figura de Geometria es classe; in figura:

	A	B	C	D	
$B \varepsilon AC$	vale:				« B es puncto de segmento AC ».
$BC \supset AD$	»				« segmento BC continere in AD ».
$AC \wedge BD = BC$	»				« parte commune ad AC et BD es BC ».

In Arithmetica, nos indica classe plus importante per signos:

$N_0$  = numero (intero, positivo aut nullo).

$N_1$  = numero naturale (intero positivo) =  $N_0 + 1$  = summa de aliquo numero  $N_0$  cum 1.

$R$  = numero rationale =  $N_1/N_1$  = ratione de duo numero naturale.

$12 \varepsilon N_1 \times 4$       « 12 es multiplo de 4 ».

$25 \varepsilon N_1^2$       « 25 es numero quadrato ».

$N_1 \supset R$       « omni numero naturale es rationale ».

$6 \times N_1 \supset 2 \times N_1$       « omni multiplo de 6 es numero pari ».

$2 \times N_1 \wedge 3 \times N_1 = 6 \times N_1$       « omni multiplo commune de 2 et de 3 es multiplo de 6, et vice-versa ».

Maximo numero de propositiones de Formulario es scripto ope solo signos de Logica =,  $\varepsilon$ ,  $\supset$ ,  $\wedge$ , combinato cum signos de Arithmetica. Lege p. ex. pag. 30, 32, 34, 35, 48, 49, 55, 85-92, ...

Signo  $\varepsilon$  es litera initiale de vocabulo graeco *ἐστίν*.

Nos pote indica relatione «  $b$  contine  $a$  » sub forma «  $b \subset a$  », ubi signo  $\subset$  es initiale de « contine », pauco deformato. Tunc si nos invertit duo membro, nos vertit signo de relatione (ut in Arithmetica  $a < b$  vale  $b > a$ ), et nos indica idem relatione per  $\lfloor a \subset b \rfloor$ , lege «  $a$  continere in  $b$  ».

Signo  $\supset$  occurre in Gergonne, a.1816, Abel t. 1 p.36, et in aliquo raro Auctore, et sub alio forma in Leibniz.

L  
a  $\supset$  b

\* 1.1  $a \varepsilon \text{Cls} \supset a \supset a$

«Si  $a$  es classe, tunc omni  $a$  es  $a$ ».

Nos saepe indica propositiones de Formulario per numero decimale 1.1, 2.3, etc. Mutatione de numero integro es indicato per signo \*.

2  $a \varepsilon \text{Cls} \supset x, yea \equiv xea . yea$

Df,

«Si  $a$  es classe, tunc  $x, yea$  vale  $xea . yea$ ». Definitione de «,».

Bipuncto «:» divide propositione in duo parte; primo parte consta de hypothesi et signo de deductione; secundo parte es aequalitate de logica. Primo membro es signo novo  $x, yea$ , que nos defini aequale ad secundo membro expresso per symbolos noto.

In modo simile, nos scribe  $x, y, zea$  in loco de  $x, yea . zea$ , vel de  $xea . yea . zea$ .

Nos conveni, in P.2, que  $p \supset q$  et  $p \supset . q$  vale  $p \supset . q$ .

Exemplo: 5,7 ε Np «5 et 7 es numero primo».

3  $a, b \varepsilon \text{Cls} . xea . a \supset b \supset . xeb$

4  $a, b, c \varepsilon \text{Cls} . a \supset b . b \supset c \supset . a \supset c$

Syll

«Si  $a, b$  es classe, et si  $x$  es  $a$ , et si omni  $a$  es  $b$ , tunc  $x$  es  $b$ ».

«Si  $a, b, c$  indica tres classe, et si omni  $a$  es  $b$ , et si omni  $b$  es  $c$ , tunc omni  $a$  es  $c$ ».

Propositione 3 et 4 exprime forma de ratiocinio dicto «syllogismo».

Existe analogia intra signo ε et  $\supset$ ; in vero si in propositione 4 nos scribe ε in loco de primo  $\supset$ , nos habe P.3.

Existe differentia intra signo ε et  $\supset$ ; non lice scribe ε in loco de secundo  $\supset$  in P.4. In vero, ex hypothesi, in latino scholastico:

«Petrus et Paulus sunt apostoli; apostoli sunt duodecim» in symbolo:

«Petro, Paulo ε apostolo; apostolo ε classe de 12 individuo», seque nullo conclusionem.

Relatione  $xay$ , intra duo objecto  $x$  et  $y$ , es dicto *transitivo* (de Morgan, CambridgeT. a. 1856 t. 6 p. 104), si de  $xay . yaz$  seque  $xaz$ .

Relatione  $x > y$  de arithmetica es transitivo.

§1 P.3 dice que relatione  $x = y$  es transitivo.

Syllogismo, sub forma 2.4, dice que signo  $\supset$  es transitivo.

Exemplo praecedente proba que signo ε non es transitivo.

Existe alio differentia inter signo  $\supset$  et ε. Signo ε es commutabile cum signo =; signo  $\supset$  non habe ee proprietate. Signo ε es distributivo ad  $\cup$ , quod non es vero pro signo  $\supset$ . Vide §4 P.2.1 nota, et §5 P.3.1 nota.

Aristotele (a. —383 —321) enuntia syllogismo, §2P.1.4, sub forma:

«Εἰ τὸ  $A$  κατὰ παντὸς τοῦ  $B$ , καὶ τὸ  $B$  κατὰ παντὸς τοῦ  $\Gamma$ , ἀνάγκη τὸ  $A$  κατὰ παντὸς τοῦ  $\Gamma$  κατηγορεῖσθαι.»

Nota usu de literas variabile in Aristotele.

Alio forma de syllogismo, et de ratiocinio, considerato ab Aristotele, et ab logicos scholastico, non habe applicatione in Mathematica.

- \* 2.1  $a, b \in \text{Cls} \supset a \cap b \in \text{Cls}$   
 2  $a, b \in \text{Cls} \supset a \cap b \supset a$   
 3  $a, b \in \text{Cls} \supset a \cap b \supset b$

- \* 3.1  $a \in \text{Cls} \supset a \cap a = a$   
 2  $a, b \in \text{Cls} \supset a \cap b = b \cap a$  Comm  $\cap$   
 3  $a, b, c \in \text{Cls} \supset (a \cap b) \cap c = a \cap (b \cap c)$  Assoc  $\cap$   
 4  $a, b, c \in \text{Cls} \supset a \cap b \cap c = (a \cap b) \cap c$  Df

Operatione  $\cap$  intra duo objecto  $a$  et  $b$ , es dicto «commutativo», si  $a \cap b = b \cap a$ ; et «associativo», si  $(a \cap b) \cap c = a \cap (b \cap c)$ .

In Arithmetica, operationes  $+$  et  $\times$  es commutativo et associativo.

P3.2.3 dice que operatione  $\cap$  es commutativo et associativo.

Valore commune de duo membro de aequalitate 3 es indicato per  $a \cap b \cap c$ , sine parenthesi (P.4) per Df (definitione).

Aliquo theorema super minimo commune multiplo aut maximo commune divisore inter plure numero seque de solo P2.1.2.3 de Logica. Vide pag. 53 § mlt P1.2.21, 3.2.10.1.3.

- \* 4.1  $a, b \in \text{Cls} \supset a = b \equiv a \supset b \cdot b \supset a$

«Si  $a$  et  $b$  es Cls, aequalitate  $a = b$  vale affirmatione simultaneo de: omni  $a$  es  $b$ , et omni  $b$  es  $a$ ». Exprime signo  $=$  per  $\supset$ .

- 2  $a, b \in \text{Cls} \supset a \supset b \equiv a = a \cap b$

Exprime  $\supset$  per  $=$  et  $\cap$ .

- 3  $a, b \in \text{Cls} \supset x \varepsilon a \cap b \equiv x \varepsilon a \cdot \wedge \cdot x \varepsilon b$  Distrib( $\varepsilon, \cap$ )

- 4  $a, b, c \in \text{Cls} \supset a \supset b \cap c \equiv a \supset b \cdot a \supset c$  Distrib( $\supset, \cap$ )

Nos dice que operatione  $\cap$  es «distributivo» ad operatione  $\supset$ , si

$$a \cap (b \cap c) = (a \cap b) \cap (a \cap c) \quad \text{Distrib}(\cap, \cap)$$

In Arithmetica,  $\times$  se distribue ad  $+$ :  $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$ .

P.3.4 affirma que  $\varepsilon$  et  $\supset$  es ambo distributivo ad  $\cap$ .

- \* 5. : Indice ad signo  $\supset$ .

$x; y$  vel  $(x, y)$  indica systema composito ex duo objecto  $x$  et  $y$ .

$x, y, z$  es systema de tres variabile:

- 0  $x; y; z = (x; y); z$  Df

Notatione  $(x, y)$  es diffuso in Analysis. Me scribe  $x; y$  quando existe periculo de ambiguitate cum conventione P1.2.

Si  $p_x$  et  $q_x$  es propositione que contine literas  $x$ , scriptura:

$$p_x \supset_x q_x$$

significa « de  $p_x$  seque, pro omni valore

Nos tace indice ad  $\supset$ , quando non tace; id es in tres casu :

1°. Quando propositione contine tace ad  $\supset$  es systema de variables in

Per ex. in P3.1, signo  $\supset$  habe indice in P3.3  $a;b;c$ .

2°. Quando illo es signo de deductione per maximo numero de punctos es systema de variables in hypothesis.

3°. In fine, nos tace indice ad secundu de forma  $p \supset (q \supset r)$ , id es ad signo de thesi. Indice tacito es systema de variables et non in  $p$ .

Si  $a$  es formula que contine litera variabile reale in  $a$ , si valore de  $a$  de casu contrario, nos dice que  $x$  es appa-

Subsiste principio generale :

« Variabile que figura ut indice signo  $\supset$  es apparente in toto deducti-

$$1 \quad a, b \in \text{Cls} \supset \therefore a \supset b \equiv x \varepsilon a \supset x \varepsilon b$$

Si  $a$  et  $b$  es classe, tunc propositione « omni  $a$  es  $b$  » vale deductione:

« Si  $x$  es  $a$ , seque pro omni valore  $x$  »

Nos « opera per  $x \varepsilon$  » quando nos es membro de  $a \supset b$ . Nos « opera per  $x \varepsilon$  » formatione inverso.

Exemplo :

$$Np \wedge (4N_1 + 1)$$

« Omni numero primo multiplo de 4 plus 1, »

Nos opera per  $x \varepsilon$ :  $x \varepsilon Np \wedge (4N_1 + 1)$

« Si  $x$  es numero primo de forma  $4N_1 + 1$ , tunc »

Nos distribue  $\varepsilon$  ad  $\wedge$  (P4.3):  $x \varepsilon Np \wedge (4N_1 + 1)$

« Si  $x$  es numero primo, et si  $x$  habe forma »

$$^2 \quad x=y := a \varepsilon \text{Cls} . x \varepsilon a . \supset_a . y \varepsilon a$$

«Duo objecto  $x$  et  $y$  es aequale, vel identico inter se, quando, de  $x \varepsilon a$ , seque  $y \varepsilon a$ , pro omni classe arbitrario  $a$ ».

In loco de «classe» nos pote lege «proprietate». Ergo duo objecto es identico, si omni proprietate de primo es semper proprietate de secundo.

$$^3 \quad a, b, c \varepsilon \text{Cls} . \supset : :$$

$$x \varepsilon a . \supset_x : (x;y) \varepsilon b . \supset_y . (x;y) \varepsilon c . := x \varepsilon a . (x;y) \varepsilon b . \supset_{x;y} . (x;y) \varepsilon c$$

Import Export

Si  $p_x$  es propositione que contine variabile  $x$ , et si  $q_{x;y}$  et  $r_{x;y}$  es propositione cum duo variabile  $x$  et  $y$ , tunc propositione: «de  $p_x$  seque, pro omni valore de  $x$ , que de  $q_{x;y}$  seque pro omni valore de  $y$ ,  $r_{x;y}$ », in symbolo

$$p_x . \supset : q_{x;y} . \supset . r_{x;y}$$

vale propositione:

«de  $p_x$  et  $q_{x;y}$  seque, pro omni valore de  $x$  et de  $y$ ,  $r_{x;y}$ », in symbolo

$$p_x \wedge q_{x;y} \supset_{x;y} r_{x;y}$$

Nos «importa hypothesis  $p_x$ » vel «collige duo hypothesis  $p_x$  et  $q_{x;y}$ », quando nos transforma primo propositione in secundo; et nos «exporta hypothesis  $p_x$ » vel «separa hypothesis  $p_x$  et  $q_{x;y}$ » quando nos transforma secundo enuntiatio in primo.

Pro scribe, per symbolos, toto interessante regula praecedente, nos reduce propositiones  $p_x$ ,  $q_{x;y}$ ,  $r_{x;y}$  ad forma  $x \varepsilon a$ ,  $(x;y) \varepsilon b$ ,  $(x;y) \varepsilon c$ , ubi  $a$ ,  $b$  et  $c$  es classe.

Exemplo. Regula P2.2, applicato ad propositiones, da :

$$a \varepsilon \text{Cls} . x \varepsilon a . \supset . x \varepsilon a$$

Signo  $\supset$  habe indice tacito  $a$  et  $x$  (regula 1). Me exporta  $a \varepsilon \text{Cls}$ :

$$a \varepsilon \text{Cls} . \supset : x \varepsilon a . \supset . x \varepsilon a .$$

Primo signo  $\supset$  porta indice tacito  $a$  (regula 2), et secundo signo  $\supset$  habe indice tacito  $x$  (regula 3). Me supprime in thesi signo  $x \varepsilon$ , per P5.1, et me obtine :

$$a \varepsilon \text{Cls} . \supset . a \supset a$$

que es «principio de identitate» P1.1.

Alio exemplo. Propositione 5.1, ubi in loco de signo  $=$  me scribe  $\supset$ , per P4.1, fi :

$$a, b \varepsilon \text{Cls} . \supset . a \supset b . \supset : x \varepsilon a . \supset . x \varepsilon b$$

Me collige tres hypothesis, et habe :

$$a, b \varepsilon \text{Cls} . a \supset b . x \varepsilon a . \supset . x \varepsilon b$$

que es P1.3.

Exemplo ex Arithmetica :

$$a \varepsilon N_1 . b \varepsilon N_1 + a . c \varepsilon N_1 \times b . \supset . c \varepsilon N_1 \times a$$

«Si  $a$  es numero naturale, et si  $b$  es multiplo de  $a$ , et  $c$  es multiplo de  $b$ , tunc  $c$  es multiplo de  $a$ ».

4 puncto divide propositione in 5 parte; tres primo es propositione inter que es tacito signo  $\wedge$ ; signo  $\supset$  porta ut indice tacito systema  $a, b, c$ .

Ce propositione, pro lege de exportatione, es reductibile ad forma:

$$a \in N_1 . b \in N_1 \times a . \supset : c \in N_1 \times b . \supset . c \in N_1 \times a .$$

«Si  $a$  es numero naturale, et si  $b$  es multiplo de  $a$ , tunc, si numero  $c$  es multiplo de  $b$ , illo es multiplo de  $a$ ».

Bipuncto ( $:$ ) divide propositione in 2 parte, primo consta de Hp et de signo de deductione. Secundo parte es thesi de toto propositione; ce thesi es deductione, que habe suo Hp et suo Ths. Primo signo  $\supset$  habe indice tacito  $a$  et  $b$ , que figura in Hp de toto propositione. Secundo signo  $\supset$  porta indice tacito  $c$ , que existe in Hp de Ths, et non in Hp de propositione. Litera  $c$  es reale in Hp de Ths  $c \in N_1 \times b$ , et in Ths de Ths  $c \in N_1 \times a$ , et apparente in Ths de toto propositione. Nos elimina litera apparente  $c$  in Ths, si nos «opera per  $c \exists$ »; propositione fi:

$$a \in N_1 . b \in N_1 \times a . \supset . N_1 \times b \supset N_1 \times a$$

«Si  $a$  es numero naturale, et si  $b$  es multiplo de  $a$ , tunc omni multiplo de  $b$  es multiplo de  $a$ ».

Exemplo de signo  $\supset$  cum indice explicito, in Arithmetica: pag.27 P1.3, pag.63 P2.1.2.3, P3.1.

### §3 3 (que)

Si propositione  $p_x$  contine variabile  $x$ , tunc « $x \exists (p_x)$ » vale « $x$  que  $p_x$ », vel « $x$  que satisfac ad conditione  $p_x$ ».

$$1 \quad a \in \text{Cls} . \supset . x \exists (x \in a) = a$$

«Objectos  $x$  que satisfac ad conditione  $x \in a$  forma classe  $a$ ».

Ergo operatione  $x \exists$  et  $x \in$  destrue se mutuo, et es inter se inverso.

Ita in Arithmetica, ubi operatione es scripto in ordine contrario,

$$a + x - x = a.$$

$$2 \quad a, b \in \text{Cls} . \supset . x \exists (x \in a \wedge x \in b) = a \cap b$$

Distrib( $\exists, \cap$ )

«Classe commune ad duo classe  $a$  et  $b$  es classe de  $x$  que satisfac ad conditione  $x \in a$  et  $x \in b$ ». Exprime signo  $\cap$  inter classe per idem signo inter propositione; et affirma que signo  $\exists$  es distributivo ad  $\cap$ , ut suo inverso  $\in$  (§2 P5.1).

In scriptura  $x \exists p_x$ , litera  $x$  es apparente.

Exemplo:

$$a, b \in N_1 . \supset . \text{quot } a, b = \max[N_0 \cap x \exists x \times b \leq a]$$

«dato duo numero  $a$  et  $b$ , quoto de  $a$  per  $b$  es maximo numero  $x$  tale que  $x$  multiplicato per  $b$  non supera  $a$ ». (pag. 48).

## §4 - (non)

\* 1.  $a, b, c \in \text{Cls} \rightarrow$ :

•0  $x \varepsilon a \Rightarrow x \varepsilon (\neg a) : a \neg b \Rightarrow a \neg b : \neg a \supset b \Rightarrow (\neg a) \supset b : \neg a = b \Rightarrow (\neg a) = b$  Df

•1  $\neg a \in \text{Cls}$

•2  $a \supset b \rightarrow \neg b \supset \neg a$

Transp

«Si omni  $a$  es  $b$ , tunc omni non  $b$  es non  $a$ ».

•3  $ab \supset c \rightarrow a \neg c \supset \neg b$

Transp

«Si de  $ab$  seque  $c$ , de  $a$  et non  $c$  seque non  $b$ ».

Nos «transporta», quando nos applica regula •2 aut •3.

•4  $\neg(\neg a) = a$

«Duo negatione forma affirmatione».

•5  $a \supset b \Rightarrow \neg b \supset \neg a$

•6  $ab \supset c \Rightarrow a \neg c \supset \neg b$

\* 2•0  $x = y \Rightarrow \neg(x = y)$ 

Df

•1  $a \varepsilon \text{Cls} \rightarrow \neg(x \varepsilon a) = x \varepsilon \neg a = x \neg \varepsilon a$  Comm( $\varepsilon, \neg$ )

«Negatione de propositione  $x \varepsilon a$  vale  $x$  es non  $a$ ».

Nos dice que operatione  $a$  es commutabile cum operatione  $b$ , si

$$abx = bax$$

Comm( $\varepsilon, \neg$ )

Ergo, operatione  $\varepsilon$  es commutabile cum  $\neg$ .

P. ex. si nos pone: (ignorante) =  $\neg$  (docto), seque:

$\neg(\text{Petro es docto}) = \text{Petro} \neg \varepsilon \text{ docto} = \text{Petro} \varepsilon \neg \text{ docto} = \text{Petro es ignorante}$ .

Operatione  $\supset$  non es commutabile cum  $\neg$ . P. ex. de  $\neg(\text{homo} \supset \text{docto})$ , id es «non es vero que omni homo es docto», non seque  $(\text{homo} \supset \neg \text{docto})$ , id es  $(\text{homo} \supset \text{ignorante})$ , «omni homo es ignorante».

Exemplo:

$$N_p = (1 + N_1) - \{(1 + N_1) \times (1 + N_1)\}.$$

«Numero primo es numero superiore ad 1, non producto de duo factore superiore ad unitate»

$$a, b \varepsilon \mathbb{Q} : a \neq b \rightarrow a^2 + b^2 > 2ab$$

«Si  $a$  et  $b$  es quantitate differente, tunc...»

## §5 - (aut)

\* 1.  $a, b, c, \varepsilon \text{Cls} \rightarrow$ :

•0  $abc = (ab)c : a \neg bc = a \neg (bc) : a \neg b \supset c \Rightarrow (a \neg b) \supset c : a \supset \neg bc \Rightarrow a \supset (b \neg c) : a \neg bc = (a \neg b)c : x \varepsilon a \neg b \Rightarrow x \varepsilon (a \neg b)$  Df

•1  $a \neg b \in \text{Cls}$

•2  $a \supset a \neg b$

•3  $b \supset a \neg b$

\* 2.  $a, b, c \in \text{Cls} \supset$

·1  $a \cup a = a$

·2  $a \cup b = b \cup a$

Comm  $\cup$

·3  $(a \cup b) \cup c = a \cup (b \cup c) = a \cup b \cup c$

Assoc  $\cup$

\* 3.  $a, b, c \in \text{Cls} \supset$

·1  $x \in a \cup x \in b \implies x \in a \cup b$

Distrib( $\in, \cup$ )

·2  $a \supset c \cdot b \supset c \implies a \cup b \supset c$

·3  $b \supset a \implies a \cup b = a$

Si nos muta  $\cup$  in  $\cap$ , et  $a \supset b$  in  $b \supset a$ , in P1·1·2·3, 2·1·2·3, 3·1·2·3 de praesente §, nos habet propositiones de §2: P2·1·2·3, 3·1·2·3, 4·3·4·2 P3·1 dice que  $\in$  se distribuit ad  $\cup$ .

Relatione  $\supset$  non est distributiva ad  $\cup$ . Nam ex propositione

$$N_0 \supset 2N_0 \cup (2N_0 + 1) \quad \text{« Omni numero est par aut impari »,}$$

non licet deducere: « Omni numero est par » aut « omni numero est impari ».

\* 4·1  $a, b, c \in \text{Cls} \supset a(b \cup c) = ab \cup ac$  Distrib( $\cap, \cup$ )

Exprime proprietatem distributivam de  $\cap$  ad  $\cup$ . Plures Auctores, per hanc analogiam, vocant operationem  $\cap$  et  $\cup$  « multiplicationem et additionem de logica ».

3 \* 5.  $a, b \in \text{Cls} \supset$

·1  $x \exists (x \in a \cup x \in b) = a \cup b$

Distrib( $\exists, \cup$ )

·2  $a \cup b = x \exists (c \in \text{Cls} \cdot a \supset c \cdot b \supset c \supset_c x \in c)$

Dfp  $\cup$

« Classe  $a \cup b$  est systema de omni objecto  $x$  tale quod, si nos sumamus classem arbitrarium  $c$ , quae contineat  $a$ , et quae contineat  $b$ , sequitur, pro omni classe  $c$ , quod  $x$  est  $c$  ».

Primo membro contineat signum  $\cup$ , et secundo est compositum per signos de §1-3. Ergo P5·2 est definitio possibilis de signo  $\cup$ .

- \* 6.  $a, b, c, d \in \text{Cls} \supset$

·1  $\neg(a \cap b) = \neg a \cup \neg b$

« Negatione de producto logico est summa de negatione de factoribus ». Est analogo ad proprietatem de logarithmo.

·2  $a \cup b = \neg[\neg(a) \cap \neg(b)]$

Dfp  $\cup$

Est alia definitio possibilis de signo  $\cup$  per  $\cap$  et  $\neg$ .

·3  $\neg(a \cup b) = \neg a \cap \neg b$

·4  $a \cap b = \neg(\neg a \cup \neg b)$

·5  $a \cap b \supset c \implies a \supset b \cap c$

Transp

·6  $a \cap b \supset c \implies a \cap c \supset b \cap c$

Transp

·7  $a \cap b = x \exists (c \in \text{Cls} \cdot a \supset b \cap c \supset_c x \in c)$

Dfp  $\cap$

Exemplo de signo  $\cup$ , pag. 39, pag. 59.





§7  $\iota$ \* 1.0  $\iota x = y \exists (y = x)$ Df  $\iota$ ·01  $y \varepsilon \iota x . = . y \varepsilon (\iota x) : a \supset \iota x . = . a \supset (\iota x) : a = \iota x . = . a = (\iota x)$  Df·1  $y \varepsilon \iota x . = . y = x$  [ Dfi . Oper  $y \varepsilon . \supset . P$  ]·2  $a \varepsilon \text{Cls} . \supset : x \varepsilon a . = . \iota x \supset a$ ·3  $a \varepsilon \text{Cls} . \supset : x, y \varepsilon a . = . \iota x \cup \iota y \supset a$ ·4  $a \varepsilon \text{Cls} . \supset . -a = x \exists (\iota x \wedge a = \wedge)$  Dfp=

$\iota x$ , lege «aequale ad  $x$ », es classe composito de omni  $y$ , que satisfacit ad conditione  $y = x$ . Id es,  $\iota x$  indica classe continente solo objecto  $x$ . Signo  $\iota$  es initiale de vocabulo  $\iota\sigma\sigma\varsigma$ .

Si in Df de  $\iota$ , P·0, nos opera per  $y \varepsilon$ , id es, si nos scribe  $y \varepsilon$  ante duo membro de aequalitate, et si nos mene que  $y \varepsilon$  et  $y \exists$  destrue inter se, resulta (P·1) que  $\varepsilon$  vale signo  $=$ .

Vide exemplos de signo  $\iota$  in pag. 37.

$$q \wedge x \exists (x^2 - 3x + 2 = 0) = \iota 1 \cup \iota 2$$

«radices reale de aequatione scripto es 1 et 2». Nos opera per  $x \varepsilon$ , et distribue  $\varepsilon$  ad  $\wedge$  et distribue  $\varepsilon$  ad  $\cup$ .

$$x \varepsilon q . x^2 - 3x + 2 = 0 . = . x \varepsilon \iota 1 \cup . x \varepsilon \iota 2 ,$$

unde, per Df  $\iota$ :

$$x \varepsilon q . x^2 - 3x + 2 = 0 . = . x = 1 \cup . x = 2 .$$

\* 2.  $a \varepsilon \text{Cls} . \nexists a : x, y \varepsilon a . \supset x, y . x = y : \supset ::$ ·0  $z = \iota a . = . a = \iota z$  Df  $\iota$ ·1  $b \varepsilon \text{Cls} . \supset : \iota a \varepsilon b . = : a = \iota x . \supset_x . x \varepsilon b . = : \nexists x \exists (a = \iota x . x \varepsilon b) . = : \nexists a \wedge b . = : a \supset b$  Dfp·2  $\iota a \varepsilon a$  ·3  $\iota(\iota a) = a$  ·4  $\iota(\iota x) = x$ ·5  $\wedge = \iota x \exists [a \varepsilon \text{Cls} . \supset_a . a = a = x]$  Dfp  $\wedge$ 

Si classe  $a$  contine uno solo individuo  $z$ , id es si  $a = \iota z$ , nos indica per  $\iota a$  ce individuo  $z$ ,  $z = \iota a$ . Nos exprime que classe  $a$  contine uno solo individuo, per phrasi: «classe  $a$  es existente vel non nullo; et si  $x$  et  $y$  pertine ambo ad classe  $a$ , tunc  $x = y$ ».

Operatione  $\iota$  es inverso de  $\iota$ . In defectu de vocabulo aequivalente in lingua commune, nos pote lege signo  $\iota$  per «illo», vel «to»; in vero, in aliquo casu, illo responde ad articulo de lingua commune. Vide definitione de subtractione in §— pag. 44, § P1·0, pag. 46 §max P1·0,...

§8 Df (definitione)  
Dfp (definitione possibile)

Omni definitione, in mathematica, habet formam :

$$x = a \qquad \text{Df}$$

ubi  $x$  est signum novum,  $a$  est series de signo noto. Df exprimit conventionem de scribere signo simpliciter  $x$ , dicto « definitum », in loco de serie  $a$ , dicto « definientem ».

Dfp, lege « definitione possibile », est æqualitas que in primo membro habet signum non occurrentem in altero membro. Characterem de Dfp habere ad propositionem, et non dependere de ullo conventionem.

Si nos ponamus in ordine omni ideam de Mathematica (vel de aliquo scientia), nos vocamus « definitionem possibilem de signo  $x$ , relativo ad ordinem datum » æqualitatem

$$x = (\text{expressione composita per signos præcedentes } x).$$

Inter definitiones possibilem de signo  $x$ , nos eligimus formam magis convenientem; et definitionem possibilem fieri realem per conventionem.

Nos vocamus « ideam primitivam, relativam ad ordinem datum », ideam que non habet definitionem possibilem, in ordine considerato.

Existe aliquo idea primitiva; in facto, nos non potest definire primo ideam, que non habet præcedentem; et nos non potest definire signo  $=$ , que figura intra duo membra de omni definitione.

Idea primitiva, relativa ad unum ordinem, potest esse definita in ordine differente. Quare, si per ideam  $a, b, c$  nos definiamus  $d$ , et si per ideam  $a, b, d$  nos definiamus  $e$ , licet sumamus ut ideam primitivam, vel  $a, b, c$ , vel  $a, b, d$ .

Nos potest eliminare omni signo definitum, si nos scribimus in suo loco, valorem definientem illum.

Ergo omni definitione exprimit abbreviationem, in theoria non necessario, sed utilem in practica. Si nos non potest eliminare signo definitum, suo definitione habet aliquo defectum.

Aristoteles classificat de Df in reales et nominales :

« ὁ ὁρίζομενος δείκνυσθαι ἢ τί ἐστίν ἢ τι σημαίνει τοῦνομα. (Anal. post. II 7).

In Mathematica, omni Df est nominalis. Cuius observationem occurrat in Möbius (a.1815 t. 4, p.388)

« Definitionum divisi in verbales et reales omni caret sensu ». et in Stuart Mill (a.1838) ::

« All definitions are of names, and names only ».

Vide Vailati, RdM. t. 8, p.57-63.

Df mathematico non satisfac ad regula que omni Df procede per genere proximo et per differentia specifico Aristotele, Top. I, 8:

‘Ο ὁρισμὸς ἐκ γένους καὶ διαφορῶν ἐστίν.

Nam, supposito noto signo 1 et +, aequalitate:

$$2 = 1+1, \quad 3 = 2+1, \quad 4 = 3+1, \dots$$

es definitione ds 2, 3, 4, ...; et non existe genere aut specie.

Exemplo: Df de classes:  $N_1, N_p, n, R, \dots$  et de individuos  $x, e, i, \dots$   
Df de operationes:  $\uparrow, >, -, /, \max, \text{quot}, \dots$  habe Hp.

Definitione per abstractione de functio  $q$  habe forma

$$q.x = q.y \text{ .} = (\text{expressione composito per signos praecedente})$$

Non defini symbolo simplo  $qx$ , sed solo aequalitate  $qx=qy$ .

Formul. contine Df per abstractione: §Num 1·0 §a 2·2 4·2 ...

Omni Df reale aut possibile debe es «homogeneo» pro literas variabile, id es ambo membro de aequalitate debe contine idem variabile reale. In vero si nos pone  $f(x,y) = \text{«expressione que depende de } x, y, z\text{»}$ , nos da idem nomen ad differente valores de expressione.

Dm (demonstratione)

Pp (propositio primitivo)

| (substitutione).

Demonstratione de uno propositione es suo deductione ex propositiones praecedente. Deductione de uno propositione ab praecedentes, es aliquo forma de ratiocinio. Collectione completo de forma de ratiocinio, que nos inveni in analysi de comune demonstrationes de Mathematica, constitue systema de formula de Logica-Mathematica.

Si nos suppose que propositiones de aliquo scientia es disposito in ordine, nos dice que uno propositione es primitivo, in relatione ad ordine dato, si nos non pote deduce illo ab praecedentes.

Si in aliquo scientia existe idea primitivo, et existe propositione primitivo, que fixa valore de idea non definito.

Nos proba que uno propositione es primitivo, in ordine dato, si nos inveni interpretatione de ideas primitivo, que satisfac ad omni propositione praecedente, et non ad propositione considerato. Nos proba que systema de propositione primitivo es mutuo ne-dependente, in modo absoluto, si, pro omni propositione, nos adduce interpretatione de systema de ideas primitivo, que satisfac ad omni Pp, excepto propositione considerato.

Si  $p$  es formula, que contine litera  $x$ ,

$$(a \mid x) p$$

indica resultatu de substitutione de  $a$  ad  $x$  in formula  $p$ .

In Arithmetica, signo de substitutione figura solo in aliquo demonstratione. Illo es casu particulare de signo que occurre in theoria de functione (pag. 77).

In omni theorema, lice substitue omni litera pro valore arbitrario. Si hypothesi fi vero, nos supprime illo, et scribe solo thesi. Si hypothesi contine, ut factore logico, propositione vero, vel consequentia de alio factore, nos supprime illo.

#### Historia.

In praesente editione de Formulario, Logica-Mathematica es reducto ad minimo necessario pro intelligentia de partes sequente. Editione magis completo, es in Formularto t. 3 a.1901.

Ecce aliquo indicatione summario super historia.

Leibniz (a.1646—1716) es vero creatore de Logica-Mathematica. Vide:

L. Couturat, *Opuscles et fragments inédits de Leibniz*. Paris a. 1903 pag. XVI+682

Me extrahe citationes sequente, cum indicatione de correspondente P de Formulario :

§2 P4·2 Omne  $A$  est  $B$  id est  $AB \propto A$ .

§2 P5·2 Eadem sunt quorum unum in alterius locum substitui potest, salva veritate ».

§4 P1·4  $A \propto \overline{\text{non non } A}$  ».

§4 P1·5  $A$  est  $B$  ergo non  $B$  est non  $A$ .

§5 P1·2  $N$  est in  $A (\oplus) N$ .

P2·1 Si idem secum ipso sumatur, nihil constituitur novum, seu  $A+A \propto A$ .

P3·2 Si  $A$  est in  $C$  et  $B$  est in  $C$  etiam  $A+B$  erit in  $C$ .

P3·3 Si  $B$  est in  $A$ , erit  $A+B \propto A$ ... Si  $A+B \propto A$ , tunc  $B$  erit in  $A$ .

P6·2 Sive  $A$  sive  $B$ , hoc est non neque  $A$  neque  $B$ .

§6 P1·7 Omne  $A$  est  $B$ , id est ...  $A$  non  $B$  est non Ens.

Lambert J. H., in a. 1781, exprime proprietate distributivo de  $\wedge$  ad  $\vee$ , §5P4·1 :

« Will man aber setzen  $(m+n)A$ , so ist dieses  $= mA+nA$ . »

De Morgan a. 1847, Boole a. 1854, Schröder a. 1890, etc. re-inveni theoremas de Leibniz, da ad illo forma symbolico semper magis completo, et evolve plure applicatione de Mathematica ad Logica, que non occurre in applicatione de Logica ad Mathematica.

Vide historia recente de Logica-mathematica in:

Rivista di Matematica, t.1 a.1901 - t.8 a.1905, et Formulario t.1-t.4.

C. Burali-Forti, *Logica Matematica*, Milano a. 1894.

L. Couturat, in *Revue de Métaphysique et de Morale* a. 1904-1905 (plure et interessante articulo super theoria, et applicationes ad Arithmetica et ad Geometria).

L. Couturat, *Manuel de Logistique*, Paris Alcan a. 1905.

» *Les définitions mathématiques*, Enseignement mathématique, a.1905 p. 27.

» Congrès international de Philosophie, tenu à Genève; Rapports p.706.

B. Russell, *The principles of mathematics*, Cambridge, University Press, a. 1903.

E. B. Wilson, *The foundations of Mathematics*, American B. a. 1904, p. 74.

Plure alio articulo de Prof. Whitehead et Huntington in *American J. of Mathem.*, et in *Bull. of the American Society*.

## VOCABULARIO I.

Me collige aliquo vocabulo, frequente in *Mathematica*, commune in generale ad A (lege; Anglo, English), D (lege: Deutsch, vel Germano in sensu stricto), F (lege: Franco), H (lege: Hispano), I (lege: Italo) et R (lege: Russo).

Maximo numero de vocabulo internationale es L (lege: Latino). Omni vocabulo, que non habe indicatione contrario, es latino.

Plure vocabulo habe origine commune in G (lege: Graeco) trans L.

In aliquo casu, vocabulo L vel G habe vocabulo || (lege: parallelo) in ADR; et origine commune in E (lege: Europaeo antiquo), id es, ramo de Indo-Europaeo, que resulta ex comparatione de GLADR. Tunc es utile comparatione de vocabulo cum S (lege: Sanscrito).

Me trahe omni elemento linguistico, quando occurre, ex grammatica et vocabulario, commune et etymologico, de singulo lingua ADEFGHILRS. Resulta que studio linguistico, utile, quasi necessario, ad Mathematico, non es multo; sed hodie es sparso in plure et voluminoso libro.

Pro citatione de Auctores, transcriptione de GRS, etc. vide in fine de libro.

In praesente libro, me adopta vocabulo magis diffuso. Pro grammatica, me seque Leibniz «Grammatica rationalis» (Vide RdM. t.8, p.74), que duce ad suppressione de omni flexione. Principio de internationalitate duce ad idem resultatu; in vero, raro elemento grammaticale es commune ad linguas moderno.

In orthographia, me seque Latino.

## Abbreviationes.

- $\supset$  vale « genera ».  
 $\subset$  „ « deriva ».  
 $+$  es signo de unione de duo elemento de lingua. Valore de signo  $-$ , et de 0, es consequentia de regulas de Arithmetica.  
 $\sim$  indica elemento commune ad vocabulo  $a$ ,  $b$ ; es idea commune expresso per literas commune; exprime quod linguistas voca thema, radice, praefixo, suffixo, etc.  
 $-$ , tractu de unione; indica fragmento de vocabulo de lingua considerato.

## §1.

1. **es**, H es, F es-t, es, I è, es-sere.

|| G es-ti, A is, D is-t, R es-ti, S as.  $\subset$  E es.

Lege: **es** es vocabulo latino (imperativo et thema de *sum*, *esse*; in generale thema de verbo vale suo imperativo); mane cum paucio variatione in Hispano, in Franco et in Italo. Illo es parallelo ad vocabulo Graeco, Anglo, Deutsch, Russo et Sanscrito.

Nos pone, secundo conventione adoptato per Linguistas,

$$E e = L e = G e = A e (i) = D e (i) = R e = S a$$

$$E s = L A D R S s = G s (h)$$

Tunc forma de vocabulo Europaeo antiquo, ex LGRS, resulta **es**.

**E e** produce in Germanico, id es in A et D, per regula, **e**, et per exceptione **i**. Si secundo syllaba de aliquo vocabulo **E** contine **i**, tunc vocale **e**, **a**, **o**, **u** in primo syllaba fi **i**, **ä**, **ö**, **u**. Exemplo:

D erde, irdisch, gott, göttlich,... A angle, english;...

De vocabulo **G esti** = **R esti** = **S asti** nos induce **E esti**, que genera Gotico ist, D ist, A is.

Linguas moderno habe comune vocabulo Indo-Europaeo «**es**». Latino «**es**» mane in vocabulo «**es-sentia**» ADFHIR, et Graeco «**es**» mane celato in «**ontologia**» ADFHIR. Plure elemento es commune ad linguas moderno sub triplice forma **E L G**.

2. **aequo**, I equo, H ecuo.  $\supset$  aequ-atore ADFHIR. || S aica, eca.

Lege: **aequo** es vocabulo latino (ablativo et thema de nominativo *aequus*; in generale, thema de nomen es suo ablativo). Illo mane, paucio alterato, in I et H. Es elemento internationale. Parallelo ad vocabulo Sanscrito.

L ae  $\supset$  AFHIR e, D ae,

id es diphthongo **L ae** mane in D, et fi **e**, in omni alio lingua.

3. **aequa** = fac aequo, es aequo.  $\subset$  aequo (2) — -o + -a (4)

Resulta de vocabulo praecedente, in quo nos supprime desinentia -o et adde desinentia -a.

4. -a — -o = libera — libero = sana — sano = firma — firmo ...

$\supset$  HI -a — -o, F 0, A 0.

Substitutione de desinentia -a ad desinentia -o, nunc considerato, es frequente in L. Illo mane in Hispano et in Italo; in F et A ce differentia de forma evanesce, F ferme = A firm = L firmo (adjectivo), firma (verbo).

5. **aequale**, aequali, A equal, F égal, H equal, I eguale. = aequo.

⊂ aequa (3) + -le (6) = aequo -o + -ale (239).

«aequali» es vocabulo latino, ablativo, et thema de «aequali-s que occurre in vocabulario), aequali-um».

«aequale» es vocabulo latino, nominativo neutro, thema de «aequale-m, aequale-s»; generante I «eguale».

In tardo latino, ablativo in -i es mutato in -e, et mane sub ce forma in linguas moderno. Ita me cita vocabulos latino.

6. -le, -li = (5) ∩ differentia-le ∩ fide-le ∩ simi-le ∩ -i-le (199) ∩ -a-le.

AF -l, -le, DH -l, I -le, R -l' || G -lo (224).

\*\*\*

Scriptura de forma:

$$x = y$$

es dicto «aequalitate», «aequatione».  $x$  et  $y$  es «membro» de aequatione.

7. **aequalitate**, A equality, F égalité, H igualdad.

⊂ aequale (5) -e + -itate (8) = aequali + -tate.

8. -itate = bon-itate ∩ facil-itate ∩ nov-itate ∩ univers-itate ...

A -ity, D -itāt, F -ité, H -idad, I -ità, R -itat'. ⊂ -i- + -tate.

9. -i- = voc-i-fera ∩ aequ-i-voco ∩ nov-i-tate ∩ ...

Es litera de unione de duo elemento. Deriva de finale -i de plure vocabulo: facili-tate, classi-fica, ...

10. -tate = (8) ∩ liber-tate ∩ hones-tate ∩ ... || G -τητι, S -tati.

11. **aequatione**, A equation, F équation, H ecuacion, I equazione,

D aequation (in Astronomia). ⊂ aequa (3) + -tione (12).

12. -tio, -tione = (11) ∩ lec-tione ∩ defini-tione ∩ no-tione ∩ ...

ADF -tion, H -cion, I -zione, R -tsija.

13. **membro** I, A member, F membre, H miembro.

14. **ergo** A.

15. **segue** (L de anno + 200, thema de L classico), III segue, F sui-t.

⊃ seque-nte A, con-seque-ntia D, secu-ndo (minuto) DR, soc-io, ...

|| G hep-, S sac'e.

16. **si** FH, I se.

17. **tunc**, F donc, I dunque.

\*\*\*

Scriptura de forma

$$a \supset b$$

ubi  $a$  et  $b$  es propositione, es dicto «deductione».

18. **deductione**, AD deduction, F déduction, H deduccion, I deduzione,

R deductsija. ⊂ deduce (19) -e + -tione (12).

L -ctione ⊃ I -zione.

19. **deduce** AHI, F dédui-re. ⊂ de (21) + duce (20).



20. **duc, duce**  $\supset$  de-duce, pro-duce, intro-duc-tione, ...  
 || A tow, D ziehe.  
 Ad latino *d* responde GSR *d*, A *t*, D *z*. Exemplo:  
 L duo = G dyo = A two = D zwei = R dva = S dva.  
 L decem = G deca = A then = D zehn = R desja-ti = S daça.
21. **de** FH, I di, ADFHIR de-. (A to, D zu, R do, E do = L ad, habeo solo primo litera commune cum L de).
22. **thesi**  $\theta\acute{\epsilon}\sigma\iota$ -s G, AD thesis, F thèse, H tesis, I tesi, R tesis.  
 $\supset$  (25), syn-thesi, par-en-thesi, ... = L positione.  
 $\subset$  the- (23) + -si (24).
23. the-,  $\theta\epsilon$ -  $\supset$  (22), the-ma, homo-the-tia. = L pone, fac (137).
24. -si  $\supset$  the-si, analysi, basi mathesi, genesi, phasi, phrasi, physi, ellipsi.  
 || G.dorico -ti, L -ti, -ti-one (12).
25. **hypothesi**  $\acute{\upsilon}\pi\acute{o}\theta\epsilon\sigma\iota\varsigma$  GADFHIR.  $\subset$  hypo + thesi (22).  
 = L sup-posi-tione.
26. hypo G  $\supset$  hypo-thesi, hypo-crita, hypo-teinusa. || L sub (95).  
 Ad E *s* initiale et ante vocale responde G *h*:  
 L sex, septem, serpe, sede, semi-, super  
 || G hex, hepta, herpe, hed-, hemi, hyper.
27. **et**, F et, I e, ed, H y.  $\supset$  LAF et-cetera.  
 || G eti, S ati, Gotico ith, R i, ot'.
- §2.
28. **classe** FHI, A class, classis, D klasse, R class'.  
 $\subset$  G.dorico clasi, G.classico clési  $\subset$  cla- (= cla-ma) + -si (24).
29. **omni**, I ogni.  $\supset$  omni-potente AFHI, omni-voro, omni-bus, ...
30. **-s**, suffixo de plurale. = matre-s  $\cap$  rosa-s  $\cap$  anno-s  $\cap$  sensu-s  $\cap$  die-s.  
 F -s = rose-s — rose, H I(sardo) et Port. -s = rosa-s — rosa.  
 || A -s = rose-s — rose = day-s — day. Gotico: dag-os.  
 G -s, -es, mêter-es  $\cap$  sphaira-s  $\cap$  ...  
 S açva-s — açva, matar-as — matar.  $\subset$  E -s, -es.  
 Nos scribe suffixo -s de plurale quando es utile; vale «omni, classe».
31. **syllogismo**  $\sigma\upsilon\lambda\lambda\omicron\gamma\iota\sigma\mu\acute{o}\varsigma$  GADFHIR.  $\subset$  syl- + logo — -o + -ismo.
32. syn G, syl- (ante l), sym- (ante m, b, p), sy- (ante s) = L cum.  
 $\supset$  syn-chrono, syn-taxi, syl-laba, sym-bolo, sy-stema, ...  
 || R s', so, su-, S sam.
33. logo G.  $\supset$  dia-logo, astro-logo, log-ica, log-arithmo. = ratiocinio.
34. **logico** GHI, A logical, D logisch, F logique, R logic'.  
 $\subset$  logo (33) — -o + -ico.
35. -ico LGHI, A -ic, -ical, D -isch, F -ique, R -ic'.  
 = G log-ico, con-ico, geometr-ico, ...  
 = L am-ico, pud-ico, ... un-ico, med-ico ...  
 || D -ig = stein-ig  $\cap$  einz-ig, R in-oc', S -ica.  $\subset$  -i- (9) + -co (201).

36. **logica** λογική G, A logic, D logik, F logiqu  
 $\subset$  logico (34) — -o + -a (37).
37. -a (transcriptione L de desinentia G classico  
 $=$  logic-a  $\cap$  arithmetic-a  $\cap$  mathematic-a  $\cap$  p  
AD 0, F -a, HIR -a.  
Indica feminile naturale aut artificiale. V
38. -ismo GHI, F -isme, A -ism, D -ismus, R -is  
 $\supset$  syllog-ismo, barbar-ismo, social-ismo,...
39. **associativo**; introducto ab Hamilton, a. 1841  
 $\subset$  associa + -tivo.
40. **associa** I, A associa-te, F associe, A asocia  
 $\subset$  ad- (41) + socio (42) — -o + -a (4).
41. **ad**, ad-, as- (ante s), ac- (ante c). I ad, a,  
ADFHIR ad-. || A at.
42. **socio** HI.  $\supset$  soci-ale R, soci-etate D.  $\subset$  se  
soc- = seque (15).
- Nota. Transformatione de e in o existe in L.ir  
tege, toga; pende, pondo; mene (thema de com-m  
seque, socio; fer, fortuna; vertice, vortice.
- In G: phere, phoro; lege, logo;...
- Responde ad D sehe, sah; gebe, gab; nehme  
Et A see, saw; give, gave; sit, sat; speak, s
43. -io = soc-io  $\cap$  exim-io  $\cap$  gen-io  $\cap$  patr-io  $\cap$  ...  
|| G -io = ax-io-ma  $\cap$  patr-io  $\cap$  ...  
|| S pitri-ja, R -yj, -ij = matern-ij  $\cap$  dobr-
44. -tivo = ac-tivo  $\cap$  posi-tivo  $\cap$  accusa-tivo  $\cap$  a
45. **commutativo**; vocabulo introducto ab S  
de § 4 P 2.1. In sensu de § 2 P 3.2, illo o  
ternione de Hamilton.  $\subset$  commuta (46) +
46. **commuta** I, AF commute, H conmuta.  $\subset$
47. **cum**, con-, co- (ante vocale, g, h), col- (ant  
HI con.  $\supset$  co-efficiente ADFHIR.
48. **muta** I, F mue, H muda.  $\supset$  per-muta-tio
49. **distributivo**  $\subset$  distribue (50) — -e + -tiv  
Ce vocabulo es introducto ab Servois, a. 1
50. **distribue** FHI. A distribu-te.  $\subset$  dis- (51)
51. dis- (ante c, p, q, s, t, præcedente vocale),  
 $=$  dis-junge  $\cap$  dis-puta  $\cap$  dis-tribue  $\cap$  di-vi  
|| D zwi- = zwi-schen  $\cap$  zwie-fach  $\cap$  ..., C
52. **tribue**  $\supset$  dis-tribue  $\cap$  at-tribue  $\cap$  con-tribu
53. **opera-**, A opera-te, D operire, F opère, F  
 $\supset$  opera-tione (191), opera-tore.  $\subset$  opere

54. **opere, opus, opera**, I opera, F oeuvre, H obra. || S apasi.  
 ⊃ oper-ario, oper-oso, opus-culo. opere ⊂ op- (55) + -ere (56).
55. op- = opera, fac. || S ap-, D übe, L ape, ap-to, op-ta.
56. -ere, -es, -us, -ore ⊃ gen-us, gen-ere; temp-us, temp-or-ale, temp-es-tate, temp-us-culo; hon-ore, hon-es-to; am-ore, dol-ore; ama-re, dole-re, es-se. || G gen-os = S g'an-as = L genus. ⊂ E -es.  
 Nota. In L, litera *s* inter duo vocale, muta se in *r*: plus, plure; masculo, marito; gestu, gerente; osculo, orale. ...
57. **per** I, F par, H por. ADFHR per-. || L prae, por-, pro (134), A for, far, D für, ver-, vor, G peri, parà, pro, R pere-, pri, pro, S pari, pra, pura. Es differente casu de idem vocabulo.  
 Nota. Alio exemplo de correspondentia:  
 L *p* || A *f*, D *f*, *v*, G *p*, R *p*, S *p*.  
 L *pater* || A *father*, D *vater*, G *pater*, S *pitar*.  
 L *pleno* || A *full*, D *voll*, G *pleio*, R *polno*, S *prana*.
58. **systema**, systemate GADFHR. ⊂ sy- (32) + ste- (59) + -ma (60).
59. ste-, sta- ⊃ sta-tica ADFHR, ec-sta-si, sta-dio, ... || L sta (77).
60. -ma, -mate, -ma = syste-ma ◊ theore-ma ◊ axio-ma ◊ lem-mat-ico...  
 || L -men, -mento (251).

## §3.

61. **que** (thema L de que-m), qui, quo, quod, quam.  
 F que, qui, H que, quien, I che, chi.  
 || S ca; G po-; Gotico hvas, hvo, hva; A who, what; D wer, was; R co, c-to, c'-to.

## §4.

62. **ne, non**, in-, F ne, non; H no, ni; I nè, non.  
 ⊃ ne-sci, ne-utro ADFHR, in-variante D, in-ertia R.  
 || G ne-, an-, a- ⊃ an-hydro, an-archia, a-symmetrico ...  
 || A no, none, un- = un-even ◊ un-just, ...  
 D nein, nicht, un- = un-sicher ◊ un-ähnlich ◊ ... R ne, S na.
63. **transporta**, A transport, D transport-ire, F transporte, HI trasporta.  
 ⊂ trans (64) + porta (67).
64. **trans** H tras, I tra, ADFHR trans-. ⊂ tra- + -ns.
65. tra- ⊃ in-tra, pene-tra, tra-mite.
66. -ns = (64) ◊ stude-ns ◊ .... = -ente (142).  
 Id es, *trans* es participio praesente neutro de verbo hypothetico *tra*, existente in plure composito.
67. **porta** (verbo) HI, F porte. ⊃ porta (nomen) FHI, D pforte, im-porta, ex-porta, ... ⊂ por- (68) + -ta (69).
68. por- = porta, fer, i. ⊃ L por-ta, por-tu ADFHR || A ford, D furt.  
 || G peir-e, por-o; A fare, ferry, D fahre, führe; R por-yt!, S par.

69. -ta, suffixo L, saepe cum valore = 0. *Ecce* canta LHI = cane L; *consulta* LHI = A abbreviate = L abbrevia, A create = C -to (135) -o + -a (4).

§5.

70. **aut**, F ou, H o, u, I o, od. C au- (|| G ay

71. **vel** = aut; non indica oppositione. C vo

§6.

72. **nullo**. AD null, F nul, nulle, H nulo, I n C ne (62) -e + ullo (73).

73. **ullo** = aliquo. C un- (114) + -lo (224).

74. **existe** FH, A exist, D existire, I esiste.

75. **ex** = ne in. C ex-ponente ADHIR, ex- || G ex, ec C ec-centricio ADFHIR, ec-

76. siste C as-siste-nte AD. con-siste, per-siste C sta (77), per «reduplicatione», frequen- ADR, in S, et in Gotico.

77. **sta** I, H esta. || A stand, D stehe, G st C con-sta, di-sta, re-sta, sta-bile AFHI,

§7.

78. **illo**, ille, illa (demonstrativo in L). C F c-elle; H él, el, ello, la; Port. o, a; I i C ollo (L antiquo) C on- (|| R ono, S Vanic'ek et Fick.

79. **to** (thema L) C is-to, t-ale, t-anto, to-t, F ce-t, ce-tte, H es-to, I ques-to.

- || G to (demonstrativo in Homero, articulo A the, D der, das, S ta, R to (demonstrativo Leibniz, et suo contemporaneos, adoptato latino, quando es utile.

Alio exemplo de correspondentia : ELGRS +

L te, tu, A the, D du, de-in, G (dorico)

§8.

80. **definitione**, AD definition, F définition, R definitijsja. C defini + -tione (12).

81. **defini**, A define, F défini-r, H defini-r, I C de (21) + fini.

82. **fini**, A fini-sh, FH fini-r, I fini-sce. C fi

83. **fine** I, FH fin, AL finis. C fin-ale D.

84. -i = fin-i C un-i C im-ped-i C vest-i ...

85. **demonstratione**. A demonstration, F démonstration, H demonstra-  
cion, I dimostrazione, R (in politica) demonstratsija.  
C demonstra + -tione (12).
86. **demonstra**, A demonstra-te, F démontre, H demostra, I dimostra.  
C de (21) + monstra.
87. **monstra**, F montre, HI mostra. C monstro — -o + -a (92).
88. **monstro**, A monster, F monstre, I mostro (in sensu malo).  
= que mone, re notabile. C mone + -es (57) + -tro.
89. **mone**, A mon-ish. D mon-itore AFHI.  
= fac mene, causativo de mene (90). Vide (42).
90. **mene** (thema L) = memora, recorda, cogita.  
D men-te, com-men-to, men-tione...  
|| A mean, D meine, G men-, R mini-ti, S man-je.  
C E mene D A mind = G menos = S manas = L mente.
91. -tro D ara-tro a mons-tro a ras-tro a ...  
|| G -tro = me-tro a cen-tro a ... || S -tra, A -der, D -ter.
92. -a — -o = dona — dono = loca — loco = numera — numero  
= da, fac; numera = da numero. Vide (4).
93. **substitutione** ADFHI. C substitue (94) — -e + -tione (12).
94. **substitue** F, A substitute, D substituire, H substitu-ir, I sostitu-ire.  
C sub (95) + -stitue (96).
95. **sub, subto**. F sous; H so, soto; I sotto; Port. sob; ADFHIR sub-  
|| G hypo (26). Vide (124) et (257).
96. -stitue D sub-stitue, con-stitue, in-stitue. = statue (97).  
Transformatione de *a* in *i*, mane in L.intn.: cade, ac-cide-nte;  
fac, coef-fic-iente; habe, ex-hibe;....  
Illo es constante in latino classico, si litera *a* es ultimo litera de syllaba.
97. **statue** = fac sta, D statu-ire. D statu-to ADFHIR.  
C statu (99) + -e (98).
98. -e = acu-e a statu-e a tribu-e.
99. **statu**, A state, D staat, F état, H estado, I stato. || R statí, G stasi,  
D stadt. C sta (77) + -tu.
100. -tu = fruc-tu a ean-tu a sta-tu a gus-tu a adven-tu a por-tu.  
|| G bro-ty, as-ty; S vas-tu, gan-tu; D fur-t, lus-t.  
D HI -to, AF -t, -te, et se confunde cum L -to:  
L cantu = AHI canto, AF chant; L canto = HI cantato.

Continua post Arithmetica, pag. 65.

II

# ARITHMETICA



## II. ARITHMETICA.

### §1 +

$N_0$  vale « numero », et es nomen commune de 0,1,2, etc.

0 » « zero ».

+ » « plus ». Si  $a$  es numero,  $a+$  indica « numero sequente  $a$  ».

Quæstione, si nos pote defini  $N_0$ , significa si nos pote scribe æqualitate de forma

$N_0 =$  expressione composito per signos noto  $\cup \cap = \dots$ , quod non es facile.

Ergo nos sume tres idea  $N_0$ , 0, + ut idea primitivo, per que nos defini omni symbolo de Arithmetica.

Nos determina valore de symbolo non definito  $N_0$ , 0, + per systema de propositio primitivo sequente.

\* 1.

Pp

·0  $N_0 \varepsilon \text{Cls}$

·1  $0 \varepsilon N_0$

·2  $a \varepsilon N_0 \cdot \supset \cdot a+ \varepsilon N_0$

·3  $s \varepsilon \text{Cls} \cdot 0 \varepsilon s : a \varepsilon s \cdot \supset \cdot a+ \varepsilon s : \supset \cdot N_0 \supset s$  Induct

·4  $a, b \varepsilon N_0 \cdot a+ = b+ \cdot \supset \cdot a = b$

·5  $a \varepsilon N_0 \cdot \supset \cdot a+ = 0$

Lege :

·0  $N_0$  es classe, vel « numero » es nomen commune.

·1 Zero es numero.

·2 Si  $a$  es numero, tunc suo successivo es numero.

·3  $N_0$  es classe minimo, que satisfac ad conditione ·0·1·2;



id est, si  $s$  es classe, que contine 0; e si  $a$  pertine ad classe  $s$ , seque pro omni valore de  $a$ , que et  $a+$  pertine ad  $s$ ; tunc omni numero es  $s$ .

Ce propositione es dicto « principio de inductione », et nos indica illo per abbreviatione « Induct ».

Omni conditione determina uno classe; ergo nos pote lege principio de inductione sub forma :

Si  $s$  es conditione, satisfacto ab numero 0, et si omni vice que illo es vero pro numero  $a$ , et es vero pro suo successivo, tunc conditione  $s$  es vero pro omni numero.

·4 Duo numero, que habe successivo æquale, es æquale inter se.

·5 0 non seque ullo numero.

Systema præcedente de Pp suffice pro deduce omni propositione de Arithmetica, de Algebra et de Calculo infinitesimale.

Illo es necessario, vel singulo Pp non depende, in modo explicito aut implicito, de systema de cetero propositione. Quod nos proba ut seque :

1. Nos considera serie periodico, per exemplo, serie de hora astronomico de die, 0, 1, 2, ... 23, 0, 1, ... ubi hora que seque 23 es de novo 0.

Ce serie es classe (·0), que contine 0 (·1), que contine successivo de omni suo elemento (·2); illo satisfac ad principio de inductione (·3); et ad conditione ·4. Sed, in serie considerato, 0 seque numero 23; exemplo considerato satisfac ad omni Pp, excepto ·5. Ergo Pp ·5 exprime que serie de numero non es periodico, proprietate non implicito in conditione ·0 ·1 ·2 ·3 ·4.

2. Serie periodico, sequente antiperiodo, ut serie

0, 1, 1, 1, ...

satisfac ad conditione ·0 ·1 ·2 ·3 ·5, et non ad conditione ·4; nam  $0+ = 1$ , et  $1+ = 1$ , sed 0 non  $= 1$ .

3. Si in loco de  $N_0$  nos lege « numero rationale positivo aut nullo », et si conserva ad 0 et  $N_0$  valore commune, tunc conditione ·0 ·1 ·2 ·4 ·5 es satisfacto, sed non principio de inductione ·3. Nam non suffice de nosce que si uno proprietate es vero pro aliquo numero  $x$  es quoque vero pro  $x+1$ , ut nos deduce que omni numero rationale habe ce proprietate.

4. Serie finito, ut 0, 1, 2, ubi  $0+ = 1$ ,  $1+ = 2$ ,  $2+ = 3$  (que non pertine ad serie), satisfac ad conditione ·0 ·1 ·3 ·4 ·5, et non ad ·2; nam ultimo numero non habe successivo in serie dato.

5. Si nos considera serie 1, 2, 3, ... composito ex  $N_0$ , post suppressione de 0, nos habe exemplo que satisfac ad omni Hp, excepto ·1.

6. In fine, ut nos satisfac ad omni Pp, excepto ·0, nos muta valore de signo Cls; nos tribue ad Cls valore de « omni classe, excepto  $N_0$  », et ad  $x \in N_0$  valore « es numero », ut si  $N_0$  es classe.

## \* 2.

## Definitione de cifras.

$$\begin{aligned} 1 &= 0+ . 2 = 1+ . 3 = 2+ . 4 = 3+ . 5 = 4+ . \\ 6 &= 5+ . 7 = 6+ . 8 = 7+ . 9 = 8+ . X = 9+ \end{aligned} \quad \text{Df}$$

Nos voca 1 successivo de 0; 2 es successivo de 1,...

Signo Romano X es necessario usque ad numeratione in §N.

De P1·1·2 resulta que

$$0+ \quad 0++ \quad 0+++ \quad 0++++ \quad \text{etc.}$$

es numero. Si nos subintellige 0, et in loco de + nos scribe tractu, nos habe signo de numero

$$: \quad || \quad ||| \quad \text{etc.}$$

expresso ut reunione de unitate. Illo es systema primitivo de numeratione et hodie adoptato in joco de chartas, sub forma

$$: \quad .: \quad :: \quad \text{etc.}$$

In hieroglyphos de antiquo Ægypto, numero 1, 2,... 9 es indicato per 1, 2,... 9 tractu. Signo  $\cap$  vale decem; existe alio signo cum valore 100, 1000. In transformatione de scriptura hieroglyphico super saxo, in scriptura hieratico et demotico super papyro, in anno -2000 circa, scribas de Ægypto collega ce tractu, et forma signo simplice, vel cifra; illos transforma

$$= \text{in } 2, \equiv \text{in } 3, = \equiv \text{in } 23, \text{ et post in } 5, \text{ etc.}$$

Tale es origine de nostro cifras (Lindemann, *Zur Geschichte der ... Zahlzeichen*, MünchenA. a. 1896 t. 26 p. 625).

Usu de cifra ab Ægypto transi in India, post in Arabia, et in fine in Europa verso anno + 1200.

Indos in anno + 400 circa, introduce signo 0 sub formas ., o, 0, pro indica loco vacuo in numeratione decimale. 0 es considerato ut numero per mathematicos de a. 1600.

Signo + habe forma actuala post anno 1500; es deformatione de anteriore signo p.

## \* 3.

## Definitione de additione.

$$\begin{aligned} \cdot 1 \quad a \in N_0 . \supset . a+0 &= a \\ \cdot 2 \quad a, b \in N_0 . \supset . a+(b+) &= (a+b)+ \end{aligned} \quad \text{Df+}$$

Si  $a$  es numero, tunc  $a+0$  vale  $a$ .

Et si  $a$  et  $b$  indica numero, tunc summa de  $a$  cum successivo de  $b$  es successivo de summa de  $a$  cum  $b$ .

$$\begin{aligned} \cdot 3 \quad a \in N_0 . \supset . a+1 &= a+ \quad [ (0 \mid b)P \cdot 2 . Pp \cdot 1 . P2 . P3 \cdot 1 . \supset . P ] \\ & , \quad a+2 = (a+)+ \quad [ (1 \mid b)P \cdot 2 . \supset . P ] \end{aligned}$$

Si in P·2, in loco de  $b$  nos scribe 0, nos habe

$$a, 0 \in N_0 . \supset . a+(0+) = (a+0)+.$$

Hp vale  $a \varepsilon N_0$ .  $0 \varepsilon N_0$ . Secundo propositione es vero, per Pp.1, ergo nos supprime illo. Signo  $0+$ , per definitione, (P2) vale 1;  $a+0$  vale  $a$ , per P3.1; ergo:  
 $a \varepsilon N_0 \supset a+1 = a+$ ,  
 id es, numero successivo de  $a$ , jam indicato per  $a+$ , vale  $a+1$ ; notatione commune, de que nos vol fac usu constante.

\* 4.

•0  $a, b, c \varepsilon N_0 . a = b \supset a + c = b + c$

[ I§1 P.1  $\supset$ :  $a, c \varepsilon N_0 \supset a \varepsilon x \exists (a + c = x + c)$   
 I§2 P5.2  $\supset$ :  $a, b, c \varepsilon N_0 . a = b \supset b \varepsilon x \exists (a + c = x + c)$  (1)  
 (1)  $\supset$  P ]

•1  $a, b \varepsilon N_0 \supset a + b \varepsilon N_0$

[  $a \varepsilon N_0$  . Df+  $\supset$  .  $a + 0 \varepsilon N_0$  (1)

$a, b \varepsilon N_0 . a + b \varepsilon N_0$  . Df+ . P1.2  $\supset$  .  $a + (b + 1) = (a + b) + 1$   
 $(a + b) + 1 \varepsilon N_0 \supset a + (b + 1) \varepsilon N_0$  (2)

(1) . (2) . Induct  $\supset$  . P ]

•2  $a, b, c \varepsilon N_0 \supset (a + b) + c = a + (b + c)$  Assoc+

[  $a, b \varepsilon N_0 \supset (a + b) + 0 = a + b$  .  $a + (b + 0) = a + b \supset$   
 $(a + b) + 0 = a + (b + 0)$  (1)

$a, b, c \varepsilon N_0 . (a + b) + c = a + (b + c)$  . Oper+1  $\supset$  .  $[(a + b) + c] + 1 = [a + (b + c)] + 1$

” ” ” Df+  $\supset$  .  $(a + b) + (c + 1) =$  ”

” ” ” ”  $\supset$  . ” =  $a + [(b + c) + 1]$

” ” ” ”  $\supset$  . ” =  $a + [b + (c + 1)]$  (2)

(1) . (2) . Induct  $\supset$  . P ]

•3  $a, b, c \varepsilon N_0 \supset a + b + c = (a + b) + c$  Df

•4  $a, b \varepsilon N_0 \supset a + b = b + a$  Comm+

[ Df+  $\supset$  .  $0 + 0 = 0$  (1)

$a \varepsilon N_0 . 0 + a = a$  . Df+  $\supset$  .  $0 + (a + 1) = (0 + a) + 1 = a + 1$  (2)

(1) . (2) . Induct  $\supset$ :  $a \varepsilon N_0 \supset 0 + a = a$  (3)

Df+  $\supset$  .  $1 + 0 = 0 + 1 = 1$  (4)

$a \varepsilon N_0 . 1 + a = a + 1$   $\supset$  .  $1 + (a + 1) = (1 + a) + 1 = (a + 1) + 1$  (5)

(4) . (5) . Induct  $\supset$ :  $a \varepsilon N_0 \supset 1 + a = a + 1$  (6)

$a, b \varepsilon N_0 . a + b = b + a$  . Df+  $\supset$  .  $a + (b + 1) = (a + b) + 1 = (b + a) + 1$

Df+  $\supset$  . ” =  $b + (a + 1)$

(6)  $\supset$  . ” =  $b + (1 + a)$

Assoc+  $\supset$  . ” =  $(b + 1) + a$  (7)

(3) . (7) . Induct  $\supset$  . P ]

•5  $a, b, c \in N_0 . a+c = b+c \supset a=b$

[  $a, b \in N_0 . a+0 = b+0 \supset a=b$  (1)

$a, b, c \in N_0 : a+c = b+c \supset a=b : P1.4 \supset$  (2)

$a+(c+1) = b+(c+1) \supset a+c = b+c \supset a=b$   
(1) . (2) . Induct  $\supset P$  ]

•6  $a, b, c \in N_0 \supset a=b \implies a+c = b+c$

[  $P4.0 . \text{Export} \supset a, b, c \in N_0 \supset a=b \supset a+c = b+c$  (1)

$P4.5 . \text{Export} \supset a+c = b+c \supset a=b$  (2)

(1) . (2) .  $\text{IS}2P4.1 \supset P$  ]

•7  $a, b \in N_0 . a=0 \supset a+b = 0$

[  $a \in N_0 . a=0 . \text{Df}+ \supset a+0 = 0$  (1)

$a, b \in N_0 . P1.5 \supset a+(b+1) = (a+b)+1 . (a+b)+1 = 0 \supset$   
 $a+(b+1) = 0$  (2)

(1) . (2) . Induct  $\supset P$  ]

•8  $a, b \in N_0 \supset a+b = 0 \implies a=0 . b=0$

[  $P.7 . \text{Transp} \supset a, b \in N_0 . a+b = 0 \supset a=0$  (1)

(1) .  $\text{Comm}+ \supset b=0$  (2)

(1) . (2)  $\supset a=0 . b=0$  (3)

$\text{Df}+ \supset 0+0 = 0$  (4)

(3) . (4)  $\supset P$  ]

Super analysi de idea de numero, et suo historia, vide Formulario anteriore, et novo publicationes:

Huntington, *A complete set of postulates for the theorie of absolute continuous magnitude*. AmericanT. a.1902 p.264.

Dickson, *Definitions of a field by independent postulates*, AmericanJ. a.1903 p.13.

Dickson, *Definitions of a linear associative algebra by independent postulates*, Id. p.21.

Huntington, *Two definitions of an Abelian group by sets of independent postulates*, Id. p.27.

Huntington, *Definitions of a field by sets of independent postulates*, Id. p.31.

Huntington, *On a new edition of Stolz's Allgemeine Arithmetik, with an account of Peano's definition of number*. AmericanB. a.1902, t.9 p.40.

C. Burali-Forti. *Sulla teoria generale delle grandezze e dei numeri*. Atti Acc. Sc. Torino, 1904.

Encyclopédie des sciences mathématiques, t. 1, a. 1904.

§2       $\times$ 

$$\ast \quad 1. \quad a, b, c \in N_0 \quad \begin{array}{l} \cdot 0 \quad a \times 0 = 0 \\ \cdot 01 \quad a \times (b+1) = (a \times b) + a \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} \cdot 0 \\ \cdot 01 \end{array}} \right\} \text{DfX}$$

Definitione de signo  $\times$  per inductione.

Lege  $a \times b$  «  $a$  multiplicato per  $b$  », vel «  $a$  per  $b$  », vel « producto de  $a$  per  $b$  ».  $a$  et  $b$  es dicto « factore ».

Signo  $\times$  se inveni in Oughtred, *Clavis mathematica*, a. 1631.

Illo es signo hieroglyphico N. 87 de antiquo Ægyptios.

$$\cdot 02 \quad \begin{array}{l} a \times 1 = a \\ a \times 2 = a + a \end{array} \quad \begin{array}{l} [ (0 | b) P \cdot 01 \supset P ] \\ [ (1 | b) \quad \quad \quad ] \end{array}$$

$$\cdot 03 \quad \begin{array}{l} ab = a \times b \\ a \times b + c = (a \times b) + c \end{array} \quad \begin{array}{l} a \times b \times c = (a \times b) \times c \\ a + b \times c = a + (b \times c) \end{array} \quad \text{Df}$$

$$\cdot 1 \quad a \times b \in N_0$$

$$[ a \in N_0 \cdot \text{DfX} \cdot \supset \cdot a \times 0 \in N_0 \quad (1)$$

$$a, b \in N_0 \cdot a \times b \in N_0 \cdot \text{DfX} \cdot \S + 4 \cdot 1 \cdot \supset \cdot a \times (b+1) \in N_0 \quad (2)$$

$$(1) \cdot (2) \cdot \text{Induct} \cdot \supset \cdot P ]$$

$$\cdot 2 \quad a(b+c) = ab+ac \quad \text{Distrib}(\times, +)$$

$$[ a, b \in N_0 \cdot \supset \cdot a \times (b+0) = a \times b + a \times 0 \quad (1)$$

$$a, b, c \in N_0 \cdot a(b+c) = ab+ac \cdot \text{Assoc} + \cdot \text{DfX} \cdot \supset \cdot a[b+(c+1)] =$$

$$a[(b+c)+1] = a(b+c)+a = ab+ac+a = ab+a(c+1) \quad (2)$$

$$(1) \cdot (2) \cdot \text{Induct} \cdot \supset \cdot P ]$$

$$\cdot 3 \quad (a+b)c = ac+bc \quad \text{Distrib}(\times, +)$$

$$[ a, b \in N_0 \cdot \supset \cdot (a+b) \times 0 = a \times 0 + b \times 0 \quad (1)$$

$$a, b, c \in N_0 \cdot (a+b)c = ac+bc \cdot \text{DfX} \cdot \supset \cdot (a+b)(c+1) = (a+b)c + (a+b) =$$

$$ac+bc+a+b = (ac+a)+(bc+b) = a(c+1)+b(c+1) \quad (2)$$

$$(1) \cdot (2) \cdot \text{Induct} \cdot \supset \cdot P ]$$

$$\cdot 4 \quad ab = ba \quad \text{CommX}$$

$$[ \text{DfX} \cdot \supset \cdot 0 \times 0 = 0 \quad (1)$$

$$a \in N_0 \cdot 0 \times a = 0 \cdot \text{DfX} \cdot \supset \cdot 0 \times (a+1) = 0 \times a + 0 = 0 \quad (2)$$

$$(1) \cdot (2) \cdot \text{Induct} \cdot \supset \cdot 0 \times a = 0 \quad (3)$$

$$\text{DfX} \cdot \supset \cdot 1 \times 0 = 0 \quad (4)$$

$$a \in N_0 \cdot 1 \times a = a \cdot \supset \cdot 1 \times (a+1) = 1 \times a + 1 = a + 1 \quad (5)$$

$$(4) \cdot (5) \cdot \text{Induct} \cdot \supset \cdot 1 \times a = a \quad (6)$$

$$a \in N_0, P \cdot 0, (3) \vdash a \times 0 = 0 \times a \quad (7)$$

$$a, b \in N_0, ab = ba, \text{Df} \times \vdash a(b+1) = ab+a = ba+a$$

$$(6), P \cdot 3 \vdash \quad = ba+1a = (b+1)a \quad (8)$$

$$(7), (8), \text{Induct} \vdash P \quad ]$$

$$\cdot 5 \quad (a \times b) \times c = a \times (b \times c) \quad \text{Assoc} \times$$

$$[ \quad (a \times b) \times 0 = a \times (b \times 0) \quad (1)$$

$$a, b, c \in N_0, (ab)c = a(bc), \text{Df} \times, \text{Distrib}(\times, +) \vdash$$

$$(ab)(c+1) = (ab)c + ab = a(bc) + ab = a(bc+b) = a[b(c+1)] \quad (2)$$

$$(1), (2), \text{Induct} \vdash P \quad ]$$

$$\cdot 6 \quad a \times b = 0, a = 0 \vdash b = 0$$

$$\cdot 7 \quad a \times b = 0, a = 0, b = 0$$

$$\cdot 8 \quad a \times c = b \times c, c = 0 \vdash a = b$$

$$\ast \quad 2. \quad a, b, c, d \in N_0, \vdash$$

$$\cdot 1 \quad (a+b)(c+d) = ac+bc+ad+bd$$

$$\cdot 2 \quad (a+b)(b+c)(c+a) + abc = (ab+bc+ca)(a+b+c)$$

$$\cdot 3 \quad ab(a+b) + bc(b+c) + ca(c+a) + 2abc = (a+b)(b+c)(c+a)$$

## §3    ↑

$$\ast \quad 1. \quad a, b, c \in N_0 \quad \supset \quad \begin{array}{l} \cdot 0 \quad a \uparrow 0 = 1 \\ \cdot 01 \quad a \uparrow (b+1) = (a \uparrow b) \times a \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} \cdot 0 \\ \cdot 01 \end{array}} \right\} \text{Df} \uparrow$$

Lege  $a \uparrow b$ , «  $a$  ad potentia  $b$  », «  $a$  ad potestate  $b$  », «  $a$  ad  $b$  ». Es definitio per inductione.  $a$  es « basi »,  $b$  es « exponente ».

Notatione de P·5 es de Descartes a. 1637. De Morgan a. 1845 propone signo  $\uparrow$  (sub forma pauco differente), que es signo de radice verso. Illo es commodo quando exponente es expressioe complexio, et necessario in citatione de P1·0, 1·3, etc.

$$\begin{array}{ll} \cdot 02 \quad a \uparrow 1 = a & [ \text{Df} \uparrow . b = 0 \supset P ] \\ \quad \quad a \uparrow 2 = a \times a & [ \quad \quad \quad b = 1 \quad \quad \quad ] \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \cdot 03 \quad 1 \uparrow b = 1 & \\ [ \quad 1 \uparrow 0 = 1 & (1) \\ \quad b \in N_0 . 1 \uparrow b = 1 \supset 1 \uparrow (b+1) = (1 \uparrow b) \times 1 = 1 \times 1 = 1 & (2) \\ (1) . (2) . \text{Induct} \supset P ] & \end{array}$$

$$\cdot 04 \quad 0 \uparrow (a+1) = 0$$

$$\begin{array}{ll} \cdot 05 \quad a \uparrow b + c = (a \uparrow b) + c & . \quad a + b \uparrow c = a + (b \uparrow c) \\ \quad \quad a \uparrow b \times c = (a \uparrow b) \times c & . \quad a \times b \uparrow c = a \times (b \uparrow c) \end{array} \quad \text{Df}$$

$$\begin{array}{ll} \cdot 1 \quad a \uparrow b \in N_0 & \\ [ \quad a \in N_0 . \text{Df} \uparrow \supset a \uparrow 0 \in N_0 & (1) \\ \quad a, b \in N_0 . a \uparrow b \in N_0 \supset (a \uparrow b) \times a \in N_0 . \text{Df} \uparrow \supset a \uparrow (b+1) \in N_0 & (2) \\ (1) . (2) . \text{Induct} \supset P ] & \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \cdot 2 \quad a \uparrow (b+c) = a \uparrow b \times a \uparrow c & \\ [ \quad a, b \in N_0 \supset a \uparrow (b+0) = a \uparrow b = (a \uparrow b) \times 1 = a \uparrow b \times a \uparrow 0 & (1) \\ \quad a, b, c \in N_0 . a \uparrow (b+c) = a \uparrow b \times a \uparrow c \supset & \\ \quad \quad a \uparrow [b+(c+1)] = a \uparrow [(b+c)+1] = a \uparrow (b+c) \times a = & \\ \quad \quad a \uparrow b \times a \uparrow c \times a = a \uparrow b \times (a \uparrow c \times a) = a \uparrow b \times a \uparrow (c+1) & (2) \\ (1) . (2) . \text{Induct} \supset P ] & \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \cdot 3 \quad (a \times b) \uparrow c = (a \uparrow c)(b \uparrow c) & \text{Distrib}(\uparrow, \times) \\ [ \quad a, b \in N_0 \supset (a \times b) \uparrow 0 = a \uparrow 0 \times b \uparrow 0 & (1) \\ \quad a, b, c \in N_0 . (a \times b) \uparrow c = a \uparrow c \times b \uparrow c \supset (a \times b) \uparrow (c+1) = (a \times b) \uparrow c \times (a \times b) = & \\ \quad (a \uparrow c) \times (b \uparrow c) \times a \times b = [(a \uparrow c) \times a] \times [(b \uparrow c) \times b] = a \uparrow (c+1) \times b \uparrow (c+1) & (2) \\ (1) . (2) . \text{Induct} \supset P ] & \end{array}$$

$$4 \quad (a \setminus b) \setminus c = a \setminus (b \times c)$$

$$[ (a \setminus b) \setminus 0 = a \setminus (b \times 0) = 1 \quad (1)$$

$$(a \setminus b) \setminus c = a \setminus (b \times c) \quad \therefore (a \setminus b) \setminus (c+1) = a \setminus (b \times (c+1)) = a \setminus (b \times c + b) = a \setminus (b(c+1)) \quad (2)$$

$$(1) \cdot (2) \cdot \text{Induct} \quad \therefore P ]$$

$$5 \quad a^b = a \setminus b \quad \text{Df}$$

\* 2.  $a, b \in \mathbb{N}_0 \quad \therefore$

$$1 \quad (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$[ \quad \quad = (a+b)(a+b) = aa + ab + ba + bb = \quad \quad ]$$

$$2 \quad (a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$[ \quad \quad = (a+b)^2(a+b) = (a^2 + 2ab + b^2)(a+b) = a^3 + 2a^2b + ab^2 + a^2b + 2ab^2 + b^3 = \quad \quad ]$$

$$3 \quad (a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$$

$$4 \quad (a+b)^5 = a^5 + b^5 + 3ab(a+b)^3$$

$$5 \quad (a+b)^4 + a^4 + b^4 = 2(a^2 + ab + b^2)^2$$

$$(a+b)^5 + a^5 + b^5 = 2(a^2 + ab + b^2)^2 + 3[ab(a+b)]^2$$

$$6 \quad a^3(a+b)^2 + a^2b^2 + (a+b)^2b^2 = (a^2 + ab + b^2)^2$$

$$7 \quad (a+b)^6 = a^6 + b^6 + 5ab(a+b)(a^2 + ab + b^2)$$

$$8 \quad (a+b)^7 = a^7 + b^7 + 7ab(a+b)(a^2 + ab + b^2)^2$$

$$9 \quad (a+b)^8 + a^8 + b^8 = 2(a^2 + ab + b^2)^3 [(a^2 + ab + b^2)^2 + 4a^2b^2(a+b)^2]$$

\* 3.  $a, b, c \in \mathbb{N}_0 \quad \therefore$

$$1 \quad (a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$$

$$2 \quad (a+b+c)^3 = a^3 + b^3 + c^3 + 3(a^2b + ab^2 + a^2c + ac^2 + b^2c + bc^2) + 6abc$$

$$3 \quad \quad \quad = a^3 + b^3 + c^3 + 3(a+b)(a+c)(b+c)$$

$$4 \quad \quad \quad + 3abc = a^3 + b^3 + c^3 + 3(a+b+c)(ab+ac+bc)$$

$$5 \quad \quad \quad + a^3 + b^3 + c^3 = (b+c)^3 + (c+a)^3 + (a+b)^3 + 6abc$$

$$6 \quad (a+b+c)^4 + a^4 + b^4 + c^4 = 2(a^2 + b^2 + c^2)(a+b+c)^2 + 8abc(a+b+c) + 2(a^2b^2 + a^2c^2 + b^2c^2)$$

$$7 \quad (a+b+c)^4 + a^4 + b^4 + c^4 =$$

$$(a+b)^4 + (a+c)^4 + (b+c)^4 + 3 \times 4abc(a+b+c)$$

$$8 \quad (a+b+c)^5 = a^5 + b^5 + c^5 + 5(a+b)(a+c)(b+c)(a^2 + b^2 + c^2 + ab + ac + bc)$$

$$(a+b+c)^4 + (a^4 + b^4 + c^4) + 4abc(a+b+c) =$$

$$2\{(a+b)^3(b+c)^2 + (b+c)^3(c+a)^2 + (c+a)^3(a+b)^2\}$$

$$9 \quad a(b+c)^2 + b(c+a)^2 + c(a+b)^2 = (a+b)(b+c)(c+a) + 4abc$$



## §4 Cls'

\* 1.0  $k \in \text{Cls} \supset \text{Cls}'k = \text{Cls} \wedge x\exists(x \supset k)$  Df

Si  $k$  es classe,  $\text{Cls}'k$ , lege « classe de  $k$  » indica classe que continere in  $k$ , vel omni classe  $x$ , que satisfac ad conditione  $x \supset k$ .

Si  $u$  es classe de numero, et  $a$  es numero, tunc  $u+a$  indica classe de numero que nos obtine, si nos adde ad singulo numero  $u$ , numero  $a$ ; vel es classe composito de omni objecto  $x$ , reductibile ad forma  $x=y+a$ , ubi  $y$  es aliquo individuo de classe  $u$ ; in symbolo:

$u, v, w \in \text{Cls}'N_0, a \in N_0 \supset$

·1  $u+a = x\exists[x \wedge y\exists(x = y+a)]$  Df

·2  $a+u = \text{ } \text{ } (x = a+y)$  Df

·3  $u+v = x\exists[x\exists(y\exists z)(y \in u \wedge z \in v \wedge x = y+z)]$  Df

·4  $a+u = u+a$  ·5  $u+v = v+u$  } Comm + {

·6  $u+(v+w) = (u+v)+w = u+v+w$  } Assoc + {

·7  $a+(u \cap v) = (a+u) \cap (a+v)$  } Distrib (+,  $\cap$ ) {

$u+(v \cap w) = (u+v) \cap (u+w)$

\* 2.  $u, v, w \in \text{Cls}'N_0, a, b \in N_0 \supset$

·1-3  $(\times | +)$  P1.1-3 Df

·4  $au = ua$  ·5  $uv = vu$  ·6  $u(vw) = (uv)w = uvw$

·7  $a(u+v) = au+av$

·8  $u(a+b) \supset ua+ub$  ·9  $u(v+w) \supset uv+uw$

\* 3.  $u, v \in \text{Cls}'N_0, a, b \in N_0 \supset$

·1-3  $(\uparrow | +)$  P1.1-3

Df

·4  $a\uparrow(u+v) = (a\uparrow u) \times (a\uparrow v)$

·5  $(u \times v)^a = u^a \times v^a$

·6  $(a\uparrow a)\uparrow b = a\uparrow(ab)$

·7  $(a \times b)\uparrow u \supset a\uparrow u \times b\uparrow u$

·8  $u^{a \times b} \supset u^a u^b$



§5  $N_1 >$ \* 1.0  $N_1 = N_0 + 1$ 

Df

 $N_1$ , lege « numero naturale », indica successivo de numero..1  $N_1 \supset N_0$ [  $a \in N_0 . b = a + 1 . \S +1.2 \supset b \in N_0$  (1)(1) . Elim  $a \supset \exists N_0 \neg a \in (b = a + 1) \supset b \in N_0$ (2) . Df  $N_1 \supset b \in N_1 \supset b \in N_0$  (3)(3) . Oper  $b \supset P$  ].2  $N_0 = \iota 0 \cup N_1$ [  $\S +1.1 . \S +1.2 . P.1 \supset \iota 0 \supset N_0 . N_1 \supset N_0 . I \S \cup P 3.2 \supset \iota 0 \cup N_1 \supset N_0$  (1) $\S = .1 \supset 0 \in \iota 0$  (2)Df  $N_1 \supset a \in N_0 \supset a + 1 \in N_1$  (3)(2) . (3) . Induct  $\supset N_0 \supset \iota 0 \cup N_1$  (4) (1) . (4)  $\supset P$  ].3  $0 = \epsilon N_1$ [  $\S +1.5 \supset a \in N_0 . b = a + 1 \supset b = 0$ Elim  $a . Df N_1 \supset b \in N_1 \supset b = \epsilon \iota 0$ Comm( $=, \epsilon$ )  $\supset b \in N_1 \supset b = \epsilon \iota 0$ Oper  $b \supset N_1 \supset \iota 0$ Transp  $\supset \iota 0 \supset = N_1$  $\S +1.2 \supset P$  ].4  $N_1 = N_0 - \iota 0$  Dfp[  $P.3 . Oper = \iota 0 \supset N_0 - \iota 0 = N_1 - \iota 0 . N_1 - \iota 0 = N_1 \supset P$  ].5  $N_0 - N_1 = \iota 0$ .6  $0 = \iota N_0 - N_1$ \* 2.  $a, b, c, d \in N_0 \supset$ .0  $b > a \equiv b \in a + N_1$ 

Df &gt;

.01  $a < b \equiv b > a$ 

Df &lt;

Nos dice que  $b$  es majore de  $a$ , et que  $a$  es minore de  $b$ , et nos scribe  $b > a$ ,  $a < b$ , quando  $b$  es summa de  $a$  cum aliquo numero naturale..02  $a > b > c \equiv a > b . b > c$ 

Df

.1  $c > b . b > a \supset c > a$ [  $x, y \in N_1 . c = b + y . b = a + x \supset c = a + x + y = a + (x + y) \supset c > a$  (1)(1) . Elim( $x; y$ )  $\supset P$  ]

$$\cdot 2 \quad b > a \implies b + c > a + c$$

$$[ x \in N_1, b = a + x \implies b + c = a + x + c = a + c + x \implies b + c > a + c \quad (1)$$

$$x \in N_1, b + c = a + c + x, \S + P4.5 \implies b = a + x \implies b > a \quad (2)$$

$$(1)(2), \text{Elim } x \implies P ]$$

$$\cdot 3 \quad b > a, d > c \implies b + d > a + c$$

$$[ \text{Hp}, P.2 \implies b + d > a + d, a + d > a + c, P.1 \implies \text{Ths} ]$$

$$\cdot 4 \quad a = 0 \implies a > 0$$

$$[ P1.2 \implies a \in 0 \cup N_1 \implies P ]$$

$$\cdot 5 \quad a = b \implies a < b \implies a > b$$

$$[ a \in N_0, b = 0, P.4 \implies P \quad (1)$$

$$a, b \in N_0, a = b \implies a < b + 1 \quad (2)$$

$$, a < b \implies , \quad (3)$$

$$, c \in N_0, a = b + (c + 1), P.4 \implies d = b + 1 \implies a > b + 1 \quad (4)$$

$$, a > b, (4), \text{Elim } c \implies , \quad (5)$$

$$, a = b \implies a < b \implies a > b : (2)(3)(5) \implies$$

$$a < b + 1 \implies a = b + 1 \implies a > b + 1 \quad (6)$$

$$(1), (6), \text{Induct} \implies P ]$$

$$\cdot 6 \quad \neg(a > a)$$

$$[ 0 \in N_1 \implies a + 0 \in a + N_1 ]$$

$$* \quad 3. \quad a, b \in N_0 \implies : \cdot 0 \quad b \leq a \implies a \leq b \implies b \in a + N_0 \quad \text{Df} \leq$$

$$\cdot 1 \quad , \quad , \implies \neg(b < a) \quad \text{Dfp}$$

$$\cdot 2 \quad , \quad , \implies b > a \implies b = a \quad \text{Dfp}$$

$$* \quad 4.0 \quad a \in N_0, b \in a + N_0 \implies a \cdot b = (a + N_0) \cdot (b + N_1) \quad \text{Df} \dots$$

$$\cdot 1 \quad , \quad = N_0 \wedge x \exists (a \leq x \leq b) \quad \text{Dfp}$$

$a \cdot b$  indica classe de numero inter  $a$  et  $b$ .

$$\cdot 2 \quad c, a \in N_0, b \in a + N_0 \implies c + (a \cdot b) = (c + a) \cdot (c + b)$$

$$\text{Distrib}(+, \cdot)$$

$$\cdot 3 \quad a \in N_0 \implies a \cdot a = a$$

$$a, b \in N_0 \implies$$

$$\cdot 4 \quad (0 \cdot a) + (0 \cdot b) = 0 \cdot (a + b)$$

$$\text{Distrib}(0 \cdot, +)$$

$$\cdot 5 \quad 0 \cdot a = 0 \cdot b \implies a = b$$

$$\cdot 6 \quad a \leq b \implies 0 \cdot a \supset 0 \cdot b \implies a \in 0 \cdot b$$

$$\text{Dfp}$$

$$\cdot 7 \quad N_0 = N_0 \times (a + 1) + 0 \cdot a$$

$$* \quad 5. \quad a, b, c \in N_0 \implies$$

$$\cdot 1 \quad b \in N_0 \times a, c \in N_0 \times b \implies c \in N_0 \times a \quad [ (\times +) P2.1 \supset P ]$$

$$\cdot 2 \quad b \in N_0 \times a \implies N_0 \times b \supset N_0 \times a$$

$$[ P.1, \text{Export} \implies a \in N_0, b \in N_0 \times a \implies c \in N_0 \times b \implies c \in N_0 \times a$$

$$\text{Oper } c \implies P ]$$

- 3  $b, c \in N_0 \times a \supset b + c \in N_0 \times a$   
 [  $x, y \in N_0 . b = xa . c = ya \supset b + c = (x + y)a \supset b + c \in N_0 \times a$  (1)  
 (1) . Elim( $x; y$ )  $\supset$  P ]
- 4  $N_0 \times a + N_0 \times a = N_0 \times a$  [ = P·3 ]
- 5  $b, b + c \in N_0 \times a \supset c \in N_0 \times a$
- 6  $b \in N_0 \times a \supset bc \in N_0 \times ac$
- 7  $m, n \in N_0 \times c \supset am + bn \in N_0 \times c$
- 8  $a(a+1) \in 2N_0 . a(a+1)(a+2) \in 6N_0 . a(a+1)(2a+1) \in 6N_0$
- 9  $a + b \in 2N_0 \Rightarrow a, b \in 2N_0 \vee a, b \in 2N_0 + 1$

\* 6.  $a, b, c, d \in N_1 \supset$ :

- 0  $a > b \supset ac > bc$   
 [  $x \in N_1 . a = b + x \supset ac = bc + xc \supset ac > bc$  (1)  
 (1) . Elim  $x \supset$  P ]
- 1  $ac > bc \supset a > b$   
 [ P·0 .  $a \leq b \supset ac \leq bc$  . Transp  $\supset$  P ]
- 2  $a > b \Rightarrow ac > bc$  [ = P·0·1 ]
- 3  $a > b . c > d \supset ac > bd$   
 [ Hp . P·0  $\supset ac > bc . bc > bd \supset$  Ths ]
- 4  $a > b . c > d \supset ac + bd > ad + bc$   
 [ Hp .  $x, y \in N_1 . a = b + x . c = d + y \supset ac + bd = 2bd + by + dx + xy .$   
 $ad + bc = 2bd + by + dx \supset$  Ths ]

\* 7.  $a, b, m, n \in N_1 \supset$ :

- 1  $a > b \supset a^m > b^m$   
 [  $m = 1 \supset$  P (1)  
 $m \in N_1 . a > b . a^m > b^m \supset a^{m+1} > b^{m+1}$  (2)  
 (1) . (2) . Induct  $\supset$  P ]
- 2  $a > 1 . m > n \supset a^m > a^n$   
 [ Hp .  $p \in N_1 . m = n + p \supset a^{n+p} = a^n \times a^p . a^p > 1 \supset$  P ]

\* 8·1  $N_0^3 \supset 4N_0 \vee (4N_0 + 1)$

[  $N_0 = 2N_0 \vee (2N_0 + 1) . (2N_0)^3 \supset 4N_0 . (2N_0 + 1)^2 \supset 4N_0 + 1 \supset$  P ]

$$N_0^2 \supset 3N_0 \vee (3N_0 + 1)$$

$$N_0^3 \supset 4N_0 \vee (8N_0 + 1)$$

$$N_0^2 \supset 5N_0 \vee (5N_0 + 1) \vee (5N_0 + 4)$$

$$N_0^3 \supset 7N_0 \vee (7N_0 + 1) \vee (7N_0 + 6)$$

$$N_0^2 \supset 9N_0 \vee (9N_0 + 1) \vee (9N_0 + 8)$$

$$N_0^4 \supset 5N_0 \vee (5N_0 + 1)$$

## \* 9.

- 1  $N_1 \supset N_1^2 + N_0^2 + N_0^4 + N_0^8$  { BACHET a.1621 p.241 :  
 « Omnem autem numerum vel quadratum esse vel ex duobus aut tribus  
 aut etiam quatuor quadratis componi, satis experiendo deprehendis. » }

- 2  $N_1^2 + N_1^2 \supset N_1 - N_1^2$  { ALCHODSCHANDI a.992 {  
 •3  $N_1^4 + N_1^4 \supset N_1 - N_1^2$  { FERMAT t.1 p.327 {  
 •4  $n \in N_0 + 3 \cdot \supset N_1^n + N_1^n \supset N_1 - N_1^n$  { FERMAT t.1 p.291 :

« Cubum autem in duos cubos, aut quadratoquadratum in duos quadrato-  
 quadratos, et generaliter nullam in infinitum ultra quadratum potestatem  
 in duas eiusdem nominis fas est dividere: cuius rei demonstrationem mi-  
 rabilem sane detexi. Hanc marginis exiguitas non caperet .. »

\* 11.  $a, b \in N_1, a \neq b \cdot \supset$ 

- 1  $a^2 + b^2 > 2ab$  [ P6-4  $\supset$  P ]  
 •2  $2(a^2 + b^2) > (a+b)^2$  [ P-1  $\supset$  P ]  
 •3  $(a+b)^2 > 4ab$  { EUCLIDE VI P27 { [ P-1  $\supset$  P ]  
 •4  $a^2 + b^2 > ab(a+b)$  { HARRIOT p.79 {  
 [ P-1  $\cdot \supset (a^2 + b^2)(a+b) > 2ab(a+b) \cdot \supset P$  ]  
 •5  $2(a^2 + b^2) > (a+b)(a^2 + b^2)$   
 [ P-4  $\cdot \supset 2(a^2 + b^2) > ab(a+b) + a^2 + b^2 \cdot \supset P$  ]  
 •6  $4(a^2 + b^2) > (a+b)^2$   
 [ P-5  $\cdot \supset 4(a^2 + b^2) > (a+b) \cdot 2(a^2 + b^2) \cdot P-2 \cdot \supset P$  ]  
 •7  $3(a^4 + a^2b^2 + b^4) > (a^2 + ab + b^2)^2$  { BERTRAND a.1855 p.142 {  
 •8  $2(a^4 + a^2b^2 + b^4) > 3ab(a^2 + b^2)$   
 •9  $4(a^3 + ab + b^3)^2 > 3^2(a^2b + ab^2)^2$  { HARRIOT a.1631 p.85 {  
 •91  $3^3(a^3 + a^2b + ab^2 + b^3)^4 > 4^4a^2b^2(a^2 + ab + b^2)^3$

\* 12.  $a, b, c \in N_1, (a \neq b \neq c) \cdot \supset$ 

- 11  $a^2 + b^2 + c^2 > ab + ac + bc$  [ P11-1  $\supset$  P ]  
 •12  $3(a^2 + b^2 + c^2) > (a+b+c)^2 > 3(ab + ac + bc)$  [ P-11  $\supset$  P ]  
 •13  $a \leq b \leq c, a+b > c \cdot \supset 2(ab + ac + bc) > a^2 + b^2 + c^2$   
 [ Hp  $\cdot \supset (b+c)a > a^2, (c+a)b > b^2, (a+b)c > c^2 \cdot \supset P$  ]  
 •15  $2(a^2 + b^2 + c^2) > a^2(b+c) + b^2(c+a) + c^2(a+b)$  [ P11-4  $\supset$  P ]  
 •16  $3(a^2 + b^2 + c^2) > (a+b+c)(a^2 + b^2 + c^2)$  [ P-15  $\supset$  P ]  
 •17  $3(a^2 + b^2 + c^2) > (a+b+c)(ab + ac + bc)$  [ P-11, P-16  $\cdot \supset P$  ]

- 18  $9(a^3+b^3+c^3) > (a+b+c)^3$  [ P·16 . P·12 .  $\supset$  P ]  
 ·19  $a^3(b+c)+b^3(c+a)+c^3(a+b) > 6abc$  [ P11·1 .  $\supset$  P ]  
 ·20  $a^3+b^3+c^3 > 3abc$  [P·15 . P·19 .  $\supset$  P ]  
 } ·11·12·19·20 HARRIOT a.1631 p.84 {  
 ·21  $8(a^3+b^3+c^3) > 3(a+b)(a+c)(b+c)$  [P·15 . P·20 .  $\supset$  P]  
 ·22  $(a+b+c)(a^2+b^2+c^2) > 9abc$  [ P·19 . P·20 .  $\supset$  P ]  
 ·23  $2(a+b+c)(a^3+b^3+c^3) > 3[a^2(b+c)+b^2(c+a)+c^2(a+b)]$  [P·15  $\supset$  P]  
 ·24  $(a+b+c)^3 > 3^3abc$  [ P·19 . P·20 .  $\supset$  . P ]

{HARRIOT a.1631 p.85 : « Si quantitas secetur in tres partes inæquales Cubus è tertia parte totius major est solido è tribus partibus inæqualibus. Si sint quantitatis tres partes inæquales  $p, q, r$ , est...

$$\left. \begin{array}{l} p+q+r \\ p+q+r \\ p+q+r \end{array} \right\} > 27pqr$$

- 25  $(a+b)(b+c)(c+a) > 8abc$  [ P·19  $\supset$  P ]  
 ·26  $a^3+b^3+c^3+3abc > a^2(b+c)+b^2(c+a)+c^2(a+b)$   
 ·27  $a > b > c . \supset . a^3b+b^3c+c^3a > a^2c+b^2a+c^2b$   
 ·30  $(ab+ac+bc)^3 > 3abc(a+b+c)$  [  $(bc,ca,ab) \mid (a,b,c)$  P·12  $\supset$  P ]  
 ·31  $a^4+b^4+c^4 > abc(a+b+c)$   
 [  $(a^2,b^2,c^2) \mid (a,b,c)$  P·11 .  $\supset . a^4+b^4+c^4 > a^2b^2+a^2c^2+b^2c^2$  (1)  
 $(ab,ac,bc) \mid (a,b,c)$  P·11 .  $\supset . a^2b^2+a^2c^2+b^2c^2 > abc(a+b+c)$  (2)  
 (1) . (2) .  $\supset$  . P ]  
 ·32  $(a+b+c)(a^3+b^3+c^3) > (a^2+b^2+c^2)^3$

\* 13.  $a, b, c, d \in N_1 . \neg(a=b=c=d) . \supset .$

- 1  $4(a^3+b^3+c^3+d^3) > (a+b+c+d)^3$   
 ·2  $3(a^3+b^3+c^3+d^3) > 2(ab+ac+ad+bc+bd+cd)$  [P·1  $\supset$  P]  
 ·3  $3(a+b+c+d)^3 > 8( \quad \quad \quad )$  [P·2  $\supset$  P]  
 } ·2·3 MACLAURIN a.1726 LondonT. t.34 p.109, 104, 112 {  
 ·4  $a, b, c, d \in N_1 . \neg(ad=bc) . \supset . (a^3+b^3)(c^3+d^3) > (ac+bd)^3$   
 ·5  $a, b, c, d \in N_1 . \neg(ad=bc) . \supset . (a^3d^3+b^3c^3)(c+d)^2 > (a+b)^3c^3d^3$   
 ·6  $a, b, c, d, e, f \in N_1 . \neg(aef= bdf= cde) . \supset .$   
 $(a^3+b^3+c^3) \times (d^3+e^3+f^3) > (ad+be+cf)^3$

\* 14.  $a, b, m \in N_1 . a \Leftarrow b . \supset$ .

- 1  $a^{m+1} + b^{m+1} > ab(a^m + b^m)$   
 [ Hp .  $a > b . \supset . a^{m+1} > b^{m+1} . P6 \cdot 4 . \supset . P$  ]  
 ·2  $2^m(a^{m+1} + b^{m+1}) > (a+b)^{m+1}$

\* 15.  $a, b, c \in N_1 . \supset$ :

- 1  $a^2 \in N_1 b^2 . \Rightarrow . a \in N_1 b$     ·2  $a^2 \in N_1 b^2 . \Rightarrow . a \in N_1 b$   
 } EUCLIDE VIII P14-17:

*Ἐὰν τετράγωνος τετράγωνον μετρήῃ, καὶ ἡ πλευρὰ τὴν πλευρὰν μετρήσῃ καὶ ἂν ἡ πλευρὰ τὴν πλευρὰν μετρήῃ, καὶ ὁ τετράγωνος τὸν τετράγωνον μετρήσῃ.*

*Ἐὰν κύβος ἀριθμὸς κύβον ἀριθμὸν μετρήῃ, —————*

*—————, καὶ ὁ κύβος τὸν κύβον —————. }*

- 3  $a \in N_1 \times b . \Rightarrow . a^m \in N_1 \times b^m$     } EUCLIDE VIII P6 {  
 ·4  $a^2 + b^2 \in 3N_1 . \supset . a, b \in 3N_1$  :  $a^2 + b^2 \in 7N_1 . \supset . a, b \in 7N_1$   
 ·5  $a^2 = b^2 + c^2 . \supset . b \in 3N_1 \cup c \in 3N_1 . b \in 4N_1 \cup c \in 4N_1 .$   
 $a \in 5N_1 \cup b \in 5N_1 \cup c \in 5N_1 . abc \in 3 \times 4 \times 5 \times N_1$   
 } FRÉNICLE a.1676 p.76-79 {  
 ·6  $m \in 2N_1 + 1 . \supset . a^m + b^m \in N_1 \times (a+b)$   
 ·7  $n \in N_1 - 3N_1 . \supset . a^{2n} + a^n + 1 \in N_1 \times (a^2 + a + 1)$   
 } EULER Op. post. t.1 p.186 {  
 ·8  $a^2 \in N_1^2 . \supset . a \in N_1^2$     } EUCLIDE IX P6 :  
*Ἐὰν ἀριθμὸς ἐαυτὸν πολλαπλασιάσας κύβον ποιῇ, καὶ αὐτὸς κύβος ᾖ.*  
 [  $a, b \in N_1 . a^2 = b^2 . \supset . a^2 = b \times b^2 . \supset . a^2 \in N_1 \times b^2 . P15 \cdot 1 . \supset . a \in N_1 \times b$   
 $a, b, c \in N_1 . a = bc . a^2 = b^2 . \supset . b^2 c^2 = b^2 . \supset . c^2 = b . \supset . a = c^2 . \supset . a \in N_1^2$  ]  
 ·9  $(N_1 \times a^2) \cap N_1^2 = N_1^2 \times a^2$     [ P15·1 .  $\supset . P$  ]

\* 16.  $a \in N_1 . \supset$ .

- 1  $a+1, a^2+1 \in 2N_1^2 . \Rightarrow . a=1$  .  $\vee . a=7$     } FERMAT t.2 p.434 {  
 ·2  $a^2+2 \in N_1^2 . \Rightarrow . a=5$     ·3  $a^2-4 \in N_1^2 . \Rightarrow . a=2$  .  $\vee . a=11$   
 } FERMAT a.1657 t.2 p.345:

«... il n'y a qu'un seul nombre carré en entiers qui, joint au binaire, fasse un cube, et le dit carré est 25...»

«... si on cherche un carré qui, ajouté à 4 fasse un cube, on n'en trouvera jamais que deux en nombres entiers, savoir 4 et 121.»!

- 4  $a^2 + a \in 2N_1^2 \supset a=1$  { FERMAT t.1 p.341 }
- 5  $a(a+1)(a+2)(a+3)+1 \in N_1^2$  [  $= (a^2+3a+1)^2$  ]
- 6  $a(a+1), a(a+1)(a+2) \in N_1^2 \cup N_1^2$
- 7  $2 \times (N_0^2 + N_0^2) \supset N_0^2 + N_0^2$  .  $(N_1^2 + N_1^2) \times (N_1^2 + N_1^2) \supset N_0^2 + N_1^2$   
 $(2N_0+1)(8N_0+7) \supset N_0^2 + N_0^2 + N_1^2$  { LEGENDRE a.1797 p.398 }  
 $2N_0+1 \supset N_0^2 + N_0^2 + 2N_0^2$  " "
- $n \in N_1 \supset (N_0^2 + N_0^2 + N_0^2)^n \supset N_0^2 + N_0^2 + N_0^2$
- 8  $(N_1+1)^2 \supset N_1^2 + N_1^2 + N_0^2 + N_0^2$   
 { P. TANNERY IdM. a.1898 t.5 p.281 }
- 9  $(8N_0+7) \times N_1^2 \supset N_1^2 + N_1^2 + N_1^2 + N_1^2$   
 { FERMAT a.1636 t.2 p.66:

« Octuplum cuiuslibet numeri unitate deminutum componitur ex quatuor quadratis tantum, non solum in integris sed etiam in fractis ».

\* 17.

- 1  $a \in N_1, a^2 \in N_1^2 + 2N_1^2 \supset a \in N_1^2 + 2N_1^2$   
 { FERMAT t.1 p.340; Dm. EULER *Algèbre* t.2 c.13 }
- 3  $N_1^2 + N_1^2 \supset N_1 - N_1^2$  { FERMAT t.1 p.340 }
- 6  $N_1^2 \times (4N_0+3) \supset N_1 - (N_0^2 + N_0^2)$  { FERMAT a.1640 t.2 p.203:  
 « Un nombre moindre de l'unité qu'un multiple du quaternaire n'est ni  
 carré, ni composé de deux carrés, ni en entiers, ni en fractions ».
- 7  $N_1^2 \times (8N_0+7) \supset N_1 - (N_0^2 + N_0^2 + N_0^2)$  { FERMAT voir 9·22 }



## §6 —

\* 1.0  $a \in N_0 . b \in a + N_0 . \supset . b - a = \iota [N_0 \wedge x \exists (x + a = b)]$  Df —

$$1.1 \quad b - a \in N_0 . (b - a) + a = b$$

$$[ \text{Hp} . \supset . \exists N_0 \wedge x \exists (b = x + a) ] \quad (1)$$

$$\text{Hp} . x, y \in N_0 . b = x + a . b = y + a . \S + 4.5 . \supset . x = y \quad (2)$$

$$(1) . (2) . \S P.1 . \supset . b - a \in N_0 \wedge x \exists (x + a = b) ]$$

Si  $a$  es numero, et  $b$  es numero superiore aut æquale ad  $a$ , tunc  $b - a$ , lege «  $b$  minus  $a$  » indica illo numero  $x$  tale que  $x + a$  vale  $b$ . Definitione de signo —.

Si nos opera per signo  $x =$  super ambo membro de definitione, id es, si nos scribe  $x =$  ante ambo membro, nos obtine

$$x = b - a . = . x = \iota [N_0 \wedge x \exists (x + a = b)]$$

Si, in loco de  $x =$ , in secundo membro, nos scribe  $x \iota$  (per §1), et si nos mene que  $\iota$  et  $\iota$  se destrue, nos habe

$$x = b - a . = . x \iota [N_0 \wedge x \exists (x + a = b)]$$

Nos distribue signo  $x \iota$  ad duo factore logico de secundo membro, et supprime  $x \iota x \exists$ , que mutuo se destrue, et habe

$$x = b - a . = . x \iota N_0 . x + a = b.$$

Viceversa, de ultimo propositione, si nos extrahe signo  $b - a$  in primo membro, nos deduce definitione de —.

$$2. \quad a, b \in N_0 . \supset . (b + a) - a = b$$

$$[ (b + a) \vdash b P.1 . \supset . [(b + a) - a] + a = b + a . \S + 4.5 . \supset . P ]$$

$$3. \quad a \in N_0 . \supset . a - 0 = a . a - a = 0$$

$$[ a + 0 = a . \text{Oper} - 0 . \text{Oper} - a . \supset . P ]$$

$$4. \quad a, b, c \in N_0 . \supset .$$

$$a + b - c = (a + b) - c . a - b + c = (a - b) + c . a - b - c = (a - b) - c \quad \text{Df}$$

$$5. \quad b, c \in N_0 . a \in b + c + N_0 . \supset . a - (b + c) = a - b - c$$

$$[ a - b - c + (b + c) = a - b - c + (c + b) = a - b - c + c + b = a - b + b = a . \text{Oper} -(b + c) . \supset . P ]$$

$$6. \quad a, c \in N_0 . b \in c + N_0 . \supset . a + (b - c) = a + b - c$$

$$[ a + (b - c) + c = a + [(b - c) + c] = a + b . \text{Oper} - c . \supset . P ]$$

$$7. \quad c \in N_0 . b \in c + N_0 . a \in b + N_0 . \supset . a - (b - c) = a - b + c$$

$$[ a - b + c + (b - c) = a - b + c + b - c = a - b + b + c - c = a - b + b = a . \text{Oper} -(b - c) . \supset . P ]$$

$$8. \quad b, c \in N_0 . a \in b + N_0 . \supset . a - b + c = a + c - b$$

$$[ a - b + c = c + (a - b) = c + a - b = a + c - b ]$$

$$9. \quad b, c \in N_0 . a \in b + c + N_0 . \supset . a - b - c = a - c - b \quad [ P.5 \supset P ]$$

- \* 2.1  $a, b \in N_0 . a > b . \supset . a - b \in N_1$
- \* 2  $a, b \in N_0 . a > b . c \in a + N_0 . \supset . c - a < c - b$   
 [ Hp.  $\supset . a - b \in N_1 . (c - a) + (a - b) = c - b . \supset .$  Ths ]
- \* 3  $a, b, c \in N_0 . a > b . b \in c + N_0 . \supset . a - c > b - c$   
 [ Hp.  $\supset . a - b \in N_1 . a - c = (b - c) + (a - b) . \supset .$  P ]
- \* 4  $a, b, c, d \in N_0 . a > b . c < d . b \geq d . \supset . a - c > b - d$   
 [ Hp.  $\supset . a - c > b - c . b - c > b - d . \supset .$  Ths ]
- \* 3.1  $b, c \in N_0 . a \in b + N_0 . \supset . (a - b)c = ac - bc$   
 [ Df- . Distrib( $\times, +$ )  $\supset . ac = [(a - b) + b]c = (a - b)c + bc . \supset .$  P ]
- \* 2  $b, d \in N_0 . a \in b + N_0 . c \in d + N_0 . \supset . (a - b)(c - d) = ac + bd - bc - ad$

## §7 /

- \* 1.0  $a \in N_1 . b \in N_1 \times a . \supset . b/a = 1 N_1 \wedge \exists x(x \times a = b)$  Df/  
 \* 1  $b/a \in N_1 . (b/a) \times a = b$
- \* 2  $a, b \in N_1 . \supset . (b \times a)/a = b$
- \* 3  $a \in N_1 . \supset . a/1 = a . a/a = 1$
- \* 4  $a, b, c \in N_1 . \supset . a \times b/c = (a \times b)/c .$   
 $a/b \times c = (a/b) \times c .$   
 $a/b/c = (a/b)/c$  Df
- \* 3  $b, c \in N_1 . a \in b \times c \times N_1 . \supset . a/(b \times c) = a/b/c$
- \* 6  $a, c \in N_1 . b \in c \times N_1 . \supset . a \times (b/c) = a \times b/c$
- \* 7  $c \in N_1 . b \in c \times N_1 . a \in b \times N_1 . \supset . a/(b/c) = a/b \times c$
- \* 8  $b, c \in N_1 . a \in b \times N_1 . \supset . a/b \times c = a \times b/c$
- \* 9  $b, c \in N_1 . a \in b \times c \times N_1 . \supset . a/b/c = a/c/b$
- \* 2.1  $c \in N_1 . a, b \in N_1 \times c . \supset . (a + b)/c = a/c + b/c$   
 [  $a/c + b/c \times c = a/c \times c + b/c \times c = a + b .$  Oper  $/c . \supset .$  P ]
- \* 2  $c \in N_1 . a, b \in N_1 \times c . a > b . \supset . (a - b)/c = a/c - b/c$   
 [  $(a - b)/c \times c = a/c \times c - b/c \times c .$  Oper  $-b/c . \supset .$  P ]

$(N_1, \times, /, 1) \mid (N_0, +, -, 0) \S - P1.0-9 . \supset . \S / P1.0-9$

Lege  $b/a$  «  $b$  diviso per  $a$  », vel «  $b$  in  $a$  ». Ab plure P de §- nos deduce P de §-, si nos lege  $N_1, \times, /, 1$  in loco de  $N_0, +, -, 0$ .



- 6  $b \geq a \rightarrow \max(a \cdot b) = b$
- 7  $(0 \cdot a) \wedge (0 \cdot b) = 0 \rightarrow \max(u \wedge v) = 0$
- 8  $\exists u \in N_0 \rightarrow \exists u \wedge (m + N_1) \rightarrow$
- [ Hp .  $m = 0 \rightarrow 0 = \max u \rightarrow$  Ths  
 $m \in N_0 : u \in \text{Cls}'N_0 \rightarrow \exists u \rightarrow \exists u \wedge (m + N_1)$   
 $\rightarrow \exists u \wedge (m + 1 + N_0) \rightarrow \exists m \in u \rightarrow$   
 $\text{Hp}(2) \rightarrow m \in u \rightarrow m = \max u \rightarrow$   
 $\text{Hp}(2) \rightarrow m \in u \rightarrow \exists u \wedge (m + N_0) \rightarrow$   
 $\text{Hp}(2) \rightarrow (3) \rightarrow (4) \rightarrow \max u \in N_0$   
 $(1) \rightarrow (5) \rightarrow \text{Induct} \rightarrow P ]$

\* 2.  $u, v \in \text{Cls}'N_0 \rightarrow \max u, \max v$

- 1  $\max(u \wedge v) = \max(u \wedge \max v)$
- 2  $\max(u + v) = (\max u) + (\max v)$
- [ Hp  $\rightarrow \max u \in u \rightarrow \max v \in v \rightarrow$   
 $x \in u \rightarrow y \in v \rightarrow x + y \rightarrow x \leq \max u$   
 $z \in u + v \rightarrow (2) \rightarrow \text{Elim}(x; y) \rightarrow z \leq$   
 $(1) \rightarrow (3) \rightarrow \text{Df max} \rightarrow P ]$
- 3  $\max(u \times v) = (\max u) \times (\max v)$
- 4  $u \in \text{Cls}'N_1 \rightarrow \max(u \uparrow v) =$
- 5  $a \in N_1 \rightarrow \max N_1 \wedge x \in a \in N_1$
- 6  $\max u \in u \rightarrow \text{num } u \in N_1$

§10 min (v)

\* 1·0·4  $(\min, <) \mid (\max, >)$  §

- 5  $u \in \text{Cls}'N_0 \rightarrow \min u = 0$
- 7  $a, b \in N_0 \rightarrow (0 \cdot a) \wedge (0 \cdot b) = 0$
- 8  $u \in \text{Cls}'N_0 \rightarrow \exists u \rightarrow \min u \in u$
- 9  $\min N_0 = 0 \rightarrow \min N_1 = 1$

\* 2.  $\min \mid \max$  §max 2·1·4

- 5  $u \in \text{Cls}'N_0 \rightarrow \max u = \min$
- 6  $\min u = \max$

## §11 quot (quoto) rest (resto)

\* 1.  $a, b \in N_0, c, d \in N_1, \supset$ .

•0  $\text{quot}(a, c) = \max[N_0 \wedge x \exists (x \times c \leq a)]$  Df quot

•1  $\text{quot}(a, c) \in N_0$

[  $0 \in N_0 \wedge x \exists (x \leq a) \cdot \neg \exists N_0 \wedge x \exists (x \leq a \wedge (a \div N_1)) \cdot \S \max 1.8 \cdot \supset \cdot P$  ]

•2  $\text{quot}(0, c) = 0$  [  $\text{quot}(0, c) = \max[N_0 \wedge x \exists (x \times c \leq 0)] = \max \{0\} = 0$  ]

•3  $\text{quot}(a, 1) = a$  [  $\text{quot}(a, 1) = \max[N_0 \wedge x \exists (x \leq a)] = \max \{0 \dots a\} = a$  ]

•4  $\text{quot}(ad, cd) = \text{quot}(a, c)$

[  $\text{quot}(ad, cd) = \max N_0 \wedge x \exists (cdx \leq ad) = \max N_0 \wedge x \exists (cx \leq a) = \text{quot}(a, c)$  ]

•5  $c \times \text{quot}(a, c) \leq a < c \times [\text{quot}(a, c) + 1]$

•6  $\text{quot}(a, c) = \iota N_0 \wedge x \exists [x \times c \leq a \cdot (x+1) \times c > a]$  Dfp

•7  $\text{quot}(ac+b, c) = a + \text{quot}(b, c)$

[ P.5  $\supset$ .  $c \cdot \text{quot}(b, c) \leq b < c[\text{quot}(a, c) + 1]$

Oper+ac  $\supset$ .  $c[a + \text{quot}(b, c)] \leq ac+b < c[a + \text{quot}(a, c) + 1]$

P.6  $\supset$ . P ]

•8  $\text{quot}(a, cd) = \text{quot}[\text{quot}(a, c), d]$

[  $d \times \text{quot}[\text{quot}(a, c), d] \leq \text{quot}(a, c)$  (1)

$\text{quot}(a, c) < d \times [\text{quot}[\text{quot}(a, c), d] + 1]$  (2)

(2)  $\supset$ :  $\text{quot}(a, c) + 1 < d \times [\text{quot}[\text{quot}(a, c), d] + 1]$  (3)

$c \times \text{quot}(a, c) \leq a$  (4)

$a < c \times [\text{quot}(a, c) + 1]$  (5)

(1)  $\cdot$  Oper  $\times c$   $\cdot$  (4)  $\supset$ .  $cd \times \text{quot}[\text{quot}(a, c), d] \leq a$  (6)

(3)  $\cdot$  Oper  $\times c$   $\cdot$  (5)  $\supset$ .  $a < cd \times [\text{quot}[\text{quot}(a, c), d] + 1]$  (7)

(6)  $\cdot$  (7)  $\supset$ . P ]

\* 2. Hp P1  $\supset$ :

•0  $a < c \implies \text{quot}(a, c) = 0$  :  $a \leq c \implies \text{quot}(a, c) \in N_1$

•1  $a > b \supset \text{quot}(a, c) \leq \text{quot}(b, c)$

•2  $c > d \supset \text{quot}(a, c) \leq \text{quot}(a, d)$

•3  $a > b, c < d \supset \text{quot}(a, c) \leq \text{quot}(b, d)$

•4  $\text{quot}(a+b, c) \leq \text{quot}(a, c) + \text{quot}(b, c)$

•5  $\text{quot}(a+b, c) \leq \text{quot}(a, c) + \text{quot}(b, c) + 1$

•6  $a > \text{quot}(b, c) \implies ac > b$

- 7  $\text{quot}(a, c) > \text{quot}(b, d) \implies ad > bc$
- 8  $c \times \text{quot}(a, d) \leq \text{quot}(ac, d) < [\text{quot}(a, d) + 1]c$
- 9  $\text{quot}(a, c) \times \text{quot}(b, d) \leq \text{quot}(ac, bd) < [\text{quot}(a, c) + 1] \times [\text{quot}(b, d) + 1]$

\* 3·0  $a \in N_1, b \in N_1 \times a \supset \text{quot}(b, a) = b/a$

\* 4.  $a, b \in N_0, c, d \in N_1 \supset$ :

- 0  $\text{rest}(a, c) = a - c \times \text{quot}(a, c)$  Df rest
- 1  $a = c \times \text{quot}(a, c) + \text{rest}(a, c)$  [ =P·0 ]
- 2  $\text{rest}(a, c) < c$   
[ §quot1·5  $\supset a < c \times [\text{quot}(a, c) + 1] \supset a - c \times \text{quot}(a, c) < c$ . Df rest  $\supset$  P ]
- 3  $q, r \in N_0, a = cq + r, r < c \supset q = \text{quot}(a, c), r = \text{rest}(a, c)$   
[  $\text{quot}(a, c) = \text{quot}(cq + r, c) = c + \text{quot}(r, c), \text{quot}(r, c) = 0 \supset$  P ]
- 4  $\text{rest}(a + bc, c) = \text{rest}(a, c)$   
[  $\text{rest}(a + bc, c) = a + bc - c \times \text{quot}(a + bc, c) = a + bc - c \times [b + \text{quot}(a, c)]$   
 $= a - c \times \text{quot}(a, c) = \text{rest}(a, c)$  ]
- 5  $\text{rest}(ad, cd) = d \times \text{rest}(a, c)$   
[  $\text{rest}(ad, cd) = ad - cd \times \text{quot}(ad, cd) = ad - cd \times \text{quot}(a, c)$   
 $= d \times [a - \text{quot}(a, c)] = d \times \text{rest}(a, c)$  ]
- 6  $\text{rest}(a + b, c) = \text{rest}[\text{rest}(a, c) + \text{rest}(b, c), c]$   
[  $a = c \times \text{quot}(a, c) + \text{rest}(a, c), b = c \times \text{quot}(b, c) + \text{rest}(b, c) \supset a + b =$   
 $c \times [\text{quot}(a, c) + \text{quot}(b, c)] + \text{rest}(a, c) + \text{rest}(b, c) \supset \text{rest}(a + b, c) =$   
 $\text{rest}[\text{rest}(a, c) + \text{rest}(b, c), c]$  ]
- 7  $\text{rest}(ab, c) = \text{rest}[\text{rest}(a, c) \times \text{rest}(b, c), c]$
- 8  $m \in N_1 \supset \text{rest}(a^m, c) = \text{rest}_1[\text{rest}(a, c)]^m, c$

\* 5. Hp P1  $\supset$

- 0  $\text{rest}(0, c) = 0, \text{rest}(c, c) = 0$  ·1  $\text{rest}[\text{rest}(a, c), c] = \text{rest}(a, c)$
- 2  $\text{rest}(a, c) = \text{rest}(b, c) \implies \text{rest}(a + d, c) = \text{rest}(b + d, c)$
- 3  $a < c \supset \text{rest}(a, c) = a$  ·4  $a > c \supset a > 2 \text{rest}(a, c)$
- 5  $a \in N_0 \times c \implies \text{rest}(a, c) = 0$
- 6  $\text{rest}(a, c) = \text{rest}(b, c) \supset \text{rest}(ad, c) = \text{rest}(bd, c)$
- 7  $\text{rest}(a + b, c) = \text{rest}(b, c) \supset a \in N_0 \times c$
- 8  $\text{rest}(a, c) + \text{rest}(b, c) \in N_0 \times c \supset a + b \in N_0 \times c$
- 9  $\text{rest}(a^2, 6) = \text{rest}(a, 6) \quad \text{rest}(a^2, 4) \in \{0, 1\}$

\* 6. Hp P1 . $\supset$ .

$$\cdot 1 \quad \text{quot}[\text{rest}(a, c), c] = 0 . \text{quot}[\text{rest}(a, cd), c] = \text{rest}[\text{quot}(a, c), d]$$

$$\cdot 2 \quad \text{rest}(a, c) + c \times \text{rest}[\text{quot}(a, c), d] = \text{rest}(a, cd)$$

$$\cdot 3 \quad a \leq c . \text{quot}(a, c) = \epsilon d \times N_1 . \supset .$$

$$\text{rest}(a, cd) > \text{rest}(a, c) . \text{rest}(a, cd) - \text{rest}(a, c) \in c \times N_1$$

$$\cdot 4 \quad \text{quot}(a+b, c) = \text{quot}(a, c) + \text{quot}[b + \text{rest}(a, c), c]$$

$$\cdot 5 \quad \text{quot}(a, c) = \text{quot}(a, c+d) . = . \text{rest}(a, c) \leq [\text{quot}(a, c)] \times d$$

$$\cdot 6 \quad c > d . \supset : \text{quot}(a, c) = \text{quot}(a, c-d) . = .$$

$$c - \text{rest}(a, c) > [\text{quot}(a, c) + 1] \times d$$

$$\cdot 7 \quad \text{quot}(a, c) = \text{quot}(a+b, c+b) . = . \text{rest}(a, c) \leq [\text{quot}(a, c) - 1] \times b$$

$$\cdot 8 \quad \max N_1 \{ \text{quot}(a+x, c) = \text{quot}(a, c) \} = c - \text{rest}(a, c) - 1$$

$$\cdot 9 \quad ac \leq . \supset . \text{quot}[a, \text{quot}(a, c)] = c + \text{quot}[\text{rest}(a, c), \text{quot}(ac, c)]$$

$$\text{-----} \text{rest}[a, \text{quot}(a, c)] = \text{rest}[\text{rest}(a, c), \text{quot}(a, c)]$$

## §12 Cfr

$a \in N_0, n \in N_1 \Rightarrow$

•0  $\text{Cfr}_0 a = \text{rest}(a, X)$  ,  $\text{Cfr}_n a = \text{Cfr}_0 \text{quot}(a, X^n)$  Df

•1  $\text{rest}(a, 2) = \text{rest}(\text{Cfr}_0 a, 2)$  .  $\text{rest}(a, 5) = \text{rest}(\text{Cfr}_0 a, 5)$   
[  $a = X \text{quot}(a, X) + \text{Cfr}_0 a$  .  $X = 2 \times 5 \Rightarrow P$  ]

•2  $\text{rest}(a, 4) = \text{rest}(\text{Cfr}_0 a + 2\text{Cfr}_1 a, 4)$   
[  $\text{rest}(a, 4) = \text{rest}[X^2 \times \text{quot}(a, X^2) + X \times \text{Cfr}_1 a + \text{Cfr}_0 a, 4]$  .  
 $\text{rest}(X^2, 4) = 0$  .  $\text{rest}(X, 4) = 2 \Rightarrow P$  ]

•3  $\text{rest}(a, 8) = \text{rest}(\text{Cfr}_0 a + 2\text{Cfr}_1 a + 4\text{Cfr}_2 a, 8)$

•4  $a \in 2N_0 \Rightarrow \text{Cfr}_0 a \in 2N_0$  :  $a \in 5N_0 \Rightarrow \text{Cfr}_0 a \in 5N_0$

•5  $\text{Cfr}_0 a^5 \in \{0 \cup \{1\} \cup \{4\} \cup \{5\} \cup \{6\} \cup \{9\}$

$\text{Cfr}_0 a^5 = 6 \Rightarrow \text{Cfr}_1 a^5 \in 2N_0 + 1$

$a \in (2N_1) - (5N_1) \Rightarrow \text{Cfr}_0 a^5 = 6$

$a \in N_1 - (2N_1) - (5N_1) \Rightarrow \text{Cfr}_0 a^5 = 1$

$a, n \in N_1 \Rightarrow \text{Cfr}_0 a^5 = \text{Cfr}_0 a$  .  $\text{Cfr}_0 a^{n+5} = \text{Cfr}_0 a^n$

$m \in (4N_0) \setminus (4N_0 + 1) \Rightarrow \text{Cfr}_1 7^m = 0$

$m \in (4N_0 + 2) \setminus (4N_0 + 3) \Rightarrow \text{Cfr}_1 7^m = 4$

Si  $a$  es numero,  $\text{Cfr}_0 a$  indica « cifra de unitate », et  $\text{Cfr}_n a$  indica « cifra de loco  $n$ , ante unitate ».

## §13 ord

$a, b \in N_1 \Rightarrow$  •0  $\text{orda} = \max N_0 \wedge n \exists (X^n \leq a)$  Df

•1  $X \nmid \text{orda} \leq a < X \nmid (\text{orda} + 1)$

•2  $\text{ord}(a+b) \geq \max(\text{orda} \cup \text{ord} b)$   
 $\leq \text{max} + 1$

•3  $a > b \Rightarrow \text{orda} \leq \text{ord} b$

•4  $\text{ord}(a \times b) \leq \text{orda} + \text{ord} b$   
 $\geq \text{orda} + \text{ord} b + 1$

•5  $b \times \text{orda} \leq \text{ord}(a \nmid b) < b \times \text{orda} + b$

•6  $a > b \Rightarrow \text{ord}(a - b) \geq \text{orda}$

•7  $a > b \Rightarrow \text{ord} \text{quot}(a, b) \leq \text{orda} - \text{ord} b - 1$   
 $\leq \text{orda} - \text{ord} b$

$\text{orda}$ , lege : ordine de  $a$ . Numero de cifras de  $a$  vale  $\text{orda} + 1$ .



## §14 ! C

\* 1.0  $0! = 1$  :  $a \in N_0 \rightarrow (a+1)! = a! \times (a+1)$  Df

\*01  $a, b \in N_0 \rightarrow \begin{matrix} a+b! = a+(b!) & . & a-b! = a-(b!) \\ a \times b! = a \times (b!) & . & a/b! = a/(b!) \end{matrix}$  Df

\*1  $a, b \in N_0 \rightarrow (a+b)! \in N_1 \times (a! \times b!)$  } B. PASCAL t.3 p.274:

« Omnis productus a quotlibet numeris continuis est multiplex producti a totidem numeris continuis quorum primus est unitas. »

Notatione  $a!$  « factoriale de  $a$  », introducto per Kramp a. 1808, es plus diffusio que notatione  $\Pi a$ ,  $\lfloor a$ .

\* 2.  $mn \in N_0 \rightarrow$

\*0  $C(m, 0) = 1$  .  $C(m, n+1) = C(m, n) \times (m-n)/(n+1)$  Df

Numeros  $C(m+1, 2)$ ,  $C(m+2, 3)$  es vocato ab Pythagoricos (Jamblichus, Diophanto, Boetio ...) « numeros triangulare, pyramidale, figurato ».

Functione  $C(m, n)$ , aut  $C_{m,n}$ , se inveni et sub formas

$\left[ \frac{m}{n} \right]$  (Euler),  $(m)_n$  (Cauchy),  $\binom{m}{n}$  (Raabe),  $m_n$ , etc.

et es vocato « numero de combinationes de  $m$  objecto ad  $n$  » (Pascal).

\*1  $C(m, 1) = m$  .  $C(m, m) = 1$

\*2  $C(m+n, m) = C(m+n, n)$  } PASCAL t.3 p.289:

« Duo quilibet numeri æque combinantur in eo quod amborum aggregatum est. »

\*3  $C(m+1, n+1) = C(m, n+1) + C(m, n)$

\*4  $m \in n + N_0 \rightarrow C(m+1, n) = C(m, n) \times (m+1)/(m-n+1)$

\*5  $C(m+1, n+1) = C(m, n) \times (m+1)/(n+1)$   
} PASCAL t.3 p.289 !

\*6  $p \in N_0$  .  $n \in p + N_0$  .  $m \in n + N_0 \rightarrow C(m, n) \times C(n, p) = C(m, p) \times C(m-p, n-p)$

\*7  $m \in N_1 \rightarrow C(m, n) = \text{num}[\text{Cls } 1 \dots m \text{ cu } r3(\text{num } r = n)]$  Dfp

\*8  $n \in N_0$  .  $m \in n + N_0 \rightarrow C(m, n) = m! / [n! (m-n)!]$  Dfp

## §15 mlt Dvr

\* 1.  $a, b, c \in N_1 \supset$ :

$$\cdot 0 \quad \text{mlt}(a, b) = m(a, b) = \min [(a \times N_1) \wedge (b \times N_1)] \quad \text{Df m} \\ = \text{minimo commune multiplo de } a \text{ et } b.$$

In praesente § nos scribe  $m(a, b)$  et  $D(a, b)$ ; in § successivos nos ute notatione plus longo  $\text{mlt}(a, b)$  et  $\text{Dvr}(a, b)$ .

Notationes  $m(a, b)$ ,  $D(a, b)$ , introducto per Lebesgue a. 1859, adoptato per Lucas, es hodie de usu commune.

$$\cdot 01 \quad \cdot = a \times \min[N_1 \wedge y \exists (ay \in N_1 \times b)]$$

$$\cdot 1 \quad m(a, b) \in N_1 \quad . \quad m(a, b) \in N_1 \times a \wedge N_1 \times b \quad . \quad m(a, b) \leq a \times b \\ [a \times b \in (N_1 \times a) \wedge (N_1 \times b) \supset \exists (N_1 \times a) \wedge (N_1 \times b) \cdot \S \text{min } 1 \cdot 8 \supset P]$$

$$\cdot 2 \quad m(a, a) = a \quad . \quad m(1, a) = a \\ [m(a, a) = \min(a \times N_1 \wedge a \times N_1) = \min(a \times N_1) = a \times \min N_1 = a \times 1 = a] \\ [m(1, a) = \min(N_1 \wedge a \times N_1) = \min(a \times N_1) = a]$$

$$\cdot 21 \quad m(a, b) = m(b, a) \quad [ \text{Comm} \supset P ]$$

$$\cdot 3 \quad a \in N_1 \times b \supset m(a, b) = a \\ [ \text{Hp} \supset N_1 \times a \supset N_1 \times b \supset (N_1 \times a) \wedge (N_1 \times b) = N_1 \times a \supset m(a, b) = \min(N_1 \times a) = (\min N_1) \times a = 1 \times a = a ]$$

$$\cdot 4 \quad a \in N_1 \times b \Rightarrow m(a, b) = a \quad [ P \cdot 3 \supset P ]$$

$$\cdot 5 \quad m(ac, bc) = c \times m(a, b) \quad \text{Distrib}(x, m) \\ [m(ac, bc) = a \times c \times \min[N_1 \wedge y \exists (a \times c \times y \in N_1 \times b \times c)] \\ = a \times \min[(N_1 \wedge y \exists (ay \in N_1 \times b))] \times c = m(a, b) \times c]$$

$$\cdot 6 \quad N_1 \times a \wedge N_1 \times b \supset N_1 \times m(a, b) \quad \{ \text{EUCLIDE VII P35} \} \\ [x = m(a, b) \cdot c \in (N_1 \times a) \wedge (N_1 \times b) \supset \text{rest}(c, x) \in 0 \cdots (x-1) \wedge (N_0 \times a) \wedge (N_0 \times b) \cdot \\ \exists 1 \cdots (x-1) \wedge (N_0 \times a) \wedge (N_0 \times b) \supset \text{rest}(c, x) = 0 \supset c \in N_1 \times m(a, b)]$$

$$\cdot 7 \quad N_1 \times a \wedge N_1 \times b = N_1 \times m(a, b) \quad [ P \cdot 1 \cdot 6 \supset P ]$$

$$\cdot 8 \quad m(a, b) = \iota N_1 \wedge x \exists [N_1 \times x = (N_1 \times a) \wedge (N_1 \times b)] \quad \text{Dfp}$$

\* 2.  $a, b, c \in N_1 \supset$ :

$$\cdot 1 \quad a \times b \in N_1 \times m(a, b) \quad [a \times b \in N_1 \times a \wedge N_1 \times b \cdot P1 \cdot 6 \supset P]$$

$$\cdot 2 \quad a, b \in N_1 \times c \supset a \times b / m(a, b) \in N_1 \times c \\ [ \text{Hp} \supset ab/c \in N_1 \times a \wedge N_1 \times b \supset ab/c \in N_0 \times m(a, b) \supset P ]$$

- 3  $a \times b \in N_1 \times c \supset a \times b / m(a, b) \in N_1 \times c$   
 $[ a = [ab/m(a, b)] \times m(a, b)/b ]$
- 4  $N_1 \wedge x \exists (a, b \in N_1 \times x) = N_1 \wedge x \exists (a \times b / m(a, b) \in N_1 \times x) \quad [ = P \cdot 2 \cdot 3 ]$

\* 3.  $a, b, c \in N_1 \supset$ :

- 0  $Dvr(a, b) = D(a, b) = \max N_1 \wedge x \exists (a, b \in N_1 \times x) \quad DfD$   
 $= \text{maximo commune divisore}$
- 01  $\quad = \max[N_1 \wedge a/N_1 \wedge b/N_1] \quad Dfp$
- 02  $D(a, b) = ab/m(a, b)$   
 $[ DfD \supset D(a, b) = \max N_1 \wedge x \exists (a, b \in N_1 \times x)$   
 $P1 \cdot 7 \supset \quad = \max N_1 \wedge x \exists [ab/m(a, b) \in N_1 \times x] = ab/m(a, b) ]$
- 1  $D(a, b) \in N_1 \quad a, b \in N_1 \times D(a, b)$   
 $[ 1 \in N_1 \wedge a/N_1 \wedge b/N_1 \quad \neg \exists N_1 \wedge a/N_1 \wedge b/N_1 \wedge (a + N_1) \quad \S \max 1 \cdot 8 \supset P ]$
- 2  $D(a, a) = a \quad D(1, a) = 1 \quad D(a, b) = D(b, a)$
- 3  $a \in N_1 \times b \supset D(a, b) = b$   
 $[ Hp \supset a, b \in N_1 \times b \quad \neg \exists (b + N_1) \wedge (b/N_1) \supset P ]$
- 4  $D(a, b) = b \quad a \in N_1 \times b$
- 5  $D(ac, bc) = c \times D(a, b) \quad \text{Distrib}(X, D)$
- $[ P \cdot 02, P1 \cdot 5 \supset D(ac, bc) = ac \times bc / m(ac, bc) = [ab/m(a, b)] \times c = D(a, b) \times c ]$
- 6  $a, b \in N_1 \times c \supset D(a, b) \in N_1 \times c \quad [ P \cdot 5 \supset P ]$   
 $\{ \text{EUCLIDE VII P2: } \alpha \text{ } \epsilon \alpha \nu \text{ } \alpha \rho \iota \theta \mu \omicron \varsigma \text{ } \delta \upsilon \omicron \text{ } \alpha \rho \iota \theta \mu \omicron \nu \varsigma \text{ } \mu \epsilon \tau \rho \eta \nu, \text{ } \kappa \alpha \iota \text{ } \tau \omicron \text{ } \mu \acute{\epsilon} \gamma \iota \sigma \tau \omicron \nu \text{ } \alpha \upsilon \tau \omega \nu \text{ } \kappa \omicron \iota \nu \omicron \nu \text{ } \mu \acute{\epsilon} \tau \rho \omicron \nu \text{ } \mu \epsilon \tau \rho \acute{\eta} \sigma \epsilon \iota \text{ } \}$
- 7  $N_1 \wedge a/N_1 \wedge b/N_1 = N_1 \wedge D(a, b)/N_1$
- 8  $D(a, b) = N_1 \wedge x \exists (N_1 \wedge x/N_1 = N_1 \wedge a/N_1 \wedge b/N_1)$

\* 4.  $a, b \in N_1 \supset$ :

- 1  $a \in N_1 \times b \supset D(a, b) = D[b, \text{rest}(a, b)]$   
 $[ Hp \cdot x \in N_1 \cdot a, b \in N_1 \times x \supset a - b \times \text{quot}(a, b) \in N_1 \times x \supset \text{rest}(a, b) \in N_1 \times x \quad (1)$   
 $Hp \cdot b, \text{rest}(a, b) \in N_1 \times x \supset b \times \text{quot}(a, b) + \text{rest}(a, b) \in N_1 \times x \supset a \in N_1 \times x \quad (2)$   
 $Hp \cdot (1) \cdot (2) \supset N_1 \wedge x \exists (a, b \in N_1 \times x) = N_1 \wedge x \exists [b, \text{rest}(a, b) \in N_1 \times x] \cdot$   
 $\text{Oper max} \supset P ]$

4·2  $D(a, b) = D[b, b - \text{rest}(a, b)]$

- 3  $a > b \supset D(a, b) = D(a - b, b) \quad \{ \text{EUCLIDE VII P1} \}$
- 4  $D(a + 1, a) = 1 \quad \cdot 5 \quad D(2a + 1, 2a - 1) = 1$
- 6  $a \in 2N_1 \cdot b \in 2N_1 + 1 \cdot a > b \supset D(a + b, a - b) = D(a, b)$
- 7  $a, b \in 2N_1 + 1 \cdot \text{---} \supset \text{---} = 2D(a, b)$
- 8  $a > b \cdot D(a, b) = 1 \supset D(a + b, a - b) \in 1 \vee 2$

\* 5.  $a, b \in N_1 \rightarrow$ :

- 1  $D(a, b) = 1 \rightarrow m(a, b) = a \times b$
- 2  $m(a, b) = a \times b / D(a, b)$

\* 6.  $a, b, c, d \in N_1 \rightarrow$ :

- 1  $ab \in N_1 \times c \rightarrow D(a, c) = 1 \rightarrow b \in N_1 \times c$   
 $[ \text{Hp} \rightarrow ab \in N_1 \times c \rightarrow cb \in N_1 \times c \rightarrow D(ab, cb)$   
 $b \times D(a, c) = b \rightarrow P ]$   
 $[ \text{Hp} \rightarrow ab \in N_1 \times a \cap N_1 \times c \rightarrow ab \in N_1 \times m(a, c) ]$
- 2  $D(a, b) = 1 \rightarrow c \in N_1 \times a \cap N_1 \times b \rightarrow c \in N_1 \times$
- 3  $D(a, b \times c) = D[a, b \times D(a, c)]$
- 4  $D(a, c) = 1 \rightarrow D(ab, c) = D(b, c)$
- 5  $D(a, b) = 1 \rightarrow a \in N_1 \times c \rightarrow D(b, c) = 1$
- 6  $D(a, c) = 1 \rightarrow D(b, c) = 1 \rightarrow D(ab, c) = 1$
- 7  $D(a, c) = D(b, c) = D(a, d) = D(b, d) =$
- 8  $D(b, c) = 1 \rightarrow D(a, b \times c) = D(a, b) \times$
- 9  $D[a/D(a, b), b/D(a, b)] = 1$   
 $[ \text{Distrib}(\times, D) \rightarrow D(a, b) \times D[a/D(a, b), b/D(a, b)] =$

\* 7.  $a, b, c, d \in N_0 \rightarrow$ :

- 1  $a/b = c/d \rightarrow D(a, b) = 1 \rightarrow c/a = d/b$   
 $[ \text{Hp} \rightarrow ad = bc \rightarrow bc \in N_1 \times a \rightarrow D(a, b) = 1 ]$
- 2  $D(a, b) = D(c, d) = 1 \rightarrow a/b = c/d \rightarrow$   
 $\{ \text{EUCLIDE VII P20, 21} \}$

\* 8.  $a, b, m, n \in N_1 \rightarrow$ :

- 1  $D(a, b) = 1 \rightarrow D(a^m, b) = 1$   
 $[ m = 1 \rightarrow P$   
 $m \in N_1 \rightarrow D(a, b) = 1 \rightarrow D(a^m, b) = 1 \rightarrow \text{P6.6} \rightarrow 1$   
 $(1) \rightarrow (2) \rightarrow \text{Induct} \rightarrow P ]$
- 2  $D(a, b) = 1 \rightarrow D(a^m, b^n) = 1$   
 $[ \text{Hp} \rightarrow \text{P.1} \rightarrow D(a^m, b) = 1 \rightarrow \text{P.1} \rightarrow P ]$
- 3  $a, b, m \in N_1 \rightarrow D(a, b) = 1 \rightarrow ab \in N_1^m \rightarrow$

\* 9.1  $a, b \in N_1 + 1$ .  $D(a, b) = 1$ .  $\supset$ .

$$\text{rest}(ax, b) \mid x \cdot 1 \cdots (b-1) = 1 \cdots (b-1)$$

$$[x \in 1 \cdots (b-1) \supset \text{rest}(ax, b) \in 1 \cdots (b-1)]$$

$$x, y \in N_1 \cdot x < y \cdot \text{rest}(ax, b) = \text{rest}(ay, b) \supset \text{rest}[(y-x)a, b] = 0 \supset$$

$$(y-x)a \in N_1 \times b \supset y-x \in N_1 \times b$$

$$x, y \in 1 \cdots (b-1) \cdot x < y \supset y-x \in N_1 \times b \supset \text{rest}(ax, b) = \text{rest}(ay, b)$$

$$\text{num rest}(ax, b) \mid x \cdot 1 \cdots (b-1) = b-1 \supset P$$

\* 2  $a, b \in N_1 + 1$ .  $D(a, b) = 1$ .  $\supset$ .  $\exists N_1 \wedge n \exists (a^n \in N_1 b + 1)$

\* 10.  $a, b, c \in N_1$ .  $\supset$ .

$$*0 \quad m(a, b, c) = \min(N_1 \times a \wedge N_1 \times b \wedge N_1 \times c) \quad \text{Df}$$

$$*1 \quad m(a, b, c) = m[m(a, b), c] \quad \{ \text{EUCLIDE VII P36} \}$$

$$[m(a, b, c) = \min[(N_1 \times a) \wedge (N_1 \times b) \wedge (N_1 \times c)] \\ = \min[(N_1 \times m(a, b)) \wedge (N_1 \times c)] = m[m(a, b), c] ]$$

$$*2 \quad D(a, b, c) = \max N_1 \wedge x \exists (a, b, c \in N_1 \times x) \quad \text{Df}$$

$$*3 \quad D(a, b, c) = D[D(a, b), c] \quad \{ \text{EUCLIDE VII P3} \}$$

$$[ \text{P-3} \cdot \text{Oper } x \exists \supset N_1 \wedge x \exists (a, b \in N_1 \times x) = N_1 \wedge x \exists [D(a, b) \in N_1 \times x] .$$

$$\text{Oper } [\wedge x \exists (c \in N_1 \times x)] \cdot \text{Distrib}(\exists, \wedge) \cdot \text{Oper } \max \cdot \text{Df } D \supset P ]$$

$$*4 \quad a, b, c \in 2N_0 + 1 \supset D(a, b, c) = D[(a+b)/2, (a+c)/2, (b+c)/2]$$

$$*5 \quad D(a, b, c) \times m(ab, ac, bc) = abc \\ m \text{ ————— } D \text{ ————— }$$

$$*6 \quad m(a, b, c) D(a, b) D(a, c) D(b, c) = abc D(a, b, c)$$

$$\{ *5-6 \text{ LEBESGUE a.1859 p.31,34} \}$$

$$*7 \quad [N_1, b \in N_1 \times a, D(a, b), m(a, b), 1] \mid [\text{Cls}, a \supset b, a \wedge b, a \wedge b, \wedge]$$

$$I \S \varepsilon 1.1.4 \quad 2.1.2.3 \quad 3.1.2.3 \quad 4.1.2.4$$

$$\S \cup 1.1.2.3 \quad 2.1.2.3 \quad 3.2.3 \quad 4.1 \quad \S \wedge 1.1.2.3.4$$

\* 11.  $a, b, m, n, \in N_1$ .  $\supset$ .

$$*0 \quad D(a, b) = 1 \cdot ab \in N_1^2 \supset a, b \in N_1^2 \\ \{ \text{LEIBNIZ a.1678 Math. Schr. t.7 p.122} \}$$

$$*1 \quad D(a, b) = 1 \supset N_1^a \wedge N_1^b = N_1^{ab}$$

$$*2 \quad D(a, b) = 1 \supset (N_1 + 1) \wedge (a^2 + b^2) / N_1 \supset N_1^2 + N_1^2$$

$$*3 \quad D(a, b) = 1 \supset N_1 \wedge (a^2 + b^2) / (N_1 + 1) \supset (4N_0 + 1) \cup 2$$

$$\quad \quad \quad N_1 \wedge (a^4 + b^4) / (N_1 + 1) \supset (8N_0 + 1) \cup 2$$

$$\quad \quad \quad N_1 \wedge (a^{2^m} + b^{2^m}) / (N_1 + 1) \supset (N_0 \times 2^{m+1} + 1) \cup 2$$

$$\{ \text{EULER PetrNC. t.1 a.1747-48 p.32} \}$$

- \*4  $N_1(2^{2n}+1)/N_1 \supset 16nN_0+1$   
 \*5  $D(a,b)=1, ab \in 4N_1+1 \supset N_1(a^{2abn}+b^{2abn})/N_1 \supset (8abnN_0+1)u_2$   
 ! LUCAS Torino A. a.1878 t.13 p.281 !  
 \*6  $D(a,b) = \text{num } 1 \dots b \wedge x \exists (ax \in N_1 \times b)$   
 \*7  $D(a,b,c) = \text{num } 1 \dots c \wedge x \exists (ax, bx \in N_1 \times c)$   
 \*8  $n \in N_1+1 \supset m(1 \dots 2n) = m[(n+1) \dots 2n]$   
 \*9  $a, b, m, n, x \in N_1, x^n-1 \in N_1 \times a, x^n-1 \in N_1 \times b, D(a,b)=1 \supset$   
 $x^m(m,n)-1 \in N_1 \times a \times b$

Dfp

Dfp

- \* 12.  $u, v \in \text{Cls } N_1, a, b \in N_1 \supset$   
 \*0  $mu = \min[N_1 \wedge x \exists (u \supset N_1 \wedge x/N_1)]$   
 \*1  $ma = a$   
 \*2  $m(ua \vee tb) = m(a, b)$   
 \*3  $mu \in N_1$   
 \*4  $m(ua \times a) = a \times mu$   
 \*5  $m(ua \vee v) = m(mu, mv)$   
 \*6  $m(ua \times v) = mu \times mv$

Df

- \* 13.  $u, v \in \text{Cls } N_1, a, b \in N_1 \supset$   
 \*0  $Du = \max[N_1 \wedge x \exists (u \supset N_1 \times x)]$   
 \*1  $Da = a$   
 \*2  $D(a, b) = D(ua \vee tb)$   
 \*3  $Du \in N_1$   
 \*4  $D(ua \times a) = a \times Du$   
 \*5  $D(ua \vee v) = D(Du, Dv)$   
 \*6  $D(ua \times v) = (Du \times Dv)$

Distrib(X,m)  
 ! STIELTJES a.1895 p.4 !

Df

- \* 14.  $u \in \text{Cls } N_1, v \in N_1 \wedge x \exists (u \supset N_1 \times x) \supset$  Iev. §2.1  $\supset$  Ev  
 Hp(1), msu  $\supset$   $\exists v(m+N_1) \cdot (1) \cdot \text{§max } 2 \supset$  max  $\in N_1$   
 (1), (2), Elim m. Elim v  $\supset$  P ]  
 \*1  $D(ua \times a) = a \times Du$   
 \*2  $D(ua \vee v) = D(Du, Dv)$   
 \*3  $D(ua \times v) = (Du \times Dv)$

(1)

(2)

Distrib(X,D)  
 ! STIELTJES a.1895 p.4 !

## §16 Np (numero primo)

- \* 1.0  $N_p = (1 + N_1) - [(1 + N_1) \times (1 + N_1)]$  Df Np
- \*1  $b \in N_1 . a \in N_p \wedge (N_1 \times b) \supset b \in 1 \vee 1a$   
 $[ b, c \in N_1 . a \in N_p . a = bc . \text{Df } N_p \supset \neg(b, c \in N_1 + 1) \supset b = 1 \vee c = 1 \supset b \in 1 \vee 1a ]$
- \*11  $a \in N_p \supset N_1 \wedge a / N_1 = 1 \vee 1a$  [ = P.1 ]
- \*2  $a \in N_p . b \in N_1 \wedge (N_1 \times a) \supset D(a, b) = 1$   
 $[ N_1 \wedge a / N_1 = 1 \vee 1a . a = b / N_1 \supset N_1 \wedge a / N_1 \wedge b / N_1 = 1 ]$   
 } EUCLIDE VII P29:
- Ἄπας πρῶτος ἀριθμὸς πρὸς ἅπαντα ἀριθμὸν, ὃν μὴ μετρεῖ, πρῶτός ἐστιν.*
- \*3  $a \in N_p . b, c \in N_1 . bc \in N_1 \times a \supset b \in N_1 \times a \vee c \in N_1 \times a$   
 } EUCLIDE VII P30:
- Ἐὰν δύο ἀριθμοὶ πολλαπλασιάσαντες ἀλλήλους ποιῶσιν τινα, τὸν δὲ γενόμενον ἐξ αὐτῶν μετρήῃ τις πρῶτος ἀριθμὸς, καὶ ἓνα τῶν ἐξ ἀρχῆς μετρήσει.*
- [ Hp . P.1  $\supset D(b, a) \in 1 \vee 1a$  (1)  
 Hp .  $D(b, a) = 1$  . §D6.1  $\supset c \in N_1 \times a$  (2)  
 Hp .  $D(b, a) = a$   $\supset b \in N_1 \times a$  (3)  
 (2) . (3) . Oper  $\vee$  . (1)  $\supset P$  ]
- \*4  $a \in N_1 + 1 \supset \min[(N_1 + 1) \wedge (a / N_1)] \in N_p$   
 $[ a \in (N_1 + 1) \wedge (a / N_1) \supset \min[(N_1 + 1) \wedge (a / N_1)] \in N_1 + 1$  (1)  
 $x \in (N_1 + 1) \wedge (a / N_1) . y \in N_1 + 1 . x \in (N_1 + 1) \times y \supset y \in (N_1 + 1) \wedge (a / N_1)$   
 $y < x \supset x = \min[(N_1 + 1) \wedge (a / N_1)]$  (2)  
 $a \in (N_1 + 1) \wedge (a / N_1) . x \in (N_1 + 1) \times (N_1 + 1) \supset x = \min[(N_1 + 1) \wedge (a / N_1)]$  (3)  
 $x = \min[(N_1 + 1) \wedge (a / N_1)]$  . (3) . Transp  $\supset x \in (N_1 + 1) - [(N_1 + 1) \times (N_1 + 1)]$   
 $\supset x \in N_p ]$
- \*5  $N_1 + 1 \supset N_1 \times N_p$  } EUCLIDE VII P31:  
*Ἄπας σύνθετος ἀριθμὸς ἐπὶ πρῶτον τινὸς ἀριθμοῦ μετρεῖται.*  
 $[ a \in N_1 + 1 . x = \min[(N_1 + 1) \wedge (a / N_1)] \supset x \in N_p \wedge (a / N_1) \supset a \in N_1 \times N_p ]$
- \*6  $m \in N_1 \supset \exists N_p \wedge (m + N_1)$   
 } EUCLIDE IX P20: *Οἱ πρῶτοι ἀριθμοὶ πλείους εἰσὶν παντὸς τοῦ προτεθέντος πλὴθους πρῶτων ἀριθμῶν.*
- [ Hp  $\supset m! + 1 \in N_1 + 1$  . P.3  $\supset m! + 1 \in N_1 \times N_p$  (1)  
 $x \in N_p . x \leq m \supset m! \in N_1 \times x . 1 \in N_1 \times x \supset m! + 1 \in N_1 \times x$  (2)  
 $x \in N_p . m! + 1 \in N_1 \times x$  . (2) . Transp  $\supset x > m \supset \exists N_p \wedge (m + N_1)$  (3)  
 (1) . (3) . Elim.x  $\supset P$  ]

$$* \quad 2.0 \quad a \in (N_1+1) \times (N_1+1) \cdot \supset \cdot \exists Np \wedge x \exists (x^2 \leq a \cdot a \in N_1 \times x) \\ | \quad x = \min(1+N_1) \wedge (a/N_1) \cdot y = a/x \cdot \supset \cdot x \in Np \cdot y \in N_1+1 \cdot \\ \min Np \wedge (y/N_1) \leq x \cdot \supset \cdot y \leq x \cdot \supset \cdot a = xy \leq x^2 \cdot \supset \cdot \\ x \in Np \wedge (a/N_1) \cdot x^2 \leq a \quad |$$

$$2.1 \quad a \in N_1+1 \cdot \neg \exists Np \wedge x \exists (x^2 \leq a \cdot a \in N_1 \times x) \cdot \supset \cdot a \in Np \\ | \quad P.0 \cdot Transp \cdot \supset \cdot P \quad |$$

{ LEONARDO PISANO a.1202 p.38:

«Qui primum numerum... cognoscere voluerit... semper eat dividendo ipsum per primos numeros ordinate, donec aliquem primum numerum invenerit, per quem propositum numerum absque alia superatione possit dividere, vel donec ad eiusdem pervenerit radicem: si per nullum ipsorum dividi potuerit, tunc primum ipsum esse indicabit.» |

$$2 \quad a \in Np \cdot b, n \in N_1 \cdot b^n \in N_1 \times a \cdot \supset \cdot b \in N_1 \times a \quad \{ \text{EUCLIDE IX P12} \} \\ | \quad b \in N_1 \times a \cdot \supset \cdot D(a, b) = 1 \cdot \supset \cdot D(b^n, a) = 1 \cdot \supset \cdot b^n \in N_1 \times a \quad (1) \\ (1) \cdot Transp \cdot \supset \cdot P \quad |$$

$$3 \quad \text{—————} \cdot a^n \in N_1 \times b \cdot \supset \cdot b \in a \nmid N_1 \quad \{ \quad \quad \quad \} \quad \text{P13}$$

$$* \quad 3. \quad a \in Np \cdot b \in (N_1+1) = (N_1 \times a) \cdot \supset \cdot \quad 4 \quad b^{a-1} - 1 \in N_1 \times a$$

$$[ \quad Hp \cdot c = a-1 \cdot \supset \cdot D(a, b) = 1 \cdot \supset \cdot \text{rest}(bx, a) \mid x^1 \cdots c = 1 \cdots c \cdot \supset \cdot \\ \Pi[ \text{rest}(bx, a) \mid x, 1 \cdots c ] = c! \cdot \supset \cdot \Pi(bx \mid x, 1 \cdots c) \in c! + N_1 \times a \cdot \supset \cdot \\ c! b^c \in c! + N_1 \times a \cdot \supset \cdot (b^c - 1)c! \in N_1 \times a \cdot D(a, c!) = 1 \cdot \supset \cdot b^c - 1 \in N_1 \times a \quad |$$

$$2 \quad \min[N_1 \wedge x \exists (b^x - 1 \in a \times N_1)] \in N_1 \wedge (a-1)/N_1$$

$$3 \quad N_1 \wedge x \exists (b^x - 1 \in a \times N_1) = N_1 \times \min[N_1 \wedge x \exists (b^x - 1 \in a \times N_1)] \\ \{ \text{FERMAT a.1640 t.2 p.209:}$$

« Tout nombre premier mesure infalliblement une des puissances  $-1$  de quelque progression que ce soit, et l'exposant de la dite puissance est sous multiple du nombre premier donné  $-1$ ; et après qu'on a trouvé la première puissance qui satisfait à la question, toutes celles dont les exposants sont multiples de l'exposant de la première satisfont tout de même à la question. » |

$$* \quad 4.1 \quad Np \wedge (N_1+2) \supset 2N_1+1$$

$$2 \quad Np \wedge (N_1+3) \supset (6N_1+1) \cup (6N_1-1)$$

$$[ (N_1+3) = 2N_1 + (3N_1) \supset (6N_1+1) \cup (6N_1-1) ]$$

{ BUNGUS a.1599 p.399 : «...semper ... numeri primi post binarium et ternarium, in senariorum multiplicium vicinia collocati comperientur, aut uno minores, aut uno majores. » |

$$3 \quad Np \wedge (N_1+5) \supset 30N_1 \pm (1 \cup 7 \cup 11 \cup 13)$$



\* 5.1  $x \in 0 \dots 9 \Rightarrow x^2 + x + 11 \in Np$

2  $x \in 0 \dots 15 \Rightarrow x^2 + x + 17 \in Np$  ; EULER *Op. post.* t.1 p.185 {

3  $x \in 0 \dots 39 \Rightarrow x^2 + x + 41 \in Np$  ; EULER Berlin M. a.1772 p.36 {

4  $x \in 0 \dots 28 \Rightarrow 2x^2 + 29 \in Np$  ; LEGENDRE a.1797 p.10 {

5  $p \in \{3, 5, 11, 17, 41\} \Rightarrow x \in 0 \dots (p-2) \Rightarrow x^2 + x + p \in Np$

\* 6.1  $Np \wedge (4N_1 + 1) \supset N_1^2 + N_1^2$  ; GIRARD a.1634 p.156:

« Tout nombre premier qui excède un nombre quaternaire de l'unité se peut diviser en deux quarrés entiers. »

2  $a, b, c, d \in N_1, a^2 + b^2 = c^2 + d^2, a^2 + b^2 \in Np \Rightarrow a \vee b = c \vee d$

{ FERMAT t.1 p.294: « Numerus primus qui superat unitate quaternarii multiplicem, semel tantum est hypotenusa trianguli rectanguli » }

3  $a \in Np \wedge (4N_1 + 3), b, c \in N_1, b^2 + c^2 \in N_1 \times a \Rightarrow b, c \in N_1 \times a$

{ FERMAT a.1640 t.2 p.204:

« Si un nombre est composé de deux quarrés premiers entre eux, je dis qu'il ne peut être divisé par aucun nombre premier moindre de l'unité qu'un multiple du quaternaire. »

4  $Np \wedge (3N_1 + 1) \supset N_1^2 + 3N_1^2$  ; FERMAT a.1654 t.2 p.313 {

$Np \wedge [(8N_1 + 1) \vee (8N_1 + 3)] \supset N_1^2 + 2N_1^2$  ; , , {

5  $2^1 + 1, 2^2 + 1, 2^3 + 1, 2^4 + 1, 2^5 + 1 \in Np$  ; FERMAT a.1640 p.162 {

6  $m \in N_1, 2^m + 1 \in Np \Rightarrow m \in 2^k N_1$  ; FERMAT a.1640 t.2 p.205 {

[  $p \in 2N_1 + 1, m \in N_1, \S 4.2 \Rightarrow 2^{mp} + 1 \in (N_1 + 1) \times (2^m + 1) \Rightarrow P$  ]

7  $a, b, m \in N_1, a^m + b^m \in Np \Rightarrow m \in 2^k N_1$

8  $7 \times 2^{30} + 1 \in Np$  ; SEELHOFF Zm. a.1886 t.31 p.380 {

\* 7.1  $2^2 - 1, 2^3 - 1, 2^5 - 1, 2^7 - 1 \in Np$  ; EUCLIDE IX P36 scolia {

$2^{11} - 1, 2^{17} - 1, 2^{19} - 1 \in Np$

$2^{31} - 1 \in Np$  ; MERSENNE a.1644; EULER Berlin M. a.1772 p.35 {

$2^{61} - 1 \in Np$  ; PERVOUCHINE, Acad. S. Petersbourg, a.1883 {

2  $m \in N_1, 2^m - 1 \in Np \Rightarrow m \in Np$  ; FERMAT a.1640 t.2 p.198 {

3  $m \in Np, a, b \in N_1, N_1 \times m, a > b \Rightarrow a^{m-1} - b^{m-1} \in N_1 \times m$

\* 8.1  $a, b, m \in N_1, D(a, b) = 1 \Rightarrow \exists Np \wedge (a + N_0 \times b) \wedge (m + N_1)$

{ LEGENDRE a.1808 p.398; Dm. DIRICHLET a.1837 t.1 p.313,

MERTENS Wien A. a.1899; Warszawa P. t.11 p.194 }

- 2  $a \in N_1 + 3 \cdot \supset \exists N_p \wedge (a + N_1) \wedge (2a - N - 2)$   
 } BERTRAND JP. a.1845 Cahier 30 p.129.  
 Dm. TCHEBYCHEF a.1852 (Euvres t.1 p.52 {
- 3  $2(N_1 + 1) \supset N_p + N_p$  } GOLDBACH a.1742 CorrM. t.1 p.135 {  
 Demonstratione defice.  
 G. Cantor (Congrès de Caen de l'A.F. a.1894) verifica que  
 $2 \times (2 \cdots 500) \supset N_p + N_p$   
 V. Aubry (IdM. t.3 a.1896 p.75) que  $2 \times (2 \cdots 1000) \supset N_p + N_p$   
 R. Haussner (Jahresversammlung der  
 Deutschen Math. Verein. a.1900 p.7) que  $2 \times (2 \cdots 5000) \supset N_p + N_p$ .
- 4  $m \in 2 \uparrow N_1 \cdot \supset : 2^m + 1 \in N_p \cdot = \cdot 3 \uparrow (2 \uparrow (m - 1)) + 1 \in N_1 \times ((2 \uparrow m) + 1)$   
 } PROTH CorrN. a.1878 t.4 p.210 {
- 5  $q \in N_0 \cdot 4q + 3, 8q + 7 \in N_p \cdot \supset \cdot 2^{q+3} - 1 \in (8q + 7)N_1$   
 } LUCAS TorinoA. a.1878 t.13 p.283 {
- \* 9•1  $p \in N_p \cdot \supset \cdot N_1 \wedge (2^p - 1) / N_1 \supset N_0 \times p + 1$
- 2  $m, a, b \in N_1 \cdot a^m - b^m \in N_p \cdot \supset \cdot m \in N_p \cdot a = b + 1$
- 3  $a, b \in N_1 \cdot p \in N_p - 2 \cdot \supset \cdot N_1 \wedge (a^p - b^p) / N_1 \supset [N_1 \wedge (a - b) / N_1] \vee (N_1 \times p + 1)$
- 4  $\cdot \cdot \cdot \cdot a^{p-1} + b^{p-1} \in N_1 \times p \cdot \supset \cdot a, b \in N_1 \times p$   
 } 1-4 EULER PetrNC. a.1747-48 I p.20 {
- 5  $m \in N_1 \cdot \supset : m^4 + 4 \in N_p \cdot = \cdot m = 1$   
 } GOLDBACH a.1742 CorrM. t.1 p.139 ; S. GERMAIN a.1772 p.296 {
- 6  $a \in N_p \cdot b, c \in N_1 \cdot \supset \cdot (b + c)^a - b^a - c^a \in N_1 \times a$   
 } EULER PetrNC. a.1747 t.1 p.20 {
- \* 10•1  $m \in N_1 \cdot 4m + 1 \in N_p \cdot \supset \cdot m^m - 1 \in N_0 \times (4m + 1)$   
 } BIKMORE a.1896 Ed. Times, t.65 p.78 {
- $m, n, p \in N_p \cdot \supset \cdot$
- 2  $a^m + b^n \in N_p - 2 \cdot \supset \cdot \text{Dvr}(m, n) \in 2 \uparrow N_0$  } LUCAS a.1891 p.342 {
- 3  $a^m - b^n \in N_1 \times p \cdot \supset \cdot a \nmid \text{Dvr}(m, p - 1) - b \nmid \text{Dvr}(n, p - 1) \in N_1 \times p$   
 } EULER PetrNC. a.1747-48 t.1 p.20 {
- \* 11•1  $a \in N_p \cdot \supset \cdot (a - 2)! - 1 \in N_0 \times a$
- 2  $a \in N_p \cdot \supset \cdot (a - 1)! + 1 \in N_1 \times a$   
 } LEIBNIZ Mss. Math. t.3 B11 fol.10:
- Productus continuorum usque ad numerum qui anteprecedit datum divisus per datum relinquit 1, ... si datus sit primitivus. Si datus sit deri-



## §17 mp

\* 1.  $a, b \in N_1, p \in Np \rightarrow$

$$0 \quad mp(p, a) = \max [N_0 \wedge x \exists (a \in N_1 \times p^x)]$$

Si  $a$  es numero naturale, et  $p$  es numero primo  
ximo exponente de potestate de  $p$  que divide  $a$ .

$$1 \quad mp(p, a) \in N_0 \quad a \in N_1 \times p \wedge mp(p, a) \quad [m \in N_1 \cdot p \wedge m > a \cdot x \in m + N_1 \rightarrow a < p^x \rightarrow a \times p^x] \quad \neg \exists N_0 \wedge x \exists (a \in N_1 \times p^x) \wedge (m + N_1)$$

$$2 \quad mp(x, a) = \iota N_0 \wedge x \exists (a \in N_1 \times p^x \cdot a/p^x)$$

$$3 \quad mp(p, ab) = mp(p, a) + mp(p, b) \quad [x = mp(p, a) \cdot y = mp(p, b) \rightarrow a \in N_1 \times p^x \cdot b \in N_1 \times p^y \rightarrow a \times b \in N_1 \times p^{x+y} \cdot a/p^x \cdot b/p^y \in N_1 \times p \rightarrow mp(p, a \times b) = x + y]$$

$$4 \quad a \in N_1 \times b \rightarrow mp(p, a) \leq mp(p, b) \quad [c \in N_1 \cdot a = bc \rightarrow mp(p, a) = mp(p, b) + mp(p, c)]$$

$$5 \quad mp(p, a^b) = b \times mp(p, a)$$

$$6 \quad mp[p, D(a, b)] = \min[\iota mp(p, a) \vee \iota mp(p, b)]$$

$$7 \quad mp[p, m(a, b)] = \max[\iota mp(p, a) \vee \iota mp(p, b)]$$

\* 2.  $a, b \in N_1 \rightarrow$

$$1 \quad x \in Np \rightarrow_x mp(x, a) = 0 \rightarrow a = 1 \quad [a \in N_1 + 1 \rightarrow \exists Np \wedge x \exists (a \in N_1 \times x) \cdot a \in N_1 + 1 \cdot x \in Np \cdot a \in N_1 \times x \rightarrow mp(x, a) > 0]$$

$$2 \quad a \in N_1 \times b := x \in Np \rightarrow_x mp(x, a) \leq$$

$$3 \quad a \in N_1^b := x \in Np \rightarrow_x mp(x, a) \in N_0$$

\* 3.1  $a \in N_0^2 + N_1^2 := x \in Np \wedge (4N_0 + 3) \mid x$   
GIRARD

$$2 \quad n \in N_1 + 1 \rightarrow \exists Np \wedge x \exists [mp(x, n!) = 1] \quad \{ \text{LIOUVILLE JdM. s.2 t.2 a.1857 p.278} \}$$

§18  $\Phi$ 

\*  $a, b \in N_1 \supset$

·0  $\Phi a = \text{Num} \{ 1 \dots a \wedge x \exists [ \text{Dvr}(x, a) = 1 ] \}$  Df

·01  $\Phi 1 = 1$  .  $\Phi 2 = 1$  .  $\Phi 3 = 2$  ... ·02  $\Phi a \in N_1$

Euler (a.1760) voca  $\Phi a$  « numerus partium ad  $a$  primarum », et PetrA. t.4 II a.1780 p.18, indica per  $\pi a$ .

Gauss, a. 1801, Werke t.1 p.30 introduce symbolo  $\Phi$

Lucas a.1891, voca illo « indicatore », nomen introducto per Cauchy s.1 t.6 p.124 in sensu pauco differente.

·1  $\text{Dvr}(a, b) = 1 \supset \Phi(ab) = (\Phi a)(\Phi b)$

·2  $\text{Dvr}(a, b) = 1 \supset (a \nmid \Phi b) \rightarrow 1 \in bN_0$

·3  $a \in N_p \supset \Phi a = a - 1$

·4 ——— .  $m \in N_1 \supset \Phi a^m = a^{m-1}(a-1)$

## VOCABULARIO II.

101. **Arithmetica** G ἀριθμητική, A arithmetic, D arithmetik, F arithmétique, HI aritmetica, R arifmetica. = scientia de numeros.  
 ⊂ arithmetico (102) — -o + -a (37).
102. **arithmetico** G, A arithmetical, D arithmetisch, F arithmétique, HI aritmetica, R arifmetic'. = numerico.  
 ⊂ arithmo — -o + -etico (104).
103. arithmo G, = numero. ⊃ (101), log-arithmo.  
 (Ultimo elemento de arithmo es -mo || L -mo (125).  
 In primo elemento arith-, Vanic'ek vide radice ar- || L ar- = ar-te ◊ ar-mo ◊ ... . Fick vide radice ra- || L ra- = ra-tione — -tione, || D reihe, rede. Ergo G arithmo || D reim ⊃ I rima).
104. -etico G -ητικό-ς = (102) ◊ po-etico ◊ phon-etico.  
 arithmo — -o + -e ⊃ arithme- G = numera,  
 arithme- + -to (135) ⊃ arithmeto G = numerato,  
 arithmeto — -o + -ico (35) ⊃ arithmetico.
105. **numero** HI, F nombre, numéro, A number, numero, D nummer, numerus, R numer'. ⊃ numer-abile AFHI, numer-ico ADFHI, numer-a aDfHIR, numera-tione ADFHIR, ...  
 ⊂ nume- (106) + -ro (107).
106. nune-, numera, eme. ⊃ nume-ro, num-mo.  
 || G neme, nomo; D nehme.
107. -ro = nume-ro ◊ ag-ro ◊ mace-ro ◊ integ-ro ◊ libe-ro ◊ rub-ro.  
 || G -ro = ag-ro ◊ eryth-ro ◊ cylind-ro; S -ra.
108. **zero** AFHI (non L). ⊂ Arabo : sihron.
109. **plus, plure**; ADF plus, R pljus' (in Mathematica, cum valore +); I più. ⊃ plur-ale (vide nota ad N. 56), F plus-ieus.  
 || G poly, G. antiquo plos; S puru, D viel.  
 ⊂ ple — -e + -us.
110. -us, -ure, -ore, -iore ⊃ (109), maj-us, min-us, ...;  
 ⊃ maj-ore, min-ore, infer-iore, poster-iore, ...  
 || A -er; D -er, gröss-er — gross, jüng-er — jung ...; R -jejs', S -jas.  
 S nav-jas = L nov-iore = D neu-er = R nov-jes'-ij  
 Transformatione de E s in r, ut in N. 56, es commune ad LAD.  
 Vocabulo D gross + suffixo E -ios = grösser, ubi litera i es expresso per transformatione de -o- in -ö-.
111. **ple** (L. antiquo). ⊃ ple-no, F plein, H lleno, I pieno, com-ple-to AFHir., sup-ple-mento ADFhI, ...  
 || G ple-, A full, D viel, voll, R pol-no, S par.
112. **inductione** ADFHIR. ⊂ in (113) + duc (20) + -tione (12)
113. **in**, I in, FH en, || A in, D in, G en, R v'. ⊃ in-stituto ADEHIR.

114.

## NUMEROS.

**1 uno**, un-, F un, HI uno.

⊃ un-iforme ADFHI, un-ione ADFHI, un-iversitate ADFHIR...

|| a, an, one, D ein, G oino, Slavo ino. ⊂ E oino.

**2 duo**, du-, F deux, H dos, I due. ⊃ du-alismo ADFHIR.

|| A two, D zwei, G dyo, di-, R dva, dv', S dva. ⊂ E dvo.

**3 tres**, tri-, F trois, H tres, I tre. ⊃ tri-angulatione ADFHIR.

|| G treis, tri-. ⊃ tri-gonometria ADFHIR.

|| A three, D drei, R tri, S trajas. ⊂ E tri.

**4 quatuor**, quar-, quadr-, quater, F quatre, H cuatro, I quattro.

⊃ quar-to ADFHIR, quadr-atura ADFHIR, quater-nione.

|| G tettares, tetra-. ⊃ tetra-hedro ADFHI.

|| A four, D vier, R c'etyre, S c'atvar-, c'atur-. ⊂ E quetur.

**5 quinque**, quin-, F cinq, H cinco, I cinque. ⊃ quin-ario ADFHI,

quin-to ADFHIR. || G pente. ⊃ penta-metro ADFHIR.

|| A five, D fünf, R pjatj, S panc'a. ⊂ E penque.

**6 sex**, F six, H seis, I sei.

|| A six, D sechs, G hex. R s'es-tj, S s'as'. ⊂ E sex.

**7 septem**, F sept, H siete, I sette.

|| A seven, D sieben, G hepta, R semj, sedm-, S sapta. ⊂ E septem

**8 octo**, F huit, H ocho, I otto. ⊃ octo-bre ADFHIR.

|| A eight, D acht, G octo. R vos-empt, osim-, S as'ta. ⊂ E octo.

**9 novem**, F neuf, H nueve, I nove.

|| A nine, D neun, G-ennea, ena, S nava. ⊂ E neun

**10 decem**, dec-, F dix, H diez, I dieci. ⊃ dec-i-metro ADFHIR.

|| G deca. ⊃ deca-litro ADFHIR.

|| A then, D zehn, R desja-tj, S daça.

**100 centum**, cent-, F cent, H ciento, I cento, AD cent (moneta).

|| G he-caton. ⊃ hecto-gramma ADFHIR.

|| A hund-red, D hund-ert, R sto, S çata.

⊂ E cento ⊂ cen- (= decem, L -gin- de tri-gin-ta, G -con-)

+ -to (135, = 12).

**1000 mille**, mil-, F mil, mille, H mil, I mille.

⊃ L mil-ia, mill-ia, A mile, D meile, R milja.

⊂ (secundo Brugmann) smi (L sim-, G mla, =1)

+ hili (|| G chili-oi, S sa-hasra-m, E gheslo).

**1000000 milione** (non L) I, ADF million, H millon, R millon'.

⊂ mil- + -ione (accrecitivo I).

115. **cifra** (Stifel a. 1544), cyphra (Euler) ⊂ Arabo çifr.

A cipher, cypher, F chiffre, HI cifra, D ziffer, R tsifra, s'ifr'.

116. **additione** ADFHI. ⊂ addito (117) - -o + -ione (118).

117. **addito**  $\subset$  adde (118) — -e + -i- (9) + -to (135).
118. -ione = (116)  $\wedge$  un-ione  $\wedge$  leg-ione  $\wedge$  opin-ione  $\wedge$  ...  
-tione (12) = -to (135) — -o + -ione.
119. **adde**, A add, D addire.  $\subset$  ad (41) + -de.
120. -de = ad-de  $\wedge$  con-de  $\wedge$  e-de  $\wedge$  per-de ... = pone, fac (137).  
|| S dha-, G the-, A do, D thu-e.
121. **summa** (nomen), A sum, D summe, F somme, H suma, I somma, R summa.  $\subset$  summo — -o + -a (126).
122. **summa** (verbo), A sum, D summire, F somme, H suma, I somma.  
= adde.  $\subset$  summo — -o + -a (4).
123. **summo**, I sommo, H sumo.  $\supset$  summ-ario, summ-itate.  
|| S upama.  $\subset$  sup- + -mo.
124. sup-,  $\supset$  sup-er, sum-mo, sus- sus-cita, sus-pende.  
|| G hyp- = hyp-er  $\wedge$  hyp-s  $\wedge$  hyp-so.  
A up, over; D ob-, über, ober, oben, auf,...  
(S upa = L ad), S upari = L super (257).  
Es ligato cum suo contrario: sub (95).
125. -mo = sum-mo  $\wedge$  pri-mo  $\wedge$  infi-mo  $\wedge$  supre-mo  $\wedge$  extre-mo  $\wedge$  ...  
septi-mo  $\wedge$  deci-mo ...  $\wedge$  ani-mo  $\wedge$  fir-mo  $\wedge$  gru-mo ...  
|| G -mo = thy-mo (= L fumo)  $\wedge$  ther-mo  $\wedge$  hebdo-mo.  
S septa-ma  $\wedge$  das'a-ma. D war-m  $\wedge$  rau-m. R dym'.
126. -a, indica femminile naturale aut artificiale.  
= (121)  $\wedge$  fili-a  $\wedge$  ordinat-a  $\wedge$  recta. || G -a (37).
- §2.
127. **multiplicato**  $\subset$  multiplica + -to (135).
128. **multiplica** H. A multiply, D multiplicire, F multiplie, I multiplica.  
 $\subset$  multo — -o + -i- + plica.
129. **multo**, I molto, H mucho.  $\supset$  mult-iforme AFHI, mult-ituto,...  
|| secundo Vanic'ek, A many, D manche, menge; R mnogo.  
Secundo Fick, L meliore, mille. Secundo Corsen, L mole.
130. **plica**, F plie, H plega, I piega.  
 $\supset$  ex-plica  $\wedge$  com-plica  $\wedge$  du-plica ...  
|| G plece πλέκει, S praç-na, D flech-te, L plecte (295).
131. **multiplicatione**, ADFHI.  $\subset$  multiplica (128) + -tione (12).
132. **producto** H, A product, F produit, D produkt, I prodotto  
R product'.  $\subset$  produce — -e + -to.
133. **produce** AHI, F produi-re.  $\subset$  pro + duce (20).
134. **pro**, A pro, F pour, H por, pro, I per, prò.  
 $\supset$  pro-cessu ADFHIR, pro-fessore. || G pro, pro-blema ADFHIR.  
|| A for, far, D für, ver-, vor; R pro; S pra; L per.



135. -to, ADF -t, H -do, I -to, R -t'.  
 = ama-to  $\wedge$  dele-to  $\wedge$  uni-to  $\wedge$  no-to  $\wedge$  produc-to  $\wedge$  fac-to ...  
 = acu-to  $\wedge$  denta-to  $\wedge$  onus-to.  
 || G -to, cathe-to, epithe-to.  
 || A -ed, -d = unit-ed  $\wedge$  add-ed  $\wedge$  subtract-ed ...  
 D -t, -et, R -tyt, -toe, S -ta, -ita.  $\subset$  E -to.
136. **factore**, AH factor, D faktor, F facteur, I fattore, R (non math.) factor'.  $\subset$  fac + -tore
137. **fac**, F fai-re, fai-t; H hace; I fa.  
 $\supset$  fac-tura DFHiR, fac-ultate ADFHIR.  
 || A do, D thue, G the- (23), ti-the-mi, S da-dha-mi, R dje-ti, dje-lo.  
 = L -de (120).  $\subset$  E dhê.
- Linguistas pone :  
 E dh = S dh = G th = A d = D th = R d = L f, si initiale,  
 L d si medio, et L b si cum r, aut ante l, aut post u.  
 L fac  $\subset$  L feci = G thê-ce.
138. -tore A -tor, D -tor, F -teur, H -dor, -tor, I -tore, R -tor'.  
 $\supset$  ora-tore ADFHIR, doc-tore ADFHIR.  
 || G -tor, -ræg, -rog- = rhe-tore, his-tor-ico. S -tar.  
 §3.
139. **potentia, potestate**, A potency, power, D potenz, F puissance, H potencia, I potenza.  $\supset$  potentia-le ADFHIR.  
 potentia  $\subset$  potente (140) - e + -ia (143) = pote (141) + -ntia (144).  
 potestate  $\subset$  potes (141) + -tate (10).
140. **potente** HI, A potent.  $\subset$  pote (141) + -nte (142).
141. **pote-**, potes, posse, F peut, puisse, H puede, poder, I può, pote-re.  
 || G posi-s, des-pot-a = || S pati = || L potis, pote.
142. -nte, -ente, -iente, AD -ent, F -ant, -ent, HI -ente, R -ent'.  
 $\supset$  stud-ente ADfHIR, differ-ent-iale ADFHIR, expon-ente,...  
 || A -ing, D -end, G -onti, S -anta.  
 Exemplo: S bhar-anta, G pher-onti, L fer-ente, A  $\subset$  L (dif)fer-ent,  
 A || L bear-ing, D || L (ge)bär-end, HI (con)fer-ente, DR (dif)fer-ent(ial).
143. -ia HI, A -y, -e, D -ie, -ien, F -e, -ie, R -ija.  
 = (139), concord-ia, scient-ia, famil-ia ADfHiR, patr-ia, Ital-ia.  
 || G -ia = analog-ia  $\wedge$  geometr-ia  $\wedge$  ...
144. -entia, -ntia, A -ence, -ency, D -enz, F -ance, H -encia, I -enza, R -entsija.  $\supset$  corresponde-ntia ADFHIR, differ-entia ADFHI.  
 $\subset$  -ente (142) - e + -ia (143)
145. **basí**. G βάσι-s, ADFHIR.  $\subset$  ba- (146) + -si (24).
146. ba- G, || L va-  $\supset$  FI va; S ga, A go, D gehe.  $\subset$  E gva.  
 $\supset$  ba-si = pede, ba-sileus = dux, rex.
147. **exponente** H, ADR exponent, I esponente, F exposant.  
 $\subset$  expone (148) + -nte (142).

148. **expone** H, I espone.  $\subset$  ex (75) + pone (149).

149. **pone** HI  $\supset$  (148), com-pone, dis-pone; = F pose.

## §5.

150. **naturale** I, AH natural, F naturel, D natürlich, R naturalınyj.  
 $\subset$  natura (151) + -le (6).

151. **natura** HIR, AF nature, D natur.  $\subset$  nato (151) — -o + -ura (153)

152. **nato** I, F né.  $\supset$  (151), nat-ale, nat-ione ADFHIR, nat-ivo.

$\subset$  -gnato = co-gnato  $\wedge$  a-gnato  $\wedge$  ... Vide 249.

= genito  $\subset$  gene (154) — -e + -i (9) + -to.

153. -ura = (151)  $\wedge$  flex-ura  $\wedge$  fig-ura  $\wedge$  ...

154. **gene** L. antiquo. = genera.

$\supset$  (152), gene-re, gene-rale ADFHIR, gen-ito, gen-itore, gen-te.

|| G gene- = gene-si  $\wedge$  oxy-gen-o  $\wedge$  homo-gene-o...

|| AD kin-d. S g'an-, g'anita, g'anitri.

155. **majore**, A major, D major, meier, F majeur ( $\subset$  majöre), maire ( $\subset$  mājor), H mayor, I maggiore; || S mahijas.

$\subset$  mag- (156) + -iore (110).

156. mag- = pote, cresce.  $\supset$  (155)  $\wedge$  mag-istro aDfhiR  $\wedge$  mag-no.

|| A may, make; D möge, mache; R mogy.  $\subset$  E magh-, mag-.

(Es ligato ad G mega, mega-lo, mech-anica, man-gano. A more much; D mehr; S maha;..).

157. **minore** I, A minor, F mineur, H menor, D minor (Determinante)  
R (non math.) minor'.  $\subset$  min- (158) + -iore (110).

158. **mino** (L. raro).  $\supset$  (157), min-imo, min-istro ADFHIR.

|| G min-ythe, D min-dern, R men-ıs'tj.  $\subset$  mi- (159) + -no (160).

159. **mi** = minue.  $\supset$  (158). || S mi.

160. -no = mag-no  $\wedge$  ple-no  $\wedge$  Roma-no  $\wedge$  pater-no ...

|| G -no = co-no  $\wedge$  hyp-no  $\wedge$  chro-no.

A -ne = do-ne  $\wedge$  go-ne, D -n, geworde-n, gebisse-n, R -nyj, S -na.

R pol-nyj = S pra-na = L ple-no.

## §6.

161. **minus** AD, F moins, I meno, R minus'.  $\subset$  min- (158) + -us (110).

Operatione — es dicto « subtractione ».  $a-b$  es « differentia » inter  $a$  et  $b$ .

162. **subtractione** ADFHI.  $\subset$  sub (95) + tracto — -o + -ione (118).

163. **subtrahe**, A subtract. D subtrahire, F soustraire, H substrahe  
I sottrae.  $\subset$  sub + trahe (165).

164. **tracto** H, A tract, trait, F trait, I tratto.  $\subset$  trahe — -e + -to.

$\supset$  (162), con-tracto, abs-tracto, tract-ato, tract-ione, tract-rice.

-h- + -to  $\supset$  -cto: trah- + -to  $\supset$  tracto, veh- + -to  $\supset$  vecto.

165. **trahe**, F trai-re, HI trae.

166. **differentia**, A difference, D differenz, F différence, H diferencia, I differenza.  $\supset$  differentia-le ADFHIR.  $\subset$  differ + -entia (144).  
 167. **differ** A, DI differ-ire, F diffèr-er, H difer-ir.  
 $\subset$  dis- (51) + fer (168).  
 168. **fer**  $\supset$  (166), con-fer-ente, fer-tile.  
 $\parallel$  G phere  $\supset$  phere-tro, phos-phor-o, reo-phor-o, peri-pher-ia.  
 A bear, D (ge)bäre, R bra-tj, berj, S bhar.  $\subset$  E bher.  
 E bh = S bh = G ph = A b = D b = R b = L f-, -b- (L f- initiale, -b-medio).

## §7.

169. **diviso** HI, F divisé.  $\subset$  di- (51) + viso (174).  
 170. **divisione** I, ADFH division.  $\subset$  diviso (169) — -o + -ione (118).  
 171. **divide** AHI, D dividire, F divise.  $\subset$  di- (51) + vide (175).  
 172. **dividendo** I, AD dividend, F dividende. = que debe es diviso.  
 = divide (171) + -ndo (176).  
 173. **divisore** I, ADH divisor, F diviseur.  $\subset$  diviso (169) + -re (177).  
 174. viso HI, = vide (175) — -e + -to (135).  
 -d- + -t-  $\supset$  -s-: claud- + -to  $\supset$  clauso, plaud- + -to  $\supset$  plauso, ...  
 175. **vide**, F voi-r, H ve-r, I vede.  $\supset$  (171), e-vid-e-nte, in-vid-ia, pro-  
 vide-ntia.  $\parallel$  G eid-, ide  $\supset$  id-ea, parabol-o-ide. A wot, (wisse = sci)  
 R vid-jetj, vid', S vid, vidh.  
 176. -endo, -ndo  $\supset$  (172), minu-endo, multiplica-ndo, secu-ndo.  
 177. -re parte de suffixo -tore (138), -sore (173).

## §9,10.

178. **maximo** H, ADFRL maximum, I massimo.  
 $\subset$  mag- (156) + -si- + -mo (125). Elemento -si- non es simplice.  
 179. **minimo** HI, ADFRL minimum.  
 $\subset$  mino (158) — -o + -i- (9) + -mo (125).  
 180. **multiplo** HI, AF multiple.  $\subset$  multo — -o + -i- (9) + -plo (181).  
 181. -plo = (180)  $\wedge$  sim-plo  $\wedge$  du-plo  $\wedge$  ...  $\parallel$  G -plo  $\supset$  di-plo-ma, D -fal,  
 -fel, zwei-fel.  $\subset$  ple (111) — -e + -o.  
 182. -o = (181)  $\wedge$  profug-o  $\wedge$  luci-fer-o  $\wedge$  prod-ig-o  $\wedge$  bene-vol-o. = -ente.  
 super-o  $\wedge$  infer-o.  $\parallel$  G -o. strat-eg-o, anthro-p-hago. tele-graph-o.


## §11.

183. **quoto** I, quot, quoties, quotiens, ADF quotient; H cociente,  
 I quoziente.  $\supset$  quot-a, quot-idiano.  $\parallel$  S cati, catitha.  
 184. **resta** HI, A rest, F reste, D restire.  $\subset$  re- (186) — sta (77).  
 185. **resto** non L) HI, AD rest, F reste.  
 $\subset$  resta (184) — -a + -o (182).  
 186. re-, red- = red-de  $\wedge$  re-trahe  $\wedge$  re-clama  $\wedge$  re-pugna  $\wedge$  ...  
 Continua post Algebra.

III

# ALGEBRA





### III. ALGEBRA.

#### §1 f j (functione)

(§1-4 contine omni complemento ad Logica mathematica, occurrente in continuatione de Formulario).

#### \* 1.

« Functio, operatio, correspondentia » es vocabulo identico, ant simile inter se. In lingua commune, omni vocabulo relativo, ut « patre, filio,... » indica functio.

Functio es expresso in plure casu per signo que praecede variabile, que me voca signo de « prae-functio » Ita, in «  $\log x$ ,  $\sin x$  », «  $\log$ ,  $\sin$  » es signo de prae-functio.

In alios casu, signo de functio seque variabile; me voca illo signo de « post-functio ». Ita in  $a!$  (pag. 52), «  $!$  » es signo de post-functio.

Nos considera duo classe  $a$  et  $b$ ; et nos scribe  $u \in a \rightarrow b$ , et lege «  $u$  es signo de post-functione, que transforma omni  $a$  in  $b$  » vel «  $u$  es transformatore de  $a$  in  $b$  » vel «  $u$  es  $a$  ef  $b$  », si signo  $u$  scripto post omni individuo arbitrario  $x$  de classe  $a$ , produce novo elemento  $xu$ , que pertine ad classe  $b$ .

In symbolos:

$$\cdot 0 \quad a, b \in \text{Cls} \rightarrow \therefore u \in a \rightarrow b \quad \text{::} \quad x \in a \rightarrow xu \in b \quad \text{Df } j$$

Et nos scribe  $u \in b \rightarrow a$ , et lege «  $u$  es signo de prae-functione, que ad omni  $a$  fac corresponde aliquo  $b$  » vel «  $u$  es  $b$  functione des  $a$  », si signo  $u$  scripto praec omni  $a$  produce elemento de classe  $b$ :

$$\cdot 01 \quad a, b \in \text{Cls} \rightarrow \therefore u \in b \rightarrow a \quad \text{::} \quad x \in a \rightarrow ux \in b \quad \text{Df } f$$

Pro brevitate, nos enuntia propositiones super uno solo de duo signo  $f$  et  $j$ .

·1  $a, b \in \text{Cls} . u \varepsilon a \cap b . x, y \varepsilon a . x = y . \supset . xu = yu$  Oper  $u$   
 [ § = P·1  $\supset . x \varepsilon s_2(xu = zu) . \S 5 \cdot 2 . \supset . y \varepsilon s_2(xu = zu) . \supset . \text{Ths} ]$

Si duo objecto  $x$  et  $y$  es aequale inter se, et si super illo nos fac identico operatione  $u$ , et duo resultatu fi aequale.

Nos « opera per  $u$  » quando nos transforma aequalitate  $x = y$  in  $ux = uy$ .

·2  $a, b, c \in \text{Cls} . u \varepsilon a \cap b . c \supset a . \supset . u \varepsilon c \cap b$   
 [ Hp.  $x \varepsilon c . \supset . x \varepsilon a . \supset . xu \varepsilon b : \supset . P ]$

·3  $a, b, c \in \text{Cls} . u \varepsilon a \cap b . b \supset c . \supset . u \varepsilon a \cap c$   
 [ Hp.  $\supset : x \varepsilon a . \supset . xu \varepsilon b . \supset . xu \varepsilon c : \supset . \text{Ths} ]$

Si  $u$  transforma to- $s$   $a$  in  $b$ , et si  $c$  es subclasse de  $a$ , tunc  $u$  transforma to- $s$   $c$  in  $b$ . Si  $u$  es semper  $a$  ef  $b$ , et classe  $b$  continere in  $c$ , tunc  $u$  es  $a$  ef  $c$ .

\* 2·1  $+ \varepsilon N_0 \downarrow N_0$  [= § + 1·2]

+ « successivo » es operatione que transforma numero in numero. Es propositione primitivo ·2 de §+, scripto per signo  $j$ .

·2  $s \varepsilon \text{Cls} . 0 \varepsilon s . + \varepsilon s \downarrow s . \supset . N_0 \supset s$  [= Induct]

·3  $a \varepsilon N_0 . \supset . +a \varepsilon N_0 \downarrow N_0 . \times a \varepsilon N_0 \downarrow N_0 . \wedge a \varepsilon N_0 \downarrow N_0$   
 $-a \varepsilon (a + N_0) \downarrow N_0 : a \varepsilon N_1 . \supset . /a \varepsilon (a \times N_1) \downarrow N_1$

[ = § + 4·1 . §  $\times$  1·1 . §  $\wedge$  1·1 . § - 1·1 . § / 1·1 ]

Si  $a$  es numero, tunc operationes :

$+a$ , « plus  $a$  », « additione de  $a$  », « to adde  $a$  »,

$\times a$ , « per  $a$  », « to multiplica per  $a$  »,

$\wedge a$ , « ad  $a$  », « to eleva ad potestate  $a$  ».

transforma numero in numero.

Operatione :

$-a$ , « minus  $a$  », « to subtrahe  $a$  »

es possibile supra numeros superiore ad  $a$ , et

$/a$ , « in  $a$  », « to divide per  $a$  »

es possibile supra multiplos de  $a$ .

Plure Auctore moderno claude variabile inter  $()$ . Sed parenthesi jam habe in Arithmetica usu determinato, de collega plure elemento, et nos non pote ute illo in novo sensu. In vero, in scriptura  $(x)$ , litera  $x$  non es ligato ad aliquo elemento. Omni Auctore scribe  $\log x$ ,  $\sin x$ , et non  $\log(x)$ ,  $\sin(x)$ ;  $f(x+h)$  et non  $f((x+h))$ . Lagrange, Abel,... non scribe parenthesi in hoc novo sensu, introducto verso a.1823.

Nota differentia inter  $f$  et  $f$ ;  $f$  es symbolo constante, que nos lege « functione »;  $f$  es litera variabile (I §1), que pote repraesenta omni objecto, p. ex. aliquo functione.

\* 3.  $a, b, c, d \in \text{Cls} \supset$ :

$$\cdot 0 \quad u \in a_j b . v \in b_j c . x \in a . \supset . x(uv) = (xu)v = xuv \quad \text{Df}$$

$$\cdot 01 \quad u \in b_f a . v \in c_f b . x \in a . \supset . (vu)x = v(ux) = vux \quad \text{Df}$$

$$\cdot 1 \quad u \in a_j b . v \in b_j c . \supset . uv \in a_j c$$

$$\cdot 2 \quad u \in a_j b . v \in b_j c . w \in c_j d . x \in u . \supset . (xu)(vw) = (xuv)w$$

Signo  $vu$ , de P ·01, indica operatione composito per operationes  $u$  et  $v$ .

sim rep idem

\* 4.  $a, b, c \in \text{Cls} \supset$ :

$$\cdot 0 \quad u \in (bfa)\text{sim} .:= u \in bfa : x, y \in a . ux = uy . \supset_{x, y} . x=y \quad \text{Df}$$

$$\cdot 1 \quad u \in (bfa)\text{sim} . c \supset a . \supset . u \in (bfc)\text{sim}$$

$$\cdot 2 \quad \text{ } \supset . b \supset c . \supset . u \in (cfa)\text{sim}$$

$$\cdot 3 \quad \text{ } \supset . x, y \in a . \supset : x=y .:= . ux = uy$$

$$\cdot 4 \quad \text{ } \supset . v \in (cfb)\text{sim} . \supset . vu \in (cfa)\text{sim}$$

$$\cdot 5 \quad + \in (N_0 \downarrow N_0)\text{sim} \quad [= \S + 1 \cdot 4]$$

$$a \in N_0 . \supset . +a \in (N_0 \downarrow N_0)\text{sim} \quad [= \S + 4 \cdot 5]$$

$$a \in N_1 . \supset . \exists a \in (N_1 \downarrow N_1)\text{sim} . \uparrow a \in (N_1 \downarrow N_1)\text{sim}$$

$$\cdot 6 \quad u \in (bfa)\text{rec} .:= u \in (bfa)\text{sim} : y \in b . \supset_y . \exists a \wedge x \exists (ux = y) \quad \text{Df}$$

$$\cdot 7 \quad u \in (bfa)\text{rec} . v \in (cfb)\text{rec} . \supset . vu \in (cfa)\text{rec}$$

$$\cdot 8 \quad \text{idem} x = x \quad \text{Df}$$

Nos dice que  $u$  es operatione simile (sim) inter classes  $a$  et  $b$ , si  $u$  es operatione tale que, si duo resultatu es aequale, et objecto primitivo es aequale inter se.

Operatione  $u$  es « reciproco » (rec), si es simile, et si ad omni  $b$  corresponde aliquo  $a$ .

« idem » indica identitate.

\* 5.  $s \in \text{Cls} . u \in s_j s . a \in s . b, c \in N_0 . \supset$ .

$$\cdot 1 \quad au0 = a \quad \text{Df} \quad \cdot 2 \quad au(b+) = (aub)u \quad \text{Df}$$

$$\cdot 3 \quad aub \in s$$

$$[ \text{Hp} . b=0 . \text{P} \cdot 1 . \supset . \text{Ths} : \text{Hp} . aub \in s . \text{P} \cdot 2 . \supset . au(b+) \in s : \text{Induct} : \supset . \text{P} ]$$

$$\cdot 4 \quad (ub) \in s_j s \quad [= \text{P} \cdot 3]$$

$$\cdot 5 \quad u \in (s_j s)\text{sim} . \supset . (ub) \in (s_j s)\text{sim}$$

$$[ \text{Hp} . b=0 . \supset . \text{Ths} \quad (1)$$

$$\text{Hp} . ub \in (s_j s)\text{sim} . x, y \in s . x = y . \supset . xub = yub .$$

$$\supset . (xub)u = (yub)u . \supset . xu(b+) = yu(b+) \quad (2)$$

$$\text{Hp} . ub \in (s_j s)\text{sim} . (2) . \supset . u(b+) \in (s_j s)\text{sim} \quad (3)$$

$$(1).(3). \text{Induct} . \supset . \text{P} ]$$



$$\cdot 6 \quad v \in sjs : x \in s . \supset x . xuv = xvu : \supset . (aub)v = (av)ub$$

$$[ \text{Hp} . b=0 . \text{P} \cdot 1 . \supset . \text{Ths} \quad (1)$$

$$\text{Hp} . (aub)v = (av)ub . \text{P} \cdot 2 . \supset . [au(b+)]v = [(aub)u]v =$$

$$[(av)ub]u = (av)u(b+) \quad (2)$$

$$(1) . (2) . \text{Induct} . \supset . \text{P} ]$$

$$\cdot 61 \quad \text{Hp} \text{P} \cdot 6 . \supset . (aub)vc = (avc)ub$$

$$[ \text{Hp} . (ub,v,c)(v,u,b) \text{P} \cdot 6 . \supset . \text{Ths} ]$$

$$\cdot 62 \quad \text{Hp} \text{P} \cdot 6 . \supset . a[(uv)b] = a(ub)(vb)$$

$$[ \text{Hp} . b=0 . \supset . \text{Ths} \quad (1)$$

$$\text{Hp} . a[(uv)b] = a(ub)(vb) . \supset . a[(uv)(b+)] = a[(uv)b]uv =$$

$$a(ub)(vb)uv = a(ub)u(vb)v = a[u(b+)]v(b+) \quad (2)$$

$$(1) . (2) . \text{Induct} . \supset . \text{P} ]$$

$$\cdot 7 \quad a(ub)(uc) = a(uc)(ub)$$

$$[\text{P} \cdot 61 . v=u . \supset . \text{P}]$$

$$\cdot 8 \quad (aub)uc = au(b+c)$$

$$[ \text{Hp} . c=0 . \text{P} \cdot 1 . \supset . \text{Ths} \quad (1)$$

$$\text{Hp} . (aub)uc = au(b+c) . \supset . [(aub)uc]u = [au(b+c)]u \quad (2)$$

$$, \supset . (aub)u(c+) = au(b+c+) \quad (3)$$

$$\text{Hp} . (1) . (3) . \text{Induct} . \supset . \text{Ths} ]$$

Definitione de operatione repetito. Si  $s$  es classe, et  $u$  es tranformatio-  
ne des  $s$  in  $s$ , si  $a$  es individuo de classe  $s$ , et  $b$  es numero, tunc  $aub$   
indica resultatu de operatione  $u$ , repetito  $b$  vice, super  $a$ .

Additione, multiplicacione, et potestate, in Arithmetica, es operatione  
repetito, et principale theoremas seque de theoria de operatione repetito.

$$\ast \quad 6. \quad (N_0, +)|(s, u) \text{P} 5 \cdot 1 \quad \cdot 2 \quad \cdot 3 \quad \cdot 7 \quad \cdot 8 \quad \supset .$$

$$\S + \text{P} 3 \cdot 1 \quad \cdot 2 \quad 4 \cdot 1 \quad \cdot 3 \quad \cdot 2$$

$$\ast \quad 7 \cdot 0 \quad a, b \in N_0 . \supset . a \times b = 0[(+a)b] \quad \text{Dfp} \quad [= \S \times \text{P} 1 \cdot 0 \cdot 01]$$

$$\cdot 1 \quad (N_0, +a, 0)|(s, u, a) \text{P} 5 \cdot 3 . \supset . \S \times \text{P} 1 \cdot 1$$

$$\cdot 2 \quad (N_0, +a, 0)|(s, u, a) \text{P} 5 \cdot 8 . \supset . \S \times \text{P} 1 \cdot 2$$

$$\cdot 3 \quad (N_0, +a, +b, 0, c)|(s, u, v, a, b) \text{P} 5 \cdot 62 . \supset . \S \times \text{P} 1 \cdot 3$$

$$\cdot 4 \quad s \in \text{Cls} . u \in sjs . x \in s . \supset . x[(ua)b] = x[u(a \times b)]$$

$$[ \text{Hp} . b=0 . \supset . \text{Ths} \quad (1)$$

$$\text{Hp} . x[(ua)b] = x[u(a \times b)] . \supset . x[(ua)(b+1)] = x[(ua)b]ua =$$

$$[u(a \times b)]ua = xu(a \times b + a) = xu[a \times (b+1)] \quad (2)$$

$$(1) . (2) . \text{Induct} . \supset . \text{P} ]$$

$$\cdot 5 \quad (N_0, +a, 0)|(s, u, x) \text{P} 4 . \supset . \S \times \text{P} 1 \cdot 5$$

- \* 8.0  $a, m \in N_0$ .  $\supset a^m = a^m = 1[(\times a)^n$   
 $(N_0, \times a, 1) | (s, u, a) P5^{1.2} \supset \S P1^{0.01}$   
 $(N_0, \times a, 1) | (s, u, a) P5^{\cdot 3} \supset \S P1^{\cdot 1}$   
 $(N_0, \times a, \times b, 1) | (s, u, v, a) P5^{62} \supset \S P1^{\cdot 3}$   
 $(N_0, \times a, m, n, 1) | (s, u, a, b, x) P8^{\cdot 4} \supset \S P1^{\cdot 4}$

- \* 9.  $s \in \text{Cls} . r \in \text{sfs} . a \in s . b \in N_0 . \supset$   
 $\cdot 5 \quad v^0 a = a \qquad \qquad \qquad \cdot 2 \quad v^{b+1} a =$

Si signo de functione praecede variabile, plures  
indica functione repetito. Nos scribe exponente ad

§ 2 | ‘ ’

Si  $A$  es expressione que contine literas,  $\mathcal{A}$  indica signo de praefunctione, que calcula resultatu  $A$ . Ce notatione es frequente in

( $|x$ )  $A$  indica signo de postfunctione, quod  
spondet  $A$ . Nos lege signo  $A|x$  «  $A$  inversum  
variatur  $x$  »; et nos defini illo ut seque:

- \* 1.1  $a, b \in \text{Cls} \rightarrow u \in bfa \rightarrow \bigcup_x (ux)|x = u$   
 2  $\rightarrow u \in a|b \rightarrow \bigcup_x (|x)(xu) = u$

- ✱ 2.  $a, b, c, d \in \text{Cls} \ . \ u \in bfa \ . \supset$

0.  $[ (y = x_n)(x \cup y) \in \mathcal{E} ] = a, n$
10.  $[ (y = x_n) \wedge a \exists x(x) \in \mathcal{E} ] = a, n \exists y$
1.  $x \exists a \in x_n \wedge a$
2.  $c \supset a \wedge u'c \supset u'a$
3.  $\text{Hp} \wedge c \wedge (y = x_n)(x \cup y) \in \mathcal{E} \wedge u'c \supset u'a$
3.  $u'a \supset c =: x \exists a \wedge x_n \in \mathcal{E}$
4.  $c \supset a \wedge d \supset a \wedge u'(c \wedge d) = u'c \wedge u'd$
4.  $\text{Df.} \wedge u'(c \wedge d) = u'c \wedge u'd$
- Distrib.  $\wedge c \wedge d \supset a =: (c \wedge d) \supset a$
- Distrib.  $\wedge c \supset a \wedge d \supset a =: (c \wedge d) \supset a$
- Distrib.  $\wedge c \supset a \wedge d \supset a =: (c \wedge d) \supset a$
- Df.  $\wedge c \supset a \wedge d \supset a =: (c \wedge d) \supset a$



## §3 :

- \*  $a, b, c, d \in \text{Cls} \supset: \cdot 0 \cdot a:b = (x;y) \exists (x \varepsilon a \cdot y \varepsilon b)$  Df
- 01  $(x;y) \varepsilon (a:b) \equiv x \varepsilon a \cdot y \varepsilon b$  Dfp
- 02  $a:b:c = (a:b):c = (x;y;z) \exists (x \varepsilon a \cdot y \varepsilon b \cdot z \varepsilon c)$  Df

Si  $a, b$  es classe,  $a:b$  indica omni systema  $x;y$  (considerato in I §2 P6), ubi  $x$  es elemento de classe  $a$ , et  $y$  es elemento de classe  $b$ . Illo es differente de  $a;b$ , systema formato per classe  $a$  et classe  $b$ . In defectu, in nostro linguas commune, de vocabulo cum valore proximo ad signo  $:$ , nos lege illo « virgula et puncto ».

Si  $p_{xy}$  es propositione cum duo variabile  $x$  et  $y$ , vel relatione inter duo variabile, et si  $x$  varia in classe  $a$ , et  $y$  in classe  $b$ , tunc  $(x;y) \exists p_{xy}$  es  $\text{Cls}'(a:b)$ .

- 1  $(a:b) \supset (c:d) \equiv a \supset c \cdot b \supset d$
- 2  $(a:b) = (c:d) \equiv a = c \cdot b = d$
- 3  $(a:b) = (c:d) \equiv (a;b) = (c;d)$
- 4  $(a \wedge c):(b \wedge d) = (a:b) \wedge (c:d)$
- 5  $(a \vee c):b = (a:b) \vee (c:b) \quad a:(b \wedge d) = (a:b) \wedge (a:d) \quad \text{Distrib}(\wedge, \vee)$
- 6  $(a \wedge c):(b \wedge d) = (a:b) \vee (c:b) \vee (a:d) \vee (c:d)$
- 7  $\exists(a:b) \equiv \exists a \cdot \exists b$
- 8  $(\iota x:\iota y) = \iota(x;y) \quad x;y = \iota(\iota x:\iota y)$
- 9  $\iota x:\iota y = \iota z:\iota t \equiv x;y = z;t$
- { ·1-·9 PADOA RdM. a.1900 t.6 p.120 }

- \* 2·1  $u, v \in \text{Cls}'N_0 \supset: u+v = (y+z)|(y;z)(u:v)$  Dfp  
[ = II §4 P1·3 ]

## §4 F (functione definito)

Vocabulo « functione » in Mathematica habe saepe valore de symbolo « f ». Resulta de suo definitione, que si  $u$  es transformatore des  $a$  in  $b$ , et si  $c$  es classe parte de  $a$ ,  $u$  es etiam

transformatore des  $c$  in  $b$  (§1 P1'3). Per exemplo, si nos suppose operatione « mod » (valore assoluto) definito pro numero imaginario, illo resulta definito pro numero reale. Et post definitione de « mod » super numero imaginario, nos pote defini modulo de numeros complexo de ordine superiore ad 2, et modulo de substitutiones, et modulo de vectores, etc.

In Mathematica non existe uno definitione p. ex. de « multiplicatione », neque in Formulario existe aequalitate de forma :

$$X = (\text{espressione composito per alios signo}).$$

Sed existe definitione de multiplicatione inter duo  $N_0$ , post inter duo  $n$  (numero relativo), inter duo  $R$  (numero rationale), etc. In Formulario non es difficile de inveni plus que 30 definitiones de  $xXy$ , cum hypothesi-s differente.

Ergo ad signo de functione non es ligato campo in quo functione es determinato, dicto campo de variabilitate, nam nos pote semper restringe et dilata illo.

In consequentia, nos non pote loque de aequalitate de duo functione; nam duo functione pote produce identicos resultatu in uno campo, et differentes in altero; duo functione arbitrariorum  $u$  et  $v$  habe semper campo de coincidentia, expresso per:  $x\exists (ux = vx)$ . Nos non pote loque de numero de functione que satisfac ad aliquo conditione. Nullo functione es invertibile; etc.

Quando mathematicos loque de aequalitate, numero, inversione de functione, vocabulo « functione » responde ad systema  $(u; a)$ , ubi  $u$  es functione, considerato in §1, et  $a$  es campo de variabilitate. Nos voca illo « functione definito », et indica per  $F$ , aut  $\text{Funct}$ , et nos pone per  $\text{Df}$ :

$$* \quad 1.1 \quad a, b \in \text{Cls} . u \in bfa . x \in a . \supset . (u; a)x = ux \quad \text{Df}$$

Si  $a$  et  $b$  es classe, et  $u$  es  $b$  functione des  $a$ , et  $x$  es  $a$ , tunc per  $(u; a)x$  nos indica valore  $ux$ .

$$.2 \quad a, b \in \text{Cls} . u \in bfa . \supset . \text{Variab}(u; a) = a$$

Variabilitate de  $(u; a)$  es classe  $a$  de valores de variabile.

$$.3 \quad a, b \in \text{Cls} . \supset . bFa = v\exists \{ \exists bfa \wedge u\exists [v = (u; a)] \} \quad \text{Df}$$

Si  $a$  et  $b$  es classe, nos voca « functione definito des  $a$  » omni ente  $v$  reducibile ad forma  $v = (u; a)$ , ubi  $u$  es aliquo  $b$  functione des  $a$ , ut considerato in §1.

$$\cdot 4 \quad \text{Funct} = \lambda a, b \in \text{Cls} . \lambda x \in \text{Cls} . bFa$$

$$\cdot 5 \quad u \in \text{Funct} \supset \text{Variab} u = \lambda x \in \text{Cls} . \lambda y \in \text{Cls} . y \in u[x]$$

$$\cdot 6 \quad u, v \in \text{Funct} \supset u = v \equiv$$

$$\text{Variab} u = \text{Variab} v \supset \lambda x \in \text{Variab} u .$$

Duo functione definito  $u$  et  $v$  es dicto aequale de variabilitate de  $u$  coicidit cum campo de varia omni  $x$  que pertine ad campo commune de variabil

$$\cdot 7 \quad a, b \in \text{Cls} \supset bFa \supset bfa$$

De definitione  $\cdot 1$  et de definitione de  $f$  resulta nito es functione.

$$\ast \quad 2. \quad a, b \in \text{Cls} \supset ::$$

$$\cdot 0 \quad bFa = \text{Cls}'(b'a) \wedge \lambda x \in \text{Cls} . \lambda y \in \text{Cls} . (y:x) \in u . (z:x) \in u \supset_{x,y,z} y=z \}$$

$$\cdot 01 \quad bFa = \text{Cls}'(b'a) \wedge \lambda x \in \text{Cls} . \text{num } y$$

$$\cdot 1 \quad u \in bFa . x \in a \supset ux = \lambda y \in \text{Cls} . (y:x) \in u$$

Si  $a, b$  es classe,  $bFa$  indica omni relatione inter  $a$  responde uno solo  $b$ . Definitione possibile de sine usu de signo  $f$ , que occurre in P 1.

$$\ast \quad 3.0 \quad u \in \text{Funct} \text{ sim} \supset u^{-1} =$$

$$\lambda ( \text{Variab} u ) F( u' \text{Variab} u ) \wedge \lambda x \in \text{Variab} u .$$

$$\cdot 1 \quad u \in \text{Funct} \text{ sim} \supset (u^{-1})^{-1} = u$$

Si  $u$  es functione definito simile, tunc per  $u^{-1}$ , dica illo functione definito, que ad valore que assia in campo de variabilitate de  $u$ , fac correspondit de  $u$ , et tale que successione de operatione  $u$  e ce identitate.

$$\cdot 2 \quad a, b, c \in \text{Cls} . u \in (bfa) \text{ sim} . v \in (cfa) \text{ sim} \supset$$

$$\cdot 3 \quad a \in \text{Cls} . u, v \in (aFa) \text{ sim} . uv = vu \supset u^{-1}v = v^{-1}u^{-1} . u^{-1}v^{-1} = v^{-1}u^{-1}$$

$$\cdot 4 \quad a \in N_0 \supset (+a, N_0)^{-1} = (-a, a+N_0)$$

Inverso de operatione  $+a$ , in campo de numero campo de numero superiore aut aequale ad  $a$ .

$$\cdot 5 \quad a \in N_1 \supset (\times a, N_1)^{-1} = (/a, a \times N_1)$$

Formul. t. 5

num \* 4.0  $m, n \in N_1 \cdot \supset \cdot \text{num}(1 \cdots m \text{ F } 1 \cdots n) = m^n$

·1  $m \in N_1 \cdot \supset \cdot \text{num}(1 \cdots m \text{ F } 1 \cdots m)_{\text{rcp}} = m!$

{ LUCA PACIUOLO a.1494 fol.43 v. }

·2  $n \in N_1 \cdot m \in n + N_0 \cdot \supset \cdot \text{num}(1 \cdots m \text{ F } 1 \cdots n)_{\text{sim}} = m! / (m-n)!$

$1 \cdots m \text{ F } 1 \cdots n =$  « variationes cum repetitione de objectis  $1 \cdots m$  ad  $n$  ».

$(1 \cdots m \text{ F } 1 \cdots n)_{\text{sim}} =$  « variationes simple ».

Si  $m=n$ , illos es vocato « permutationes ».

## §5 $\cap \cup$

\* 1.  $u, v \in \text{Cls}'\text{Cls} \cdot \supset \cdot$

·0  $\cap u = y \{ x \in u \cdot \supset_x y \in x \} \cdot \cup u = x \{ (x \in u \cdot \supset_x y \in x) \} \cdot \text{Df}$

Si  $u$  es classe de classe, tunc  $\cap u$ , lege « parte commune des  $u$  » vel « producto logico des  $u$  » indica omni objecto pertinente ad omni classe de systema  $u$ .

$\cup u$ , lege « universo des  $u$  » vel « summa des  $u$  » indica objectos pertinentes ad aliquo classe  $u$ .

P·1 es analogo ad syllogismo.

·1  $x \in a \cdot a \in u \cdot \supset \cdot x \in \cap u$

·2  $\cup(u \cap v) = \cap u \cup \cap v$

Distrib ( $\cup, \cap$ )

·3  $\cap(u \cup v) = \cap u \cap \cap v$

·4  $u \supset v \cdot \supset \cdot \cup u \supset \cup v \cdot \cap v \supset \cap u$

·5  $\cup(u \cap v) \supset \cup u \cap \cup v$

·6  $\cap u \cup \cap v \supset \cap(u \cup v)$

{ ·2-6 C. BURALI-FORTI, MA. t.48 }

·7  $u, v \in \text{Cls} \cdot \supset \cdot \cup \{ (x; y) | x' u \} | y' v = (u; v)$

Nos considera systema  $x; y$ . Nos varia  $x$  in classe  $u$ ;  $(x; y) | x' u$  repraesenta classe de systema. Nos varia  $y$  in classe  $v$ ;  $(x; y) | x' u | y' v$  repraesenta classe de classe de systema. Suo universo vale  $(u; v)$ .

## §6 n

\* 1.0  $n = +N_0 \cup -N_0$

Df

Expressiones, ut  $+5$  et  $-3$ , jam ad nos occurre in III §1 P2.3.6. Illo es dicto:

$+N_0$  = numero positivo

$-N_0$  = numero negativo.

Vocabulo « positivo » et « negativo » habe valore de « additivo » et « subtractivo ».

Phrasi « numero negativo » habe forma grammaticale de « numero pari » sed valore differente. « Numero pari » es classe de numero, et inter vocabulo « numero » et « pari » es tacito signo logico  $\wedge$ . « Numeros negativo » non es numero, sed systema composito per numero et signo  $-$ .

n, lege « numero relativo » indica « numeros positivo et negativo ». Vocabulo « et » vale  $\cup$ .

1  $a, b \in N_0 . \supset . a + (+b) = a + b$

Df

2  $b \in N_0 . a \in b + N_0 . \supset . a + (-b) = a - b$

Bf

Prop. 1.2.7 exprime conventiones commune.

3  $x, y \in n . \supset .$

$x = y . := u \in N_0 . u + x, u + y \in N_0 . \supset u . u + x = u + y$  Df

« Duo numero relativo  $x$  et  $y$  es aequale inter se, si pro omni numero  $u$ , super que nos pote fac operationes  $+x$  et  $+y$ , semper fi  $u + x = u + y$  ».

4  $a, b \in N_0 . \supset . +a = +b . := a = b$

[  $a, b, u \in N_0 . \S + 4.6 . \supset . u + a = u + b . := a = b$  (1)

$a, b \in N_0 . (1) . \text{Export} . \supset . u \in N_0 . \supset u . u + a = u + b . := a = b$  (2)

(2) . Df.3 .  $\supset . P$  ]

5  $a, b \in N_0 . \supset . -a = -b . := a = b$

[  $a, b, u \in N_0 . u - a, u - b \in N_0 . \supset . u - a = u - b . := u + a + a + b =$   
 $u - b + a + b . := u + b = u + a . := a = b$  ]

6  $a, b \in N_0 . \supset . +a = -b . := a = 0 . b = 0$

[  $a, b, u \in N_0 . u - b \in N_0 . \supset . u + a = u - b . := u + a + b = u$   
 $. := a + b = 0 . := a = 0 . b = 0$  ]

7  $a \in N_0 . \supset . a = +a$

Df





$$\cdot 5 \quad (-b)a = -ba$$

$$\cdot 6 \quad (+a) \times (+b) = +(a \times b) \quad . \quad (-a) \times (+b) = -(a \times b) \quad .$$

$$(+a) \times (-b) = -(a \times b) \quad . \quad (-a) \times (-b) = +(a \times b)$$

{ DIOPHANTO I 9: « Λεῖψις ἐπὶ λεῖψιν πολλαπλασιασθεῖσα ποιεῖ ὑπαρξιν. Λεῖψις δὲ ἐπὶ ὑπαρξιν, ποιεῖ λεῖψιν. » }

$$\ast \quad 5. \quad a, b, c \in \mathbb{N} \quad \cdot 1 \quad a \times b \in \mathbb{N} \quad \cdot 2 \quad 0 \times a = 0 \quad . \quad 1 \times a = a$$

$$\cdot 3 \quad a(b+c) = ab+ac \quad \cdot 4 \quad ab = ba$$

$$\cdot 5 \quad a(bc) = (ab)c = abc$$

$$\cdot 6 \quad ab = 0 \quad . = . \quad a = 0 \quad . \vee \quad b = 0$$

$$\cdot 7 \quad ac = bc \quad . \quad c \neq 0 \quad \cdot \supset \quad a = b$$

$$\ast \quad 6. \quad a, b, c, d \in \mathbb{N} \quad \cdot \supset \quad \S \times P2$$

$$\cdot 1 \quad a(b-c) + b(c-a) + c(a-b) = 0$$

$$\cdot 2 \quad (a-b)(c-d) + (b-c)(a-d) + (c-a)(b-d) = 0$$

$$[ (a-d, b-d, c-d) \mid (a, b, c) \quad P \cdot 1 \quad \cdot \supset \quad P ]$$

$$\cdot 3 \quad ab(a-b) + bc(b-c) + ca(c-a) + (a-b)(b-c)(c-a) = 0$$

$$\cdot 4 \quad (a+b)(b+c)(c-a) + (b+c)(c+a)(a-b) + (c+a)(a+b)(b-c) =$$

$$-(a-b)(b-c)(c-a)$$

$$\cdot 5 \quad (a-b)(b+c-a)(a-b+c) + (b-c)(a-b+c)(a+b-c) +$$

$$(c-a)(a+b-c)(b+c-a) = -4(a-b)(b-c)(c-a)$$

$$[ [3a-b-c, 3b-c-a, 3c-a-b] \mid (a, b, c) \quad P \cdot 3 \quad \cdot \supset \quad P ]$$

$$\cdot 6 \quad a(b+c)(b+c-a) + b(c+a)(c+a-b) + c(a+b)(a+b-c) = 6abc$$

$$\cdot 7 \quad a(b-c)(b+c-a) + b(c-a)(c+a-b) + c(a-b)(a+b-c) =$$

$$2(a-b)(b-c)(c-a)$$

$$\ast \quad 7 \cdot 0 \quad ab(-a+b+c) + bc(a-b+c) + ca(a+b-c) - 3abc =$$

$$(a-b)(b-c)(c-a)$$

$$\cdot 1 \quad ab(a-b+c) + bc(a+b-c) + ca(-a+b+c) - 3abc =$$

$$-(a-b)(b-c)(c-a)$$

$$\cdot 2 \quad ab(a+b-c) + bc(-a+b+c) + ca(a-b+c) + 5abc =$$

$$(a+b)(b+c)(c+a)$$

$$\cdot 3 \quad a(a-b+c)(a+b-c) + b(a+b-c)(-a+b+c) + c(-a+b+c)(a-b+c) =$$

$$4abc - (-a+b+c)(a-b+c)(a+b-c)$$

$$\cdot 4 \quad a(a-b)(a-c)+b(b-c)(b-a)+c(c-a)(c-b) = \\ abc - (-a+b+c)(a-b+c)(a+b-c)$$

$$\cdot 5 \quad (a+b)(b-c)(c-a)+(b+c)(c-a)(a-b)+(c+a)(a-b)(b-c) = \\ 8abc - (a+b)(b+c)(c+a)$$

$$\cdot 6 \quad (a+b+c)\{(-a+b+c)(a-b+c)+(a-b+c)(a+b-c)+(a+b-c)(-a+b+c)\} = 8abc + (-a+b+c)(a-b+c)(a+b-c)$$

$$\cdot 7 \quad (aa'+bb')(cc'+dd')+(ab'-a'b)(cd'-c'd) = (ac+bd)(a'd'+b'd') + \\ (ad-bc)(a'd'-b'c')$$

n ↑

$$* \quad 10. \quad a, b \in n. \quad m, n \in N_0. \quad \supset. \quad \cdot 0 \cdot 02 = \S \uparrow P1 \cdot 0 \cdot 02 \quad \cdot 1 \quad a^m \in n$$

$$\cdot 2 \cdot 4 = \S \uparrow P1 \cdot 2 \cdot 4$$

$$\cdot 3 \quad (-a)^2 = a^2$$

$$\cdot 6 \quad (-a) \wedge (2m) = a \wedge (2m)$$

$$\cdot 7 \quad (-a) \wedge (2m+1) = -a \wedge (2m+1)$$

§ P2 . P3.

$$* \quad 11. \quad a, b \in n. \quad \supset.$$

$$\cdot 0 \quad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$\cdot 1 \quad (a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

$$\cdot 2 \quad (a+b)^2 + (a-b)^2 = 2(a^2 + b^2) \quad \{ \text{EUCLIDE II P9} \}$$

$$\cdot 3 \quad (a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab \quad \{ \quad , \quad , \quad P5 \}$$

$$* \quad 12. \quad a, b, c \in n. \quad \supset.$$

$$\cdot 1 \quad (a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 = 2(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca) \\ = 2[(a-b)(a-c) + (b-a)(b-c) + (c-a)(c-b)] \\ [ (b-c, c-a, a-b) \mid (a, b, c) \S \uparrow 3 \cdot 1 \supset. P ]$$

$$\cdot 2 \quad (a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 + (a+b+c)^2 = 3(a^2 + b^2 + c^2)$$

$$\cdot 3 \quad (a+b+c)^2 + (a+b-c)^2 + (a-b+c)^2 + (-a+b+c)^2 = 4(a^2 + b^2 + c^2)$$

$$\cdot 4 \quad (a+2b)(b+c-a) + (b+2c)(a-b+c) + (c+2a)(a+b-c) = (a+b+c)^2$$

$$\cdot 5 \quad 3(a+b+c)^2 = (a+b-c)^2 + (b+c-a)^2 + (c+a-b)^2 + 8(ab+ac+bc)$$

$$\cdot 6 \quad (-a+2b+2c)^2 + (2a-b+2c)^2 + (b-c)^2 = 9(a^2 + b^2 + c^2) + 2a2 \\ [ (2b+2c-a, 2c+2a-b, 2a+2b-c) \mid (a, b, c) P \cdot 2 \supset. P ] \\ \{ \text{EULER a.1750 CorrM. t.1 p.515} \}$$

\* 13.  $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ .

$$\begin{aligned} &^1 (a+b+c+d)^2 + (a+b-c-d)^2 + (a+c-b-d)^2 + (a+d-b-c)^2 = \\ & \quad (-a+b+c+d)^2 + (-b+c+d)^2 + (a+b-c+d)^2 + (a+b+c-d)^2 = \\ & \quad 4(a^2+b^2+c^2+d^2) \end{aligned} \quad \{ \text{LEGENDRE a.1816 p.8} \}$$

\* 14.  $a, b \in \mathbb{Z}$ .

$$\begin{aligned} &^1 (a^2+ab+b^2)(a-b) = a^3-b^3 \\ &^2 2(a^2+b^2)-(a+b)(a^2+b^2) = (a-b)^2(a+b) \\ &^3 (a+b)^3 = a(a-3b)^2 + b(b-3a)^2 \end{aligned}$$

\* 15.  $a, b, c \in \mathbb{Z}$ .

$$\begin{aligned} &^1 a^2(b-c)+b^2(c-a)+c^2(a-b) = (a-b)(a-c)(b-c) \\ &^2 a(b^2-c^2)+b(c^2-a^2)+c(a^2-b^2) = (b-a)(c-a)(c-b) \\ &^3 (a+b)^2(a-b)+(b+c)^2(b-c)+(c+a)^2(c-a) = -(a-b)(b-c)(c-a) \\ & \quad [ (b+c, c+a, a+b) | (a, b, c) \text{ P.1 } \mathbb{Z}. \text{ P } ] \\ &^4 a^3(b+c)+b^3(c+a)+c^3(a+b)-6abc = a(b-c)^2+b(c-a)^2+c(a-b)^2 \\ &^5 (a+b+c)^2-(b+c-a)^2-(c+a-b)^2-(a+b-c)^2 = 24abc \\ & \quad [ (b+c-a, c+a-b, a+b-c) | (a, b, c) \text{ §3.3 } \mathbb{Z}. \text{ P } ] \\ &^6 a^3+b^3+c^3-3abc = (a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc) \\ &^7 2(a^3+b^3+c^3-3abc) = (a+b+c)[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2] \\ &^8 3(a^3+b^3+c^3)-(a+b+c)(a^2+b^2+c^2) = \\ & \quad (a-b)^2(a+b)+(b-c)^2(b+c)+(c-a)^2(c+a) \\ &^9 2[(a+b+c)^3-27abc] = \\ & \quad (a-b)^2(a+b+7c)+(b-c)^2(7a+b+c)+(c-a)^2(a+7b+c) \end{aligned}$$

\* 16.  $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ .

$$\begin{aligned} &^1 (a+b-c)(a-b+c)(-a+b+c) = \\ & \quad a^2(b+c-a)+b^2(a+c-b)+c^2(a+b-c)-2abc \\ &^2 (a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2 = 3(a-b)(b-c)(c-a) \\ & \quad [ (b-c, c-a, a-b) | (a, b, c) \text{ §3.3 } \mathbb{Z}. \text{ P } ] \\ &^3 a(b-c)^2+b(c-a)^2+c(a-b)^2+8abc = (a+b)(b+c)(c+a) \\ &^4 (a+b+c)^2+(-a+b+c)^2+(a-b+c)^2+(a+b-c)^2 = \\ & \quad 8(a^2+b^2+c^2)+6(-a+b+c)(a-b+c)(a+b-c) \\ &^5 a^3+b^3+c^3+d^3-3(abc+abd+acd+bcd) = (a+b+c+d)(a^2+ \\ & \quad b^2+c^2+d^2-ab-bc-ca-ad-bd-cd) \end{aligned}$$

- 6  $(-a+b+c)(a-b+c)^2+(a-b+c)(a+b-c)^2+(a+b-c)(-a+b+c)^2+(-a+b+c)(a-b+c)(a+b-c) = 4\{abc-(a-b)(b-c)(c-a)\}$
- 7  $(-a+b+c)^2(a-b+c)+(a-b+c)^2(a+b-c)+(a+b-c)^2(-a+b+c)+(-a+b+c)+(-a+b+c)(a-b+c)(a+b-c) = 4\{abc+(a-b)(b-c)(c-a)\}$

✱ 17.  $a, b \in n \supset$ .

- 1  $(a^2+a^2b+ab^2+b^3)(a-b) = a^4-b^4$
- 2  $(a^2+ab+b^2)^2-(a^2-ab+b^2)^2 = 4ab(a^2+b^2)$
- 3  $a(a-2b)^2-b(b-2a)^2 = (a-b)(a+b)^2$
- 4  $(a^2+b^2)^2 = (a^2-b^2)^2+(2ab)^2 \quad \{ \text{EUCLIDE x lemma P29} \}$
- 5  $a^4+4b^4 = (a^2+2ab+2b^2)(a^2-2ab+2b^2)$   
 $\{ \text{EULER a.1742 CorrM. t.1 p.145} \}$
- 6  $a^4+a^2b^2+b^4 = (a^2+ab+b^2)(a^2-ab+b^2)$
- 7  $3(a^4+a^2b^2+b^4)-(a^2+ab+b^2)^2 = 2(a-b)^2(a^2+ab+b^2)$
- 8  $2(a^4+a^2b^2+b^4)-3ab(a^2+b^2) = (a-b)^2(2a^2+ab+2b^2)$

✱ 18.  $a, b \in n \supset$ .

- 1  $a^4+b^4-ab(a^2+b^2) = (a-b)^2(a^2+ab+b^2)$
- 2  $(a+b)^4-(a-b)^4 = 8ab(a^2+b^2) \quad [ \text{P11·2·3} \supset \text{P} ]$   
 $\{ \text{CAUCHY Exerc. a.1841 t.2 p.144} \}$
- 3  $(a+b)^4 = (a^2-6ab+b^2)^2 + 16ab(a-b)^2$

✱ 19.  $a, b, c \in n \supset$ .

- 1  $a(b-c)^2+b(c-a)^2+c(a-b)^2 = (a-b)(b-c)(c-a)(a+b+c)$   
 $= a(b^2-c^2)+b(c^2-a^2)+c(a^2-b^2)$
- 2  $a^2(b-c)+b^2(c-a)+c^2(a-b) = (a-b)(b-c)(c-a)(a+b+c)$
- 3  $(a+b-2c)(a-b)^2+(b+c-2a)(b-c)^2+(c+a-2b)(c-a)^2 = 0$   
 $[ (b+c-2a, c+a-2b, a+b-2c) \mid (a, b, c) \text{ P·1} \supset \text{P} ]$
- 4  $(a+b+c)(a+b-c)(a-b+c)(-a+b+c) =$   
 $2(a^2b^2+a^2c^2+b^2c^2)-(a^4+b^4+c^4) = (a^2+b^2+c^2)^2-2(a^4+b^4+c^4)$
- 5  $[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2]^2 = 2[(a-b)^4+(b-c)^4+(c-a)^4]$
- 6  $a^4+b^4+c^4 = \frac{(a+b+c)(a-b-c)(b-c-a)(c-a-b)+2(a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2)}{2(a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2)} \quad [ \text{P·4} \supset \text{P} ]$

$$\cdot 7 \quad (a+b+c)(a^2+b^2+c^2)-(a^2+b^2+c^2)^2 = ab(a-b)^2+c$$

$$\cdot 8 \quad (a+b)(a-b)^2+(b+c)(b-c)^2+(c+a)(c-a)^2 = 2(a+b+c)(a-b)(b-c)(c-a) \quad [b+c, c+a, a+b]$$

\* 20.  $a, b, c \in \mathbb{N} \rightarrow$

$$\cdot 1 \quad ab(a^2-b^2)+bc(b^2-c^2)+ca(c^2-a^2) = -(a-b)(b-c)(c-a)$$

$$\cdot 2 \quad ab(a+b)^2+bc(b+c)^2+ca(c+a)^2 = (a+b+c)[(a+b)(b+c)(c+a)-4abc]$$

$$\cdot 3 \quad a(b-c)(b+c-a)^2+b(c-a)(c+a-b)^2+c(a-b)(a+b-c)^2 =$$

$$\cdot 4 \quad (a+b+c)^4 + (-a+b+c)^4 + (a-b+c)^4 + (a+b-c)^4 = 4(a^4+b^4+c^4) + 24(b^2c^2+c^2a^2+a^2b^2)$$

$$\cdot 5 \quad a^2(a-b+c)(a+b-c)+b^2(a+b-c)(-a+b+c)+c^2(a-b+c)(a+b-c) = (a+b+c)^2 2abc - (a-b+c)(a+b-c)(a-b+c)$$

$$\cdot 6 \quad (a+b+c)^2(-a+b+c)^2+(a-b+c)^2+(a+b+c)^2(a-b+c)^2+(a-b+c)^2(a+b-c)^2+(a-b+c)^2 = 6(a^4+b^4+c^4)+4(a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2)$$

\* 21.  $a, b, c, d \in \mathbb{N} \rightarrow$

$$\cdot 1 \quad (a^2+b^2)(c^2+d^2) = (ac+bd)^2 + (ad-bc)^2 = \{ \text{DIOPHANTO III P22} \}$$

$$\cdot 2 \quad (a^2-b^2)(c^2-d^2) = (ac-bd)^2 - (ad-bc)^2$$

$$\cdot 3 \quad (a^2+b^2+c^2+d^2)^2 = (a^2+b^2-c^2-d^2)^2 + (2ac+2bd)^2 \{ \text{P. TANNERY IdM. a.1898 p.282} \}$$

\* 22.  $a, b, c, d, e, f, g, h, a', b', c', d', e', f', g', h', p, q \in \mathbb{N}$

$$\cdot 1 \quad (ae^2+cb^2)(a'^2+cb'^2) = (aa'+cbb')^2 + c(ab'-a'b)^2$$

$$\cdot 2 \quad \quad \quad = (ad'-cbb')^2 + c(ab'+a'b)^2$$

$$\cdot 3 \quad (ae^2+b^2+c^2)(a'^2+b'^2+c'^2) - (aa'+bb'+cc')^2 = (ab'-a'b)^2 + (ac'-a'e)^2 + (bc'-b'e)^2$$

$$\cdot 4 \quad (a^2+b^2+c^2+d^2)(a'^2+b'^2+c'^2+d'^2) = (aa'+bb'+cc'+dd')^2 + (ab'-a'b+cd'-c'd)^2 + (ac'-a'c-bd'+b'd)^2 + (ad'-a'd+bc'-b'c)^2$$

{ EULER PetrNC. t.5 a.1754 p.54 }

$$\cdot 5 \quad (a^2-pb^2-qc^2+pqd^2)(a'^2-pb'^2-qc'^2+pqd'^2) =$$

$$(aa'+pbb'+qcc'+pdd')^2 - p(ab'+a'b+q(cd'+c'd))^2$$

$$- q(ac'-pbd'+(a'c-pbd))^2 + pq(bc'-ad'+(a'd-b'c))^2$$

{ LAGRANGE a.1770 t.3 p.201 }

$$\cdot 6 \quad (a^2+b^2+c^2+d^2+e^2+f^2+g^2+h^2)(a'^2+b'^2+c'^2+d'^2+e'^2+f'^2+g'^2+h'^2) =$$

$$(aa'+bb'+cc'+dd'+ee'+ff'+gg'+hh')^2$$

$$+ (ab'-ba'+cd'-dc'+ef'-fe'+gh'-hg')^2$$

$$+ (ac'-bd'-ca'+db+eg'-fh'-ge'+hf')^2$$

$$+ (ad'+bc'-cb'-da'+eh'+fg'-gf'-he')^2$$

$$+ (ae'+bf'+cg'+dh'+ea'+fb'+gc'+hd')^2$$

$$+ (af'-be'+ch'-dg'+eb'-fa'+gd'-hc')^2$$

$$+ (ag'-bh'-ce'+df'+ec'-fd'-ga'+hb')^2$$

$$+ (ah'+bg'-cf'-de'+ed'+fc'-gb'-ha')^2$$

{ DEGEN, Mém. de l'Acad. de St. Pétersbourg, a.1822 t.8 p.4 }

$$\cdot 7 \quad (ab)^2 + [(a+b)b]^2 + [a(a+b)(a^2+ab+2b^2)]^2 = (a^2+ab+b^2)^2$$

\* 23.  $a, b, c \in \mathbb{C} \quad \square$ .

$$\cdot 1 \quad a^2+b^2-ab(a^2+b^2) = (a+b)(a-b)^2(a^2+b^2)$$

$$\cdot 2 \quad (a+b)^2 = a(a^2-10ab+5b^2) + b(5a^2-10ab+b^2)$$

$$\cdot 3 \quad ab(a^2-b^2)+bc(b^2-c^2)+ca(c^2-a^2) +$$

$$(a-b)(b-c)(c-a)(a^2+b^2+c^2+ab+bc+ca) = 0$$

$$\cdot 4 \quad a^2(b^2-c^2)+b^2(c^2-a^2)+c^2(a^2-b^2) = (a-b)(a-c)(b-c)(ab+ac+bc)$$

[ (bc, ca, ab) | (a, b, c) P20.1.  $\square$ . P ]

$$\cdot 5 \quad (a+b+c)^2 = (a+b-c)^2 + (b+c-a)^2 + (c+a-b)^2 + 80abc(a^2+b^2+c^2)$$

{ CAUCHY Exercices a.1841 t.2 p.144 }

[ (b+c-a, c+a-b, a+b-c) | (a, b, c) §3.8.  $\square$ . P ]

$$\cdot 6 \quad 2[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2] =$$

$$5(a-b)(b-c)(c-a)[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2]$$

[ (b-c, c-a, a-b) | (a, b, c) P5.  $\square$ . P ]

\* 24.  $a, b, c \in \mathbb{C} \quad \square$ .

$$\cdot 0 \quad (a+b)^2 = (a-b)^2(a^2-14ab+b^2) + 4ab(3a-b)^2(3b-a)^2$$

- 1  $(a^3+a^2b+ab^2+b^3)^3+(a^3-a^2b+ab^2-b^3)^3=2$
- 2  $(a^3+a^2b-ab^2-b^3)^3-(a^3-a^2b-ab^2+b^3)^3=4$
- 3  $(a^3+a^2b-ab^2+b^3)^3-(a^3-a^2b-ab^2-b^3)^3=.$
- 4  $4(a^3+ab+b^3)^3-27(a^2b+ab^2)^3=(a-b)^3[2(a^3$   
 $\} \text{LAGRANGE a.1777, Œuvres t.4 p.346} \}$
- 5  $a^3(b-c)^3+b^3(c-a)^3+c^3(a-b)^3=3abc(a-b$   
 $[ (ab-ac, bc-ba, ca-cb) ] (a,b,c) \text{ P14.6 } \supset. \text{ P } ]$
- 6  $(a+b)^3(b+c)^3(c-a)^3+(b+c)^3(c+a)^3(a-b)^3+$   
 $+(a-b)^3(b-c)^3(c-a)^3=4(a^3+b^3)(b^3+c$
- 7  $(a+b)^3(b-c)^3(c-a)^3+(b+c)^3(c-a)^3(a-b)^3+$   
 $+(a+b)^3(b+c)^3(c+a)^3=4(a^3+b^3)(b^3+$
- 8  $a(b-c)(a-b+c)^3(a+b-c)^3+b(c-a)(a+b-$   
 $c(a-b)(-a+b+c)^3(a-b+c)^3=-16abc$
- 9  $(a+b+c)^3\{(-a+b+c)^3(a-b+c)^3+(a-b+c$   
 $b-c)^3(-a+b+c)^3\}+(-a+b+c)^3(a-b+$   
 $64a^3b^3c^3-4(a^3+b^3+c^3)(a+b+c)-a+b+$   
 $b+c)(a+b-c)$

\* 25.  $a, b, c \in \supset.$

- 1  $a^3+b^3-ab(a^2+b^2)=(a+b)(a-b)^2(a^2+ab+$
- 2  $(a^3+b^3)(a+b)-2ab(a^2+b^2)=(a-b)^2(a+b)(a$
- 3  $(a^3+b^3)(a+b)-(a^3+b^3)(a^2+b^2)=(a-b)^2(a+$
- 4  $(a+b)^7=a(a^3-21a^2b+35ab^2-7b^3)^3+b(7a$
- 5  $(a+b+c)^7-(a+b-c)^7-(a-b+c)^7-(-a+$   
 $56abc[3(a^4+b^4+c^4)+10(a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2)]$   
 $\} \text{LAMÉ a.1840 JdM. t.5 p.197} \}$

\* 26.  $a, b \in \supset.$

- 1  $(a+b)^8=(a^4-28a^2b+70a^2b^2-28ab^3+b^4)^2$   
 $64ab(a-b)^2(a^2-6ab+b^2)^2$
- 2  $(a^4+a^2b-a^2b^2+ab^3+b^4)^3-(a^4-a^2b-a^2b^2-$   
 $4ab^3$



$$\cdot 3 \quad (a^4 + a^3b - a^2b^2 - ab^3 + b^4)^2 - (a^4 - a^3b - a^2b^2 + ab^3 + b^4)^2 = 4ab(a^2 - b^2)(a^4 - a^2b^2 + b^4)$$

$$\cdot 4 \quad a^3 + b^3 - ab(a^2 + b^2) = (a+b)(a-b)^2(a^2 + b^2)(a^4 + b^4)$$

$$\cdot 5 \quad (a+b)^9 = a(a^4 - 36a^3b + 126a^2b^2 - 84ab^3 + 9b^4)^2 + b(9a^4 - 84a^3b + 126a^2b^2 - 36ab^3 + b^4)^2$$

n >

$$\ast 30. \quad x, y \in \mathbb{N} \quad \supset: \quad \cdot 0 \quad x > y \quad \equiv \quad y < x \quad \equiv \quad x \in y + \mathbb{N}_1 \quad \text{Df}$$

$$\cdot 01 \quad x > y \quad \equiv \quad u \in \mathbb{N}_0 \cdot u + x, u + y \in \mathbb{N}_0 \quad \supset u \cdot u + x > u + y \quad \text{Dfp}$$

$$\cdot 02 \quad a, b \in \mathbb{N}_1 \quad \supset: \quad +a > +b \quad \equiv \quad a > b : +a > -b : -a > -b \quad \equiv \quad a < b$$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \quad \supset.$$

$$\cdot 1 \quad a > b \quad \cdot \quad b > c \quad \supset. \quad a > c$$

$$\cdot 2 \quad a > b \quad \equiv \quad a + c > b + c$$

$$\cdot 3 \quad a > b \quad \cdot \quad c > d \quad \supset. \quad a + c > b + d$$

$$\cdot 4 \quad a > b \quad \vee \quad a = b \quad \vee \quad a < b$$

$$\cdot 5 \quad a > b \quad \equiv \quad -a < -b$$

$$\ast 31. \quad a, b \in \mathbb{N} \quad \cdot \quad c \in \mathbb{N}_1 \quad \supset: \quad a > b \quad \equiv \quad ac > bc$$

$$\ast 32. \quad a, b, c \in \mathbb{N}_1 \quad \cdot \quad (a = b = c) \quad \supset.$$

$$\cdot 1 \quad (a + b - c)^2 + (a + c - b)^2 + (b + c - a)^2 > ab + bc + ca$$

$$\cdot 2 \quad abc > (a + b - c)(a + c - b)(b + c - a) \quad \} \text{BERTRAND a.1855 p.142} \{ \\ [ (b + c - a, a + c - b, a + b - c) | (a, b, c) \S \mathbb{N}_1 12:25 \supset. P ]$$

$$\cdot 3 \quad (a - b)^2(a + b - c) + (b - c)^2(b + c - a) + (c - a)^2(c + a - b) > 0$$

$$\ast 33 \cdot 0 \quad a \in (2\mathbb{N}_0 + 1) \setminus (5\mathbb{N}_0) \quad \supset. \quad a^4 - 1 \in 80\mathbb{N}_0$$

$$a \in \mathbb{N} \quad \supset. \quad \cdot 1 \quad (2a - 1)^2 - 1 \in 8\mathbb{N} \quad \cdot 2 \quad a(a^2 - 1) \in 6\mathbb{N}$$

$$\cdot 3 \quad a^2(a^2 - 1) \in 12\mathbb{N} \quad \} \text{LEIBNIZ MathS. t.7 p.101} \{$$

$$\cdot 4 \quad a(a^4 - 1)(a^2 - 4) \in 120\mathbb{N}$$

$$\cdot 5 \quad a^2(a^4 - 1) \in 60\mathbb{N}$$

$$\cdot 6 \quad a^2(a^2 - 2)(a^4 - 1)(a^4 - 16) \in 25200\mathbb{N} \quad \cdot 7 \quad a(a^{12} - 1) \in 2730\mathbb{N}$$

$$\cdot 8 \quad a^2(a^4 - 1)(a^4 - 9)(a^4 - 16) \in 46800\mathbb{N}$$

\* 34.  $a, b \in \mathbb{N} \supset$ .

1  $ab(a^2 - b^2) \in 6\mathbb{N}$

2  $ab(a^2 + b^2)(a^2 - b^2) \in 30\mathbb{N}$

$a \in 2\mathbb{N} + 1 \supset$  3  $a(a^2 - 1) \in 240\mathbb{N}$

4  $a^2(a^2 - 1)(a^2 - 1) \in 5760\mathbb{N}$

5  $a^3(a^2 - 1)(a^2 - 1) \in 4032\mathbb{N}$

6  $a^3(a^2 - 1)(a^2 - 1) \in 115200\mathbb{N}$

7  $a, b \in \mathbb{N} . m \in \mathbb{N}_1 \supset a^m - b^m \in \mathbb{N} \times (a - b) . a^{2m} - b^{2m} \in \mathbb{N} \times (a + b)$

8  $n \in 6\mathbb{N}_1 - 1 . a, b \in \mathbb{N}_1 \supset$

$(a + b)^n - a^n - b^n \in nab(a + b)(a^2 + ab + b^2) \times \mathbb{N}_1$

9  $n \in 6\mathbb{N}_1 + 1 . a, b \in \mathbb{N}_1 \supset$

$(a + b)^n - a^n - b^n \in nab(a + b)(a^2 + ab + b^2)^2 \times \mathbb{N}_1$

} CAUCHY a.1839 Œuvres s.1 t.4 p.501; Exerc. a.1841 t.2 p.137 {

\* 35.1  $2n + 1 \supset n^2 - n^2 . 4n \supset n^2 - n^2$

[  $a \in \mathbb{N} \supset 2a + 1 = a + 1)^2 - a^2 . 4a = (a + 1)^2 - (a - 1)^2$  ]

2  $n \supset n^2 + n^2 + n^2 + n^2 + n^2$  } OLTRAMARE IdM. a.1895 p.25,166 {

3  $a \in \mathbb{N} \supset a(a^2 - 1) \in 30\mathbb{N}$

\* 40.  $(n \mid \mathbb{N}_0) \S \max$

1  $u \in \text{Cls}'n . \max u \in u \supset \min(-u) = -\max u$

\* 41.  $u \in \text{Cls}'n . \exists u \neq 0 \supset$

0  $Du = \max[\mathbb{N}_1 \wedge x \exists (u \supset \mathbb{N} \times x)] : D(u) = 0$

Df

1  $D(u \sim u) = Du$

\* 42.

1  $a, b \in \mathbb{N}_1 . D(a, b) = 1 . c \in \mathbb{N} \supset \exists 0 \dots (b - 1) \wedge x \exists (ax - c \in n\mathbb{N})$

2  $a, b \in \mathbb{N}_1 . D(a, b) = 1 . c \in \mathbb{N} . u, v \in \mathbb{N} . au + bv = c \supset$

$x, y \in \mathbb{N} . ax + by = c \implies \exists n \wedge \exists z [x = u + bz . y = v - az]$

3  $a, b, c \in \mathbb{N} . D(a, b, c) = 1 \supset (x, y, z) \exists (ax + by + cz = 0) =$

$(bv - cr, cu - av, av - bu) \mid (u, v, w) \wedge (n : n : n)$

} CAUCHY a.1826, Œuvres s.2 t.6 p.287 {

\* 43.1  $a \in \mathbb{N}_1 . 2a + 1 \in \mathbb{N}_p . b \in \mathbb{N} = n(2a + 1) \supset$

$b \in n^2 + (2a + 1)\mathbb{N} \implies (-b)^a - 1 \in n(2a + 1)$

} LEGENDRE a.1797 N.134 {

Numeros  $n^2 + an$  vocare « residuo quadratico ».

$$\begin{aligned}
 \cdot 3 \quad (a^4 + a^3b - a^2b^2 - ab^3 + b^4)^2 - (a^4 - a^3b - a^2b^2 + ab^3 + b^4)^2 &= \\
 &= 4ab(a^2 - b^2)(a^4 - a^2b^2 + b^4) \\
 \cdot 4 \quad a^4 + b^4 - ab(a^3 + b^3) &= (a+b)(a-b)^2(a^2 + b^2)(a^4 + b^4) \\
 \cdot 5 \quad (a+b)^9 &= a(a^8 - 36a^7b + 126a^6b^2 - 84ab^3 + 9b^4)^2 + \\
 &+ b(9a^8 - 84a^7b + 126a^6b^2 - 36ab^3 + b^4)^2
 \end{aligned}$$

n >

$$\begin{aligned}
 * \quad 30. \quad x, y \in \mathbb{N} \quad \supset: \quad \cdot 0 \quad x > y &:= y < x := x \in y + \mathbb{N}_1 \quad \text{Df} \\
 \cdot 01 \quad x > y &:= u \in \mathbb{N}_0 \cdot u + x, u + y \in \mathbb{N}_0 \cdot \supset u \cdot u + x > u + y \quad \text{Dfp} \\
 \cdot 02 \quad a, b \in \mathbb{N}_1 \cdot \supset: \quad +a > +b &:= a > b : +a > -b : -a > -b := a < b \\
 a, b, c, d \in \mathbb{N} \cdot \supset: \\
 \cdot 1 \quad a > b \cdot b > c \cdot \supset. \quad a > c \\
 \cdot 2 \quad a > b &:= a + c > b + c \\
 \cdot 3 \quad a > b \cdot c > d \cdot \supset. \quad a + c > b + d \\
 \cdot 4 \quad a > b \cdot \wedge. \quad a = b \cdot \wedge. \quad a < b \\
 \cdot 5 \quad a > b &:= -a < -b
 \end{aligned}$$

$$* \quad 31. \quad a, b \in \mathbb{N} \cdot c \in \mathbb{N}_1 \cdot \supset: a > b := ac > bc$$

$$* \quad 32. \quad a, b, c \in \mathbb{N}_1 \cdot \supset: (a = b = c) \cdot \supset.$$

$$\begin{aligned}
 \cdot 1 \quad (a+b-c)^2 + (a+c-b)^2 + (b+c-a)^2 &> ab + bc + ca \\
 \cdot 2 \quad abc > (a+b-c)(a+c-b)(b+c-a) \quad \} &\text{BERTRAND a.1855 p.142} \{ \\
 [ (b+c-a, a+c-b, a+b-c) | (a, b, c) \S \mathbb{N}_1 \text{ 12} \cdot 25 \cdot \supset. \text{ P } ] \\
 \cdot 3 \quad (a-b)^2(a+b-c) + (b-c)^2(b+c-a) + (c-a)^2(c+a-b) &> 0
 \end{aligned}$$

$$* \quad 33 \cdot 0 \quad a \in (2\mathbb{N}_0 + 1) - (5\mathbb{N}_0) \cdot \supset. \quad a^4 - 1 \in 80\mathbb{N}_0$$

$$a \in \mathbb{N} \cdot \supset. \quad \cdot 1 \quad (2a-1)^2 - 1 \in 8\mathbb{N} \quad \cdot 2 \quad a(a^2-1) \in 6\mathbb{N}$$

$$\cdot 3 \quad a^2(a^2-1) \in 12\mathbb{N} \quad \} \text{LEIBNIZ MathS. t.7 p.101} \{$$

$$\cdot 4 \quad a(a^2-1)(a^2-4) \in 120\mathbb{N}$$

$$\cdot 5 \quad a^2(a^4-1) \in 60\mathbb{N}$$

$$\cdot 6 \quad a^2(a^2-2)(a^4-1)(a^4-16) \in 25200\mathbb{N} \quad \cdot 7 \quad a(a^{11}-1) \in 2730\mathbb{N}$$

$$\cdot 8 \quad a^2(a^4-1)(a^4-9)(a^4-16) \in 46800\mathbb{N}$$

§8

\* 1.1  $a, b \in N_1 \rightarrow b/a = (\times b)($

2  $R = N_1/N_1$

3  $x, y \in R \rightarrow x = y \equiv: u \in N_1$

$R =$  « Numero rationale ».

Illo es omni expressione de forma  $b/a$  indica operatione « multiplica per bile supra numeros de determinato c.

Numero rationale es operatione, u

Per conveniente substitutione nos

Prop. de §R :

$(\times, /, N_1, R) \vdash (+, -, N_0, n) \S$   
 $\supset \S$

Duo operatione  $n = +N_0 \vee -N_0$  g  
 $+3-5 = -2$ . Duo operatione  $\times N_0$   
 de identico forma. Systema vel « gru  
 reductibile ad forma  $\times N_0/N_0 = R$ .

In usu commune  $2/5$  indica opera  
 per 3 ».  $2/5$  de metro, es quod result  
 multiplica resultatu per 3. Nos praeef  
 nos rende operatione possibile in ma

Consideratione de fractione ut ope

Ahamesu, calculatore aegyptio d

Rhind, column 12 :

«  $1 - (2/3 + 1/15)$

In vero, opera supra 15, et te hab

$15 - 10 - 1$

Nota, in ce papyro, suppressione d

Super historia de differentes Df de

\* 2.  $a, b, c, d, e, f \in N_1 \rightarrow$

0  $a/b = c/d \equiv: ad = bc$

[ Hp .  $a/b = c/d \rightarrow bd, (bd)(a/b)$   
 $(bd)(a/b) = (bd)(c/d) \rightarrow$

Hp .  $ad = bc$  .  $u \in N_1$  .  $u(a/b)$  ,  
 $(ua/b)bd = (uc/d)bd$  .  $\S \times$

Hp .  $ad = bc$  . (2) . Export  $\rightarrow$   
 (1) . (3)  $\rightarrow$  P ]



$$2.1 \quad a/b = (ac)/(bc)$$

$$2.2 \quad a/b = c/b \implies a = c$$

$$2.3 \quad a/b = a/d \implies b = d$$

$$2.4 \quad a/b = c/d \implies a/c = b/d \implies b/a = d/c$$

$$2.5 \quad a/b = d/e, b/c = e/f \implies a/c = d/f$$

$$2.6 \quad a/b = e/f, b/c = d/e \implies a/c = d/f$$

$$2.7 \quad a/b = c/d \implies (a+b)/b = (c+d)/d$$

$$2.8 \quad a/b = c/d \implies a/b = (a+c)/(b+d)$$

$$2.9 \quad a/b = c/d, e/b = f/d \implies (a+e)/b = (c+f)/d$$

[ P.0  $\supset$  P.1-9 ]

{ EUCLIDE v P12, 18, 19, 22, 24, VII P 13, 17. }

$$* \quad 3.0 \quad x, y \in R \implies$$

$$x+y = 1R \wedge \exists z (u \in N_1, ux, uy \in N_1, \supset_u. ux+uy = uz) \quad \text{Df}$$

$$3.1 \quad a, b, c \in N_1 \implies a/c + b/c = (a+b)/c$$

$$[ a/c + b/c = 1R \wedge \exists z (u \in N_1, ua/c, ub/c \in N_1, \supset_u. ua/c + ub/c = uz)$$

$$= " \quad " \quad " \quad " \quad (ua+ub)/c = uz]$$

$$= " \quad " \quad " \quad " \quad u(a+b)/c = uz]$$

$$= " \quad " \quad " \quad " \quad (a+b)/c = z]$$

$$= " \quad [z = (a+b)/c] = (a+b)/c ]$$

$$2 \quad a, b, c, d \in N_1 \implies a/b + c/d = (ad+bc)/(bd)$$

$$[ a/b + c/d = (ad)/(bd) + (bc)/(bd) = (ad+bc)/(bd) ]$$

$$* \quad 4. \quad a, b, c \in R \implies \quad 4.1 \quad a+b \in R$$

$$2 \quad a+b = b+a$$

$$[ P3.0 \implies a+b = 1R \wedge \exists z (u \in N_1, ua, ub \in N_1, \supset_u. ua+ub = uz)$$

$$(\text{Comm}+) = (\S 4.4) \implies " \quad " \quad " \quad " \quad " \quad " \quad ub+ua = uz)$$

$$P3.0 \implies " \quad = b+a ]$$

$$3 \quad a+(b+c) = (a+b)+c = a+b+c$$

$$4 \quad a+c = b+c \implies a=b$$

$$* \quad 5.0 \quad x, y \in R \implies$$

$$x \times y = xy = 1R \wedge \exists z (u \in N_1, ux, uxy \in N_1, \supset_u. uxy = uz) \quad \text{Df}$$

$$a, b, c, d \in N_1 \implies$$

$$1 \quad (a/b)(b/c) = a/c$$

$$[ \text{Df} 0 \implies (a/b)(b/c) = 1R \wedge \exists z [u \in N_1, ua/b, ua \times b \times b/c \in N_1, \supset_u. u \times a \times b \times b/c = uz]$$

$$\S 1.1 \implies " \quad " \quad " \quad " \quad " \quad " \quad ua/c = uz]$$

$$\text{Df} 1.2 \implies " \quad = a/c ]$$

$$2 \quad (a/b)(c/d) = (ac)/(bd)$$

{ EUCLIDE VIII P5 }

## §8 R

\* 1.1  $a, b \in N_1 \supset b/a = (\times b)/a$  Df

2  $R = N_1/N_1$  Df R

3  $x, y \in R \supset x = y \text{ .} \text{ .} \text{ .} u \in N_1, ux, uy \in N_1 \supset u \cdot x = u \cdot y$  Df

$R = \text{« Numero rationale » .}$

Illo es omni expressione de forma  $b/a$ , ubi  $a$  et  $b$  es numero naturale;  $b/a$  indica operatione « multiplica per  $b$  et divide per  $a$  », operatione factibile supra numeros de determinato classe.

Numero rationale es operatione, ut numero relativo.

Per conveniente substitutione nos transforma aliquo Prop. de §n in Prop. de §R:

$$(\times, /, N_1, R) \mid (+, -, N_0, n) \text{ §n } 1.3 \quad 2.0 \quad 4.6.7.8 \quad 3.0 \quad 2.3.4.5.6 \\ \supset \text{ §R } 1.3 \quad 5.0 \quad 6.1.2.3.5 \quad 7.0.8.1.2.3.4.5$$

Duo operatione  $n = +N_0 \cup -N_0$  genera semper novo operatione  $n$ :  $+3-5 = -2$ . Duo operatione  $\times N_0 \cup /N_0$  non semper genera operatione de identico forma. Systema vel « gruppo de omni operatione  $\times N_0 \cup /N_0$  es reductibile ad forma  $\times N_0/N_0 = R$ .

In usu commune  $2/5$  indica operatione « divide per 5, et multiplica per 2 ».  $2/5$  de metro, es quod resulta si nos divide metro in 5 parte, et multiplica resultatu per 2. Nos praefer invertit ordine de operatione, ut nos rende operatione possibile in maximo numero de casu.

Consideratione de fractione ut operatione es naturale et antiquo.

Ahamesu, calculatore aegyptio de anno —2000 circa, scribe (papyro Rhind, columna 12):

$$\text{« } 1 - (2/3 + 1/15) = 1/5 + 1/15$$

In vero, opera supra 15, et te habe:

$$15 - 10 - 1 = 3 + 1 \text{ .}$$

Nota, in ce papyro, suppressione de numeratore, quando vale unitate.

Super historia de differentes Df de numero rationale, vide Formul. t.4.

\* 2.  $a, b, c, d, e, f \in N_1 \supset$ :

0  $a/b = c/d \text{ .} \text{ .} \text{ .} ad = bc$  { EUCLIDE VII P19 {

[ Hp .  $a/b = c/d \supset bd, (bd)(a/b), (bd)(c/d) \in N_1 \text{ . P1.2 } \supset$ .

$$(bd)(a/b) = (bd)(c/d) \supset ad = bc \quad (1)$$

Hp .  $ad = bc \text{ . } u \in N_1 \text{ . } u(a/b), u(c/d) \in N_1 \supset uad = ubc \supset$ .

$$(ua/b)bd = (uc/d)bd \text{ . § } 1.7 \supset ua/b = uc/d \quad (2)$$

Hp .  $ad = bc \text{ . (2) . Export } \supset a/b = c/d \quad (3)$

(1) . (3)  $\supset$  P ]

$$2.1 \quad a/b = (ac)/(bc)$$

$$.2 \quad a/b = c/b \implies a=c$$

$$.3 \quad a/b = a/d \implies b=d$$

$$.4 \quad a/b = c/d \implies a/c = b/d \implies b/a = d/c$$

$$.5 \quad a/b = d/e, b/c = e/f \supset a/c = d/f$$

$$.6 \quad a/b = e/f, b/c = d/e \supset a/c = d/f$$

$$.7 \quad a/b = c/d \implies (a+b)/b = (c+d)/d$$

$$.8 \quad a/b = c/d \implies a/b = (a+c)/(b+d)$$

$$.9 \quad a/b = c/d, e/b = f/d \supset (a+e)/b = (c+f)/d$$

[ P.0  $\supset$  P.1-9 ]

{ EUCLIDE v P12, 18, 19, 22, 24, VII P 13, 17. }

$$* \quad 3.0 \quad x, y \in R \supset$$

$$x+y = 1R \wedge \exists z (u \in N_1, ux, uy \in N_1 \supset u. ur+uy = uz) \quad \text{Df}$$

$$3.1 \quad a, b, c \in N_1 \supset a/c + b/c = (a+b)/c$$

$$[ a/c + b/c = 1R \wedge \exists z [ u \in N_1, ua/c, ub/c \in N_1 \supset u. ua/c + ub/c = uz ]$$

$$= , , , , (ua+ub)/c = uz ]$$

$$= , , , , u(a+b)/c = uz ]$$

$$= , , , , (a+b)/c = z ]$$

$$= , [ z = (a+b)/c ] = (a+b)/c ]$$

$$.2 \quad a, b, c, d \in N_1 \supset a/b + c/d = (ad+bc)/(bd)$$

$$[ a/b + c/d = (ad)/(bd) + (bc)/(bd) = (ad+bc)/(bd) ]$$

$$* \quad 4. \quad a, b, c \in R \supset: \quad .1 \quad a+b \in R$$

$$.2 \quad a+b = b+a$$

$$[ P.3.0 \supset a+b = 1R \wedge \exists z [ u \in N_1, ua, ub \in N_1 \supset u. ua+ub = uz ]$$

$$(Comm+) = (\S 4.4) \supset , , , , ub+ua = uz ]$$

$$P.3.0 \supset , = b+a ]$$

$$.3 \quad a+(b+c) = (a+b)+c = a+b+c \quad .4 \quad a+c = b+c \implies a=b$$

$$* \quad 5.0 \quad x, y \in R \supset$$

$$x \times y = xy = 1R \wedge \exists z (u \in N_1, ux, uxy \in N_1 \supset u. uxy = uz) \quad \text{Df}$$

$$a, b, c, d \in N_1 \supset$$

$$.1 \quad (a/b)(b/c) = a/c$$

$$[ \text{Df.0} \supset (a/b)(b/c) = 1R \wedge \exists z [ u \in N_1, ua/b, ua/b \times b/c \in N_1 \supset u. u \times a/b \times b/c = uz ]$$

$$\S 1.1 \supset , , , , ua/c = uz ]$$

$$\text{Df.1.2} \supset , = a/c ]$$

$$.2 \quad (a/b)(c/d) = (ac)/(bd)$$

{ EUCLIDE VIII P5 }

R —

- \* 31.  $a, b \in N_1, c \in a + N_1, d \in b + N_1 \rightarrow$   
 •1  $c/a = d/b \equiv (c-a)/a = (d-b)/b \quad \{ \text{EUCLIDE VII P11} \}$   
 •2  $c/a = d/b \equiv (c+a)/(c-a) = (d+b)/(d-b)$

- \* 32.0  $x \in R, y \in x + R \rightarrow y - x = \iota R \exists z(x + z = y) \quad \text{Df}$   
 •1  $b, c \in N_1, a \in b + N_1 \rightarrow a/c - b/c = (a-b)/c$   
 •2  $a, b, c, d, ad - bc \in N_1 \rightarrow a/b - c/d = (ad - bc)/(bd)$   
 (R | N<sub>0</sub>) §—

- \* 33.1  $m \in N_1 + 1, a \in R, a < 1 \rightarrow (1-a)^m > 1 - ma$   
 •2  $m \in N_1, a \in R \rightarrow (1-a)^m < 1 - m(1-a)^m a$   
     [  $[a/(1-a) \mid a] \text{P24.1.2} \supset P \quad ]$   
 •3  $\rightarrow (1-a)^m < 1/(1+ma)$   
 •4  $\rightarrow ma < 1 \rightarrow (1+a)^m < 1/(1-ma)$   
     [ P24.2.33.2  $\rightarrow (1+a)^m(1-ma) < 1 \cdot (1-a)^m(1+ma) < 1 \rightarrow P.3.4$  ]  
 •5  $m, n \in N_1, x \in R, x < n \rightarrow (1+x/m)^m(1-x/n)^n < 1$   
     [  $1 > [1+x/(mn)] \times [1-x/(mn)] \quad (1)$   
     (1) . Oper  $\backslash(mn) \rightarrow 1 > [1+x/(mn)] \backslash(mn) \times [1-x/(mn)] \backslash(mn) \quad (2)$   
     P24.1  $\rightarrow [1+x/(mn)] \backslash n \leq 1+x/m \rightarrow [1+x/(mn)] \backslash(mn) \leq (1+x/m) \backslash m \quad (3)$   
     P33.1  $\rightarrow [1-x/(mn)] \backslash m > 1-x/n \rightarrow [1-x/(mn)] \backslash(mn) > (1-x/n) \backslash n \quad (4)$   
     (2) . (3) . (4)  $\rightarrow P \quad ]$   
 •6  $x, y \in R, x \equiv y, m, n \in N_1 \rightarrow x^m y^n < [(mx + ny)/(m+n)]^{m+n}$   
     [  $mn(y-x)/(m+n) \mid x \text{ P.5} \rightarrow P \quad ]$

- \* 34.0  $a \in R, m \in N_1 \rightarrow a^{-m} = /a^m \quad \text{Df}$   
 $a, b \in R, m, n \in N_1 \rightarrow$  •1  $a^m \in R \quad \text{P11.2.4}$   
 •5  $a^{-m} = /a^m$  •6  $a^n / a^m = a^{n-m}$

- \* 40. (R | N<sub>0</sub>) §max  
 •1  $u \in \text{Cls}'R, \max u \in R \rightarrow \min /u = / \max u$



- $$\begin{array}{ll}
 \cdot 1 & a \uparrow^m \varepsilon R \\
 \cdot 2 & a^m a^n = a^{m+n} \\
 \cdot 3 & (ab)^m = a^m b^m \\
 \cdot 4 & (a^m)^n = a^{mn} \\
 \cdot 5 & / (a^m) = (/a)^m \quad \text{Comm}(/, \uparrow) \\
 \cdot 6 & p, q \in N_1 \cdot \supset \cdot (p/q)^m = p^m / q^m
 \end{array}$$

$$\mathbf{R} \succ$$

- \*** 21.  $a, b \in R \rightarrow : \cdot_0 b > a \Rightarrow a < b \Rightarrow b \in a + R$  Df  
 $\cdot_0 1 \quad b > a \Rightarrow u \in N_1, \cdot_1 a, u b \in N_1 \rightarrow u \cdot_1 u b > u a$  Dfp  
 §N<sub>1</sub> P2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14

- \* 22.**  $a, b, c, d \in \mathbb{N}_1, \supset$ :  
 $\cdot 1 \ a/b > c/b \implies a > c : a/b > a/d \implies b < d \ \{ \text{EUCL. v P10} \}$   
 $\cdot 2 \ a/b > c/d \implies ad > bc$   
 $\cdot 3 \ a/b = c/d, a > b, a > c, \supset a + d > b + c \ \{ \text{EUCL. v P25} \}$   
 $\cdot 4 \ a/(a+b) < (a+c)/(a+b+c)$   
 $\cdot 5 \ a/b < c/d, \supset a/b < (a+c)/(b+d) < c/d$   
 $\{ \text{PAPPUS VII P8 p.691} \}$

- \* 23.  $a, b, c, d \in \mathbb{R} \rightarrow$
- 1  $b > a \rightarrow b < a$
  - 2  $a < b, m, n \in \mathbb{R} \rightarrow a < (ma + nb)/(m + n) < b$
  - 3  $a < b \rightarrow \exists x \in \mathbb{R} (a < x < b)$  [P-2  $\supset$  P]
  - 4  $a \in \mathbb{R} \rightarrow a + 1 > a$

- \* 24.1  $m \in N_i + 1 . a \in R . \supset . (1+a)^m > 1+ma$   
 $[ (1+a) = 1+2a+a > 1+2a \quad (1)$   
 $m \in N_i + 1 . (1+a)^m > 1+ma . \text{Oper } \times (1+a) . \supset . (1+a)^{m+1} >$   
 $(1+ma)(1+a) = 1+(m+1)a+ma > 1+(m+1)a \quad (2)$   
 $(1) . (2) . \text{Induct. } \supset . P ]$
- \* 2  $m \in N_i . a \in R . \supset . (1+a)^m < 1+m(1+a)^m a$   
 $[ 1+a < 1+a(1+a) \quad (1)$   
 $m \in N_i . (1+a)^m < 1+ma(1+a)^m . \text{Oper } \times (1+a) . \supset .$   
 $(1+a)^{m+1} < 1+a+ma(1+a)^{m+1} < 1+a(1+a)^{m+1} +$   
 $ma(1+a)^{m+1} = 1+(m+1)a(1+a)^{m+1} \quad (2)$   
 $(1) . (2) . \text{Induct. } \supset . P ]$
- \* 3  $m \in N_i . a \in R . \supset . (1+a)^{m+1} < 1+(m+1)(1+a)^m a$   
 $[ P.2 . \text{Oper } + a(1+a)^m . \supset . P ]$

## R —

- \* 31.  $a, b \in N_1 . c \in a + N_1 . d \in b + N_1 . \supset$   
 ·1  $c/a = d/b \implies (c-a)/a = (d-b)/b$  { EUCLIDE VII P11 }  
 ·2  $c/a = d/b \implies (c+a)/(c-a) = (d+b)/(d-b)$

- \* 32·0  $x \in R . y \in x + R . \supset . y - x = 1 R \wedge \exists z (x + z = y)$  Df  
 ·1  $b, c \in N_1 . a \in b + N_1 . \supset . a/c - b/c = (a-b)/c$   
 ·2  $a, b, c, d, ad-bc \in N_1 . \supset . a/b - c/d = (ad-bc)/(bd)$   
 (R | N<sub>0</sub>) §—

- \* 33·1  $m \in N_1 + 1 . a \in R . a < 1 . \supset . (1-a)^m > 1-ma$   
 ·2  $m \in N_1 . a \in R . \supset . (1-a)^m < 1-m(1-a)^m a$   
     [  $a/(1-a) \mid a$ ] P24·1·2  $\supset$  P ]  
 ·3  $\supset . (1-a)^m < /(1+ma)$   
 ·4  $\supset . ma < 1 . \supset . (1+a)^m < /(1-ma)$   
     [ P24·2·33·2  $\supset . (1+a)^m(1-ma) < 1 . (1-a)^m(1+ma) < 1 . \supset .$  P·3·4]  
 ·5  $m, n \in N_1 . x \in R . x < n . \supset . (1+x/m)^m(1-x/n)^n < 1$   
     [  $1 > [1+x/(mn)] \times [1-x/(mn)]$  (1)  
     (1) . Oper  $\wedge (mn) . \supset . 1 > [1+x/(mn)] \wedge (mn) \times [1-x/(mn)] \wedge (mn)$  (2)  
     P24·1  $\supset . [1+x/(mn)] \wedge m \leq 1+x/m . \supset . [1+x/(mn)] \wedge (mn) \leq (1+x/m) \wedge m$  (3)  
     P33·1  $\supset . [1-x/(mn)] \wedge m > 1-x/n . \supset . [1-x/(mn)] \wedge (mn) > (1-x/n) \wedge n$  (4)  
     (2) . (3) . (4)  $\supset .$  P ]  
 ·6  $x, y \in R . x = y . m, n \in N_1 . \supset . x^m y^n < [(mx+ny)/(m+n)]^{m+n}$   
     [  $mn(y-x)/(m+n) \mid x$  P·5  $\supset .$  P ]

- \* 34·0  $a \in R . m \in N_1 . \supset . a^{-m} = /a^m$  Df  
 $a, b \in R . m, n \in N . \supset$  ·1  $a^m \in R$  P11·2·4  
 ·5  $a^{-m} = /a^m$  ·6  $a^n / a^m = a^{n-m}$

- \* 40. (R | N<sub>0</sub>) §max

- 1  $u \in \text{Cls}'R . \max u \in R . \supset . \min /u = / \max u$

$$\ast \quad 41.0 \quad u \in \text{Cls}'R . \supset . m u = \min[R^{\wedge} x \exists (u \supset x / N_1)] \quad \text{Df}$$

$$\cdot 01 \quad , \quad , \quad = /D/u \quad \text{Dfp}$$

$$\cdot 1 \quad a, b, c \in N_1 . \supset . m(a/c, b/c) = [m(a, b)] / c$$

} BERTRAND a.1849 p.107 {

$$\ast \quad 42.0 \quad u \in \text{Cls}'R . \supset . D u = \max[R^{\wedge} x \exists (u \supset N_1 \times x)] \quad \text{Df}$$

$$\cdot 1 \quad a, b, c \in N_1 . \supset . D(a/c, b/c) = [D(a, b)] / c$$

} BERTRAND a.1849 p.105 {

$$u, v \in \text{Cls}'R . D u, D v \in R . \supset . \quad \cdot 2 \quad D(u \times v) = (D u) \times (D v)$$

$$\cdot 3 \quad a \in R . \supset . D(a u) = a D u \quad \cdot 4 \quad n \in N_1 . \supset . (D u)^n = D(u^n)$$

$$\cdot 5 \quad a \in R . n \in N_1 . \supset . D[a \setminus (0 \cdots n)] = [D(1, a)]^n$$

} BARRIEU AnnN. a.1895 t.14 p.214 {

## §9 r

$$\ast \quad 1.0 \quad r = +R \cup -R \cup 0 \quad \text{Df} \quad \cdot 01 \quad r = n / N_1 \quad \text{Dfp}$$

$r = \text{« numero rationale relativo »}.$

$$x, y \in r . \supset .$$

$$\cdot 1 \quad x = y . := : u \in R . u + x, u + y \in R . \supset u . u + x = u + y \quad \text{Dt}$$

$$\cdot 2 \quad x + y =$$

$$1 r^{\wedge} \exists (u \in R . u + x, u + x + y \in R . \supset u . u + x + y = u + z) \quad \text{Df}$$

$$\cdot 3 \quad -x = 1 r^{\wedge} y \exists (x + y = 0) \quad \text{Df}$$

$$\cdot 4 \quad x - y = x + (-y) \quad \text{Df}$$

$$\cdot 5 \quad x = y . := : u \in n . ux, uy \in n . \supset u . ux = uy \quad \text{Dfp}$$

$$\cdot 6 \quad x \times y = xy = 1 r^{\wedge} \exists (u \in n . ux, uxy \in n . \supset u . uxy = uz) \quad \text{Df}$$

$$\cdot 7 \quad /x = 1 r^{\wedge} y \exists (xy = 1) \quad \text{Df}$$

$$\cdot 8 \quad x / y = x \times (/y) \quad \text{Df}$$

$$\cdot 9 \quad x + y = 1 r^{\wedge} \exists (u \in n . ux, uy \in n . \supset u . ux + uy = uz) \quad \text{Dfp}$$

$$\ast \quad 2.0 \quad a, b \in r . \supset . a + b \in r . \quad -a \in r . \quad a \times b \in r . \quad \S n$$

$$\cdot 1 \quad a \in r \neq 0 . \supset . /a \in r . \quad /-a = -/a$$

[illegible]

$$\begin{aligned} & [x, y \in \mathbb{R} . x+y=a . x-y=b . \text{Oper}+ . \text{Oper}- \supset . \\ & \quad x, y \in \mathbb{R} . 2x=a+b . 2y=a-b \supset . x=(a+b)/2 . y=(a-b)/2 \quad (1) \\ & \quad x=(a+b)/2 . y=(a-b)/2 \supset . x, y \in \mathbb{R} . x+y=a . x-y=b \quad (2) \\ & (1)(2) \supset P ] \end{aligned}$$

·6  $x, y, z, t \in \mathbb{R} . y + z + t - x = a . x + z + t - y = b . x + y + t - z = c .$   
 $x + y + z - t = d . \Rightarrow x = (a + b + c + d) / 4 - a / 2 . y = \dots$   
 { DIOPHANTO I 19 }

$$x, y \in \mathbb{R} : ax + by = c : a'x + b'y = c' \implies y \in \mathbb{R} : x = (c - by)/a$$

## §10 E β dt nt

\* 1.  $x, y \in \mathbb{R} \rightarrow$ 

- 0  $Ex = \max n \wedge y \leq x$  Df  
 Legendre a. 1808 introduce notatione  $Ex$ , lege « integro (Entier) de  $x$  ».
- 1  $Ex \in \mathbb{N} \rightarrow Ex \leq x < Ex + 1$
- 2  $Ex = i \wedge a \leq x < a + 1$  Dfp
- 3  $x \in \mathbb{N} \rightarrow Ex = x$
- 4  $x > y \rightarrow Ex \geq Ey$
- 5  $a \in \mathbb{N} \rightarrow E(a+x) = a + Ex$   
 $[ Ex \leq x < Ex + 1 \rightarrow a + Ex \leq a + x < a + Ex + 1 \rightarrow a + Ex \in \mathbb{N}_0 \rightarrow P ]$
- 6  $Ex + Ey \leq E(x+y) \leq Ex + Ey + 1$   
 $[ Ex \leq x < Ex + 1 \rightarrow Ey \leq y < Ey + 1 \rightarrow Ex + Ey \leq x + y < Ex + Ey + 2 \rightarrow P ]$

\* 2.  $x, y \in \mathbb{R} \rightarrow$ 

- 1  $a \in \mathbb{N}_1 \rightarrow a \times Ex \leq E(a \times x) < a \times (Ex + 1)$
- 2  $Ex \times Ey \geq E(x \times y) < (Ex + 1)(Ey + 1)$
- 3  $a \in \mathbb{N}_1 \rightarrow E(x/a) = E\{Ex/a\}$
- 4  $x > 1 \rightarrow E(Ey / Ex) \leq E(y/x) \leq E[Ey / (Ex + 1)]$   
 $[ (y/x) \mid y \text{ P.61} \rightarrow Ex \times E(y/x) \leq Ey < (Ex + 1) \times E(y/x + 1) \rightarrow$   
 $\text{Oper } /Ex \rightarrow E(y/x) \leq Ey/Ex \rightarrow E(y/x) \leq Ey/(Ex + 1) \rightarrow \text{Oper } E \text{ P.4} \rightarrow P ]$
- 5  $a, b \in \mathbb{N}_1 \rightarrow \text{quot}(a, b) = E(a/b)$  Dfp
- 6  $x \in \mathbb{R} \rightarrow Ex + E(-x) = -1$   
 $x \in \mathbb{N} \rightarrow Ex + E(-x) = 0$
- 7  $x \in \mathbb{R} \rightarrow E[(Ex)/x] - 1 = Ex + E(-x)$

\* 3.  $a \in \mathbb{R} \rightarrow n \in \mathbb{N} \rightarrow$ 

- 0  $\text{Cfr}_n a = \text{Cfr}_0 E(X^{-n} a)$  Df
- 1  $m, n \in \mathbb{N}_1 \rightarrow m \in \mathbb{N}_1 \times n \rightarrow \text{Cfr}_{-m}/(X^n - 1) = 1$
- 2  $\quad \quad m \in \mathbb{N}_1 \times n \rightarrow \quad \quad = 0$

- \* 4.  $a, b \in R \Rightarrow \cdot 0 \text{ } \text{orda} = \max n \wedge n \exists (X^n \leq a) \quad \text{Df}$
- 1  $X \nmid \text{orda} \leq a < X \nmid (\text{orda} + 1)$
- 2  $\text{ord}(a+b) \geq \max(\iota \text{orda} \cup \iota \text{ord}b)$
- $\leq \quad \quad \quad +1$
- [  $\text{orda} \leq \text{ord}b \Rightarrow X \nmid \text{orda} \leq a < X \nmid (\text{orda} + 1) \cdot b < X \nmid (\text{orda} + 1) \cdot$   
 $\Rightarrow X \nmid \text{orda} < a+b < 2 \times X \nmid (\text{orda} + 1) < X \nmid (\text{orda} + 2) \Rightarrow P$  ]
- 3  $a > b \Rightarrow \text{orda} \geq \text{ord}b$
- 4  $\text{ord}(a \times b) \geq \text{orda} + \text{ord}b$
- $\leq \text{orda} + \text{ord}b + 1$
- [  $X \nmid \text{orda} \leq a < X \nmid (\text{orda} + 1) \cdot X \nmid \text{ord}b \leq b < X \nmid (\text{ord}b + 1) \Rightarrow X \nmid \text{orda} +$   
 $\text{ord}b \leq a \times b < X \nmid (\text{orda} + \text{ord}b + 2) \Rightarrow P$  ]
- 5  $m \in N_1 \Rightarrow m \times \text{orda} \leq \text{ord}(a^m) < m(\text{orda} + 1)$
- 6  $a > b \Rightarrow \text{ord}(a-b) \leq \text{orda}$
- 7  $a \in R \setminus (X \nmid n) \Rightarrow \text{ord}/a = -\text{orda} - 1$
- [ Hp  $\Rightarrow X \nmid \text{orda} < a < X \nmid (\text{orda} + 1) \Rightarrow X \nmid (-\text{orda} - 1) < /a <$   
 $X \nmid (-\text{orda}) \Rightarrow P$  ]

- \* 5.  $x, y \in R \Rightarrow \cdot 0 \text{ } \beta x = x - Ex \quad \text{Df}$
- 01  $\beta \beta x = \beta x \cdot Ex = 0 \cdot \beta Ex = 0$
- Zehfuss (Grunert Archiv, a.1850 t.27 p.12) introduce functione  $\beta x$ ; li-  
 tera  $\beta$  es initiale de voce « Bruchtheil ».
- Et vocare « mantissa », id es « excedente ». Wallis, Opera a.1693 p.41:  
 « Ejusque partes decimales abscissas, *appendicem* voco, sive *mantissam* ».
- 1  $y \in n \Rightarrow \beta(x+y) = \beta x \quad \cdot 11 \text{ } \beta(x+y) = \beta(\beta x + \beta y)$
- 2  $x \in n \Rightarrow \beta x + \beta(-x) = 0 \quad \cdot 21 \text{ } x \in n \Rightarrow \beta x + \beta(-x) = 1$
- 3  $0 \leq \beta x < 1 \quad \cdot 31 \text{ } \beta(x+y) \leq \beta x + \beta y$
- 4  $y \in n \Rightarrow \beta(xy) = \beta(y \beta x)$
- 5  $a \in N_1 \Rightarrow E(ax) = a \times Ex + E(a \beta x)$
- 7  $a \in N_0 \cdot b \in N_1 \Rightarrow \text{rest}(a, b) = b \times \beta(a/b) \quad \text{Dfp}$

- \* 6.  $a, b \in R \cdot m, n \in N_1 \Rightarrow$
- 0  $dta = \min[N_1 \wedge N_1/a] \quad \text{Df}$
- 01  $nta = dt/a = \min[N_1 \wedge N_1 \times a] \quad \text{Df}$
- $dta$  = « denominatore reducto de  $a$  »  
 $nta$  = « numeratore » de  $a$  »
- Theoria et notationes per Prof. A. Padoa RdM. a.1898 p.90-94.

- 1  $dta \in N_1$  .  $dtm = 1$  .  $ntm = m$   
 ·2  $b \in N_1 \times a \Rightarrow dta \in N_1 \times dtb$  .  $ntb \in N_1 \times nta$   
 ·3  $a+b \in N_1 \supset dta = dtb$  ·31  $a-b \in N_1 \supset dta = dtb$   
 ·4  $dt(m+a) = dta$  ·41  $m > a \supset dt(m-a) = dta$   
 ·5  $dt(a^m) = (dta)^m$   
 ·6  $a \in R^m \Rightarrow dta, nta \in N_1^m$   
 Dvr mlt ·7  $Dvr(dta, nta) = 1$   
 ·8  $dta = /Dvr(1, a) = /mlt(1, /a)$  Dfp  
 ·81  $dt(m/n) = n/Dvr(m, n) = mlt(m, n)/m$   
 ·82  $Dvr(m, n) = 1 \Rightarrow dt(m/n) = n$   
 ·9  $u \in Cls'R$  .  $num u \in N_1 \supset Dvru = Dvr(nt'u) / mlt(dt'u)$   
 ·91 " " " "  $\supset mltu = mlt(nt'u) / Dvr(dt'u)$   
 { BARRIEU Mathesis a.1883 t.3 p.217 }

§11  $\eta$ 

- \* 1.0  $\eta = R^{\wedge} x \exists (x < 1)$  Df  
 ·1  $\eta \times \eta = \eta$  ·2  $\eta N_1 = \eta R = R$   
 \* 2.  $a, b \in R$  .  $u, v, w \in Cls'R \supset$   
 ·1  $b < a \Rightarrow b \in \eta a$  ·1  $\eta a = R^{\wedge} x \exists (x < a)$   
 ·2  $\eta a \supset \eta b \supset a \leq b$   
 [ Hp  $\supset b \in \eta b \supset b \in \eta a \supset \neg(b < a) \supset$  Ths ]  
 ·3  $\eta a = \eta b \supset a = b$  [ Hp . P.4  $\supset a \leq b$  .  $b \leq a \supset$  Ths ]  
 ·4  $\eta(u+v) = \eta u + \eta v$  Distrib( $\eta, +$ )  
 ·5  $\eta w(u+v) = \eta w u + \eta w v$   
 ·6  $m, n \in N_1 \supset \eta u^{m+n} = \eta u^m u^n$

- \* 3.1  $u \in Cls'R$  .  $\max u \in R \supset \eta u = \eta \max u$

- 2  $u \in Cls'R$  .  $\min(R - \eta u) \in R \supset \eta u = \eta \min u$

- 3  $u \in Cls'R$  .  $a \in R \supset \eta a = \eta u \Rightarrow a = \min(R - \eta u)$

Signo  $\eta$ , lege « fractio proprio » vel « eta », indica « numero rationale minore de 1 ». Si  $a \in R$ ,  $\eta a$  repraesenta « classe de rationale minore de  $a$  ». Si  $u \in Cls'R$ ,  $\eta u$ , vel  $\eta \times u$  repraesenta « classe de rationale minore de aliquo  $u$  ».

Nota analogia de II §5 P4.4.5.6 cum aliquo P de ce §.

## §12 Q l' l, ∞ θ

\* 1.  $u \in \text{Cls}'R . a \in R \supset: \cdot 0 \quad a < l'u . = . a \in \eta u$  Df

·1  $R \wedge x \exists (x < l'u) = \eta u$

·2  $a = l'u . = . R \wedge x \exists (x < a) = R \wedge x \exists (x < l'u)$  Df

·3  $\quad \quad \quad . = . \eta a = \eta u$

·4  $a > l'u . = . \neg (a < l'u) . \neg (a = l'u)$  Df

$l' =$  « limite superiore » ; Guilmin a.1847 ; vide RdM. t.6 p.137.

$=$  « limite supéro », « obere Grenze » ; Weierstrass !.

$=$  « maximo ideale » ; Pringsheim, *Encyclopädie*, p. 72 !.

Nos ne pone Df de forma :

$u \in \text{Cls}'R \supset: l'u =$  (expressione composito per signos praecedente) Df  
sed nos defini solo relatione  $a < l'u$ .

\* 2.  $a, b \in l' \text{Cls}'R \supset:$

·1  $a = b . = . R \wedge x \exists (x < a) = R \wedge x \exists (x < b)$  Df

Si  $a$  et  $b$  es limite supéro de classe de rationale, nos dice que  $a = b$ , quando classe de rationale minore de  $a$  (definito per P1·0) coincide cum classe de rationale minore de  $b$ .

·2  $a \leq b . = . R \wedge x \exists (x < a) \supset R \wedge x \exists (x < b)$  Df

·3  $b \leq a . = . a \leq b$  Df

·4  $a < b . = . b > a . = . \neg (b \leq a)$  Df

\* 3.  $u, v \in \text{Cls}'R \supset:$

·0  $l'u = l'v . = . \eta u = \eta v \quad [ (l'u, l'v) \mid (a, b) \text{ P2·1 } \supset . P ]$

·1  $l'u \leq l'v . = . \eta u \supset \eta v \quad [ \quad \quad \quad \text{P2·2 } \supset . P ]$

·2  $l'u < l'v . = . \exists \eta v = \eta u$

·3  $l'u = l' \eta u \quad [ \eta(\eta u) = (\eta \eta) u = \eta u . \text{ P·0 } \supset . P ]$

·4  $a \in R \supset . a = l' \eta a = l' u a$

·5  $1 = l' \eta$

\* 4·0  $u \in \text{Cls}'R . \exists u . \exists R \neg (u / \eta) \supset . l_1 u = l' R \neg (u / \eta)$  Df

·1  $\quad \quad \quad \supset: 0 = l_1 u . = . u / \eta = R$  Df

$(l_1 / \eta, <) \mid (l' \eta, >) \text{ P1 . P2 . P3}$

$l_1 u =$  « limite infero des  $u$  ».



\* 5.0  $Q = I' [Cls'R \wedge u \exists (\exists u . \exists R = \eta u)]$  Df Q  
 Q, lege « quantitate reale positivo » es omni limite supero de aliquo classe  $u$  de rationale, existente, et tale que existe aliquo rationale maiore de omni  $u$ .

$$\cdot 1 \quad R \supset Q \quad [P3.4 \supset P]$$

$$\cdot 2 \quad u \in Cls'R . \exists u . \exists R = \eta u . \supset . I' u \in Q$$

\* 6.0  $\infty = I'R$  Df  
 $\infty$ , lege « infinito », es limite supero de rationales.

$$\cdot 1 \quad I'N_1 = \infty \quad [I'N_1 = I'\eta N_1 = I'R = \infty]$$

$$\cdot 2 \quad u \in Cls'R . \supset . I' u \leq \infty$$

$$\cdot 3 \quad u \in Cls'R . \exists u . \neg \exists R = \eta u . \supset . I' u = \infty$$

$$\cdot 4 \quad u \in Cls'R . \exists u . \supset . I' u \in Q \wedge \infty \quad [P5.2. P6.3 \supset P]$$

\* 7.  $a, b, c \in Q \wedge \infty . \supset .$

$$\cdot 0 \quad a + b = I' [R \wedge x \exists (x < a) + R \wedge x \exists (x < b)] \quad \text{Df}$$

$$\cdot 1 \quad u, v \in Cls'R . \exists u . \exists v . \supset . I' u + I' v = I' (u + v) \quad \text{Distrib}(I', +)$$

$$[ \text{Hp} . \supset . I' u, I' v \in Q \wedge \infty . P.0 . \supset . I' u + I' v = I' [R \wedge x \exists (x < I' u) + R \wedge x \exists (x < I' v)] = I' (\eta u + \eta v) = I' \eta (u + v) = I' (u + v) ]$$

$$\cdot 2 \quad a + b = b + a$$

$$[ u, v \in Cls'R . I' u = a . I' v = b . \supset . a + b = I' u + I' v = I' (u + v) = I' (v + u) = I' v + I' u = b + a ]$$

$$\cdot 3 \quad a + (b + c) = (a + b) + c$$

$$[ u, v, w \in Cls'R . a = I' u . b = I' v . c = I' w . \supset .$$

$$a + (b + c) = I' u + (I' v + I' w) = I' u + I' (v + w) = I' [u + (v + w)] = I' [(u + v) + w] = I' (u + v) + I' w = (I' u + I' v) + I' w = (a + b) + c ]$$

$$\cdot 4 \quad a, b \in Q . \supset . a + b \in Q \quad \cdot 5 \quad a + \infty = \infty$$

\* 8.  $a, b, c, d \in Q . \supset :$  Dfp

$$\cdot 1 \quad b > a . = . b \in a + Q$$

$$\cdot 2 \quad b > a . = . b + c > a + c \quad \cdot 3 \quad b > a . d > c . \supset . b + d > a + c$$

\* 9.  $a, b, c \in Q \wedge \infty . \supset :$

$$\cdot 0 \quad a \times b = I' [R \wedge x \exists (x < a) \times R \wedge x \exists (x < b)] \quad \text{Df}$$

$$\cdot 1 \quad u, v \in Cls'R . \exists u . \exists v . \supset . I' u \times I' v = I' (u \times v) \quad \text{Distrib}(I', \times)$$

$$[ \text{Hp} . \supset . I' u, I' v \in Q \wedge \infty . \supset . I' u \times I' v = I' [R \wedge x \exists (x < I' u) \times R \wedge x \exists (x < I' v)] = I' [\eta u \times \eta v] = I' \eta (u \times v) = I' u \times I' v ]$$

$$\cdot 2 \quad ab = ba$$

$$\cdot 3 \quad a(bc) = (ab)c = abc$$

$$[ (\times | +) P7.2.3 \supset P9.2.3 ]$$

$$*4 \quad a(b+c) = ab+ac$$

$$[ u, v, w \in \text{Cls}'R \quad . \quad a = l'u \quad . \quad b = l'v \quad . \quad c = l'w \quad . \supset . \quad a(b+c) = l'u \times (l'v + l'w) = l'u \times l'(v+w) = l'[u \times (v+w)] = l'[\eta u(v+w)] = l'(\eta uv + \eta uw) = l'(\eta uv) + l'(\eta uw) = l'(uv) + l'(uw) = (l'u)(l'v) + (l'u)(l'w) = ac+bc ]$$

$$*5 \quad a, b \in Q \quad . \supset . \quad a \times b \in Q$$

$$*6 \quad a \times \infty = \infty$$

$$*10. \quad a, b, c, d \in Q \quad . \supset :$$

$$*1 \quad a > b \quad . = . \quad ac > bc$$

$$*2 \quad a > b \quad . c > d \quad . \supset . \quad ac > bd.$$

$$*3 \quad a > b \quad . c > d \quad . \supset . \quad ac+bd > ad+bc \quad [ \text{\$N}_1\text{P6} \supset \text{P}\cdot 1\cdot 3 ]$$

$$*11. \quad a, b \in Q \quad . \supset .$$

$$*0 \quad /a = \iota Q \wedge x \exists (x \times a = 1)$$

Df

$$*1 \quad /a \in Q$$

$$*2 \quad /(/a) = a$$

$$*3 \quad /(ab) = (/a)(/b)$$

$$*4 \quad b/a = b \times (/a)$$

Df

$$*5 \quad a = b \quad . = . \quad /a = /b \quad . = . \quad a/b = 1$$

$$*6 \quad x \in Q \quad . ax = b \quad . = . \quad x = b/a$$

$$*12\cdot 0 \quad \theta = Q \wedge x \exists (x < 1)$$

Df

$$(\theta, Q) \mid (\eta, R) \text{ \$}\eta$$

lege « theta », indica quantitate minore de 1.

$$*13. \quad u, r \in \text{Cls}'Q \quad . \exists u \quad . \exists v \quad . a \in Q \quad . \supset :$$

$$*0 \quad l'u = l'(R \cap \theta u)$$

$$: \quad l_\theta u = l_\theta(R \cap u/\theta)$$

Df

$$*1 \quad a = l'u \quad . = . \quad \theta a = \theta u$$

$$: \quad a = l_\theta u \quad . = . \quad a/\theta = u/\theta$$

$$*2 \quad \infty = l'u \quad . = . \quad \theta u = Q$$

$$: \quad 0 = l_\theta u \quad . = . \quad u/\theta = Q$$

$$*3 \quad l'(u+r) = l'u + l'r$$

$$: \quad l_\theta(u+r) = l_\theta u + l_\theta r$$

$$*4 \quad l'(u \times r) = l'u \times l'r$$

$$: \quad l_\theta(u \times r) = l_\theta u \times l_\theta r$$

$$*5 \quad l'u \in Q \quad . \supset . \quad l_\theta /u = /l'u$$

$$*6 \quad l'u = 0 \quad . = . \quad l_\theta /u = 0$$

$$*7 \quad l'(u \wedge r) = 0 \quad . = . \quad l'u = 0 \quad . \vee . \quad l'r = 0$$

$$*8 \quad l_\theta(u \wedge r) = 0 \quad . = . \quad l_\theta u = 0 \quad . \vee . \quad l_\theta r = 0$$

$$*14\cdot 0 \quad a \in Q \quad . b \in a + Q \quad . \supset . \quad b - a = \iota Q \wedge x \exists (a + x = b) \quad \text{Df}$$

$$\text{Hp}\cdot 0 \quad . \supset . \quad *1 \quad b - a \in Q \quad *2 \quad b - a + a = b \quad *3 \quad (Q \cap N_0) \text{ \$}-$$

Q ↑

\* 20.  $a, b \in Q, i \in \infty, m, n \in N_0 \rightarrow$ 

$$\cdot 0 \quad a^0 = 1 \quad . \quad a^{m+1} = a^m \times a \quad \text{Df}$$

$$\cdot 1 \quad u \in \text{Cls}'R \rightarrow \exists u \rightarrow (I'u)^m = I'(u^m) \\ [ u^0 = 1 \rightarrow I'(u^0) = 1 \rightarrow (I'u)^0 = 1 \rightarrow I'(u^0) = (I'u)^0 \quad (1)$$

$$m \in N_0 \rightarrow I'(u^m) = (I'u)^m \rightarrow (I'u)^{m+1} = (I'u)^m \times (I'u) = \\ I'(u^m) \times I'u = I'(u^m \times u) = I'(\eta u^m u) = I'\eta u^{m+1} = I'u^{m+1} \quad (2)$$

$$(1) \cdot (2) \rightarrow \text{Induct} \rightarrow P ]$$

$$\cdot 2 \quad a^m a^n = a^{m+n}$$

$$\cdot 3 \quad (ab)^m = a^m b^m$$

$$\cdot 4 \quad (a^m)^n = a^{mn}$$

$$\cdot 5 \quad a \in Q \rightarrow a^m \in Q$$

$$\cdot 6 \quad \infty^m = \infty$$

$$\cdot 7 \quad u \in \text{Cls}'Q \rightarrow \exists u \rightarrow I'(u^m) = (I'u)^m \quad . \quad I_1(u^m) = (I_1 u)^m$$

§P 2. 3. §N<sub>1</sub> P11-14. §R P24.\* 21.  $a \in Q, m, n, p, q \in N_1 \rightarrow$ 

$$\cdot 0 \quad a \upharpoonright m = {}^m \downarrow a = 1 \quad Q \exists (x^m = a) \quad \text{Df}$$

$$\cdot 01 \quad \downarrow a = {}^1 \downarrow a \quad \text{Df}$$

$$\cdot 1 \quad {}^m \downarrow a \in Q \quad \cdot 2 \quad ({}^m \downarrow a)^m = a \quad \cdot 3 \quad {}^1 \downarrow a = a$$

$$\cdot 4 \quad {}^m \downarrow (ab) = ({}^m \downarrow a) ({}^m \downarrow b) \quad \text{Distrib}(\downarrow, \times)$$

$$[ ({}^m \downarrow a) ({}^m \downarrow b)^m = ({}^m \downarrow a)^m ({}^m \downarrow b)^m = ab \rightarrow \text{Oper } {}^m \downarrow \rightarrow P ]$$

$$\cdot 5 \quad {}^m \downarrow / a = / {}^m \downarrow a \quad \text{Comm}(\downarrow, /)$$

$$[ {}^m \downarrow a \times {}^m \downarrow a = {}^m \downarrow (a/a) = {}^m \downarrow 1 = 1 \rightarrow {}^m \downarrow a = / {}^m \downarrow a$$

$$\cdot 6 \quad {}^m \downarrow (a^n) = ({}^m \downarrow a)^n \quad \text{Comm}(\downarrow, \uparrow)$$

$$[ ({}^m \downarrow a) \uparrow n \uparrow m = ({}^m \downarrow a) \uparrow (mn) = ({}^m \downarrow a) \uparrow m \uparrow n = a \uparrow n \rightarrow \text{Oper } {}^m \downarrow \rightarrow P ]$$

$$\cdot 7 \quad {}^n \downarrow ({}^m \downarrow a) = {}^{mn} \downarrow a \\ [ ({}^n \downarrow ({}^m \downarrow a)) \uparrow m \uparrow n = ({}^n \downarrow ({}^m \downarrow a)) \uparrow mn = ({}^m \downarrow a) \uparrow m = a \rightarrow \text{Oper } {}^m \downarrow \rightarrow P ]$$

$$\cdot 8 \quad n/m = q/p \rightarrow {}^m \downarrow a^n = {}^p \downarrow a^q \\ [ \text{Hp} \rightarrow ({}^m \downarrow a \uparrow n) \uparrow (mp) = a \uparrow (np) \rightarrow {}^p \downarrow (a \uparrow q) \uparrow (mp) = a \uparrow (mq) \rightarrow (np) = \\ mq \rightarrow ({}^m \downarrow a \uparrow n) \uparrow (mp) = ({}^p \downarrow a \uparrow q) \uparrow (mp) \rightarrow \text{Oper } {}^m \downarrow \rightarrow P ]$$

\* 22.0  $a \in Q, m \in R \rightarrow$ 

$$a \upharpoonright m = 1 \quad \exists [ p, q \in N_1, m = p/q \rightarrow p, q \cdot y = (a \upharpoonright p) \upharpoonright / q ] \quad \text{Df}$$

$$\cdot 1 \quad a \in Q, p, q \in N_1 \rightarrow a \upharpoonright (p/q) = {}^q \downarrow (a^p)$$

$$\cdot 2 \quad a \in 1 + Q, m \in Q \rightarrow a \upharpoonright m = I'a \upharpoonright (R \circ \theta m) \quad \text{Df}$$

- $$\begin{array}{lll}
\bullet 3 & a \in 1 + Q \text{ , } m \in Q \text{ , } \supset \cdot & a \upharpoonright m = 1, a \upharpoonright (R \setminus m / \theta) & \text{Dfp} \\
\bullet 4 & a \in \theta \text{ , } \text{ , } \text{ , } & = 1, a \upharpoonright (R \setminus \theta m) \cdot & \text{Df} \\
\bullet 5 & \text{ , } \text{ , } \text{ , } \text{ , } & = 1' a \upharpoonright (R \setminus m / \theta) & \text{Dfp}
\end{array}$$

\* 23.  $a, b, m, n \in \mathbb{Q} \Rightarrow a \nmid m \in \mathbb{Q}$

- $$\begin{aligned} \cdot 2 \quad a^m a^n &= a^{m+n} \\ [a \in 1 + Q \Rightarrow a^m \times a^n &= l'a \backslash (R\theta m) \times [l'a \backslash (R\theta n)] \\ &= l' : [a \backslash (R\theta m)] \times [a \backslash (R\theta n)] : \\ &= l'a \backslash [(R\theta m) + (R\theta n)] \\ &= l'a \backslash [R\theta(m+n)] \\ &= a^{m+n}] \\ \cdot 3 \quad (ab)^m &= a^m b^m \qquad \cdot 4 \quad (a^m)^n = a^{mn} \\ \cdot 5 \quad a > b & \Rightarrow a^m > b^m \qquad \cdot 6 \quad a > 1 \Rightarrow m > n \Rightarrow a^m > a^n \\ \cdot 7 \quad a < 1 & \Rightarrow m > n \Rightarrow a^m < a^n \end{aligned}$$

**\* 24.**  $a, b, c, d \in \mathbb{R} . \supset :$

- $$\begin{array}{l}
\text{*1 } a+\sqrt{b}=\sqrt{c} \cdot \supset . b \varepsilon R^{\circ} . c \varepsilon R^{\circ} \\
[ \text{Hp} . \text{Oper} \vdash 2 \cdot \supset . a^2+b+2a\sqrt{b}=c \cdot \supset . \sqrt{b}=(c-a^2-b)/(2a) \cdot \supset . P ] \\
\\
\text{*2 } b-\varepsilon R^{\circ} . a+\sqrt{b}=c+\sqrt{d} \cdot \supset . a=c . b=d \\
[ a>c . a+\sqrt{b}=c+\sqrt{d} \cdot \supset . (a-c)+\sqrt{b}=\sqrt{d} . P \cdot 1 \cdot \supset . b \varepsilon R^{\circ} \quad (1) \\
a<c . \quad , \quad , \quad , \quad (c-a)+\sqrt{d}=\sqrt{b} \quad , \quad , \quad , \quad (2) \\
a=-c . \quad , \quad , \quad , \quad (1) . (2) \cdot \supset . b \varepsilon R^{\circ} . \text{Transp} \cdot \supset . P ] \\
\\
\text{*3 } \sqrt{a}+\sqrt{b}=\sqrt{c} \cdot \supset . a/b \varepsilon R^{\circ} \\
[ \text{Hp} \cdot \supset . a+b+2\sqrt{(ab)}=c . P \cdot 1 \cdot \supset . a \times b \varepsilon R^{\circ} \cdot \supset . \text{Ths} ] \\
\\
\text{*4 } a/b-\varepsilon R^{\circ} . a>b . c>d . \sqrt{a}+\sqrt{b}=\sqrt{c}+\sqrt{d} \cdot \supset . a=c . b=d \\
[ \text{Hp} \cdot \supset . a+b+2\sqrt{(ab)}=c+d+2\sqrt{(cd)} . ab-\varepsilon R^{\circ} \cdot \supset . a+b=c+d . ab=cd \\
\cdot \supset . (a-b)^2=(c-d)^2 \cdot \supset . a-b=c-d \cdot \supset . \text{Ths} ] \\
\\
\text{*5 } a/b-\varepsilon R^{\circ} \cdot \supset . \sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}=\sqrt{d} \\
\\
\text{*6 } b-\varepsilon R^{\circ} . \sqrt{(a+\sqrt{b})}=\sqrt{c}+\sqrt{d} . c>d \cdot \supset . \\
a^2-b \varepsilon R^{\circ} . c=[a+\sqrt{(a^2-b)}]/2 . d=[a-\sqrt{(a^2-b)}]/2 \\
\left\{ \text{*1} , \text{*2}\cdot\text{*3} , \text{*4} , \text{*5} , \text{*6} \quad \text{EUCLIDE X P26, 42, 79, 111, 59-96} \right\}
\end{array}$$

\* 25.  $a, b \in Q \supset$ :

- $$a - b \varepsilon Q \Rightarrow \sqrt{a + \sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a + \sqrt{a^2 - b}}{2}} + \sqrt{\frac{a - \sqrt{a^2 - b}}{2}}$$

\* 26.  $a, b \in Q \rightarrow$ :

- 1  $\sqrt{ab} \leq (a+b)/2$  [  $(a+b)^2 > 4ab \rightarrow P$  ]
- 2  $\sqrt{a+b} > \sqrt{a} + \sqrt{b} - \sqrt{ab/4}$
- 3  $b > a \rightarrow (b-a)^2/(8b) < (a+b)/2 - \sqrt{ab} < (b-a)^2/(8a)$   
[  $(a+b)/2 - \sqrt{ab} = (a-b)^2/[2(a+b+2\sqrt{ab})]$  ]

## \* 30.

- 0  $m, n, x, y \in Q \cdot x = y \rightarrow x^m y^n < [(mx+ny)/(m+n)]^{m+n}$   
[  $m, n \in R \cdot p \in N_1 \cdot mp, np \in N_1 \cdot \S R33.6 \rightarrow x \nmid (mp) \times y \nmid (np) < [(mpx+np y)/(mp+np)] \nmid (mp+np) \cdot \text{Oper} \nmid p \rightarrow P$  ]
- 1  $m, n, x \in Q \cdot x < n \rightarrow (1+x/m)^m (1-x/n)^n < 1$   
[  $(1+x/m, 1-x/n) \mid (x, y) \cdot P.0 \rightarrow P$  ]
- 2  $m, x \in Q \cdot mx \in \theta \rightarrow (1+x)^m (1-mx) < 1$   
[  $(mx, 1) \mid (x, n) \cdot P.1 \rightarrow P$  ]
- 3  $m \in Q \cdot x \in \theta \rightarrow (1-x)^m (1+mx) < 1$   
[  $(x/m) \mid x \cdot P.1 \rightarrow (1+x/m)^m (1-x) < 1$   
[  $(m) \mid m \cdot (1) \rightarrow (1+mx) \nmid m (1-x) < 1 \cdot \text{Oper} \nmid m \rightarrow P$  ] (1)
- 4  $m, x \in Q \rightarrow (1+x)^{m+1} > 1+(m+1)x$   
[  $x/(1+x) \mid x \cdot P.2 \rightarrow [1-x/(1+x)]^m [1+mx/(1+x)] < 1$   
 $\rightarrow [1-x/(1+x)]^m [1+(m+1)x/(1+x)] < 1$   
 $\rightarrow 1+(m+1)x < (1+x)^{m+1}$  ]
- 5  $m \in 1+Q \cdot x \in Q \rightarrow (1+x)^m > 1+mx$   
[  $(m-1) \mid m \cdot P.3 \rightarrow P$  ]  
[  $(m-1, 1, 1, 1+mx) \mid (m, n, x, y) \cdot P.0 \rightarrow P$  ]
- 6  $m \in \theta \cdot x \in Q \rightarrow (1+x)^m < 1+mx$   
[  $(1/m, mx) \mid (m, x) \cdot P.5 \rightarrow P.6$  ]
- 7  $m \in 1+Q \cdot x, mx \in \theta \rightarrow (1-x)^m > 1-mx$
- 8  $m, x \in \theta \rightarrow (1-x)^m < 1-mx$

## \* 31.

- 1  $m, n \in Q \cdot m < n \cdot x \in Q \rightarrow (1+x/m)^m < (1+x/n)^n$   
[  $\text{Hp} \rightarrow n/m > 1 \rightarrow (1+x/n) \nmid (n/m) > 1+x/m \cdot \text{Oper} \nmid m \rightarrow P$  ]
- 2  $m < n \rightarrow (1+/m)^m < (1+/n)^n$  [  $P.1 \cdot x=1 \rightarrow P$  ]  
[  $(n-m, 1+/m, 1) \mid (n, x, y) \cdot P30.0 \rightarrow P$  ]
- 3  $m, n \in Q \cdot n > m \cdot x \in Q \cdot x < m \rightarrow (1-x/m)^m < (1-x/n)^n$   
[  $\text{Hp} \rightarrow n/m > 1 \rightarrow (1-x/n) \nmid (n/m) > 1-x/m \cdot \text{Oper} \nmid m \rightarrow P$  ]
- 4  $m, n \in Q \cdot n > m > 1 \rightarrow (1-/m)^m < (1-/n)^n$

- 5  $m, n, x \varepsilon Q . m < n . \supset . (1+x/m)^{m+x} > (1+x/n)^{n+x}$   
 [  $(m+x, n+x) \mid (m, n) \text{ P} \cdot 3 . \supset . [m/(m+x)]^{m+x} < [n/(n+x)]^{n+x} .$   
 Oper/  $\supset . P$  ]
- 6  $m, n \varepsilon Q . m < n . \supset . (1+/m)^{m+1} > (1+/n)^{n+1}$
- 7  $m, n \varepsilon Q . n > 1 . \supset . (1+/m)^m (1-/n)^n < 1$   
 [  $\text{P} 30 \cdot 1 . x=1 . \supset . P$  ]
- 8  $m, n \varepsilon Q . \supset . (1+/m)^m < (1+/n)^{n+1}$   
 [  $(n-1) \mid n \text{ P} \cdot 7 \supset P$  ]  
 [  $[n+1, (m+1)/m, n/(n+1)] \mid (n, x, y) \text{ P} 30 \cdot 0 . \supset . P$  ]
- 9  $a, b \varepsilon Q . a = b . \supset . (a+b) \mid (a+b) < a \nmid a \nmid b \nmid 2 \nmid (a+b)$   
 [  $(b, a, a, b) \mid (m, n, x, y) \text{ P} 30 \cdot 0 . \supset . P$  ]

## \* 32.

- 1  $a, b \varepsilon Q . m \varepsilon 1+Q . \supset . (a+b)^m > a^m + m a^{m-1} b$   
 [  $(b/a) \mid x \text{ P} 30 \cdot 5 . \text{Oper } \times (a \nmid m) . \supset . P$  ]
- 2  $a \varepsilon Q . b \varepsilon \theta a . m \varepsilon 1+Q . \supset . (a-b)^m > a^m - m a^{m-1} b$   
 [  $(b/a) \mid x \text{ P} 30 \cdot 7 . \text{Oper } \times (a \nmid m) . \supset . P$  ]
- 3  $a, b \varepsilon Q . m \varepsilon 1+Q . \supset . (a+b)^m < a^m + m(a+b)^{m-1} b$   
 [  $(a+b) \mid a \text{ P} \cdot 2 . \supset . a^m > (a+b)^m - m(a+b)^{m-1} b . \supset . P$  ]
- 4  $a \varepsilon Q . b \varepsilon \theta a . m \varepsilon 1+Q . \supset . (a-b)^m < a^m - m(a-b)^{m-1} b$   
 [  $(a-b) \mid a \text{ P} \cdot 1 . \supset . P$  ]
- 5  $a, b \varepsilon Q . a < b . m \varepsilon 1+Q . \supset .$   
 $m a^{m-1} < (b^m - a^m)/(b-a) < m b^{m-1}$
- 6  $a, b \varepsilon Q . m \varepsilon 1+N_1 . \supset . m \nmid (a^m + b) < a+b/(m a^{m-1})$
- 7  $a, b \varepsilon Q . m \varepsilon 1+N_1 . b < m a^m . \supset . m \nmid (a^m - b) < a-b/(m a^{m-1})$   
 [  $b/(m a^{m-1}) \mid b \text{ P} \cdot 1 \cdot 2 . \text{Oper } m \nmid . \supset . \text{P} \cdot 6 \cdot 7$  ]

\* 33.  $a \varepsilon Q-1 . m \varepsilon Q+1 . \supset .$  ·1  $a^m + /a^m > a + /a$ 

- 2  $(a^m - /a^m)/(a - /a) > m$
- 3  $a^m + /a^m > m^2(a + /a) - 2(m^2 - 1)$

\* 34.  $a, b, c \varepsilon Q . \supset :$ 

- 0  $D(a, b) = 1, \text{mod}[(na+nb)-a0]$  Df
- 1  $D(a, b) \varepsilon Q_0$  ·2  $D(a, b) = D(b, a)$
- 3  $a \varepsilon Q-R . \supset . D(1, a) = 0$
- 4  $\quad \quad \quad b \varepsilon R . \supset . D(a, b) = 0$
- 5  $D(a, b) \varepsilon Q . D(a, c) = 0 . \supset . D(b, c) = 0$
- 6  $D(ac, bc) = cD(a, b)$  ·7  $a > b . \supset . D(a, b) = D(a-b, b)$
- 8  $m \varepsilon N_1 . \supset . D(a+mb, b) = D(a, b)$

## §13 q

$$* \quad 1.0 \quad q = Q \cup -Q \cup 0$$

Df q

$$(Q_0, q) \mid (N_0, n) \text{ §n P1-32}$$

q = « quantitate » vel « numero reale ». Es numero positivo, aut negativo aut nullo.

$$* \quad 2.0 \quad a, b \varepsilon q . \supset : x = a \pm b . \equiv . x = a + b \vee x = a - b \quad \text{Df } \pm$$

$$\cdot 1 \quad a \varepsilon q . \supset : x \varepsilon q . x^2 = a . \equiv . a \leq 0 . x = \pm \sqrt{a}$$

$$\cdot 2 \quad a, b \varepsilon q . \supset : x \varepsilon q . x^2 + 2ax + b = 0 . \equiv . a^2 \leq b . x = -a \pm \sqrt{a^2 - b}$$

$$[ x^2 + 2ax + b = 0 . \equiv . (x+a)^2 = a^2 - b \\ \equiv . a^2 - b \leq 0 . x + a = \pm \sqrt{a^2 - b} . \equiv . \dots ]$$

{ EUCLIDE VI P28, 29 }

{ LEONARDO PISANO a.1202 p.407 :

« (Si) volueris invenire quantitatem census [ $x^2$ ], qui cum datis radicibus [ $+2ax$ ] equetur numero dato [ $= -b$ ], sic facias: accipe quadratum medietatis radicem [ $a^2$ ], et adde eum super numerum datum [ $a^2 - b$ ]; et eius, quod provenierit, radicem accipe [ $\sqrt{a^2 - b}$ ]; de qua numerum medietatis radicem tolle [ $\sqrt{a^2 - b} - a$ ]; et quod remanserit erit radix quesiti census. »

$$\cdot 3 \quad a, b, c \varepsilon q . a \neq 0 . \supset :$$

$$x \varepsilon q . ax^2 + bx + c = 0 . \equiv . b^2 - 4ac \leq 0 . x = [-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}] / (2a)$$

$$[ ax^2 + bx + c = 0 . \equiv . 4a^2x^2 + 4abx + 4ac = 0 . \equiv . (2ax + b)^2 - b^2 + 4ac = 0 \\ \equiv . (2ax + b)^2 = b^2 - 4ac . \equiv . \dots ]$$

{ BRAHMAGOUPTA a.598, Versione de Rodet p. 75 :

« Mets le nombre connu dans le côté opposé à celui où sont... l'inconnue et son carré. Au nombre connu, multiplié par quatre fois le nombre des  $x^2$  ajoute le carré du coefficient du terme moyen; la racine de ceci, moins le coefficient du terme moyen, étant divisée par deux fois le nombre des carrés est la valeur de  $x$ . »

$$\cdot 4 \quad a, b \varepsilon Q . \supset : a(a-b) = b^2 . \equiv . b = a(\sqrt{5}-1)/2 . \equiv . a = b(\sqrt{5}+1)/2$$

$$. \equiv . a^2 + (a-b)^2 = 3b^2 . \equiv . b(a+b) = a^2 . \equiv . a-b = a(3-\sqrt{5})/2$$

{ EUCLIDE XIII P1-6 }

\* 3.  $a, b, x, y \in q \cdot \supset$ :

1  $x, y \in \mathbb{Q} : x+y = 2a : xy = b : x$

$$a^2 > b, x =$$

$$| \ x+y=2a \ . \ xy=b \ . \supset. (x+y)^2-4;$$

$$x+y=2a \quad (x+y)^2-4xy=4(a^2-b)$$

(1) . (2) . $\supset$ :

$$+y = 2a \cdot xy = b \cdot x > y \Rightarrow x + y = 2$$

                            *D*

           D

[illegible]

{ DIOPHANTO I P27, 30 }

2.  $x, y \in \mathbb{Q} : x+y=2a : x^3+y^3=2a^3$

$$b^2 > a^2, \quad x = t$$

$$| \quad x+y=2a \quad , \quad x^2+y^2=2b^2 \quad , \quad x>y$$

$$\therefore x+y=2a \quad (6)$$

$\therefore \quad x_1$

$$= \dots$$

} DIOPHANTO I P28 {

$$\cdot 3 \quad a, b \in \mathbb{Q} \rightarrow \exists x, y \in \mathbb{Q} . x^2 + y^2 = a$$

$$a > 2b, x = \sqrt{a+2b} + \sqrt{a-2b}$$

$$[x^2 + y^2 = a \text{ , } xy = b \text{ , } x > y \text{ } \Rightarrow \text{ } x^2 + y^2 +$$

$$. x > y \implies (x+y)^2 = a+2b . (x-y)^2$$

$$2b \cdot a - 2b > 0 \cdot x - y = \sqrt{a - 2b} \cdot =$$

) VIETA Opera 1.2 P2 (

4.  $x, y \in \mathbb{Q} : x^3 + y^3 = a, x + y = b \therefore$

$$| \quad x^3+y^3=a \quad , \quad x+y=b \quad \Rightarrow \quad x+y=b \quad .$$

•                                 »                      •

...]

$$^5 \quad x' + y' = a \quad , \quad x + y = b \quad . = . \quad x + y$$

$$[x^4 + y^4 = a \quad , \quad x^4 - y^4 = b \quad ] \implies x^4 + y^4 = b$$

..»

==»

»

...]

$$x^5+y^5=a, x+y=b \implies x+y$$

$$\backslash \quad x^5 + y^5 = a \quad , \quad x + y = b \quad . = . \quad x + y = b$$

==>

$$\underline{\underline{\quad}} \rightarrow$$

==>

— 2000 —

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1019-1024.



\* 4.0  $a \varepsilon \mathbb{Q}, m \varepsilon 2N_1 + 1 \Rightarrow \sqrt[m]{a} = \sqrt[m]{q \cdot x \cdot (x^m = a)}$  Df

1  $a, b, u, r \varepsilon \mathbb{Q}, u + r = b, ur = (a/3)^3 \Rightarrow$

$$\sqrt[3]{q \cdot x \cdot (x^3 = ax + b)} = \sqrt[3]{u} + \sqrt[3]{r}$$

$$[(\sqrt[3]{u} + \sqrt[3]{r})^3 = 3(\sqrt[3]{u} + \sqrt[3]{r}) \cdot \sqrt[3]{ur} + u + r \Rightarrow \sqrt[3]{u} + \sqrt[3]{r} = a(\sqrt[3]{u} + \sqrt[3]{r}) + b]$$

} N. TARTAGLIA a.1546 p.123:

... Quando che'l cubo restasse lui solo [ $x^3 = ax + b$ ]

Tu osservarai quest'altri contratti.

Del numer farai due tal part'a volo [ $b = u + r$ ]

Che l'una in l'altra si produca schietto

El terzo cubo delle cose in stolo. [ $ur = (a/3)^3$ ]

Delle qual poi, per commun precetto

Torrai li lati cubi insieme gionti

Et cotal summa sarà il tuo concetto. [ $x = \sqrt[3]{u} + \sqrt[3]{r}$ ]

... Questi trovai, et non con passi tardi

Nel mille cinquecent'e quatro e trenta

Con fondamenti ben sald'e gagliardi

Nella città dal mar'intorno centa.!

$a, b \varepsilon \mathbb{Q} \Rightarrow$  2  $b^3 + a^3 > 0 \Rightarrow$

$$\sqrt[3]{q \cdot x \cdot (x^3 + 3ax + 2b = 0)} = \sqrt[3]{[-b + \sqrt{(b^3 + a^3)}]} + \sqrt[3]{[-b - \sqrt{(b^3 + a^3)}]}$$

3  $b^3 + a^3 = 0 \Rightarrow q \cdot x \cdot (x^3 + 3ax + 2b = 0) = a(\sqrt[3]{b}) \vee a(-2\sqrt[3]{b})$

4  $b^3 + a^3 < 0 \Rightarrow \text{num}[q \cdot x \cdot (x^3 + 3ax + 2b = 0)] = 3$

5  $a, b \varepsilon \mathbb{Q}, 8a > b \Rightarrow$

$$\sqrt[3]{a + (b + a\sqrt{[(8a - b)/(27b)]})} + \sqrt[3]{a - (b + a\sqrt{[(8a - b)/(27b)]})} = \sqrt[3]{b}$$

6  $a \varepsilon \mathbb{Q}, b \varepsilon \mathbb{Q} \Rightarrow$

$$\sqrt[3]{[a^3 + 3ab + (3a^2 + b)\sqrt{b}]} + \sqrt[3]{[a^3 + 3ab - (3a^2 + b)\sqrt{b}]} = 2a$$

\* 5.0  $a, m \varepsilon \mathbb{Q} \Rightarrow a^{-m} = (a^m)^{-1}$  Df

$a, b \varepsilon \mathbb{Q}, m, n \varepsilon \mathbb{Q} \Rightarrow$  1  $a^m \varepsilon \mathbb{Q}$  2  $a^m a^n = a^{m+n}$

3  $(ab)^m = a^m b^m$

4  $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$

5  $a > b \Rightarrow a^m > b^m$

6  $a > 1 \Rightarrow m > n \Rightarrow a^m > a^n$

7  $a < 1 \Rightarrow m > n \Rightarrow a^m < a^n$

\* 6.  $a, b \varepsilon \mathbb{Q} \Rightarrow$

0  $\text{moda} = \sqrt[3]{q \cdot x \cdot (x^3 = +x \vee x^3 = -x)}$

1  $\text{moda} \varepsilon \mathbb{Q} \vee 0$

2  $\text{mod}(a+b) \leq \text{moda} + \text{modb}$

3  $\text{mod}(-a) = \text{moda}$

4  $\text{mod}(a \times b) = \text{moda} \times \text{modb}$

$$\S \quad a \equiv 0 \pmod{a} \Rightarrow \text{mod}/a = \text{mod}a$$

•6  $m \in \mathbb{N}, \bigcup \text{mod}(a^m) = (\text{mod } a)^m$       •7  $\text{mod } a = \bigvee a^i$

$$\text{Def 7.0.} \quad \text{req. } \mathcal{D}. \quad \text{Er} = \max_{(q \mid R) \in \mathcal{D}} n^{\wedge} a_3(a \leq x) \quad \text{Df}$$

\* 8.  $n \in N_i + 1 \rightarrow x \in Q \rightarrow \neg$ .

$$\begin{aligned} \cdot 0 \quad E(n \downarrow r) &= \iota N_0 \circ \lambda z [z^n \leq r < (z+1)^n] & \text{Dfp} \\ [ \text{Df } E, \supset, E \quad n \downarrow x &= \iota N_0 \circ \lambda z [z^n \leq n \downarrow x < z+1] = \iota N_0 \circ \lambda z [z^n \leq x < (z+1)^n] ] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \cdot 1 \quad E(n \downarrow r) = E(n \downarrow E.r) \\ & [ P \cdot 0 \supset E(n \downarrow r)^n \leq x < E(n \downarrow r + 1)^n, \text{ OperE} \supset \\ & (E(n \downarrow x)^n \leq E.r < E(n \downarrow r + 1)^n, P \cdot 0 \supset P ] \end{aligned}$$

$$2 \quad a \in 1 + Q \Rightarrow \sqrt{a} \leq E\sqrt{a} + [a - (E\sqrt{a})^2] / (2E\sqrt{a})$$

$$\begin{aligned} & \cdot 3 \quad , \quad , \quad > E\sqrt{a} + [a - (E\sqrt{a})^2] / (2E\sqrt{a} + 1) \\ & [ x = E\sqrt{a} \quad , \quad y = \sqrt{a} - x \quad . \cap \quad x \in N_1 \quad , \quad 0 \leq y < 1 \quad , \quad \sqrt{a} = x + y \quad . \cap \quad \\ & \quad a = x^2 + 2xy + y^2 \quad . \cap \quad x^2 + 2xy \leq a < x^2 + 2x + 1 ] y \quad . \cap \quad \\ & (a - x^2) / 2x \leq y < (a - x^2) / 2(x+1) \quad ] \end{aligned}$$

$$4 \quad a \in 1+Q \Rightarrow {}^3\sqrt{a} - E^3\sqrt{a} \geq [a - ({}^3\sqrt{a})^3] / [3(E^3\sqrt{a})^2]$$

$$x = E^3 \sqrt{a}, \quad y = \sqrt[3]{a - x} \quad \Rightarrow \quad a = (x + y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3y^2x + y^3 \quad \Rightarrow \\ (a - x^3) / (3x^2) \leq y < (a - x^3) / (3x^2 + 3x + 1)$$

$$\cdot 6 \quad \text{ord } \sqrt[n]{x} = E(\text{ord } x/n$$

$$[n \text{ ord } \sqrt[n]{x} \leq \text{ord } x < n \cdot \text{ord } x - 1])$$

\* 9.  $a \in \mathfrak{g}$ .  $\Rightarrow$   $a + x = x + a = x$  Df

$$2 \quad a-x = (-x) + a = -\infty - x = -\infty \quad \text{Df}$$

$$^3 \quad -\infty < n < +\infty, \quad -\infty < +\infty \quad \text{Df}$$

Ad expressionem  $x - x$  nos tribue nullo sensu.

$$4 \quad l \vdash x = l \vdash x \vee l \vdash x \quad \text{Df}$$

$$u \in \text{Cls}'(q \cup \{\pm\infty\}) \text{ . } \supset \text{ .}$$

$$5 \quad \max u = 1 \wedge u \in \mathcal{B}(x \in u, \bigcup_{x \in u} x) \quad \text{Df}$$

$$6 \text{ min } t = \text{-----} \sum(t) \quad \text{Df}$$

$$\cdot 7 \quad \text{num}'' \in \mathbb{N}, \quad \exists. \max'' , \min'' \in \mathbb{N}$$

\* 10.  $u \in \text{Cls}'(q \cup t \pm \infty) \cdot \supset$

$$\cdot 0 \quad I'u = \min(q \cup t \pm \infty) \wedge \exists (x \in u \cdot \supset_x x \geq a) \quad \text{Df}$$

$$\cdot 01 \quad I_u u = \max(\quad \quad \quad \geq a) \quad \text{Df}$$

Si  $u$  es classe de quantitate finito aut infinito, tunc limite supero (infero) des  $u$  es minimo (maximo) de quantitatēs majore (minore) aut aequale ad omni  $u$ .

$$\cdot 1 \quad I'u, I_u u \in q \cup t \pm \infty \quad [\S Q P 6.4 \cdot \supset \cdot P]$$

Omni classe  $u$  de quantitates habet semper limite supero, et limite infero, finito aut infinito. Es ipso definitione de numero reale, rationale aut irrationale, considerato ut limite supero de classe de rationales.

$$\cdot 2 \quad u = \bigwedge \cdot \supset \cdot I'u = -\infty \cdot I_u u = +\infty$$

$$\cdot 3 \quad \text{num } u = 1 \cdot \supset \cdot I'u = I_u u = u$$

$$\cdot 4 \quad \text{num } u > 1 \cdot \supset \cdot I'u > I_u u$$

$$\cdot 5 \quad I'u \in u \cdot \supset \cdot I'u = \max u \quad : \quad I_u u \in u \cdot \supset \cdot I_u u = \min u$$

\* 11.  $u, v \in \text{Cls}'q \cdot a \in q \cdot \supset$

$$\cdot 1 \quad a = I'u \cdot \equiv \cdot a - Q = u - Q \quad : \quad a = I_u u \cdot \equiv \cdot a + Q = u + Q$$

$$\cdot 2 \quad +\infty = I'u \cdot \equiv \cdot u - Q = q \quad : \quad -\infty = I_u u \cdot \equiv \cdot u + Q = q$$

$$\cdot 3 \quad u \supset v \cdot \supset \cdot I'u \leq I'v \cdot I_u u \leq I_u v$$

$$\cdot 4 \quad u \supset v : y \in v \cdot \supset_y \exists x (x \leq y) : \supset \cdot I_u u = I_u v$$

$$\cdot 5 \quad \quad \quad \geq \quad \quad \quad I'u = I'v$$

$$\cdot 6 \quad I'(u \cup v) = \max(I'u \cup I'v) \quad \cdot \quad I_u(u \cup v) = \min(I_u u \cup I_u v)$$

\* 12.  $u, v \in \text{Cls}'(q \cup t \pm \infty) \cdot \supset$

$$\cdot 1 \quad I'(u + v) = I'u + I'v \quad \cdot \quad I_u(u + v) = I_u u + I_u v$$

$$[ I'u + I'v - Q = (I'u - Q) + (I'v - Q) = u - Q + v - Q = u + v - Q ]$$

$$\cdot 2 \quad I'(-u) = -I'u$$

$$[ -I'u - Q = -(I'u + Q) = -u + Q = -u - Q ]$$

$$\cdot 3 \quad m \in Q \cdot \supset \cdot I'(mu) = mI'u \cdot I_u(mu) = mI_u u$$


$$[ mI'u - Q = m(I'u - Q) = m(u - Q) = mu - Q ]$$

Inter differentes applicatione de limite supero et infero, nos cita sequente ad Geometria.

Si nos nosce area de polygono plano, nos pote defini area de omni figura in plano, ut « limite supero de area de polygonos interno ad figura dato », aut ut « limite infero de area de polygonos que contine in suo interno figura dato ».

Si nos nosce volumen de polyhedro, nos pote defini volumen de solido arbitrario ut limite supero de volumen de polyhedro interno ad illo, aut ut limite infero de volumen de polyhedro continente illo in proprio interno.

Si nos habe arcu de curva, longitududo de arcu es limite supero de longitududo de polygonales inscripto in illo.



Ita affirmatione « arcu AB in longitudine aequa segmer CD » vale « CD aequa limite supero de linea polygonale scripto in AB », et, si nos elimina expressione « limite supero nunc definito, affirmatione praecedente vale:

1° Nullo polygonale inscripto in AB supera CD.

2° Si nos sume segmento arbitrario CH minore de C pote inscribe in AB polygonale majore de CH.

Si arcu AB es plano, et convexo, suo longitududo limite infero de lineas polygonale circumscripto.

Idea de limite supero es valore plus simplio inter sensu de vocabulo « limite », que nos decompone in l' Lm, lim.

### \* 13.

$$1. f \in \text{qfr} : y, z \in R. \supset_{y, z} f(y+z) = fy + fz : x \in R : \neg$$

$$[ \text{Hp} \supset f x = f(x+0) = fx + f0 \supset f0 = 0$$

$$\text{Hp} \supset f x + f -x = f[x + (-x)] = f0 = 0 \supset f -x = -$$

$$\text{Hp} . n \in N_1 . f(n x) = n f x \supset f[n \div 1 x] = f(n x) + f x =$$

$$(n+1) f x$$

$$\text{Hp} . n \in N_1 . (3) . \text{Induct} \supset f n x = n f x$$

$$\text{Hp} . m \in n . (1) . (2) . (4) \supset f m x = m f x$$

$$\text{Hp} . n \in N_1 . (4) \supset f x = f[n x/n] = n f(x/n) \supset f$$

$$\text{Hp} . m \in n . n \in N_1 . (5) . (6) \supset f[m/n x] = f[m x/n]$$

$$\supset (1 \mid x) P (7) \supset f m/n = (m/n) f1$$

$$(8) \supset P ]$$

$$\cdot 2 \quad f \varepsilon \text{ qf} q : y, z \varepsilon q \quad \supset_{y,z} . f(y+z) = fy + fz : x \varepsilon q \text{--} r . fx \text{--} xf1 = 0 \\ \supset . l'f' \theta = \infty$$

$$[ g = (fz - xf1) \mid z . m, n \varepsilon r \quad \supset . g(mx + n) = mgx \\ \text{ " } \quad \quad \quad . m \varepsilon r \quad \supset . \exists \theta \wedge (mx + r) \quad \supset . mgx \varepsilon g' \theta \\ \text{ " } \quad \quad \quad . \supset . r \times gx \supset g' \theta . gx = 0 \quad \supset . l'(r \times gx) = \infty \\ \supset . l'g' \theta = \infty \quad \supset . P ]$$

$$\cdot 3 \quad f \varepsilon \text{ qf} q : y, z \varepsilon q \quad \supset_{y,z} . f(y+z) = fy + fz : l'f' \theta \varepsilon q : x \varepsilon q \quad \supset . \\ fx = (f1) \times x \\ [ P \cdot 2 \quad \supset . P ]$$

{ EULER, vide §lim P31; DARBOUX MA. a.1880 t.17 p.55 }

Si  $f$ , functio reale de variabile reale, es distributivo ad  $+$ , id es satisfac ad aequatio  $f(y+z) = fy + fz$ , pro omni valore de  $y$  et de  $z$ , et si limite supero de valores de  $f$  in aliquo intervallo finito, p. ex. in intervallo  $\theta$ , es finito, tunc functio coincide cum multiplicatio per numero, id es, pro omni valore de  $x$ ,  $fx$  vale  $(f1) \times x$ .

$$\cdot 4 \quad f \varepsilon \text{ qf} q : y, z \varepsilon q \quad \supset_{y,z} . f(y+z) = fy \times fz : l'f' \theta \varepsilon q : f1 = 0 : \\ x \varepsilon q \quad \supset . f1 \varepsilon Q . fx = (f1) \uparrow x \\ \{ \text{CAUCHY a.1821 p.103 } \}$$

- - - -

\* 14.  $a, b \varepsilon q \vee i \pm \infty \quad \supset .$

$$\cdot 0 \quad a^- b = q \wedge x \exists (a < x < b \vee a > x > b) \quad \text{Df}$$

$$\cdot 1 \quad a^- b = a^- b \vee ia \vee ib \quad \text{Df}$$

$$\cdot 2 \quad a^- b = a^- b \vee ia \quad . \quad a^- b = a^- b \vee ib \quad \text{Df}$$

$$\cdot 3 \quad b^- a = a^- b \quad . \quad b^- a = a^- b \quad . \quad a^- a = ia$$

$$\cdot 4 \quad -\infty^- \infty = q \quad . \quad 0^- \infty = Q \quad . \quad -\infty^- \infty = q \vee \infty \vee -\infty$$

$$\cdot 5 \quad \theta = 0^- 1 \quad . \quad \theta = 0^- 1 \quad \text{Dfp}$$

$$\cdot 6 \quad a, b \varepsilon q \quad \supset . a^- b = a + \theta(b-a) \quad \text{Dfp}$$

$$\cdot 7 \quad \quad . a \leq b \quad \supset . a^- b = a + \theta(b-a) \quad \text{Dfp}$$

Notationes de intervallo sine extremo, vel cum ambo extremo, vel cum uno, adoptato in §cont, §D, §S, §vct.

## §14 Log

\* 1.  $a, b \in \mathbb{Q} \setminus \{1\}, x, y \in \mathbb{Q}, m \in \mathbb{Q}, \supset$ .

·0  ${}^a\text{Log} x = {}_1\text{q}^a z z(a \nmid z = x)$  Df  
 $= \text{logarithmo in basi } a \text{ de } x.$

·1  ${}^a\text{Log} x \in \mathbb{Q}$       ·2  $a \nmid ({}^a\text{Log} x) = x$

·3  ${}^a\text{Log}(a \nmid m) = m$       ·4  ${}^a\text{Log} 1 = 0$       ·5  ${}^a\text{Log} a = 1$

·6  ${}^a\text{Log}(x \times y) = {}^a\text{Log} x + {}^a\text{Log} y$

[ P·2  $\supset$ ,  ${}^a\text{Log}(xy) = {}^a\text{Log}[a \nmid ({}^a\text{Log} x) \times a \nmid ({}^a\text{Log} y)]$

§q 5·2      "       $= {}^a\text{Log}[a \nmid ({}^a\text{Log} x + {}^a\text{Log} y)]$

P·3      "       $= {}^a\text{Log} x + {}^a\text{Log} y$  ]

·7  ${}^a\text{Log}/x = -{}^a\text{Log} x$

[  ${}^a\text{Log}/x = {}^a\text{Log}/[a \nmid ({}^a\text{Log} x)] = {}^a\text{Log}[a \nmid (-{}^a\text{Log} x)] = -{}^a\text{Log} x$  ]

·8  ${}^a\text{Log} x^m = m \times {}^a\text{Log} x$

${}^a\text{Log}(x^m) = {}^a\text{Log}[(a \nmid {}^a\text{Log} x)^m] = {}^a\text{Log}[a \nmid m \times {}^a\text{Log} x] = m \times {}^a\text{Log} x$

·9  ${}^a\text{Log} x = {}^b\text{Log} x \times {}^a\text{Log} b$

[  $x = b \nmid ({}^b\text{Log} x)$  . Oper  ${}^a\text{Log} \supset$ . P ]      } NEPER, a.1614 {

\* 2·0  $x \in \mathbb{Q}, \supset$ .  $\text{Log} x = {}^x\text{Log} x$  Df

·1      "       $\text{E Log} x = \text{ord } x$

[  $\text{E Log} x = {}_1\text{n}^x y z [y \leq \text{Log} x < y+1] = {}_1\text{n}^x y z [X \nmid y \leq x < X \nmid y+1] = \text{ord} x$  ]

·2  $x \in \mathbb{Q}, n \in \mathbb{N}_1, \supset$ .  $\text{Log}(X^n x) = n + \text{Log} x$

TABULA DE LOG. AD TRES DECIMALE

	10	20	30	40	50	60	70	80	90
0	000	301	477	602	698	778	845	903	954
1	041	322	491	612	707	785	851	908	959
2	079	342	505	623	716	792	857	913	963
3	113	361	518	633	724	799	863	919	968
4	146	380	531	643	732	806	869	924	973
5	176	397	544	653	740	812	875	929	977
6	204	414	556	662	748	819	880	934	982
7	230	431	568	672	755	826	886	939	986
8	255	447	579	681	763	832	892	944	991
9	278	462	591	690	770	838	897	949	995

Exemplo :  $\text{Log } 47 = 1$  (per P2·1) + ·672 (ex tabula, in verticale cum titulo 40 et in horizontale cum titulo 7).

§15  $\Sigma$ 

- \* 1.0  $m \in N_0 . f \in q f 0^{m+1} \supset \Sigma(f, 0^{m+1}) = f 0$  .  
 $\Sigma[f, 0^{m+1}] = \Sigma(f, 0^m) + f(m+1)$  Df
- \* 1  $a \in N_0 . b \in a + N_0 . f \in q f a^{b-a} \supset$   
 $\Sigma(f, a^b) = \Sigma[f(a+r)|r, 0^{b-a}]$  Df
- \* 2  $u \in \text{Cls}'q . r \in N_1 \supset \min_r u = \min u$  .  
 $\min_{r+1} u = \min[u \wedge (\min_r u + Q)]$  Df
- \* 21  $u \in \text{Cls}'q . \text{num } u \in N_1 \supset \min_{\text{num } u} u = \max u$
- \* 22  $n \in N_1 \supset \min_n N_1 = n$
- \* 3  $u \in \text{Cls}'q . \text{num } u \in N_1 \supset \Sigma u = \Sigma(\min_r u | r, 1^{n-\text{num } u})$  Df
- \* 4  $u \in \text{Cls} . \text{num } u \in N_1 . f \in q f u \supset \Sigma(f, u) =$   
 $x \exists [g \in (u f 1^{n-\text{num } u}) \text{rcp} \supset g . x = \Sigma(fg, 1^{n-\text{num } u})]$  Df
- \* 5  $u \in \text{Cls} . f \in q f u . \text{num}[u \wedge x \exists (fx = 0)] \in N_1 \supset$   
 $\Sigma(f, u) = \Sigma[f, u \wedge x \exists (fx = 0)]$  Df
- \* 6  $u \in \text{Cls} . \text{num } u \in N_1 . f \in (q f u) \text{sim} \supset \Sigma(f, u) = \Sigma(f^u u)$

Si  $u$  es classe, et si  $f$  es quantitate functione des  $u$ , tunc  $\Sigma(f, a^{b-a})$  vale « summa de valores de  $f$ , quando variable varia in  $u$  ».

Illo es definitio (P.0) si classe  $u$  habe forma  $0^{m+1}$ , vel (P.1) forma  $a^{b-a}$ .

P.3 defini summa de numeros de uno classe, que es summa de numeros dispositio in ordine crescente. Ce ordine es indicato per operatione  $\min_r u$ , lege « minimo de loco  $r$  des  $u$  » (P.2). Minimo de loco uno vale minimo; minimo de loco numero des  $u$  vale maximo des  $u$  (P.21).

P.4 defini summa de valores de functione  $f$ , quando variable varia in classe arbitrario  $u$ . Nos dispone in ordine individuos de classe  $u$ . Occurre in P15.

Signo  $\Sigma$  occurre in Lagrange a.1772 t.3 p.451. Cauchy scribe:

$$\sum_{m=0}^n f^r, \text{ ubi signo } \Sigma \text{ porta tres indice } m, n, r.$$

\* 2.

$$* 1 \quad n \in N_0 . f, g \in q f 0^{n+1} \supset \Sigma[(f+r)|r, 0^{n+1}] = \Sigma(f, 0^{n+1}) + \Sigma(g, 0^{n+1}) \quad \text{Distrib}(\Sigma, +)$$

$$^2 \quad n \in N_0 . a \varepsilon q . f \varepsilon q f 0 \cdots n . \supset . \Sigma[(a \times f r) | r, 0 \cdots n] = a \Sigma(f, 0 \cdots n) \\ \text{Comm}(a \times, \Sigma)$$

$$^3 \quad n \in N_0 . f \varepsilon q f 0 \cdots n . \supset . \Sigma(f, 0 \cdots n) = \Sigma[f(n-r) | r, 0 \cdots n]$$

$$^4 \quad a, b, c \in N_0 . a < b < c . f \varepsilon q f a \cdots c . \supset . \\ \Sigma(f, a \cdots c) = \Sigma(f, a \cdots b) + \Sigma[f, (b+1) \cdots c]$$

$$^3 \quad n \in N_0 . f \varepsilon q f 0 \cdots (n+1) . \supset . \\ \Sigma\{[f(r+1) - f r] | r, 0 \cdots n\} = f(n+1) - f 0$$

\* 3.  $m \in N_1 . \supset .$

$$^1 \quad \Sigma(1 \cdots m) = m(m+1)/2 \\ [ \Sigma(1 \cdots m) = \Sigma(r | r, 0 \cdots m) = \Sigma[(m-r) | r, 0 \cdots m] \quad (1)$$

$$\Sigma(r | r, 0 \cdots m) + \Sigma[(m-r) | r, 0 \cdots m] = \Sigma(m | r, 0 \cdots m) = m(m+1) \quad (2) \\ (1) . (2) . \supset . P ]$$

$$^2 \quad \Sigma[(2r+1) | r, 0 \cdots m] = (m+1)^2$$

$$^3 \quad a, b \varepsilon q . n \in N_1 . \supset . \Sigma\{[a+r(b-a)/n] | r, 0 \cdots n\} = (n+1)(a+b)/2$$

$$[ \Sigma[a+r(b-a)/n | r, 0 \cdots n] = \Sigma[a+(n-r)(b-a)/n | r, 0 \cdots n] \\ = \Sigma[b-r(b-a)/n | r, 0 \cdots n] \quad (1)$$

$$\Sigma[a+r(b-a)/n | r, 0 \cdots n] + \Sigma[b-r(b-a)/n | r, 0 \cdots n] \\ = \Sigma[(a+b) | r, 0 \cdots n] = (n+1)(a+b) \quad (2)$$

$$(1) . (2) . \supset . P ]$$

\* 4.1  $n \in N_1 . x \varepsilon q = 1 . \supset . \Sigma(x^r | r, 0 \cdots n) = (x^{n+1} - 1)/(x - 1)$

$$[ P2.5 . \supset . x^{n+1} - 1 = \Sigma[(x^{r+1} - x^r) | r, 0 \cdots n] = \Sigma[x^r (x - 1) | r, 0 \cdots n] = \\ (x - 1) \Sigma[x^r | r, 0 \cdots n] . \text{Oper } / (x - 1) . \supset . P ]$$

$$^2 \quad a, b \varepsilon q . a \Leftarrow b . n \in N_1 . \supset .$$

$$\Sigma(a^{n-r} b^r | r, 0 \cdots n) = (b^{n+1} - a^{n+1})/(b - a) \quad \{ \text{EUCLIDE IX P35} \}$$

$$[ \Sigma(a^{n-r} b^r | r, 0 \cdots n) = a^n \Sigma[b/a^r | r, 0 \cdots n] \\ = a^n [(b/a^{n+1} - 1)/(b/a - 1)] = \dots ]$$

\* 5.  $m \in N_1 . \supset .$

$$^1 \quad \Sigma[r(r+1)/2 | r, 1 \cdots m] = m(m+1)(m+2)/6$$

$$[ 3\Sigma[r(r+1) | r, 1 \cdots m] = 3\Sigma[r(r+1) | r, 0 \cdots (m-1)]$$

$$= \Sigma_1[r(r+1) | r, 0 \cdots (m-1)] . \supset . P ]$$

\} ARYABHATA a.500 P21 \}

$$^2 \quad \Sigma[r(r+1)(r+2)/6 | r, 1 \cdots m] = m(m+1)(m+2)(m+3)/24$$

\} ALQACHANI a.1589 p.247 \}



$$\cdot 3 \quad \Sigma (1 \cdots m)^2 = m(m+1)(2m+1)/6$$

$$[ \Sigma(r^2|r, 1 \cdots m) = \Sigma; [r, r+1) - r ] |r, 1 \cdots m| = m(m+1)(m+2)/3 - m(m+1)/2 ]$$

$$[ (n+1)^2 = \Sigma; [(r+1)^2 - r^2] |r, 0 \cdots n| = \Sigma[(3r^2 + 3r + 1)|r, 0 \cdots n] = 3\Sigma(r^2|r, 0 \cdots n) + \Sigma[(3r+1)|r, 0 \cdots n] = 3\Sigma(r^2|r, 0 \cdots n) + (3n+2)(n+1)/2 \supset \Sigma(r^2|r, 0 \cdots n) = [(n+1)^2 - (3n+2)(n+1)/2]/3 = \dots ]$$

{ ARCHIMEDE Περὶ Ἑλικῶν P10 }

$$\cdot 4 \quad \Sigma (1 \cdots m)^2 = [m(m+1)/2]^2$$

$$[ r \in \mathbb{N}_1 \supset r^2 = (r-1)r(r+1) + r ]$$

$$\cdot 5 \quad \Sigma[(2r+1)^2|r, 0 \cdots m] = (m+1)(2m+1)(2m+3)/3$$

$$\cdot 6 \quad \Sigma[(2r+1)^2|r, 0 \cdots m] = (m+1)^2(2m^2+4m+1)$$

{ IBN ALBANNA a.1369 p.5,6 }

$$* \quad 6. \quad m, n \in \mathbb{N}_1, s_m = \Sigma (1 \cdots n)^m \supset$$

$$\cdot 1 \quad s_4 = n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)/30$$

{ ALQACHANI p.247; FERMAT a.1636 t.2 p.69 :

« Exponentur quotlibet numeri in progressionē naturali ab unitate; si a quadruplo ultimi, binario aucto et in quadratum trianguli numerorum ducto, demas summam quadratorum a singulis, fiet quintuplum quadrato-quadratorum a singulis. » }

$$s_5 = n^2(n+1)^2(2n^2+2n-1)/12$$

$$s_6 = n(n+1)(2n+1)[3n^2(n+1)^2 - (3n^2+3n-1)]/42$$

$$s_7 = n^2(n+1)^2[3n^2(n+1)^2 - 2(2n^2+2n-1)]/24$$

{ WALLIS a.1655 t.1 p.381 }

$$s_8 = n(n+1)(2n+1)[5n^2(n+1)^3 - 10n^2(n+1)^2 + 3(3n^2+3n-1)]/90$$

$$s_9 = n^2(n+1)^2[2n^2(n+1)^3 - 5n^2(n+1)^2 + 3(2n^2+2n-1)]/20$$

$$s_{10} = n(n+1)(2n+1)[3n^2(n+1)^4 - 10n^2(n+1)^3 + 17n^2(n+1)^2 - 5(3n^2+3n-1)]/66$$

$$s_{11} = n^2(n+1)^2[2n^2(n+1)^4 - 8n^2(n+1)^3 + 17n^2(n+1)^2 - 10(2n^2+2n-1)]/24$$

{ Jac. BERNOULLI a.1713 p.97 }

$$\cdot 2 \quad s_3 = s_1^3 \quad 5s_4 = s_2(6s_1-1) \quad 3s_5 = 4(s_1^2-s_2)$$

$$7s_6 = 12s_2s_3-5s_4 \quad s_5+s_7 = 2s_1^4$$

$$9s_8^2 = s_1^2(8s_1+1) \quad 3s_5 = s_1^2(4s_1-1) \quad s_5 = 4s_1^3-3s_2^2$$

$$12(s_3)^5 = 16s_6-5s_4+s_2$$

$$2s_7 = 4s_3^2-3s_2^2+s_1^3 \quad 2s_8 = 3s_2^2-s_1^2$$

$$3s_7 = s_1^2(6s_1^2-4s_1+1) \quad s_7 = 2s_1^3(s_1-2)+3s_2^2$$

---


$$3s_8$$

$$11s_{10} =$$

$$33s_{10} =$$

$$3s_{11} =$$

\* 7.

$$\begin{array}{l} \cdot 1 \quad \Sigma \\ \quad [ \quad \S Q \\ \quad \quad (1) \\ \cdot 2 \quad \Sigma \\ \quad [ \quad \S Q^3 \\ \quad \quad \text{Op} \end{array}$$

\* 8.

$$\begin{array}{l} \cdot 1 \quad \Sigma( \\ \quad \quad \Sigma \\ \cdot 2 \quad \Sigma( \\ \quad \quad \Sigma \\ \cdot 3 \quad m \end{array}$$

\* 10.

$$\cdot 1 \quad m$$

\* 11.

$$\begin{array}{l} \cdot 0 \quad m \\ \quad \quad r \\ \quad [ \quad \S re \\ \cdot 1 \quad a = \\ \cdot 2 \quad re \\ \cdot 3 \quad a \\ \quad \quad \} \\ \cdot 4 \quad a \\ \cdot 5 \quad \cdot \\ \cdot 6 \quad a \end{array}$$

\* 12.0  $f \in QfN_0 \cdot \supset \cdot \Sigma(f, N_0) = 1'[\Sigma(f, 0 \cdots n) | n'N_0]$  Df

$$\cdot 1 \quad x \varepsilon \theta \cdot \supset \cdot \Sigma(x^r | r, N_0) = 1/(1-x)$$

$$\begin{aligned} [ \Sigma(x^r | r, N_0) &= 1'[\Sigma(x^r | r, 0 \cdots n) | n'N_0] \\ &= 1'[(1-x^{n+1})/(1-x) | n'N_0] \\ &= 1'[(1-x) - x^{n+1}/(1-x) | n'N_0] \\ &= 1/(1-x) - 1/[x^{n+1}/(1-x) | n'N_0] \\ &= 1/(1-x) - 1/[x^{n+1} | n'N_0](1-x) \\ &= \quad \quad \quad - 0/(1-x) = 1/(1-x) ] \end{aligned}$$

$$\cdot 2 \quad x \varepsilon \theta \cdot a \varepsilon Q \cdot \supset \cdot \Sigma(ax^r | r, N_0) = a/(1-x)$$

$$\cdot 3 \quad a \varepsilon Q \cdot \text{ord } a = 0 \cdot \supset \cdot a = \Sigma(X^{-r} \text{Cfr}_{-r} a | r, N_0)$$

$$\cdot 4 \quad a \varepsilon Q \cdot m \varepsilon N \cdot n \varepsilon N_1 : p \varepsilon m + N_1 \cdot \supset_p \cdot \text{Cfr}_{-p} a = \text{Cfr}_{-p-n} a \cdot \supset \cdot \\ a = (E X^{m+n} a - E X^m a) / [X^m (X^n - 1)]$$

$$\cdot 5 \quad x \varepsilon R \cdot \supset \cdot$$

$$\exists (m, n) \exists (m \varepsilon N \cdot n \varepsilon N_1 : p \varepsilon m + N_1 \cdot \supset_p \cdot \text{Cfr}_{-p} x = \text{Cfr}_{-p-n} x)$$

$$[ a, b \varepsilon N_1 \cdot x = a/b \cdot \supset \cdot \text{rest } X^m a, b | m \cdot 0 \cdots b \supset 0 \cdots (b-1) \cdot \supset \cdot$$

$$\exists (m, n) \exists [m \varepsilon 0 \cdots b \cdot n \varepsilon N_1 \cdot m + n \leq b \cdot \text{rest } X^m a, b = \text{rest } X^n a, b] \quad (1)$$

$$\text{Hp}(1) \cdot m \varepsilon 0 \cdots b \cdot n \varepsilon N_1 \cdot m + n \leq b \cdot \text{rest } X^m a, b = \text{rest } (X^{m+n} a, b) \cdot$$

$$p \varepsilon N_1 \cdot \supset \cdot \text{rest } (X^{m+p} a, b) = \text{rest } X^{m+n+p} a, b \cdot \supset \cdot \text{Cfr}_{-m-p} (a/b) = \\ \text{Cfr}_{-m-p-n} (a/b) ]$$

} WALLIS a.1685, Opera t.2 p.364:

\* ... post processum (Reductionis Fractionum vulgarium ad Decimales) aliquatenus continuatum, redeunt iidem numeri, et eodem ordine circulantur quo prius... semper, si non citius, post tot locos uno minus quot sunt in Divisore unitates \*, :

C \* 13.  $m, n \varepsilon N_1 \cdot \supset \cdot$

$$\cdot 1 \quad \Sigma[C(m, r) | r, 0 \cdots m] = \Sigma[C, m : 0 \cdots m] = 2^m$$

} HERIGONE a.1644 t.2 p.122{

$$\cdot 2 \quad \Sigma[C(m, s) | s, (0 \cdots m) \wedge (2N_0)] = \Sigma[C(m, s) | s, (0 \cdots m) \wedge (2N_0 + 1)] = 2^{m-1}$$

} JAC. BERNOULLI a.1713 p.104{

$$\cdot 3 \quad m \varepsilon 6N_0 \cdot \supset \cdot \Sigma[C(m, r) | r, (0 \cdots m) \wedge (3N_0)] = (2^m + 2) \cdot 3$$

$$m \varepsilon 6N_0 + 1 \vee 6N_0 + 5 \cdot \supset \cdot \quad \quad \quad = (2^m + 1) \cdot 3$$

$$m \varepsilon 6N_0 + 2 \vee 6N_0 + 4 \cdot \supset \cdot \quad \quad \quad = (2^m - 1) \cdot 3$$

$$m \varepsilon 6N_0 + 3 \cdot \supset \cdot \quad \quad \quad = (2^m - 2) \cdot 3$$

$$\cdot 4 \quad \Sigma[(-1)^r (2m+1-2r) C(2m+1, r) | r, 0 \cdots m] = 0$$

\* 14.  $a, b \in \mathbb{N}_0 . \supset$ 

- 0  $C(a, 0) = 1$  Df
- 01  $C(a, n+1) = C(a, n) \times (a-n)/(n+1)$  Df
- 02  $C(a, 1) = a . C(a, 2) = a(a-1)/2$
- 1  $C(a+1, n+1) = C(a, n) \times (a+1)/(n+1)$
- 2  $C(a+1, n+1) = C(a, n+1) + C(a, n)$
- 3  $C(-a, n) = (-1)^n C(a+n-1, n)$  {EULER PetrA. a.1784 p.86}
- 4  $a, b \in \mathbb{N}_0 . \supset . C(a+b, n) = \Sigma [C(a, n-s) C(b, s) \mid s, 0 \cdots n]$   
 { VANDERMONDE ParisM. a.1772 {
- [  $a, b \in \mathbb{N}_0 . \supset . C(a+b, 0) = C(a, 0) C(b, 0) = 1$  (1)
- $a, b \in \mathbb{N}_0 . C(a+b, n) = \Sigma [C(a, n-s) C(b, s) \mid s, 0 \cdots n] . \supset$   
 $C(a+b, n+1) = \Sigma [C(a, n-s) C(b, s) (a+b-n) (n+1) \mid s, 0 \cdots n]$   
 $= \Sigma [C(a, n-s) C(b, s) \{a-n-s+(b-s)/(n+1) \mid s, 0 \cdots n\}]$   
 $= \Sigma [C(a, n-s+1) C(b, s) (n-s+1)/(n+1) \mid s, 0 \cdots n]$   
 $+ \Sigma [C(a, n-s) C(b, s+1) (s+1)/(n+1) \mid s, 0 \cdots n]$   
 $= C(a, n+1) C(b, 0) + \Sigma [C(a, n-s+1) C(b, s) (n-s+1)/(n+1) \mid s, 1 \cdots n]$   
 $+ \Sigma [C(a, n-s+1) C(b, s) s/(n+1) \mid s, 1 \cdots n] + C(a, 0) C(b, n+1)$   
 $C(a+b, n+1) = \Sigma [C(a, n+1-s) C(b, s) \mid s, 0 \cdots (n+1)]$  (2)
1. (2) Induct.  $\supset$  P ]
- {Dm. Cayley, t. 8 p.462 a.1869}
- 5  $\Sigma [C(a+r, n) \mid r, 0 \cdots p] = C(a+p+1, n+1) - C(a, n+1)$
- 6  $a \in \mathbb{N}_0 . n \in \mathbb{N}_1 . \supset . \Sigma [(-1)^r C(a, r) \mid r, 0 \cdots n] = (-1)^n C(a-1, n-1)$

\* 15.  $a, b \in \mathbb{N}_0 . \supset$ 

- 1  $(a+b)^n = \Sigma [C(n, r) a^{n-r} b^r \mid r, 0 \cdots n]$   
 Exprime « formula de binomio ».
- { TSCHUSCH KIH a.1303; STIFEL *Arithmetica integra* a.1544  
 liber 1 c. 5; TARTAGLIA a.1556 p.73; B. PASCAL a.1665 }
- 2  $(a+b)^{2n+1} = a[\Sigma (-1)^r C(2n+1, 2r) a^{n-r} b^r \mid r, 0 \cdots n]^2 +$   
 $b[\Sigma (-1)^r C(2n+1, 2r) a^r b^{n-r} \mid r, 0 \cdots n]^2$
- 3  $(a+b)^{2n} = [\Sigma (-1)^r C(2n, 2r) a^{n-r} b^r \mid r, 0 \cdots n]^2 +$   
 $ab[\Sigma (-1)^r C(2n, 2r+1) a^{n-r-1} b^{r+1} \mid r, 0 \cdots (n-1)]^2 \dots$
- $a, b, c, x \in \mathbb{N}_0 . \supset$
- 4  $(a+b)^n = \Sigma [C(n, r) (a+rc)^{n-r} b(b+rc)^{r-1} \mid r, 0 \cdots n]$   
 { ABEL a.1826 t.1 p.102 }

$$\cdot 5 \quad m < n. \bigcup. \Sigma \{(-1)^r C(n, r) (a+rb)^m \mid r, 0 \cdots n\} = 0 \\ \text{ } \} \text{EULER a.1743 CorrM. t.1 p.264 \}$$

$$\cdot 6 \quad (1+x+x^2)^m = \Sigma \{ (x^{m-r} + x^{m+r}) \times \Sigma [C(m, r+2s) \times C(r+2s, s) \\ \mid s, 0 \cdots m] \mid r, 1 \cdots m\} + x^m \times \Sigma \{ C(m, 2s) \times C(2s, s) \mid s, 0 \cdots m\} \\ \text{ } \} \text{EULER a.1778 PetrNA. a.1794 t.12 p.47 \}$$

$$\cdot 7 \quad a, b \in \mathbb{Q}, n \in \mathbb{N}_1. \bigcup. (a+b)^{2n-1} - a^{2n-1} - b^{2n-1} = \\ (2n+1)ab(a+b) \Sigma \{ (a^2+ab+b^2)^{n-1-2r} [ab(a+b)]^{2r} C(n-r-1, 2r) \mid \\ (2r+1) \mid r, 0 \cdots E[(n-1)/3] \} \text{ } \} \text{MUIR QJ. a.1879 t.16 \}$$

\* 16.  $m, n \in \mathbb{N}_1. \bigcup.$

$$\cdot 1 \quad (m+1) \Sigma (1 \cdots n)^m = \\ (n+1)^{m+1} - 1 - \Sigma \{ C(m+1, r) \times \Sigma (1 \cdots n)^r \mid r, 0 \cdots (m-1) \} \\ [ \quad \Sigma \{ C(m+1, r) \times \Sigma (1 \cdots n)^r \mid r, 0 \cdots m-1 \} = \\ \quad \Sigma \{ \Sigma [C(m+1, r) s^r] \mid r, 0 \cdots (m-1) \} \mid s, 1 \cdots n \} = \\ \quad \Sigma \{ (1+s^{m+1} - m+1 s^m - s^{m+1}) \mid s, 1 \cdots n \} = \\ \quad (n+1)^{m+1} - 1 - (m+1) \Sigma (1 \cdots n)^m ] \\ \text{ } \} \text{PASCAL a.1655 t.3 p.309 \}$$

$$\cdot 2 \quad \Sigma \{ [C(n, r)]^2 \mid r, 0 \cdots n \} = C(2n, n) \text{ } \} \text{LAGRANGE a.1770 t.2 p.182} \\ [ \text{P14.4 } \bigcup. \text{P} ]$$

$$\cdot 3 \quad \Sigma \{ (-1)^r [C(2n, r)]^2 \mid r, 0 \cdots 2n \} = (-1)^n C(2n, n) \\ \text{ } \} \text{CESÀRO a.1884 Mathesis t.4 p.231 \}$$

$$\cdot 4 \quad \Sigma \{ (-1)^r [C(2n, r)]^3 \mid r, 0 \cdots 2n \} = (-1)^n C(3n, n) \times C(2n, n) \\ \text{ } \} \text{DIXON Mm. a.1890 t.20 p.79 \}$$

$$\cdot 5 \quad n! = \Sigma \{ (-1)^r C(n, r) (n-r)^n \mid r, 0 \cdots n \} \\ \text{ } \} \text{EULER PetrNC. a.1768 t.13 p.28 \}$$

$$\cdot 6 \quad \Sigma (1 \cdots n) = \Sigma \{ [(-1)^{r-1} C(n, r) r \mid r, 1 \cdots n] \\ \text{ } \} \text{JOH. BERNOULLI a.1740 CorrM. t.2 p.35 \}$$

$$\cdot 7 \quad \Sigma \{ (-1)^{r-1} C(n, r) / (n+r) \mid r, 1 \cdots n \} = 1 / [(2n+1) C(2n, n)] \\ \text{ } \} \text{WALLIS a.1655 p.425 :}$$

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{2 \cdot 3}, \frac{1}{3} - \frac{2}{4} + \frac{1}{5} = \frac{1 \cdot 2}{3 \cdot 4 \cdot 5}, \frac{1}{4} - \frac{3}{5} + \frac{3}{6} - \frac{1}{7} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7}$$

... et sic deinceps ... :

$$\cdot 1 \quad n \in \mathbb{N}_1. \bigcup. \\ n^n = \Sigma \{ (-1)^r C(n, r) C[n(n-r), n] \mid r, 0 \cdots n \} \\ \text{ } \} \text{N. J. HATZIDAKIS IdM. t.8 a.1901 \}$$

\* 17.1  $\text{num}[(N_0 \text{ F } 1 \cdots m) \wedge x3(\Sigma x = n)] = C(m+n-1, n)$   
 } FRÉNICLE ParisM. a.1693 t.5 {

Numero de « combinations cum repetitione de objectis  $1 \cdots m$ , ad  $n$  ».

•2  $a \in N_1 + 1 \cdot \supset \cdot \text{num} (x, y) \exists | x, y \in N_1 \cdot a = \Sigma x \cdots (x + y) | =$   
 $\text{num}(2N_1 + 1) \wedge (a \in N_1)$  } SYLVESTER CR. t.96 {

Np \* 20.1  $m \in Np \cdot n \in N_1 \cdot m > n + 1 \cdot \supset \cdot \Sigma (1 \cdots m)^n \in N_1 \times m$   
 } LIONNET ; voir Catalan BelgiqueM. t.46 a.1886 p.14 {

mp \* 21.1  $p \in Np \cdot b \in 0 \cdots (p-1) \text{ F } 0 \cdots n \cdot a = \Sigma (b \cdot p^r | r, 0 \cdots n)$   
 $\cdot \supset \cdot \text{mp}(p, a!) = (a - \Sigma b) (p-1)$   
 } KUMMER a.1852 JfM. t.44 p.115 {

•2  $p \in Np \cdot a \in N_1 \cdot \supset \cdot \text{mp}(p, a!) = \Sigma [E(a/p^r)] | r, N_1 \{$   
 } LEGENDRE a.1830 t.1 p.11 {

E \* 22.0  $x \in Q \cdot a \in N_1 \cdot \supset \cdot \Sigma [E(x+r/a)] | r, 0 \cdots (a-1) \{ = E ax$   
 } BERTRAND *Arithmétique* a.1851 p.109 {

•1  $m, n \in N_1 \cdot \supset \cdot m = \Sigma [E(m+r) n | r, 0 \cdots (n-1)]$   
 $\{ (m \cdot n, n) | x, a \cdot P \cdot 0 \cdot \supset \cdot P \}$

•2  $x \in q \cdot a \in N_1 \cdot \cdot \cdot \Sigma [x \times (1 \cdots a)] \wedge n \cdot \supset \cdot$   
 $\Sigma [E(x) | r, 1 \cdots a] + \Sigma [E(x/x) | r, 1 \cdots E a, x] = a E ax$   
 } GAUSS a.1808 t.2 p.7 {

•3  $x \in q \cdot \supset \cdot E x = \Sigma [E(x/2^r + /2) | r, N_1 \{$   
 $= E(x/2 + /2) + E(x/4 + /2) + \dots$   
 } CESÀRO *Excursions Arithm.* a.1885 p.36 {

•4  $a, b \in N_1 \cdot \text{Dvr}(2a+1, 2b+1) = 1 \cdot \supset \cdot$   
 $\Sigma [E(r(2a+1)/(2b+1)) | r, 1 \cdots b] + \Sigma [E(r(2b+1)/(2a+1)) | r, 1 \cdots a] = ab$   
 } GAUSS a.1808 t.2 p.7 {

•5  $a, b \in N_1 \cdot \supset \cdot D(a, b) = b + \Sigma [E(ah/b) | h, 1 \cdots b] + \Sigma [E(-ah/b) | h, 1 \cdots b]$

nt \* 23.  $p \in Np \cdot p > 3 \cdot \supset \cdot$

•1  $\text{nt } \Sigma [1 \cdots (p-1)] \in p^2 \times N_1$  } OSBORN a.1892 Mm. t.22 p.51 {

•2  $\text{nt } \Sigma [1 \cdots (p-1)]^2 \in p \times N_1$  } GLAISHER a.1900 QJ. t.31 p.337 {

$\Phi$  \* 24.1  $\Sigma (\Phi, N_1 \wedge a/N_1) = a$  } GAUSS a.1801 t.1 p.31 {

•2  $n \in N_1 \cdot \supset \cdot \Sigma [(\Phi r) E(n/r) | r, 1 \cdots n] = n(n+1)/2$   
 } L. CARLINI LazzeriP. a.1902 p.329 {

## §16 II

\* 1.0  $m \in N_0 . f \in Q f 0^{m+1} . \supset . \Pi(f, 0^{m+1}) = f 0 .$

$$\Pi(f, 0^{m+1}) = \Pi(f, 0^m) \times f(m+1)$$

Df

$(\Pi \mid \Sigma) \S\S 1.4$

\* 2.  $m \in N_1 . f \in Q f 1^{m+1} . \supset . \Pi(f, 1^{m+1}) = 0 . \supset . 0 \in f 1^{m+1}$

$(\Pi \mid \Sigma) \S\S 2$

Definitione de  $\Pi(f, u)$ , « producto de valores de functione  $f$ , quando variabile sume omni valore in classe  $u$  », analogo ad Df de  $\Sigma f, u$ .

\* 2.  $m, n \in N_1 . \supset .$

$$1. (n+2)\Sigma \Pi[(r+s)|s, 0^{n+1}]|r, 1^{m+1} = \Pi[(m+s)|s, 0^{n+1}]$$

} FERMAT t.1 p.341:

« In progressionem naturalem, quae ab unitate sumit exordium, quilibet numerus  $[m]$  in proximam majorem  $[m+1]$  facit duplum sui trianguli  $[=2 \cdot (1+2+\dots+m)]$ ; in triangulum proximam majorem, facit triplum suae pyramidis; in pyramidem proximam majorem facit quadruplum sui triangulo-trianguli; et sic uniformi et generali in infinitum methodo. »

$$2. a \in Q . \supset . m \Sigma / \Pi[(a+r+s)|s, 0^{m+1}]|r, 1^{n+1} = \\ / \Pi[(a+s)|s, 1^{m+1}] - / \Pi[(a+n+s)|s, 1^{m+1}]$$

$$3. u \in Q f 1^{n+1} . \supset .$$

$$1 = \Sigma u_r / \Pi[(1+u_r)|s, 1^{n+1}]|r, 1^{n+1} + / \Pi(1+u_s)|s, 1^{n+1}] \\ \text{ } \} \text{ NICOLE Paris M. a.1727 p.257 }$$

\* 3.

$$1. n \in N_1 + 1 . x \in Q f 1^{n+1} . \supset . \Pi[(1+x_r)|r, 1^{n+1}] > 1 + \Sigma(x, 1^{n+1})$$

$$[ n=2 . \supset . (1+x_1)(1+x_2) = 1+x_1+x_2+x_1x_2 > 1+(x_1+x_2) \quad (1)$$

$$n \in N_1 . \Pi[(1+x_r)|r, 1^{n+1}] > 1 + \Sigma(x, 1^{n+1}) . \supset .$$

$$\Pi[(1+x_r)|r, 1^{n+1}] = \Pi[(1+x_r)|r, 1^{n+1}] \times (1+x_{n+1}) >$$

$$[1 + \Sigma(x, 1^{n+1})] + x_{n+1} = 1 + \Sigma(x, 1^{n+1}) + x_{n+1} \Sigma(x, 1^{n+1}) > \\ 1 + \Sigma(x, 1^{n+1}) \quad (2)$$

$$(1) . (2) . \text{Induct} . \supset . P ]$$

$$2. n \in N_1 + 1 . x \in Q f 1^{n+1} . \supset . \Pi[(1-x_r)|r, 1^{n+1}] > 1 - \Sigma(x, 1^{n+1})$$

$$3. n \in N_1 . a \in Q f 1^{n+1} . \supset . \sqrt[n]{\Pi(a, 1^{n+1})} \leq \Sigma(a, 1^{n+1}) / n$$

\*4  $n \in N_1, a, m \in Qf1 \dots n \rightarrow$

$$\Pi(a, \uparrow m_r | r, 1 \dots n) / \Sigma(m, 1 \dots n) \leq \Sigma(m, a_r | r, 1 \dots n) / \Sigma(m, 1 \dots n)$$

$$[ \S Q 30.0 \rightarrow (a_1 \uparrow m_1)(a_2 \uparrow m_2) \leq [(m_1 a_1 + m_2 a_2) / (m_1 + m_2)] \uparrow (m_1 + m_2) \quad (1)$$

$$n \in N_1, \Pi(a_r \uparrow m_r | r, 1 \dots n) \leq [\Sigma(m_r a_r | r, 1 \dots n) / \Sigma(m, 1 \dots n)] \uparrow \Sigma(m, 1 \dots n) \cdot \text{Oper} \times a_{n+1} \rightarrow \Pi[a_r \uparrow m_r | r, 1 \dots (n+1)] \leq [\Sigma(m_r a_r | r, 1 \dots n) / \Sigma(m, 1 \dots n)] \uparrow \Sigma(m, 1 \dots n) \times a_{n+1} \uparrow m_{n+1} \rightarrow \Pi[a_r \uparrow m_r | r, 1 \dots (n+1)] \leq [\Sigma(m_r a_r | r, 1 \dots (n+1)) / \Sigma(m, 1 \dots (n+1))] \uparrow \Sigma(m, 1 \dots (n+1)) \quad (2)$$

(1) . (2) . Induct  $\rightarrow$  P ]

\* 4.0  $m \in N_1, a \in N, F(1 \dots m) \rightarrow (\Sigma a)! \in N, \times \Pi(a!)$

\*1  $m, n \in N_1, a \in Qf1 \dots m \rightarrow (\Sigma a)^n =$

$$\Sigma\{n! / \Pi(u!, 1 \dots m)\} \times \Pi(a_r \uparrow u_r | r, 1 \dots m) | u, (N_0 F 1 \dots m) \cap u \Sigma(\Sigma u = n) \}$$

{ LEIBNIZ a.1678; Mss. *Math.* III A 3 fol.16;

BERNOULLI Joh. a.1695, (*LEIBNIZ Math.S.* t.3 p.181):

« Esto... polynomium quodcunque  $s+x+y+z$  etc. elevandum ad potentiam quaecunque  $r$ ; Dico coefficientem termini  $s^a x^b y^c z^e$  etc. fore

$$\frac{r \cdot r-1 \cdot r-2 \cdot r-3 \cdot r-4 \cdot \dots \cdot 1}{1.2.3 \dots a \times 1.2.3 \dots b \times 1.2.3 \dots c \times 1.2.3 \dots e} \quad \cdot \{$$

\*2  $n \in N_1, a \in Qf1 \dots n \rightarrow$

$$\Sigma\{(Ib) \times \Sigma[(r, a)^n | s, 1 \dots n] | r, (u \cup u-1) F1 \dots n\} = 2^n \times n! \times \Pi a$$

{ LAGRANGE Mss. in-4° t.6 a.1782 }

\* 5.1  $a \in N_1 \rightarrow a = \Pi\{x \uparrow \text{mp}(x, a) | x, Np\}$

\*2  $a \in N_1 \rightarrow \text{num}(N_1 \wedge a / N_1) = \Pi\{[\text{mp}(x, a) + 1] | x, Np\}$

{ WALLIS a.1685; Opera t.2 p.498 }

\*3  $u \in \text{Cls}'N_1, \exists u \rightarrow Du = \Pi\{x \uparrow \min \text{mp}(x, u) | x, Np\}$

\*4 ———.  $\text{num } u \in N_1 \rightarrow mu = \text{—————max—————}$

\*5  $a \in N_1 \rightarrow \Sigma(N_1 \wedge a / N_1) = \Pi\{[x \uparrow [\text{mp}(x, a) + 1] - 1] / (x - 1) | x, Np\}$   
 $= \Pi\{x^r | r, 0 \dots \text{mp}(x, a) | x, Np\}$

{ WALLIS a.1658; Opera t.2 p.814 :

« Si duorum pluriumve numerorum primorum potestates quaelibet invicem ducantur, factus partibus suis aliquoties auctus, aequatur facto ex componentibus partium suarum aliquotarum additione auctis ». }

\*6  $a \in N_1 + 1 \rightarrow \Phi a = \Pi\{x \uparrow [\text{mp}(x, a) - 1] \times (x - 1) | x, Np \wedge a / N_1\}$   
 { EULER PetrNC. a.1760-61 t.8 p.85-103 }

\*7  $a \in R \rightarrow \text{mp}(p, a) = \text{mp}(p, nta) - \text{mp}(p, dta) \quad \text{Df}$

\*8  $a \in R^m := x \in Np \rightarrow \text{mp}(x, a) \in n \times m \quad \text{Ths } 1.3.4$



$$\begin{aligned} * \quad 6.1 \quad n \in N_1, a \in (qf1 \cdots n) \text{sim} . x \in q-(a'1 \cdots n) . m \in 0 \cdots (n-1) \quad \supset . \\ x^m / \Pi[(x-a_r)|r, 1 \cdots n] = \\ \sum \{ a_r^{-m} / [(x-a_r) \Pi[(a_r-a_s)|s, 1 \cdots n-r]] | r, 1 \cdots n \} \end{aligned}$$

Decompositione de fractione, que habet ut denominatore producto de factores in  $x$ , in summa de fractiones simplice.

$$\begin{aligned} * \quad 2 \quad n \in N_1, m \in q-(-n \cdots 0) \quad \supset . \\ \sum [(-1)^r C(n, r) / (m+r) | r, 0 \cdots n] = n! / \Pi(m+0 \cdots n) \end{aligned}$$

### §17 $\Delta$ (differentia)

$$* \quad 1. \quad a, b \in n . a < b . f, g \in qf a \cdots b \quad \supset .$$

$$* \quad 0 \quad (\Delta f)a = \Delta fa = \Delta(f, a) = f(a+1) - fa \quad \text{Df } \Delta$$

Si  $f$  es quantitate functione de numeros inter  $a$  et  $b$ , tunc differentia  $f(a+1) - fa$  indicare per  $\Delta f, a$ , vel per  $(\Delta f)a$ , vel, in modo plus simplice, per  $\Delta fa$ . Ce differentia non vale  $\Delta(fa)$ , id es non es functio de quantitate  $fa$ , sed es functio de functio  $f$ , et de numero  $a$ .

Signo  $\Delta$  es introducto per Euler, Calc. diff. a.1755.

$$* \quad 1 \quad \Delta(f+g, a) = \Delta fa + \Delta ga$$

$$* \quad 2 \quad c \in q \quad \supset . \Delta(axf, a) = c \times \Delta fa$$

$$* \quad 3 \quad \Delta(fx \times gx | x, a) = f(a+1) \Delta ga + ga \Delta fa$$

$$* \quad 4 \quad a \in N_1 \quad \supset . \Delta(1/a, a) = -1/[a(a+1)]$$

$$* \quad 5 \quad g \in qf a \cdots b \quad \supset . \Delta(fx/gx | x, a) = (ga \Delta fa - ga \Delta fa) / [ga \times g(a+1)]$$

$$* \quad 6 \quad \Delta[f(-x) | x, -b] = -\Delta f(b-1)$$

$$* \quad 2.1 \quad c \in q . a \in n \quad \supset . \Delta(c^x | x, a) = c^a(c-1)$$

$$* \quad 2 \quad a \in n . n \in N_1 \quad \supset . \Delta[C(a, n) | a, a] = C(a, n-1)$$

$$* \quad 3 \quad \Delta[C(-a, n) | a, a] = -C(-a-1, n-1)$$

$$* \quad 4 \quad x, y \in N_1 \quad \supset . \Delta[\Pi(x+0 \cdots y) | x, x] = (y+1) \Pi(x+1 \cdots y)$$

$$* \quad 5 \quad x, y \in N_1 \quad \supset . \Delta[\Pi(x+0 \cdots y) | y, y] = -(y+1) / \Pi[x+0 \cdots (y+1)]$$

$$\begin{aligned} * \quad 6 \quad n \in N_1, a \in qf 0 \cdots n \quad \supset . \Delta \{ \sum [a_r x^{n-r} / (n-r)! | r, 0 \cdots n] | x, x \} = \\ \sum \{ \sum [a_s / (r-s)! | s, 0 \cdots (r-1)] x^{n-r} / (n-r)! | r, 1 \cdots n \} \end{aligned}$$



$$\cdot 1 \quad A_0=1 \quad A_1=-1/2 \quad A_2=1/12 \quad A_3=0 \quad A_4=-1/720 \quad \dots$$

$$\cdot 2 \quad n \in \mathbb{N}_1 \quad \bigcup \quad A_{n+1}=0$$

$$\cdot 3 \quad n \in \mathbb{N}_1 \quad \bigcup \quad B_n=(-1)^{n-1}(2n)!A_n \quad \text{Df}$$

$$\begin{aligned} \cdot 4 \quad & B_1 = /6 \quad B_2 = /30 \quad B_3 = /42 \quad B_4 = /30 \quad B_5 = 5/66 \quad B_6 = 691/2730 \quad B_7 = 7/6 \quad B_8 = 3617/510 \\ & B_9 = 43867/798 \quad B_{10} = 174611/330 \quad B_{11} = 854513/138 \\ & B_{12} = 236364091/2730 \quad B_{13} = 8553103/6 \\ & B_{14} = 23749461029/870 \quad B_{15} = 8615841276005/14322 \\ & B_{16} = 7709321041217/510 \quad B_{17} = 2577687858367/6 \\ & B_{18} = 26315271553053477373/1919190 \\ & B_{19} = 2929993913841559/6 \\ & B_{20} = 261082718496449122051/13530 \\ & B_{21} = 1520097643918070802691/1806 \\ & B_{22} = 27833269579301024235023/690 \\ & B_{23} = 596451111593912163277961/282 \\ & B_{24} = 5609403368997817686249127547/46410 \\ & B_{25} = 495057205241079648212477525/66 \\ & B_{26} = 801165718135489957347924991853/1590 \\ & B_{27} = 29149963634884862421418123812691/798 \\ & B_{28} = 2479392929313226753685415739663229/870 \\ & B_{29} = 84483613348880041862046775994036021/354 \\ & B_{30} = 1215233140483755572040304994079820246041491/56786730 \end{aligned}$$

$B_n$  es *nesimo* de numeros que «ab inventore Jacobo Bernoulli vocari solent Bernoulliani» (Euler *Calc. diff.* t.2 §122).

Euler indica illos per  $B_1, B_2, B_3, \dots$ ; notatio  $B_1, B_2, B_3, \dots$  que nos seque, es adoptato per Binet, JP. a.1839 t.16 cah.27 p.240, per Ohm, Markoff.

Bernoulli a.1713 calcula  $B_5$ ; Euler  $B_{15}$ ; Rothe (communicatos per Ohm in JfM. a.1840 t.20 p.11)  $B_{31}$ ; Adams (JfM. a.1878 t.85 p.269)  $B_{62}$ .

Bibliographia de ce numeros in AJ. t.5 a.1882 p.228.

$$\cdot 5 \quad n \in \mathbb{N}_1 \quad \bigcup \quad B_n \in \mathbb{R}$$

$$\cdot 6 \quad n \in \mathbb{N}_1 \quad \bigcup \quad 2(2^{2n}-1)B_n \in \mathbb{N}_1$$

} GENOCCHI Ann. di Mat. a.1852 t.3 p.399 {

$$\cdot 7 \quad n \in \mathbb{N}_1 \quad \bigcup \quad \beta[(-1)^n B_n] = \sum Np \wedge z[2n \varepsilon (z-1) \times \mathbb{N}_1]$$

} STAUDT JfM. a.1840 t.21; CLAUSEN, AstronNachr. t.17 {

$$\cdot 8 \quad n \in \mathbb{N}p \wedge (N_1+3) \quad \bigcup \quad nt B_n \in n \times \mathbb{N}_1$$

} ADAMS a.1878 JfM. t.85 p.269 {

\* 2.  $x \in \mathbb{N}_1 \cdot \supset$ .

$$\begin{aligned} \cdot 0 \quad \text{Bern}(x, n) &= \sum [A_r x^{n-r} / (n-r)! | r, 0 \dots (n-1)] & \text{Df} \\ &= x^n / n! - x^{n-1} / [2(n-1)!] + \\ &\quad \sum \{ (-1)^{r-1} B_r x^{n-r} / [(2r-1)!(n-2r)!] | r, 1 \dots E[(n-1)/2] \} \\ B(x, n) &= \text{fonctione de Bernoulli, de ordine } n \text{ (Raabe a.1848).} \end{aligned}$$

$$\cdot 1 \quad \text{Bern}(x, 1) = x \quad . \quad \text{Bern}(x, 2) = x^2/2 - x/2 \quad . \\ \text{Bern}(x, 3) = x^3/6 - x^2/4 + x/12 \quad . \dots$$

$$\cdot 2 \quad \text{Bern}(0, n) = 0$$

$$\cdot 3 \quad \text{Bern}(x+1, n) - \text{Bern}(x, n) = x^{n-1} / (n-1)!$$

$$\cdot 4 \quad n, x \in \mathbb{N}_1 \cdot \supset \cdot \sum (1 \dots x)^n = n! \text{ Bern}(x+1, n+1) \\ \{ \text{Jac. BERNOULLI a.1713 p.97:}$$

$$\cdot \int n^c \propto \frac{1}{c+1} n^{c+1} + \frac{1}{2} n^c + \frac{c}{2} A n^{c-1} + \frac{c \cdot c-1 \cdot c-2}{2 \cdot 3 \cdot 4} B n^{c-3} + \dots$$

et ita deinceps, exponentem potestatis ipsius  $n$  continue minuendo binario, quousque perveniat ad  $n$  vel  $n^2$ . Literæ capitales A, B, C, D, etc., ordine denotant coefficients ultimorum terminorum pro  $\int n^n, \int n^4, \int n^6, \int n^8$  etc. nempe  $A \propto 1/6, B \propto -1/30, C \propto 1/42, D \propto -1/30 \dots$  }

$$\cdot 5 \quad \text{Bern}(x, n) - (-1)^n \text{Bern}(-x, n) = -x^{n-1} / (n-1)!$$

$$\cdot 6 \quad \text{Bern}(x, n) + (-1)^{n-1} \text{Bern}(1-x, n) = 0$$

$$\cdot 7 \quad \text{Bern}(1, n) = 0$$

$$\cdot 8 \quad n \in 2\mathbb{N}_1 + 1 \cdot \supset \cdot \text{Bern}(1/2, n) = 0$$

## §19 Med

\* 1.  $u, v \in \text{Cls}'q \cdot a, b \in q \cdot \supset$ .

$$\cdot 0 \quad \text{Med} u = q \wedge x \exists (1, u \leq x \leq 1' u) \quad \text{Df}$$

Si  $u$  es classe de numeros, nos voca medio des  $u$  omni numero inter limite supero et infero des  $u$ .

Cauchy a.1821 p.29 introduce signo « medio » sub forma « M ».

$$\cdot 1 \quad \text{Med Med } u = \text{Med } u \quad \cdot 2 \quad v \supset u \cdot \supset \cdot \text{Med } v \supset \text{Med } u$$

$$\cdot 3 \quad \text{Med}(\text{Med } u \wedge \text{Med } v) = \text{Med } u \wedge \text{Med } v$$

$$\cdot 4 \quad \text{Med}(a+u) = a + \text{Med } u \quad . \quad \text{Med } au = a \text{ Med } u \\ \text{Med}(-u) = -\text{Med } u \quad . \quad \text{Med}(ua \vee tb) = a \vee b$$

$$\begin{aligned}
 & \cdot 5 \quad u \in \text{Cls}'Q \supset \text{Med}/u = / \text{Med}u \\
 & \quad u \in \text{Cls}'Q \supset \text{Med}(u \uparrow a) = (\text{Med}u) \uparrow a \\
 & \quad a \in Q \supset \text{Med}(a \uparrow u) = a \uparrow (\text{Med}u) \\
 & \quad a \in Q - t1 \cdot u \in \text{Cls}'Q \supset \text{Med} {}^a \text{Log}u = {}^a \text{Log} \text{Med}u
 \end{aligned}$$

$$\cdot 6 \quad \lambda \text{Med}u = \text{Med} \lambda u$$

$$\cdot 7 \quad \text{I}'\text{mod}u = \text{I}'\text{mod} \text{Med}u$$

$$* \quad 2. \quad n \in N_1 \cdot x \in \text{qf } 1 \cdots n \cdot a, b \in \text{Qf } 1 \cdots n \supset$$

$$\begin{aligned}
 & \cdot 1 \quad [\Sigma(x, 1 \cdots n)]/n \in \text{Med } x'(1 \cdots n) \\
 & \quad = \text{« valore medio arithmetico des } x \text{ »} .
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \cdot 2 \quad \Sigma(a_r \times x_r | r, 1 \cdots n) / \Sigma(a, 1 \cdots n) \in \text{Med } x'(1 \cdots n) \\
 & \quad = \text{« id. cum coefficientes } a \text{ »} .
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \cdot 3 \quad \sqrt{[\Sigma(a^2, 1 \cdots n)]/n} \in \text{Med } a'(1 \cdots n) \\
 & \quad = \text{« medio quadratico »} .
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \cdot 4 \quad {}^n \sqrt{\Pi(a, 1 \cdots n)} \in \text{Med } a' 1 \cdots n \\
 & \quad = \text{« medio geometrico des } a \text{ »} .
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \cdot 5 \quad [\Pi(a \uparrow b_r | r, 1 \cdots n)] \uparrow / \Sigma(b, 1 \cdots n) \in \text{Med } a' 1 \cdots n \\
 & \quad = \text{« id. cum pondere } b \text{ »} .
 \end{aligned}$$

$$* \quad 3. \quad a, b \in n \cdot n \in N_1 \cdot b > a + n \cdot f \in \text{qfa} \cdots b \supset$$

$$\cdot 1 \quad fb - fa \in (b - a) \text{Med } 1f'(a \cdots (b - 1))$$

$$[ \text{P2} \cdot 1. \text{§4P3} \cdot 1 \supset \text{P} ]$$

$$\cdot 2 \quad g \in \text{qfa} \cdots b \cdot \Delta g \in \text{Qfa} \cdots b - 1 \supset$$

$$(fb - fa) / (gb - ga) \in \text{Med}[\Delta f x / \Delta g x | x' a \cdots (b - 1)]$$

$$[ \text{P2} \cdot 2 \supset \text{P} ]$$

$$\begin{aligned}
 & \cdot 3 \quad x \in a \cdots b \supset fx - fa - (x - a)(fb - fa) / (b - a) \in \\
 & \quad (x - a)(x - b) / 2 \text{Med } 1^2 f' a \cdots (b - 2)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \cdot 4 \quad fb - \Sigma[C(b - a, r) 1^r f a | r, 0 \cdots n] \in \\
 & \quad C(b - a, n + 1) \text{Med } 1^{n+1} f' a \cdots (b - n - 1)
 \end{aligned}$$

$$[ \text{§4P4} \cdot 3 \supset \text{P} ]$$

$$\begin{aligned}
 & \cdot 5 \quad \Sigma(f, a \cdots b) - (b - a + 1)(fa + fb) / 2 \\
 & \quad \in -C(b - a + 1, 3) \text{Med } 1^2 f' (a \cdots b - 2) / 2
 \end{aligned}$$

$$[ \text{§4P4} \cdot 4 \supset \text{P} ]$$

$$\begin{aligned}
 & \cdot 6 \quad \Sigma[C(b - z - 1, n) f z | z, a \cdots (b - n - 1)] \in \\
 & \quad C(b - a, n + 1) fa + C(b - a - 1, n + 1)(fb - fa) / (n + 2) \\
 & \quad + (n + 1) / 2 C(b - a + 1, n + 3) \text{Med } 1^2 f' [a \cdots (b - 2)]
 \end{aligned}$$

## §20 Num infn

\* 1.  $a, b \in \text{Cls} \supset$ :

\*0  $\text{Num} a = \text{Num} b \text{ .} \equiv \text{.} \exists (bfa) \text{recp}$  Df

Si  $a$  et  $b$  es classe, tunc nos dice que numero des  $a$  aequa numero des  $b$ , quando existe correspondentia reciproco inter  $a$  et  $b$ .

Signo « num » de II §10 es casu particulare de signo « Num », et primo, quando existe, vel quando classe es finito, coincide cum secundo.

Num'Cls significa « numero de aliquo classe ». G. Cantor voca illos « numero cardinale », et in loco de « Numero » dice « Mächtigkeit » « puissance ».

Df 0 es expresso per solo signo de logica I et III §1-§4. Hic Arithmetica pote incipe, et nos defini, in modo directo, signos  $>$ , 0, 1,  $+$ ,  $\times$ ,  $\wedge$ ,  $N_0$ .

\*1  $\text{Num} a \leq \text{Num} b \text{ .} \equiv \text{.} \exists \text{Cls}'b \wedge x \exists (\text{Num} a = \text{Num} x)$  Df

\*2  $a \supset b \supset \text{Num} a \leq \text{Num} b$

\* 2.  $x, y, z \in \text{Num}'\text{Cls} \supset$ :

\*1  $x < y \text{ .} \equiv \text{.} x \leq y \wedge x \neq y$

\*3  $x \leq y \wedge y \leq z \supset x \leq z$

\*6  $x \leq y \wedge y \leq x \supset x = y$

{ G. CANTOR RdM. a.1895 p.135; Dm. BERNSTEIN, publiée par BOREL *Th. des Fonctions* a.1898 p.104 }

0 \* 3.0  $0 = \text{Num} \wedge$  Df

\*1  $a \in \text{Cls} \supset \text{Num} a = 0 \text{ .} \equiv \text{.} a = \wedge$

Numero de  $a$  es 0, quando classe  $a$  es nullo.

1 \* 4.0  $1 = \text{Num}'[\text{Cls} \wedge a \exists (\exists a : x, y \in a \supset x, y. x = y)]$  Df

\*1  $a \in \text{Cls} \supset \text{Num} a = 1 \text{ .} \equiv \text{.} \exists a : x, y \in a \supset x, y. x = y$

+ \* 5.0  $x, y \in \text{Num}'\text{Cls} \supset x + y = \text{Num}'[a, b \in \text{Cls} \wedge \text{Num} a = x \wedge \text{Num} b = y \wedge a \cap b = \wedge \supset a, b. z = \text{Num}(a \cup b)]$  Df

$$\cdot 1 \quad a, b \in \text{Cls} . a \cup b = \bigwedge . \bigcup . \text{Num}(a \cup b) = \text{Num } a + \text{Num } b$$

$$\cdot 2 \quad x, y, z \in \text{Num}'\text{Cls} . \bigcup . x + y = y + x . x + (y + z) = (x + y) + z . 0 + x = x . x \leq x + y$$

$\cdot 1$  Si duo classe  $a$  et  $b$  habe nullo elemento commune, tunc numero de  $a \cup b$  vale numero de  $a$  plus numero de  $b$ . Es transformabile in P·0, definitione de summa de duo numero cardinale.

$$\times \quad * \quad 6\cdot 0 \quad x, y \in \text{Num}'\text{Cls} . \bigcup . x \times y = 1 \text{ } z \exists [ a, b \in \text{Cls} . \text{Num } a = x . \text{Num } b = y . \bigcup_{a, b} . z = \text{Num}(a \cdot b) ] \quad \text{Df}$$

$$\cdot 1 \quad a, b \in \text{Cls} . \bigcup . \text{Num}(a \cdot b) = \text{Num } a \times \text{Num } b$$

$$\cdot 2 \quad x, y, z \in \text{Num}'\text{Cls} . \bigcup . xy = yx . x(yz) = (xy)z . x(y+z) = xy + xz$$

Numero de individuo constituyente systema  $(a \cdot b)$  vale productio de numero de  $a$  per numero de  $b$ .

$$\uparrow \quad * \quad 7\cdot 0 \quad x, y \in \text{Num}'\text{Cls} . \bigcup . x \uparrow y = 1 \text{ } z \exists [ a, b \in \text{Cls} . \text{Num } a = x . \text{Num } b = y . \bigcup_{a, b} . z = \text{Num}(a \uparrow b) ] \quad \text{Df}$$

$$\cdot 1 \quad a, b \in \text{Cls} . \bigcup . \text{Num}(a \uparrow b) = \text{Num } a \uparrow \text{Num } b$$

Numero de functione definitio que ad omni  $b$  fac corresponde aliquo  $a$  vale numero de  $a$  elevato ad numero de  $b$ .

$$\text{inf} \quad * \quad 8\cdot 0 \quad \text{inf} =$$

$$\text{Num}'\{\text{Cls} \wedge a \exists [\exists \text{Cls} \wedge u \exists (u \supset a . u = a . \text{Num } u = \text{Num } a)]\} \quad \text{Df}$$

$$\cdot 1 \quad a \in \text{Cls} . \bigcup :$$

$$\text{Num } a \in \text{inf} . = . \exists \quad , \quad , \quad , \quad , \quad , \quad ,$$

$$\cdot 2 \quad a \in \text{Cls} . \bigcup : \text{Num } a \in \text{inf} . = . 1 + \text{Num } a = \text{Num } a \quad \text{Dfp}$$

Nos dice que numero de  $a$  es uno infinito, si existe aliquo classe  $u$  parte de  $a$ , et tale que numero de parte  $u$  aequa numero de classe totale  $a$ .

Existe plure infinito, de valore differente. Vide P11·2.

$$N_0 \quad * \quad 9\cdot 0 \quad N_0 = (\text{Num}'\text{Cls}) - \text{inf} \quad \text{Df}$$

$$\cdot 1 \quad a \in \text{Cls} . \bigcup . \text{Num } a \in N_0 \vee \text{inf}$$

$$\cdot 2 \quad a \in \text{Cls} . \bigcup :: \text{Num } a \in N_0 . = . \therefore \neg \exists a . \wedge : x \in a . \bigcup x . \text{Num } a = \text{Num}(a - x)$$

$$\cdot 3 \quad \text{Num } N_1 = \text{Num } N_0 \quad [ + \varepsilon (N_1 \text{f} N_0) \text{rep} ]$$

$$\cdot 4 \quad \text{Num } N_0 \in \text{inf} \quad [ N_1 \supset N_0 . N_1 = N_0 . \text{Num } N_1 = \text{Num } N_0 ]$$

$$\cdot 3 \quad x \in \text{Num}' \text{Cls} . y \in N_0 . x \leq y \supset x \in N_0$$

$$\cdot 6 \quad \text{ } \text{ } \text{ } . x \leq \text{Num } N_0 . x \in \text{inf} \supset x = \text{Num } N_0$$

{ G. CANTOR JfM. a.1877, AM. t.2 p.313

$N_0$  (jam considerato in Arithmetica) indica omni numero non infinito, vel vale « numero finito ». Es suo definitione in praesente novo theoria.

Numero de  $N_1$ , de numero pari, de numero impari aequa numero de  $N_0$ ; Nam existe correspondentia reciproco inter ces classe. Ergo, numero de  $N_0$  es infinito.

$$\ast \quad 10 \cdot 1 \quad m \in N_1 . \supset m + \text{Num } N_0 = \text{Num } N_0$$

$$[ N_1 = (1 \cdots m) \cup (m + N_1) . \text{Num}(1 \cdots m) = m . \text{Num}(m + N_1) = \text{Num } N_0 ]$$

$$\cdot 2 \quad \text{Num } N_0 + \text{Num } N_0 = \text{Num } N_0$$

$$[ N_0 = (2N_0) \cup (2N_0 + 1) . \text{Num}(2N_0) = \text{Num}(2N_0 + 1) = \text{Num } N_0 ]$$

$$\cdot 3 \quad \text{Num } n = \text{Num } N_0$$

$$[ \text{mod}(2x-1, 2) - 1/2 | x \in (N_0 \text{fn}) \text{rcp} ]$$

$$[ (-1)^{\text{rest}(x+1, 2)} \times \text{quot}(x+1, 2) | x \in (n \text{f} N_0) \text{rcp} ]$$

Numero de  $n$  « numero integro positivo et negativo », aequa numero de  $N_0$ , vel de  $N_1$  « numero naturale ». In vero si ad numero  $n$ :

n) ... -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 ...  
nos fac corresponde:

$N_0$ ) ... 6 4 2 0 1 3 5 ...

resulta correspondentia reciproco inter  $n$  et  $N_0$ . Si nos scribe in primo loco numero  $N_0$ , idem correspondentia sume forma:

$N_0$ ) 0 1 2 3 4 5 6 ...

n) 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3 ...

In demonstratione symbolico, nos exprime  $N_0$  per  $n$ , et  $n$  per  $N_0$ .

$$\cdot 4 \quad m \in N_0 . \supset m \times \text{Num } N_0 = \text{Num } N_0$$

$$\cdot 5 \quad \text{Num}(N_0 : N_0) = \text{Num } N_0$$

$$[ [(x+y)(x+y+1).2+y] | (x,y) \in N_0 \text{f}(N_0 : N_0) \text{rcp} ]$$

{ G. CANTOR, RdM. a.1895 t.5 p.144 }

0 1 3 6 10 ...

2 4 7 11 ...

5 8 12 ...

9 13 ...

14 ...

...

In vero, figura fac corresponde numero scripto ad numero de horizontale et ad numero de verticale.

$$\cdot 6 \quad \text{Num } N_0 \times \text{Num } N_0 = \text{Num } N_0$$

$$[ = P \cdot 5 ]$$

$$\cdot 7 \quad \text{Num } R = \text{Num } N_0$$

$$[ R = N_1 N_1 . \supset \text{Num } R \leq \text{Num } N_1 \times \text{Num } N_1 = \text{Num } N_1 . \text{Num } R \in \text{inf} . P9 \cdot 6 . \supset P ]$$

$$\cdot 8 \quad m \in N_1 . \supset (\text{Num } N_0)^m = \text{Num } N_0$$



$$\cdot 9 \quad \text{Num}(N_0 \cdot F 0 \cdots n) \uparrow n \cdot N_0 \uparrow = \text{Num} N_0$$

{ CANTOR AM. t.2 p.306:

« On peut faire correspondre un à un les nombres algébriques aux nombres appartenants à la série des entiers positifs ».

Classe  $u$  vocare « numerabile », « de primo potestate » si  $\text{Num} u = \text{Num} N_0$ .  
 $n, R, r$  es classe numerabile (P.3.7).

Si ad classe numerabile nos adde numero finito de elemento, resulta classe numerabile (P.1). Classe que consta de duo classe numerabile (P.2), vel de  $m$  classe numerabile (P.4) es numerabile. Classe formato per systema de 2, 3, ...  $m, \dots$  individuo de classe numerabile es numerabile (P.8). Et classe de systema de numero finito, sed arbitrario, de individuo de classe numerabile, es numerabile (P.9). Per ex. numero de functiones algebrico de gradu finito, cum coefficientes integro, vel rationale, vel in aliquo classe numerabile, vale  $\text{Num} N_0$ .

$$* \quad 11.1 \quad f \in \Theta \uparrow N_0 \cdot \supset \cdot \exists \Theta = f \cdot N_0$$

[  $\Sigma [10^{-n} \text{rest}(\text{Cfr-} n f n + 5, 10) \mid n, N_1] \in \Theta = f \cdot N_0$  ]

Si  $f$  es serie de quantitates, in aliquo intervallo finito, p. ex.  $\Theta$ , semper existe in ce intervallo, aliquo numero que non pertine ad serie.

In vero, me evolve in fractione decimale omni numero de serie. Me forma numero decimale, que habe:

cifra decimale de ordine 1 differente de cifra decimale de ordine 1 de primo numero de serie.

cifra decimale de ordine 2 differente de cifra decimale de ordine 2 de secundo numero de serie.

et ita porro. Me forma cifra differente de cifra dato, cum additione d 5, et subtractione de 10, si es necesse.

Numero que resulta es differente de omni numero de serie.

{ CANTOR JfM. a.1874 p.258; AM. p.308 {

$$\cdot 2 \quad \text{Num } \Theta > \text{Num } N_0 \quad [P.1 \supset P]$$

Ergo numeros reale inter 0 et 1 non es ordinabile in serie.

$\text{Num} \Theta$  vocare « secundo potestate » vel « potestate de continuo ».

$$\cdot 3 \quad \text{Num } Q = \text{Num } q = \text{Num } \Theta = \text{Num } (\Theta - R)$$

{ CANTOR JfM. a.1877 p.242; AM. a.1883 p.316 {

$$\cdot 4 \quad 2 \uparrow \text{Num } N_0 = \text{Num } N_0 \uparrow \text{Num } N_0 = \text{Num } (\text{Cls } N_0) = \text{Num } Q$$

$$\cdot 5 \quad \text{Num}(q \uparrow q) = \text{Num } Q$$

$$\cdot 6 \quad n \in N_1 \cdot \supset \cdot \text{Num}(q \uparrow F 1 \cdots n) = \text{Num } Q$$

{ CANTOR AM. t.2 p.315:

« On peut faire correspondre d'une façon complète et à sens unique un ensemble continu à  $n$  dimensions à un ensemble continu d'une seule dimension ».

§21  $\Lambda$   $\lambda$   $\nabla$   $\delta$

\* 1.  $u, v \in \text{Cls}'q = i \wedge \neg$

$$\bullet_0 \quad A'u = l'(Cls'u - t \wedge) \quad . \quad A_l u = l_l'(Cls'u - t \wedge) \quad \text{Df}$$
$$\cdot 01 \quad Au = A'u \cup A_0u \quad \text{Df } A$$
$$\bullet 02 \quad \lambda u = q \wedge Au = q \wedge x \exists [1, \text{mod}(u-x) = 0] \quad \text{Df } \lambda$$

Si  $u$  es classe non nullo de quantitate :

$\Delta'u =$  limites supero de classes non nullo in  $u$ .

$$\Delta u = \text{infero} \quad \gg \quad \gg$$

$Au =$  « limites de  $u$  » vel « classe limite » es classe composita de duo classe praecedente.

Nos pote lege «  $x \in Au$  » per «  $x$  es prope (proximo) ad  $x$  ».

$\lambda u$  indica limites finito de  $u$ ; id es classe composito per quantitates  $x$  tale que limite infero de valores absoluto de differentias inter omni  $u$  et  $x$  es nullo.

$1, \text{ mod } (n-x)$ , in Geometria, es dicto « distantia de figura  $n$  ad puncto  $x$  », et coincide cum distantia minimo, quando minimo existe. Ergo  $\lambda n$  es classe de punctos  $x$ , que habe distantia nullo de figura  $n$ .

$$03 \quad x \varepsilon y \wedge u := x \varepsilon y : h \varepsilon Q . \bigcup_h . \exists u \wedge [ \varepsilon u \bmod (y-x) < h ] \quad \text{Dfp}$$

$$[ \text{P}02 . \text{Oper } x \varepsilon . \text{Df} ] , \bigcup . \text{P}$$
$$4 \quad u \supset \lambda u \wedge A'u \wedge A_1 u$$

$$[ x \varepsilon u \supset, 0 \varepsilon u-x \supset, 0 \varepsilon \text{ mod}(u-x) \supset, 1 \text{ mod}(u-x) \Rightarrow 0 \supset, x \varepsilon \lambda u ]$$

•2  $\lambda\lambda u = \lambda u$

$$[(\lambda u \mid u)^{P.1} \rightarrow \lambda u \supset \lambda \lambda u] \quad (1)$$
$$x \in \lambda \lambda u, h \in Q, P \cdot 01 \cdot \supset, \exists \lambda u \wedge y \exists [\text{mod}(y-x) < h/2] \quad (2)$$
$$\text{Hp}(2) \cdot y \in \lambda u \cdot \supset. \exists z [ \text{mod}(z-y) < h/2 ] \quad (3)$$
$$\text{Hp}(3) \cdot \text{mod}(y-x) < h/2 \cdot \text{zeu} \cdot \text{mod}(z-y) < h/2 \cdot \supset \cdot \text{mod}(z-x) < h \quad (4)$$
$$\text{Hp}(4) \supset \exists u \exists z [ \text{mod}(z-x) < h ] \quad (5)$$
$$x \varepsilon \lambda \lambda u, h \varepsilon Q, (5) \text{ Elim}(y, z), (2), (3) \cdot \supset, \exists u \wedge z \varepsilon [\text{mod}(z - x) < h] \quad (6)$$
$$x\varepsilon \lambda \mu . (6) \text{ Export } \supset . x\varepsilon \lambda \mu \quad (7)$$

(1).(7)  $\sup. P$  ]

- 3  $\Delta(u \cup v) = \Delta u \cup \Delta v$  Distrib( $\Delta, \cup$ )  
 [ Df  $\lambda$   $\therefore \lambda(u \cup v) = q \wedge x \exists !, \text{mod}[(u \cup v) - x] = 0$  {  
 Distrib ' $\cup$ '  $\therefore$   $\lambda(u \cup v) = q \wedge x \exists !, [\text{mod}(u - x) \cup \text{mod}(v - x)] = 0$  {  
 §Q 13.8  $\therefore$   $\lambda(u \cup v) = q \wedge x \exists !, \text{mod}(u - x) = 0 \cup \text{mod}(v - x) = 0$  {  
 Df  $\lambda$   $\therefore$   $\lambda(u \cup v) = \lambda u \cup \lambda v$  ]

- 31  $u \supset v \therefore \Delta u \supset \Delta v$   
 [ Hp  $\therefore v = u \cup v$  . P.3  $\therefore \Delta v = \Delta u \cup \Delta v$   $\therefore$  Ths ]

- 4  $\Delta(u \cap v) \supset \Delta u \cap \Delta v$   
 [  $u \cap v \supset u$  .  $u \cap v \supset v$  . P.31  $\therefore \lambda(u \cap v) \supset \lambda u$  .  $\lambda(u \cap v) \supset \lambda v$  . Cmp  $\therefore$  P ]

- 41  $\lambda u = u$  .  $\lambda v = v \therefore \lambda(u \cap v) = u \cap v$   
 [ Hp . P.4 . P.1  $\therefore \lambda(u \cap v) \supset u \cap v$  .  $u \cap v \supset \lambda(u \cap v)$   $\therefore$  Ths ]

- 5  $\text{I}'u = \text{I}'\lambda u = \max \Delta u : \text{I}_\mu = \text{I}_\lambda \lambda u = \min \Delta u$

- 6  $\text{I}'u \varepsilon q \therefore \text{I}'u = \max \lambda u : \text{I}_\mu \varepsilon q \therefore \text{I}_\mu = \min \lambda u$

- 7  $\Delta u = \lambda u \cup \text{I}'u \cup \text{I}_\mu$  Dfp  $\Delta$

Classe  $\Delta u$  es formato de classe  $\lambda u$ , et de  $\infty$  et de  $-\infty$ , quando illos es limite supero, aut infero, des  $u$ .

- 8  $\text{I}'u, \text{I}_\mu \varepsilon q \therefore \Delta u = \lambda u$

✱ 2.  $u, v \varepsilon \text{Cls}'q - \iota \wedge a \varepsilon q \therefore$

- 1  $\lambda(a + u) = a + \lambda u$   
 [  $x \varepsilon \lambda(a + u) \therefore \text{I}, \text{mod}(a + u - x) = 0 \therefore \text{I}, \text{mod}[u - (a - x)] = 0 \therefore$   
 $x - a \varepsilon \lambda u \therefore x \varepsilon a + \lambda u$  ]

- 11  $\lambda u + \lambda v \supset \lambda(u + v)$   
 [  $a = b + c$  .  $b \varepsilon \lambda u$  .  $c \varepsilon \lambda v \therefore \text{I}, \text{mod}(u - b) = 0$  .  $\text{I}, \text{mod}(v - c) = 0 \therefore$   
 $\text{I}, \text{mod}(u + v - b - c) = 0 \therefore \text{I}, \text{mod}(u + v - a) = 0 \therefore a \varepsilon \lambda(u + v)$  (1)  
 (1) . Elim( $b; c$ )  $\therefore$  P ]

- 12  $\lambda(u + v) = \lambda(\lambda u + \lambda v)$   
 [ P2.11 . P1.1 . Oper  $\lambda \therefore \lambda(\lambda u + \lambda v) \supset \lambda(u + v)$  .  $u + v \supset \lambda u + \lambda v \therefore$  P ]

- 13  $\text{I}'\text{mod } u, \text{I}'\text{mod } v \varepsilon Q \therefore \lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v$  Distrib( $\lambda, +$ )

- 2  $\lambda(a \times u) = a \times \lambda u$  •21  $\lambda u \times \lambda v \supset \lambda(u \times v)$

- 3  $m \varepsilon N_1 \therefore \lambda(u^m) = (\lambda u)^m$  Comm( $\lambda, \uparrow$ )

- 31  $m \varepsilon q$  .  $u \varepsilon \text{Cls}'Q \therefore$  Ths.3

- 32  $a \varepsilon Q \therefore \lambda(a \uparrow u) = a \uparrow (\lambda u)$

- 4  $\Delta(-u) = -\Delta u$  Comm( $\Delta, -$ )

$$\cdot 5 \quad 0 \neq \lambda u \text{ l'modu } \varepsilon Q \text{ } \supset \lambda / u = / \lambda u \quad \text{Comm}(\lambda, /)$$

$$\cdot 6 \quad \begin{aligned} \lambda N_0 &= N_0 \cup \iota \infty \text{ } . \lambda n = n \cup \iota \infty \cup \iota - \infty \text{ } . \\ \lambda R &= Q \cup \iota 0 \cup \iota \infty \text{ } . \lambda r = q \cup \iota \infty \cup \iota - \infty \text{ } . \\ \lambda / N_1 &= / N_1 \cup \iota 0 \text{ } . \lambda (/ N_1 + / N_1) = (/ N_1 + / N_1) \cup \iota 0 \end{aligned}$$

$$* \quad 3. \quad u \varepsilon \text{Cls}'q \text{ } \text{---} \iota \wedge \text{ } \supset: \quad \cdot 1 \quad \text{Num } u \varepsilon N_1 \text{ } \supset. \lambda u = u$$

$$\cdot 2 \quad a, b \varepsilon q \text{ } . a < b \text{ } \supset. \lambda(a \text{---} b) = a \text{---} b$$

$$\cdot 3 \quad a \varepsilon Q \text{---} \iota 1 \text{ } \supset. \lambda {}^a \text{Log } u = {}^a \text{Log } \lambda u$$

$$* \quad 4. \quad u, r \varepsilon \text{Cls}'q \text{ } \text{---} \iota \wedge \text{ } \supset.$$

$$\cdot 0 \quad \nabla u = x \exists [x \varepsilon \lambda(u \text{---} \iota x)] \quad \text{Df } \nabla$$

$$\cdot 01 \quad \delta u = q \wedge \nabla u = q \wedge x \exists \{ \lambda \text{ mod } [(u \text{---} \iota x) \text{---} x] = 0 \} \quad \text{Df } \delta$$

$\nabla u$ , «classe derivata de  $u$ » es classe de  $x$  que es prope alios  $u$ , id es de  $u$  diferente de  $x$ .  $\delta u$  indica valores finito in  $\nabla u$ .

$$\cdot 1 \quad u \supset r \text{ } \supset. \nabla u \supset \nabla r$$

$$\cdot 2 \quad \nabla(u \cup v) = \nabla u \cup \nabla v$$

$$\cdot 3 \quad \delta \delta u \supset \delta u$$

$$\cdot 4 \quad m \varepsilon N_1 \text{ } \supset. \delta^m u \supset \delta u$$

Classe derivata de derivata de  $u$  continere in derivata de  $u$ . Nota suo differentia de P1.2.

$$\cdot 5 \quad \nabla n = \pm \infty \text{ } . \nabla / N_1 = \iota 0$$

$$\nabla (/ N_1 + / N_1) = \iota 0 \cup / N_1 \text{ } . \nabla (/ N_1 - / N_1) = / N_1 \cup - / N_1 \cup \iota 0$$

$$\cdot 6 \quad a \varepsilon q \text{ } \supset. \delta(a + u) = a + \delta u$$

$$\cdot 7 \quad (u + \delta v) \cup (r + \delta u) \cup (\delta u + \delta r) \supset \delta(u + v)$$

$$\cdot 8 \quad \text{l'modu } u, \text{l'mod } r \varepsilon Q \text{ } \supset. \delta(u + r) = (u + \delta r) \cup (v + \delta u) \cup (\delta u + \delta v)$$

$$\cdot 9 \quad \lambda u = u \cup \nabla u \quad \text{Dfp}$$

$$* \quad 5. \quad \text{Hp P 4 } \supset.$$

$$\cdot 1 \quad \text{Num } u \varepsilon \text{infn } \supset. \nabla \nabla u : \text{Num } u \varepsilon N_1 \text{ } \supset. \nabla u = \wedge$$

$$\cdot 2 \quad \delta u \supset u \text{ } \supset. \text{Num } u \varepsilon N_0 \cup \iota \text{Num } N_0 \cup \iota \text{Num } Q$$

$$\cdot 3 \quad \delta u = u \text{ } \supset. \text{Num } u = \text{Num } Q$$

$$\cdot 4 \quad \iota \infty \wedge \delta u = \wedge \text{ } \supset. \text{Num } u \varepsilon N_0 \cup \iota \text{Num } N_0$$

$$\cdot 5 \quad \text{Num } \delta u = \text{Num } N_0 \text{ } \supset. \text{Num } u = \text{Num } N_0$$

{ G. CANTOR MA. a.1882 p.51; a.1884 p.485; AM. a.1883 p.374 }

Bibliographia: Vivanti Formulario 1895 p.71.

## § 22 Intv in ex am

\* 1.0 Intv =  $x\exists a(a,b)\exists(a,b\epsilon q . a < b . x = a \neg b)$  Df

« Intv », lege « intervallo » es omni objecto reductibile ad forma  $a \neg b$ , ubi  $a$  et  $b$  es quantitate determinato et finito, et  $a$  es minore de  $b$ . Notatione utile in calculo integrale.

$$1 \quad u \in \text{Intv} \supset u = l_u \neg l'u$$

$$2 \quad u \in \text{Intv} \supset \text{Long}u = l'u - l_u \quad \text{Df}$$

= amplitudo, longitudo, long-ore de  $u$ .

\* 2.  $u, v \in \text{Cls}'q \supset$   $0 \quad \text{in}u = q - \lambda(q-u) = u - \delta(q-u) \quad \text{Df}$   
 $\text{ex}u = \text{in}(q-u) = q - \lambda u \quad \text{am}u = q - \text{in}u - \text{ex}u = \lambda u \cap \lambda(q-u)$

$$1 \quad \text{in}u \supset u . \text{ex}u \supset -u . u \supset \text{in}u \cup \text{am}u . q-u \supset \text{ex}u \cup \text{am}u$$

$$2 \quad \text{in}u \cap \text{ex}u = \Lambda . \text{in}u \cap \text{am}u = \Lambda . \text{ex}u \cap \text{am}u = \Lambda .$$

$$q = \text{in}u \cup \text{ex}u \cup \text{am}u$$

$$3 \quad \text{in in } u = \text{in}u . \text{in ex}u = \text{ex}u . \text{am}u = \text{in am}u \cup \text{am am}u .$$

$$\text{am am}u = \text{am in}u \cup \text{am ex}u . \text{in}(u \cap \text{am}u) = \Lambda .$$

$$\text{ex am}u = \text{in}u \cup \text{ex}u . \text{ex in}u = q - (\text{in}u \cup \text{am in}u) .$$

$$\text{ex ex}u = q - (\text{ex}u \cup \text{am ex}u) . \text{in am in}u = \Lambda . \text{in am ex}u = \Lambda .$$

$$\text{in am am}u = \Lambda . \text{am am am}u = \text{am am}u .$$

$$\text{am am in}u = \text{am in}u . \text{am am ex}u = \text{am ex}u .$$

$$\text{am in am}u \supset \text{am am}u$$

$$4 \quad \text{in}(u \cap v) = \text{in}u \cap \text{in}v . \text{ex}(u \cap v) = \text{ex}u \cap \text{ex}v . \text{in}u \cup \text{in}v \supset$$

$$\text{in}(u \cup v) \supset \text{in}u \cup \text{in}v \cup \text{am}u \text{ am}v . \text{ex}u \cup \text{ex}v \supset$$

$$\text{ex}(u \cup v) \supset \text{ex}u \cup \text{ex}v \cup \text{am}u \text{ am}v . \text{in}u \text{ am}v \cup \text{in}v \text{ am}u \supset$$

$$\text{am}(u \cap v) \supset \text{in}u \text{ am}v \cup \text{in}v \text{ am}u \cup \text{am}u \text{ am}v . \text{ex}u \text{ am}v \cup$$

$$\text{ex}v \text{ am}u \supset \text{am}(u \cup v) \supset \text{ex}u \text{ am}v \cup \text{ex}v \text{ am}u \cup \text{am}u \text{ am}v .$$

$$\text{in}(\text{in}u \cup \text{in}v) = \text{in}u \cup \text{in}v . \text{in}(\text{am am}u \cup \text{am am}v) = \Lambda$$

[ Peano, Arithmetices principia, a.1889 ]

$\text{in}u$  es classe de numeros reale, vel de punctos, in  $u$ , (inter  $u$ , interno ad  $u$ , interiore ad  $u$ ).

$\text{ex}u$  indica punctos ex (extra, externo ad, exteriore ad)  $u$ .

$\text{am}u$  indica punctos am (circum), « frontièrè » (Jordan a.1893).

**am** es vocabulo de antiquo latino (Catone, ...).  $\supset$  L am-bo HI, am-plo A, am-puta A, amb-iguo A, amb-itione DR.

|| G amphi  $\supset$  amphi-theatro ADFHIR, amphi-bio, ...

|| D um. || ? S abhi, R oba.

## §23 prob (probabilitate)

$a, b, s \in \text{Cls} . \text{Nums} \in N_1 . \supset$

·0  $\text{prob}(a, s) = \text{Num}(a \cap s) / \text{Nums}$  Df

$a$  et  $s$  es classe; numero des  $s$  es finito. Tunc probabilitate de casu  $a$  inter casu  $s$  es ratione de numero des  $s$  que es  $a$  ad numero totale des  $s$ .

Objectos de classe  $s$  dicere « casus possibile »; objectos de classe  $a \cap s$  « casus favorable ».

In applicationes de probabilitate ad praxi, casus  $s$  es supposito possibile in gradu aequale.

Per exemplo, probabilitate que pila extracto ex urna, que contine  $m$  pila albo et  $n$  nigro, es albo, vale  $m/(m+n)$ . Nos suppone que pilas habe idem volumen pondere, forma...

·01  $a \supset s . \supset . \text{prob}(a, s) = \text{Num}a / \text{Nums}$  Dfp

Si classe  $a$  de  $P \cdot 0$  continere in  $s$ , Df sume forma plus simpliciter ·01.

·1  $\text{prob}(\bigwedge, s) = 0$  ·11  $\text{prob}(s, s) = 1$

·2  $\text{prob}(\neg a, s) = 1 - \text{prob}(a, s)$

·3  $a \cap b = \bigwedge . \supset . \text{prob}(a \cap b, s) = \text{prob}(a, s) + \text{prob}(b, s)$

[ Hp  $\supset . \text{Num}(a \cap b) = \text{Num}(a) + \text{Num}(b)$  . Oper Nums  $\supset . P$  ]

Si nos parti casus favorable  $a \cap b$  in duo classe  $a$  et  $b$ , probabilitate de  $a \cap b$  es summa de probabilitates de  $a$  et  $b$ . Ce  $P$  appellare « theorema de probabilitate totale ».

·4  $\text{prob}(a \cap b, s) = \text{prob}(a, s) \times \text{prob}(b, a \cap s)$

Probabilitate, dicto composito per  $\cap$ , que inter casus  $s$  se praesentat in idem tempore casus  $a$  et  $b$ , es producto de probabilitate que inter  $s$  occurre  $a$ , per probabilitate de casu  $b$  inter  $s$  que es  $a$ , id es, per probabilitate de  $b$ , quando nos sci que  $a$  es facto.

·5  $u, v \in \text{Cls} . \text{Num}u, \text{Num}v \in N_1 . a, b \in \text{Cls} . \supset . \text{prob}(a : b, u : v) = \text{prob}(a, u) \times \text{prob}(b, v)$

Probabilitate composito per  $:$ .

\* 2·1  $\text{prob}(2N, 1 \cdots 10) = 1/2$  .  $\text{prob}(3N, 1 \cdots 10) = 3/10$   
 $\text{prob}(3N, 1 \cdots 10 \cap 2N) = 1/5$  .  $\text{prob}(6N, 1 \cdots 10) = 1/10$

Probabilitate que uno numero inter numeros de 1 ad 10 es pari vale 1/2. Probabilitate que illo es multiplo de 3 vale 3/10. Probabilitate que illo es multiplo de 6 vale producto de probabilitate que illo es pari, per probabilitate que numero pari inter 1 et 10 es multiplo de 3.

$$\cdot 2 \quad n \in N_1 \cdot \supset.$$

$$\{\text{prob}[(1 \cdots n F 1 \cdots n) \text{rep} \wedge f \exists (x \in 1 \cdots n \cdot \supset_x \cdot f x = x), (1 \cdots n F 1 \cdots n) \text{rep}]\} \\ = \sum \{ (-1)^n / n! \mid n, 0 \cdots n \}$$

} MOIVRE *Misc. Anal.* a.1730 p.185 {

Probabilitate que in extractione de numeros  $1 \cdots n$ , nullo se praesenta in suo ordine.

$$\cdot 3 \quad m, n \in N_1 \cdot p \in 1 \cdots m \cdot q \in 1 \cdots n \cdot a, b \in \text{Cls} \cdot \text{Num} a = m \cdot \text{Num} b = n \\ a \wedge b = \bigwedge \cdot \supset. \text{prob}[\text{Cls}'(a \wedge b) \wedge u \exists (\text{Num} u \wedge a = p \cdot \text{Num} u \wedge b = q), \\ \text{Num} \text{Cls}'(a \wedge b) \wedge u \exists (\text{Num} u = p + q)] \\ = C(m, p) \times C(n, q) / C(m + n, p + q) \\ = m! n! / (p + q)! (m + n - p - q)! [(m + n)! p! q! (m - p)! (n - q)!]$$

Urna contine pilas de specie  $a$ , lege albo, in numero de  $m$ , et pilas  $b$ , lege nigro, in numero de  $n$ . Nos extrahe combinatione de  $p + q$  pila. Formula da probabilitate que combinatione extracto contine  $p$  pila albo et  $q$  nigro.

$$\cdot 4 \quad s \in \text{Cls} \cdot \text{Num} s \in N_1 \cdot a \in \text{Cls} \cdot m \in N_1 \cdot n \in 1 \cdots m \cdot \supset. \text{prob}[s F 1 \cdots m \wedge \\ u \exists [\text{Num} 1 \cdots m \wedge x \exists (u \wedge x a) = n], s F 1 \cdots m] = \\ C(m, n) \text{prob}(a, s)^n \text{prob}(\neg a, s)^{m-n}$$

Si  $s$  es casus possibile,  $a$  es casus favorable, formula da probabilitate que in repetitione de  $m$  vice de experimento,  $n$  vice illo es favorable.

## §24 Cx

$$\ast \quad 1 \cdot 0 \quad n \in N_1 \cdot \supset. \text{Cx } n = q F 1 \cdots n$$

Df

Nos voca « numero complexo de ordine  $n$  » et indica per  $\text{Cx} n$ , complexo de  $n$  numero reale.

$$n \in N_1 \cdot a, b, c \in \text{Cx} n \cdot h, k \in q \cdot \supset.:$$

$$\cdot 1 \quad a = b \quad \text{def} \quad r \in 1 \cdots n \cdot \supset_r \cdot a_r = b_r \quad [ \text{III } \S 4 F P 1 \cdot 6 \cdot \supset. P ]$$

Duo complexo es aequale quando habe elementos correspondente aequale.

$$\cdot 2 \quad a + b = r \text{ Cx} n \wedge x \exists (r \in 1 \cdots n \cdot \supset_r \cdot x_r = a_r + b_r) \\ = [(a_r + b_r) | r, 1 \cdots n]$$

Df

Summa de duo complexo es complexo que habe ut elementos summa de elementos correspondente.

$$\cdot 3 \quad 0 = (r 0 : 1 \cdots n)$$

Df

Df de complexo nullo.

$$\cdot 4 \quad -a = \text{Cxn} \wedge x \exists (a+x=0) = (-a_r | r, 1 \dots n) \quad \text{Df}$$

$$\cdot 5 \quad a-b = a+(-b) \quad \text{Df}$$

$$\cdot 6 \quad ha = \text{Cxn} \wedge x \exists (r \in 1 \dots n \supset x_r = ha_r) \\ = (ha_r | r, 1 \dots n) \quad \text{Df}$$

$$\cdot 7 \quad a+b = b+a \quad . \quad a+(b+c) = (a+b)+c = a+b+c \quad . \\ a+0 = a \quad . \quad -0 = 0 \quad . \quad a-a = 0 \quad . \\ ha \in \text{Cxn} \quad . \quad 1a = a \quad . \quad h(a+b) = ha+hb \quad . \\ (h+k)a = ha+ka \quad . \quad h(ka) = (hk)a = hka$$

\* 2. unit

$$n \in \mathbb{N}_1, r \in 1 \dots n \supset$$

$$\cdot 0 \quad \text{unit}(n, r) = \text{Cxn} \wedge x \exists (x_r = 1 : s \in (1 \dots n) - r \supset x_s = 0) \quad \text{Df} \\ a, b \in \text{Cxn} \cdot h \in q \supset$$

$$\cdot 01 \quad \text{unit}(n, r) = \{E[(r+s+1)/n] - E[(r+s)/n] | s, 1 \dots n\}$$

$$\cdot 1 \quad a = \sum [a_s \text{unit}(n, s) | s, 1 \dots n]$$

$$\cdot 2 \quad a+b = \sum [(a_s+b_s) \text{unit}(n, s) | s, 1 \dots n]$$

$$\cdot 3 \quad ha = \sum [(ha_s) \text{unit}(n, s) | s, 1 \dots n]$$

«unit( $n, r$ )», «unitate de ordine  $n$  et de loco  $r$ », «Haupteinheit», es complejo, que habe 1 ut elemento de loco  $r$ , et omni alio nullo.

$$\text{mod} \quad * \quad 3. \quad n \in \mathbb{N}_1, x, y \in \text{Cxn} \cdot a \in q \supset$$

$$\cdot 0 \quad \text{mod} x = \sqrt{[\sum (x_r^2 | r, 1 \dots n)]} \quad \text{Df}$$

$$\cdot 1 \quad \text{mod} x \in \mathbb{Q}_0$$

$$\cdot 2 \quad \text{mod}(x+y) \leq \text{mod} x + \text{mod} y$$

$$[\S 29 \cdot 1 \supset (x_1^2 + x_2^2 + \dots)(y_1^2 + y_2^2 + \dots) \leq (x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots)^2]$$

$$\text{P} \cdot 0 \supset \text{mod} x \text{ mod} y \leq x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots$$

$$\supset (\text{mod} x)^2 + (\text{mod} y)^2 + 2 \text{mod} x \text{ mod} y \leq (x_1 + y_1)^2 + (x_2 + y_2)^2 + \dots$$

$$\supset (\text{mod} x + \text{mod} y)^2 \leq [\text{mod}(x+y)]^2 \supset \text{Ths}]$$

$$\cdot 3 \quad \text{mod}(ax) = \text{mod} a \text{ mod} x \quad \cdot 4 \quad \text{mod} x = 0 \implies x = 0$$

1 δ \* 4. (Cxn | q) §1 §8

$$\cdot 0 \quad u \in \text{Cls}' \text{Cxn} \supset Au = \lambda u \vee (u \in \wedge u' \text{ mod} u) \quad \text{Df}$$

$$Au = \delta u \vee (u \in \wedge u' \text{ mod} u) \quad \text{Df}$$

$$\text{Med} \quad * \quad 5 \cdot 0 \quad n \in \mathbb{N}_1, u \in \text{Cls}' \text{Cxn} \supset \text{Med} u = \text{Cxn} \wedge x \exists$$

$$[a \in \text{Cxn} \supset \sum (a_r x_r | r, 1 \dots n) \in \text{Med} | \sum (a_r x_r | r, 1 \dots n) | x' u] \quad \text{Df}$$

$$\S \text{Med P1} \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 6$$

Nos dice que classe  $u$  es *mediana*, si  $\text{Med} u = u$ .



## §25 Dtrm (determinante)

\* 1.0  $m \in N_1, u \in (1 \cdots m F 1 \cdots m) \text{rcp} \supset$

$$\text{sgn} u = (-1)^{\uparrow \text{Num}[(x;y) \exists (x,y \in 1 \cdots m . x < y . ux > uy)]} \quad \text{Df}$$

01  $m \in N_1, u, v \in (1 \cdots m F 1 \cdots m) \text{rcp} \supset \text{sgn} uv = (\text{sgn} u) \times (\text{sgn} v)$

Si  $u$  es correspondentia reciproco, vel permutatione, de numeros  $1 \cdots m$ ,  $\text{sgn} u$  indica unitate positivo aut negativo, secundo que numero de ambos  $(x;y)$  que forma inversione, es pari aut impari.

1  $m \in N_1, a \in qF(1 \cdots m : 1 \cdots m) \supset$

$$\text{Dtrm} a = \sum \{ \text{sgn} u \prod [a(r, u_r) | r, 1 \cdots m] | u, (1 \cdots m F 1 \cdots m) \text{rcp} \} \quad \text{Df}$$

} LEIBNIZ a.1678 MathS. t.7 p.5 :

« Inveni Canonem pro tollendis incognitis quocunque aequationes non nisi simplici gradu ingredientibus... Fiant omnes combinationes possibiles literarum coefficientium, ita ut nunquam concurrant plures coefficientes ejusdem incognitae et ejusdem aequationis. Hae combinationes affectae signis, ut mox sequetur, componantur simul... Lex signorum haec est. Uni ex combinationibus assignetur signum pro arbitrio, et caeterae combinationes quae ab hac differunt coefficientibus duabus, quatuor, sex etc., habebunt signum oppositum ipsius signo; quae vero ab hac differunt coefficientibus tribus, quinque, septem etc., habebunt signum idem cum ipsius signo » . !

$m$  es numero, et  $a$  es litera, que cum duo indice integro inter 1 et  $m$ , repraesenta quantitate.

Plure A. scribe valores de  $a$  super  $m$  linea horizontale et  $m$  verticale, et appella « matrice » ce figura.

Si  $u$  es permutatione de numeros  $1 \cdots m$ , nos considera producto de valores  $a(r, u_r)$ , ubi  $r$  varia de 1 ad  $m$ , et multiplica illo per  $\text{sgn} u$ , id es per unitate positivo aut negativo, secundo que permutatione  $u$  habe numero pari aut impari de inversiones. Summa de productos, que resulta, si nos substitue  $u$  per omni permutatione de numeros de 1 ad  $m$ , vocare « determinante des  $a$  » (Gauss), que nos abbrevia in  $\text{Dtrm} a$ .

\* 2.  $m \in N_1, a \in qF(1 \cdots m : 1 \cdots m) \supset$

$$1 \quad \text{Dtrm}[a(r,s) | (s,r)] = \text{Dtrm} a$$

$$2 \quad u \in (1 \cdots m F 1 \cdots m) \text{rcp} \supset$$

$$\text{Dtrm} a(r, u_r) | (r,s) = \text{sgn} u \times \text{Dtrm} a$$

$$3 \quad n \in N_1, u, v \in \text{Cls}' N_1, \text{Num} u = \text{Num} v = n, a \in qf(u:v) \supset$$

$$\text{Dtrm}(a, u:v) = \text{Dtrm} \{ a(\min_r u, \min_s v) | (r,s), 1 \cdots n : 1 \cdots n \} \quad \text{Df}$$

$\text{Dtrm}(a, u:v)$ , es dicto « subdeterminante, determinante partiale, complementare ».

$$\begin{aligned} & \cdot 4 \quad n \in N_1, a \in qF(1^{...n} : 1^{...n}), r \in 1^{...n} \supset \\ & \quad \text{Dtrma} = \sum [(-1)^{r+s} a_{r,s} \text{Dtrm}(a, 1^{...n} - r : 1^{...n} - s) | s, 1^{...n}] \\ & \quad \quad \quad \{ \text{CRAMER a.1750 p.656 } \} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \cdot 5 \quad n \in N_1, a \in qF(1^{...n} : 1^{...n}), u \in \text{Cls}' 1^{...n}, v \in u \supset \\ & \quad \text{Dtrma} = \sum \{ (-1)^{\sum u + \sum v} \times \text{Dtrm}(a, u : v) \times \text{Dtrm}(a, 1^{...n} - u : \\ & \quad \quad \quad 1^{...n} - v) | v, (\text{Cls}' 1^{...n}) \cap v \exists (\text{Num } v = \text{Num } u) \} \\ & \quad \quad \quad \{ \text{LAPLACE ParisM. a.1772 p.267 } \} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \cdot 6 \quad \text{Hp}^3 \supset. \text{Dtrm}[(-1)^{r+s} \text{Dtrm}(a, 1^{...m} - r : 1^{...m} - s) | (r, s), \\ & \quad \quad \quad 1^{...m} : 1^{...m}] = (\text{Dtrma}) \prod (m-1) \\ & \quad \quad \quad \{ \text{CAUCHY JP. a.1812 p.82 } \} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \cdot 7 \quad n \in N_1, a \in qf(1^{...n} : 1^{...n}) \supset \\ & \quad \text{mod Dtrma} \leq \sqrt[n]{H[\sum (a_{r,s}^2 | s, 1^{...n}) | r, 1^{...n}]} \end{aligned}$$

$$\cdot 8 \quad \text{mod Dtrm}(a, 1^{...n} : 1^{...n}) \leq [\max \text{mod } a'(1^{...n} : 1^{...n})]^n n!^{n/2}$$

$$\begin{aligned} * \quad & 3 \cdot 1 \quad m \in N_1, a, b \in qF(1^{...m} : 1^{...m}) \supset \\ & \quad \text{Dtrma} \times \text{Dtrmb} = \text{Dtrm}[\sum (a_{r,t} b_{s,t} | t, 1^{...m}) | (r, s), 1^{...m} : 1^{...m}] \\ & \cdot 2 \quad m, n \in N_1, m > n, a, b \in qf(1^{...m} : 1^{...n}) \supset \\ & \quad \text{Dtrm}[\sum (a_{r,t} b_{s,t} | t, 1^{...m}) | (r, s), 1^{...n} : 1^{...n}] = \\ & \quad \sum \{ \text{Dtrm}(a, v : 1^{...n}) \times \text{Dtrm}(b, v : 1^{...n}) | v, (\text{Cls}' 1^{...m}) \cap v \exists (\text{Num } v = n) \} \\ & \quad \quad \quad \{ \text{BINET a.1813 p.287 } : \end{aligned}$$

« ... Avec des  $x', x'', x'''$ , &c.;  $y', y'', y'''$ , &c.,  $z', z'', z'''$ , &c., ayant formé  $n \frac{n-1}{2} \frac{n-2}{3}$  résultantes à trois lettres, et aussi d'autres résultantes avec des  $\xi, v, \zeta$ , semblablement accentués, on trouve que la somme des produits des résultantes correspondantes...

$$\begin{aligned} \Sigma(x, y', z'')(\xi, v', \zeta'') &= \Sigma x \xi \Sigma y v \Sigma z \zeta + \Sigma y \xi \Sigma z v \Sigma x \zeta + \Sigma z \xi \Sigma x v \Sigma y \zeta \\ &\quad - \Sigma x \xi \Sigma y v \Sigma z \zeta - \Sigma y \xi \Sigma x v \Sigma z \zeta - \Sigma z \xi \Sigma y v \Sigma x \zeta \end{aligned}$$

Ce dernier membre est de la forme  $(x, y', z'')$ ; on en peut donc conclure que le produit d'un nombre quelconque de fonctions, telles que  $\Sigma(x, y', z'')(\xi, v', \zeta'')$  est de la forme  $(x, y', z'')$ . »

$$\begin{aligned} & \cdot 3 \quad m, n \in N_1, m < n, a, b \in qf(1^{...m} : 1^{...n}) \supset \\ & \quad \text{Dtrm}[\sum (a_{r,t} b_{s,t} | t, 1^{...m}) | (r, s), 1^{...n} : 1^{...n}] = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} * \quad & 4 \cdot 1 \quad m \in N_1 + 1, a \in qf 1^{...m} \supset \\ & \quad \text{Dtrm}[a, {}^{m-1} | (r, s), 1^{...m} : 1^{...m}] = \prod \{ H[(a_r - a_s) | s, 1^{...(r-1)}] | r, 2^{...m} \} \\ & \quad \quad \quad \{ \text{VANDERMONDE ParisM. a.1772 p.518; CAUCHY a.1821 p.426 } \} \end{aligned}$$

$$\cdot 2 \quad m \in N_1 + 1 \cdot \supset \cdot \text{Dtrm}[r^*](r, s), 1 \cdots m : 1 \cdots m] = \Pi(r! | r, 1 \cdots m)$$

$$\cdot 3 \quad \text{Hp} \cdot 1 \cdot \supset \cdot \text{Dtrm}[\Sigma(a, N_1 \wedge r/N_1 \wedge s/N_1)] |(r, s), 1 \cdots m : 1 \cdots m| \\ = \Pi(a, 1 \cdots m) \quad \} \text{MANSION CorrN. t.4 a.1878 p.109} \cdot$$

$$\text{Dvr mlt } \Phi \quad * \quad 5. \quad m \in N_1 + 1 \cdot \supset \cdot$$

$$\cdot 1 \quad \text{Dtrm}(\text{Dvr}, 1 \cdots m : 1 \cdots m) = \Pi(\Phi, 1 \cdots m) \\ \hline = m! \Pi(1 - 1/p) \Pi(E(m/p) | p, Np \wedge 1 \cdots m) \\ \} \text{SMITH a.1876 t.2 p.161} \cdot$$

« Let  $(m, n)$  denote the greatest common divisor of the integral numbers  $m$  and  $n$ ; and let  $\psi(m)$  be the number of numbers not surpassing  $m$  and prime to  $m$ ; the symmetrical determinant...

$$\begin{array}{c} \Sigma \pm (1, 1) (2, 2) \dots (m, m) \\ s \text{ equal to } \psi 1 \times \psi 2 \times \dots \times \psi(m). \cdot \end{array}$$

$$\cdot 2 \quad \text{Dtrm}(\text{mlt}, 1 \cdots m : 1 \cdots m) = m! \Pi[(1 - 1/p) \Pi(E(m/p) | p, Np \wedge 1 \cdots m)] \\ \} \text{SMITH a.1876 t.2 p.163} \cdot$$

Vide alios propositiones super Dtrm, in Formul. t. 4, p. 207.

### §26 lin Subst Sb

$$\begin{array}{l} * \quad 1. \quad m, n \in N_1 \cdot \supset \cdot \quad \cdot 0 \quad (Cxm \text{ F } Cxn) \text{lin} = \\ (Cxm \text{ F } Cxn) \wedge f \exists [x, y \in Cxn \cdot \supset_{x, y} \cdot f(x + y) = f x + f y : \\ l' \text{ mod } f' (Cxn \wedge u \exists (\text{modu} < 1)) \in Q \end{array} \quad \text{Df}$$

$$\cdot 01 \quad \text{SubstCxn} = (Cxn \text{ F } Cxn) \text{lin} \quad \text{Df}$$

Nos dic que aliquo complexo de ordine  $m$ , functione de complexos de ordine  $n$ , es functione lineare, si functione de summa es summa de functiones. Nos adde conditione que limite supero de valores absoluto de functione in campo finito es finito, pro deduce P.11.

« Substitutione de complexos de ordine  $n$  », breviato in « SubstCxn », vale Cxn functione lineare des Cxn.

Functiones lineare, et substitutiones occurre in:

Gauss a. 1801 t.1 p. 302

Servois Ann. a.1815 p.93, sub nomen: functiones distributivo.

Boole, Cambridge Math. Journal a. 1841 t.3 p.1, 106.

Grassmann a.1844, Werke t.2 p.241.

Cayley a. 1845, Math. Papers t.1

Laguerre a. 1867, OEuvres t.1 p. 221-266.

Peirce, John Hopkins Circular, Baltimore a.1882 N.22.

$f, g, h \in (Cxm \text{ F } Cxn) \text{ lin} \quad \supset$ :

\*1  $x, y \in Cxn \quad \supset \quad f(x+y) = fx + fy$

\*11  $h \in Q \quad \supset \quad f h x = h f x \quad [ \text{§q(III §13) P13.3} \quad \supset \quad P ]$

\*2  $f + g = [(fx + gx) | x, Cxn] \quad \text{Df}$

\*21  $f + g \in (Cxm \text{ F } Cxn) \text{ lin}$

[ Hp.  $x, y \in Cxm \quad \supset \quad (f+g)(x+y) = f(x+y) + g(x+y) = fx + fy + gx + gy = fx + gx + fy + gy = (f+g)x + (f+g)y \quad ]$

\*22  $f + g = g + f$

\*23  $(f+g) + h = f + (g+h) = f + g + h$

Summa de functiones lineare es commutativo et associativo.

$m, n, p \in N_1 \quad . \quad f, f' \in (Cxm \text{ F } Cxn) \text{ lin} \quad . \quad g, g' \in (Cxp \text{ F } Cxm) \text{ lin} \quad . \quad h \in Q \quad \supset$ .

\*3  $gf = [gf x | x, Cxn] \quad \text{Df}$

\*31  $gf \in (Cxp \text{ F } Cxn) \text{ lin}$

[ Hp.  $x, y \in Cxn \quad . \quad \text{§f P2.2} \quad \supset \quad (gf)(x+y) = g[f(x+y)] = g(fx + fy) = g(fx) + g(fy) = (gf)x + (gf)y \quad ]$

\*32  $g(f+f') = gf + gf' \quad . \quad (g+g')f = gf + g'f$

Producto de functiones lineare es distributivo et associativo, sed non commutativo in generale.

\*4  $k = (k \times, Cxn) \quad \text{Df}$

\*41  $k \in \text{Subst } Cx n \quad . \quad f k = k f$

Multiplicatione per numero reale es functione lineare.

\*5  $a \in \text{Subst } n \quad \supset \quad a^m \in \text{Subst } n$

\*6  $p \in N_1 \quad . \quad a \in Cxn \text{ F } 1 \cdots p \quad . \quad \neg \exists Cxp \neg 0 \wedge x \exists [ \sum (x_r a_r | r, 1 \cdots n) = 0 ]$   
 $. \quad b \in Cxm \text{ F } 1 \cdots p \quad \supset \quad b/a = \iota [ Cxm \text{ F } \sum (qa, 1 \cdots p) ] \text{ lin} \wedge$   
 $f \exists [ r \in 1 \cdots p \quad \supset \quad f a_r = b_r ] \quad \text{Df}$

Si  $a$  et  $b$  es successione de  $p$  complexo de respectivo ordine  $n$  et  $m$ , tunc  $b/a$  indica illo correspondentia lineare inter complexos de ordine  $m$  et complexos de systema  $qa_1 + qa_2 + \dots + qa_p$ , tale que ad  $a_1, a_2, \dots, a_p$  responde  $b_1, b_2, \dots, b_p$ . Nos suppose que complexos  $a$  es independente, id es que non existe successione de numeros  $x_1, x_2, \dots, x_p$ , non omni nullo, que redde  $x_1 a_1 + x_2 a_2 + \dots + x_p a_p = 0$ .

mod Subst

\* 2.  $n \in N_1 \quad . \quad a, b \in \text{Subst } Cx n \quad . \quad x \in Cx n \quad . \quad k \in Q \quad \supset$ .

\*0  $\text{mod } a = \max [ ( \text{mod } ax ) / ( \text{mod } x ) ] | x \in ( Cxn \neg 0 ) \quad \{ \quad \text{Df}$

·1  $\text{moda} \varepsilon Q_0$

[  $x \varepsilon Cx_n \rightarrow 0, y = x/\text{mod}x \rightarrow$

$y \varepsilon Cx_n, \text{mod}y = 1, (\text{mod}ax)/\text{mod}x = (\text{mod}ay)/\text{mod}y \rightarrow$

$(\text{mod}ax)/\text{mod}x \mid x \mid (Cx_n \rightarrow 0) = (\text{mod}ax)/\text{mod}x \mid x \mid [Cx_n \wedge y \varepsilon (\text{mod}y = 1)]$  (1)

$[(\text{mod}ax)/\text{mod}x] \mid x \varepsilon Q_0 \mid [Cx_n \wedge y \varepsilon (\text{mod}y = 1)] \text{cont}$  (2)

(2) . §cont 1·3 . (1) . P·0  $\rightarrow$  P ]

·11  $\text{mod}ax \leq \text{mod}a \text{mod}x$

[P·0 . P·1  $\rightarrow$  P]

·12  $\text{mod}a = 0 \Rightarrow a = 0$

·2  $\text{mod}(a+b) \leq \text{mod}a + \text{mod}b$

[ Hp .  $x \varepsilon Cx_n$  . P2·1  $\rightarrow$   $\text{mod}(a+b)x = \text{mod}(ax+bx)$

----- . §cx 3·2  $\rightarrow$  -----  $\leq \text{mod}ax + \text{mod}bx$

----- . P·11  $\rightarrow$  -----  $\leq \text{mod}a \text{mod}x + \text{mod}b \text{mod}x$

$\leq (\text{mod}a + \text{mod}b) \text{mod}x$  (1)

Hp . (1)  $\rightarrow$   $x \varepsilon Cx_n \rightarrow$   $[\text{mod}(a+b)x]/\text{mod}x \leq \text{mod}a + \text{mod}b$  (2)

(2) . P·0  $\rightarrow$  P ]

·21  $\text{mod}(ka) = k \text{mod}a$

·3  $\text{mod}(ab) \leq \text{mod}a \text{mod}b$

[ Hp .  $x \varepsilon Cx_n$  . P·1  $\rightarrow$

$\text{mod}[(ab)x] = \text{mod}[a(bx)] \leq \text{mod}a \text{mod}bx \leq \text{mod}a \text{mod}b \text{mod}x$

Hp :  $x \varepsilon Cx_n \rightarrow$   $[\text{mod}(ab)x]/\text{mod}x \leq \text{mod}a \text{mod}b : \text{P·0} \rightarrow$  P ]

·4  $m \varepsilon N_1 \rightarrow \text{mod}(a^m) \leq (\text{mod}a)^m$

[ P·3  $\rightarrow$  P ]

Sb \* 3.  $n \varepsilon N_1, u, r \varepsilon qF(1 \cdots n : 1 \cdots n) \rightarrow$

·0  $\text{Sbu} = \{ [\Sigma(u_r, s x_s \mid s, 1 \cdots n) \mid r, 1 \cdots n] \mid x, Cx_n \}$

Df

Si  $u$  es matrice quadro de ordine  $n$ ,  $\text{Sbu}$  substitutione repraesentato per matrice  $u$  indica operatione que, ad complexo  $x$  fac corresponde complexo que habe, ut elemento de loco  $r$ ,  $\Sigma(u_r, s x_s \mid s, 1 \cdots n)$ .

·01  $x \varepsilon Cx_n \rightarrow (\text{Sbu})x = \{ [\Sigma(u_r, s x_s \mid s, 1 \cdots n) \mid r, 1 \cdots n] \}$

·1  $\text{Sbu} \varepsilon \text{Subst}Cx_n$

·2  $\text{Sbu} + \text{Sbv} = \text{Sb}(u+v)$

·3  $(\text{Sbv})(\text{Sbu}) = \text{Sb}[\Sigma(v_{r,q} u_{qs} \mid q, 1 \cdots n) \mid (r,s), 1 \cdots n : 1 \cdots n]$

·4  $a \varepsilon \text{Subst}Cx_n \rightarrow a = \text{Sb}^1 [a \text{unit}(n,s)]_r \mid (r,s), 1 \cdots n : 1 \cdots n \}$

Dtrm \* 4.  $n \varepsilon N_1, a, b \varepsilon \text{Subst}Cx_n, u \varepsilon qF(1 \cdots n : 1 \cdots n) \rightarrow$

·0  $\text{Dtrma} = \text{Dtrm}^1 [a \text{unit}(n,s)]_r \mid (r,s), 1 \cdots n : 1 \cdots n \}$

Df

- 01  $\text{Dtrm } a \neq 0 \supset a \in (\text{SubstCxn})_{\text{rcp}}$   
 ·02  $x \in \text{Cxn} \neq 0 \cdot ax = 0 \supset \text{Dtrm } a = 0$   
 ·03  $\text{Dtrm } a = 0 \implies \exists \text{Cxn} \neq 0 \wedge xz(ax = 0)$   
 ·04  $h \in q \cdot x \in \text{Cxn} \neq 0 \cdot ax = hx \supset \text{Dtrm}(a-h) = 0$   
 ·1  $\text{Dtrm}(ab) = \text{Dtrm } a \text{ Dtrm } b$   
 ·11  $m \in \mathbb{N}_1 \supset \text{Dtrm}(a^m) = (\text{Dtrm } a)^m$   
 ·2  $\text{Dtrm } a \neq 0 \supset a^{-1} = /a = \text{SubstCxn} \wedge xz(ax = 1) \quad \text{Df}$   
 ·3  $\text{Dtrm } \text{Sbu} = \text{Dtrm } u$   
 ·4  $(\text{Sbu})^{-1} =$   
 $\text{Sb} \{ (-1)^{r+s} \text{Dtrm}[u, 1^{r-1} \dots n-1 : 1^{r-1} \dots n-s] \mid (r,s), 1^{r-1} \dots n : 1^{r-1} \dots n \} / \text{Dtrm } u$   
 ·5  $\text{Dtrm } u \neq 0 \cdot y \in \text{Cxn} \supset x \in \text{Cxn} \cdot (\text{Sbu})x = y \implies x = (\text{Sbu})^{-1}y$

\* 5.  $n \in \mathbb{N}_1 \cdot a, b \in \text{SubstCxn} \supset$

·0  $r \in 1^{r-1} \dots n \supset$   
 $\text{Invar}_r a = \Sigma [\text{Dtrm}(a, u^r) \mid u, (\text{Cls}' 1^{r-1} \dots n) \wedge u \exists (\text{Num } u = r)] \quad \text{Df}$   
 « Invariante de gradu  $r$  de substitutione  $a$  ».

·01  $\text{Invar}_r a = \text{Invar}_r a$

Nos tace indice 1.

·1  $\text{Invar}_r a = \text{Dtrm } a$

·2  $h \in q \supset \text{Invar}_r(ha) = h^r \text{Invar}_r a$ .

Dice que  $\text{Invar}_r$  de substitutione es functio homogeneo de gradu  $r$  de coefficientes de  $a$ .

·3  $\text{Invar}(a+b) = \text{Invar}_r a + \text{Invar}_r b$

·4  $a^n + \Sigma (-1)^r (\text{Invar}_r a) a^{n-r} \mid r, 1^{r-1} \dots n \} = 0$

$\} \text{CAYLEY London T. a.1858; Papers t.2 p.475}$

Dem: Laguerre JP. t.25 a.1867 p.215, Frobenius JfM. t.84 a.1878 p.1, Berlin Ber. a.1896 p.601.

Aequatio algebrico ad que satisfac Subst  $a$  dicere aequatio characteristico (Cauchy, Frobenius), aequatio latente (Sylvester).

·41  $h \in q \supset \text{Dtrm}(a+h) = h^n + \Sigma [(\text{Invar}_r a) h^{n-r} \mid r, 1^{r-1} \dots n]$

·5  $u \in q \text{f}(1^{r-1} \dots n : 1^{r-1} \dots n) : r, s \in 1^{r-1} \dots n \supset r, s. u_{r,s} = u_{s,r} \supset$

$\exists (q \text{f } 1^{r-1} \dots n) \wedge xz \{ h \in q \supset h. \text{Dtrm}(\text{Sbu} - h) = \Pi [(x_r - h) \mid r, 1^{r-1} \dots n] \}$

$\} \text{LAGRANGE Berlin M. a.1773 p.108, pro } n=3;$

Dem. CAUCHY Exerc. a.1829 t.4 p.140. Oeuvres s.2 t.9 p.174.

Si matrice  $u$  es « symmetrico », aequatio characteristico

$$\text{Dtrm } \text{Sbu} - h = 0$$

habe omni radice reale.

§27  $i$  (unitate imaginario)  $q'$  (numero imaginario)

$$\ast \quad 1.0 \quad i = \text{Sb}[(0, -1), (1, 0)] \quad \text{Df}$$

$$\cdot 01 \quad q' = q + iq \quad \text{Df}$$

$$\cdot 1 \quad u, v \in q \quad \supset \quad i(u, v) = (-v, u)$$

$$\cdot 2 \quad i^2 = -1$$

$$\cdot 3 \quad \text{mod } i = 1 \quad . \quad \text{Inv}_i i = 0 \quad . \quad \text{Dtrm } i = 1$$

$$\cdot 4 \quad x, y, u, v \in q \quad \supset \quad (x + iy)(u, v) = (xu - yv, xv + yu)$$

$$\cdot 5 \quad x, y \in q \quad \supset \quad \text{mod}(x + iy) = \sqrt{x^2 + y^2} \quad . \quad \text{Inv}_i(x + iy) = 2x \\ \text{Dtrm}(x + iy) = x^2 + y^2$$

$$\cdot 6 \quad x, y, x', y' \in q \quad . \quad x + iy = x' + iy' \quad \supset \quad x = x' \quad . \quad y = y'$$

$$[ \quad x + iy = x' + iy' \quad \supset \quad x - x' = i(y' - y) \quad \supset \quad (x - x')^2 = -(y' - y)^2 \quad \supset \quad \\ (x - x')^2 + (y - y')^2 = 0 \quad \supset \quad x = x' \quad . \quad y = y' \quad ]$$

$$(q' \mid n) \text{ III } \S 6 \text{ n P } 5 \cdots 26 \quad (q' \mid r) \S 9 \text{ r P } 2 \cdots 4$$

Unitate imaginario es substitutio repraesentato per matrice

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Unitate imaginario, « più di meno » de Bombelli a.1579, es indicato per «  $i$  ». (Euler in Memoria praesentato ad Petr.A. a.1777, et publicato in Calc. Integr. a.1794 t.4 p.184).

$q'$  « numero imaginario » (Cauchy), es omni Substitutione de forma  $x + iy$ , ubi  $x, y \in q$ , et  $i$  habe valore explicato.

Gauss a.1831 t.2 p.102 muta nomen in « numero complexo »; quod producit ambiguitate cum Cx2.

Super alias definitione de numero imaginario, vide meo articulo: « Principio de permanentia » in RdM t.8. p. 84, et Form. t.4 p.219.

real imag K

$$\ast \quad 2. \quad a, b \in q' \quad . \quad x, y \in q \quad \supset$$

$$\cdot 0 \quad \text{real } a = r q \wedge x3(a - r \varepsilon i q) \quad \text{Df}$$

$$\text{imag } a = r q \wedge y3(a - iy \varepsilon q) = (a - \text{real } a)/i \quad \text{Df}$$

$$K a = \text{real } a - i \text{imag } a = 2 \text{real } a - a \quad \text{Df}$$

« real » = parte reale, occorre in quaterniones de Hamilton sub forma S=scalare, et in Weierstrass sub forma R.

« imag » = coefficiente de parte imaginario.

« K » = conjugato (Cauchy a.1821).  
= conjuncto (Gauss a.1831 t.2 p.102).

$$^1 \text{ real}(x+iy) = x \quad \text{imag}(x+iy) = y \quad K(x+iy) = x-iy$$

$$^2 a = \text{real}a + i \text{ imag}a \\ \text{real}a = (a + Ka)/2 \quad \text{imag}a = (a - Ka)/(2i) \quad \text{Dfp}$$

$$^3 \text{ real}(a+b) = \text{real}a + \text{real}b \quad \text{imag}(a+b) = \text{imag}a + \text{imag}b \\ K(a+b) = Ka + Kb$$

$$^4 \text{ real}ia = -\text{imag}a \quad \text{imag}ia = \text{real}a \quad Kia = -iKa$$

$$^5 \text{mod}a = \sqrt{[(\text{real}a)^2 + (\text{imag}a)^2]}$$

$$^6 \text{Inv}a = \text{real}a \quad \text{Dtr}ma = \text{mod}a^2 = a \times Ka$$

$$^7 \text{mod}ab = \text{mod}a \text{mod}b \quad Kab = KaKb$$

$$^8 m \in N_1 \quad \supset \quad \text{mod}(a^m) = (\text{mod}a)^m \quad Ka^m = (Ka)^m$$

$\sqrt{\phantom{x}} \sqrt{\phantom{x}}^*$

$$* \quad 3. \quad a \in q' \quad m, n \in N_1 \quad \supset \quad \cdot 0 \quad {}^m\sqrt{a} = q' \wedge x \exists (x^n = a) \quad \text{Df}$$

$$^1 \quad a \in \mathbb{C} \quad \supset \quad {}^m\sqrt{a} = \{ ({}^m\sqrt{a}) \wedge x \exists (\text{real}x = \max \text{real } {}^m\sqrt{a}) \} \quad \text{Df}$$

${}^m\sqrt{a}$ , id es  $({}^m\sqrt{a})a$ , indica classe de radices algebrico de gradu  $m$  de  $a$ .

${}^m\sqrt{a}$  indica « radice principale », que habe parte reale maximo.

Cauchy, (Œuvres s.2 t.12 p.220).

$$^1 \quad {}^m\sqrt{0} = 0$$

$$^2 \quad a \neq 0 \quad \supset \quad \text{Num } {}^m\sqrt{a} = m$$

$$^3 \quad x \in {}^m\sqrt{a} \quad \supset \quad {}^m\sqrt{a} = x \times {}^m\sqrt{1}$$

$$^4 \quad x, y \in {}^m\sqrt{1} \quad \supset \quad x \times y, x/y, x^n, x^{-n}, Kx \in {}^m\sqrt{1}$$

$$^5 \quad x \in q \quad y \in q \quad \supset \quad$$

$$\sqrt{(x+iy)} = \sqrt{[(\sqrt{x^2+y^2})+x]/2} + i\sqrt{[(\sqrt{x^2+y^2})-x]/2}$$

$$\sqrt{(x-iy)} = \sqrt{[(\sqrt{x^2+y^2})+x]/2} - i\sqrt{[(\sqrt{x^2+y^2})-x]/2}$$

$$^6 \quad \sqrt[3]{1} = 1 \quad \omega = (-1 + i\sqrt{3})/2 \quad \omega^2 = (-1 - i\sqrt{3})/2$$



## \* 4.

1.  $n \in N_1, a \in q'f(1 \dots n) \supset \exists q' \wedge x \exists [x^n + \Sigma(a_r x^{n-r} | r, 1 \dots n) = 0]$

2.  $\text{Hp} 1 \supset \exists (q'f(1 \dots n) \wedge \exists x \exists q' \supset x^n + \Sigma(a_r x^{n-r} | r, 1 \dots n) = \Pi[(x - \varepsilon_r) | r, 1 \dots n])$  } GIRARD a.1629 fol. E3:

« Toutes les equations d'algebre reçoivent autant de solutions, que la denomination de la plus haute quantité le demonstre ».

Bibliographia: Loria RdM. a.1891 t.1 p.185, t.2 p.37.

## VOCABULARIO III.

## §1.

187. **Algebra**, (L.mathematico a. 1200) ADHIR algebra, F algèbre.  
 $\subset$  Arabo: algebr (Muhammed ben Musa a.820. = reunion.
188. **funzione**, A function, D funktion, F fonction, H funcion, I funzione, R funtsija.  $\subset$  functo — -o + -ione (118).
189. functo  $\supset$  (188), de-functo.  $\subset$  funge- — -e + -to.  
 -g- + -t-  $\supset$  -ct-: rege — -e + -to  $\supset$  recto, lege — -e + -to  $\supset$  lec-to.
190. funge-, I funge = habe, frue, fac. || S bhung'-ate.
191. **operatione**, AD operation, F opération, H operacion, I operazione, R operatsija.  $\subset$  opera- (53) + -tione (12).
192. **correspondentia** (non L.), A correspondence, correspondency, D korrespondenz, F correspondance, H correspondencia, I corrispon- denza, R correspondentsija.  $\subset$  (193) — -e + -ia (143).
193. **correspondente** (non L.), A correspondent, correspond-ing, D kor- respondent, F correspondant, H corrispondiente, I corrispondente, R correspondent'.  $\subset$  (194) + -nte (142).
194. **corresponde** (non L.) FH, A correspond, D korrespondire, I corri- sponde.  $\subset$  con- (47) + responde.  
 con- + -r-  $\supset$  corr-: con- + -rige  $\supset$  corrige.
195. **responde** H, A respond, D respondire, F répond-re, I risponde.  
 $\subset$  re- (186) + sponde.
196. sponde = promitte.  $\supset$  (195), sponso. || GD spende = distribue.
197. **simile** AI, H simil.  $\supset$  simil-itudo AFHI. || G homalo.  
 $\subset$  sim- (198) + -ile (199).
198. sim-, sēm- = uno, toto, omni.  $\supset$  sem-per, sin-gulo, sem-el,...  
 || G homo, hen = uno, A same, some, to seem, D zu-samm-en  
 R s', so, sy-, sam', S sama.

199. -ile = (197) ◊ ag-ile ◊ fac-ile ◊ ...  
 ◊ -i- (9) + -le (6). || -ulo (224).
200. **reciproco** HI, A reciproc-al, F réciproque, D rekiprosche.  
 = pro et retro.  
 ◊ re- (186) + -co (201) - -o + -i- (9) + pro (134) + -co (201).
201. -co ◊ alter-co ◊ pris-co ◊ -i-co (35). || G -co = physi-co..., S -ca  
 §2.
202. **inverso** HI, AF inverse. ◊ in (113) + verso (203).
203. **verso** HI, F vers. ◊ verso (in poesia), vers-ione, di-verso...  
 ◊ verte - -e + -to (135).  
 -t + -to ◊ -so : ute- - -e + -to ◊ uso  
 flecte - -e + -to ◊ flexo.
204. **verte** HI. ◊ vert-ice, verte-bra, con-verte,...  
 || D werde = fl, (vor)-wärts, R vraz'da = adversione, S vart.  
 §4.
205. **variabile** I, AFH variable, D variabel. ◊ varia + -bile.
206. **varia** HI, A vary, D variire, F varie. ◊ (205), varia-tione.  
 ◊ vario (207) - -o + -a (4).
207. **vario** HI, A vari-ous, vari-ed, F vari-é.
208. -bile, AFH -ble, D -bel, I -bile.  
 ◊ (205) ◊ mo-bile ◊ sci-bile ◊ sta-bile ◊ ... = -ile (199).  
 §6.
209. **relativo** HI, A relative, F relatif. ◊ relato - -o + -ivo.
210. **relato** H, A related. ◊ (209), relat-ione AFHIR, relato-re.  
 ◊ re- (186) + lato.
211. **lato** ◊ trans-lato, lato-re, ob-lat-ione, super-lat-ivo. || G tleto-s  
 ◊ tule (212) - -e + -to (135 per via non simplice).
212. **tule** (L. antiquo) = fer, eleva, acqua. ◊ L tuli, tol-era, tol-le.  
 || G tal-anto = pondo. A tla-nte, A thole = D ge-dul-d = tolerantia  
 S tul, tula.
213. -ivo A -ive, D -iv, F -if, -ive, HI -ivo, R -iv'.  
 ◊ -t-ivo (44) ◊ pass-ivo ◊ noc-ivo... ◊ -i- (9) + -vo (214).
214. -vo, -uo ◊ (213) ◊ ae-vo ◊ ar-vo ◊ sal-vo ◊ noc-uo ◊ vac-uo ◊  
 assid-uo ◊ individ-uo ◊ contin-uo ◊ perpet-uo.
215. **positivo** HI, A positive, D positiv, F positif, R positiv, in sensu  
 particolare). ◊ posita - -o + -ivo (213).
216. **posito, posto** (L. raro).  
 ◊ (215) ◊ posit-ione ◊ des-posito. ◊ Lintu. postu. || D fest  
 ◊ po- + -sito. = sito.

217. **po-, pos** (L. antiquo), **post**; F puis, H pues, Port. pos, I poi, do-po.  $\supset$  (216), po-li, post-ero, post-scripto, ADFHL. || R po, po-, pos-, S pas'ead, pa'cea. (= ab-, G apo, secundo Brugmann).
218. **sito** HI.  $\supset$  sit-nato, sit-uatione. || G heto  $\supset$  cat-heto, S ava-sita.  $\subset$  si- + -to (135).
219. si- = si-ne  $\wedge$  si-to  $\wedge$  de-si-mentia. = pone.  
|| G he,  $\xi$ - =  $\xi$ -tós  $\wedge$   $\xi$ -s  $\wedge$   $\xi$ -péro-s  $\wedge$  ..., S ava-sa.
220. **negativo** HI, A negative, D negativ, F négatif.  
 $\subset$  nega + -tivo (44).
221. **nega** HI, F nie.  $\supset$  (220)  $\wedge$  nega-tione.  
 $\subset$  ne- (62) + (-ga = ai = die, secundo Van.).
- §7.
222. **modulo** HI, AF module, F modèle, moule, D modell, R modul'.  
 $\subset$  modo — o + -ulo.
223. **modo** HI (F mode)  $\supset$  (222), mod-ifica, mod-era, mod-esto ADFHL.  
= mensura, regula. || D mass.
224. -ulo, -lo  $\supset$  (222), capít-ulo, cale-ulo, ... cred-ulo, pend-ulo, temp-lo, exemp-lo. = -ile (199): fac-ile, fac-ultate; sim-ile, sim-ula; ...  
|| A -le = crippl-le  $\wedge$  spind-le  $\wedge$  litt-le. D -el  
|| G -lo, ido-lo, mega-lo; S -la; R -l', -la, -lo.
225. **valore** I, AH valor, F valeur.  $\subset$  vale — e + -ore (56).
226. **vale** HI, F val-oir.  $\supset$  (225), val-uta AFIR. || S bala = vi.
227. **absoluto** H, A absolute, D absolut, F absolu, I assoluto, R abso-ljut-nyj.  $\subset$  ab + soluto.
228. **ab**  $\supset$  (227), ab-dica, ab-scissa ADFHIR, ...  
|| G apo  $\supset$  apo-stolo  $\wedge$  apo-crypho  $\wedge$  ... || D ab, A of, S apa.
229. **soluto**  $\supset$  solut-ione.  $\subset$  solve — e + -to (135).
230. **solve** A, F ré-soudre, H sol-tar, I scioglie, ri-solve, D re-solv-ire.  
 $\subset$  se- + -lue, e de se fi o per influxu de u in lue.
231. **se** FH, I se, si.  
|| A se-If, D si-ch, se-in, se-lbst, G he, R se-bja, -sja, S sva.  
**sed**, se-  $\supset$  se-cessione, se-cerne, sed-itione, se-lecto, ...  
= de se, ab se, ab. = I ma, F mais  $\subset$  L magis.
232. -lue  $\supset$  di-lue  $\wedge$  so-lve, so-lu-to  
|| G  $\lambda$ 's, ana-ly-si, A lose, D los, S lu.
233. **mole** HI. = magnitudine.  $\supset$  mole-cula ADFHL. || G molo AFHIR.  
Vocabulo « mole » de Leibniz es plus conforme ad etymologia que « modulo » et « valore absoluto », sed hodie non es adoptato.

234. **signo** H, A sign, F signe, I segno.  $\supset$  sign-a D, sign-ale DR.  
 $\subset$  sig- (|| D sage, secundo Van., Fick, || L seca, secundo Henry) + -no (160).

## §8.

235. **rationale**. AD rational, F rationnel, H racional, I razionale, R ratsional-maj.  $\subset$  ratione — -e + -ale.  
 236. **ratione**, A ratio, ration, D ration, F ration, raison, H racien, razon, I ragione, ragione, R ratsion'.  $\subset$  rato — -o + -ione (118).  
 237. **rato** HI.  $\supset$  (236), rat-ifica ADFHIR.  $\subset$  ra- + -to (135).  
 238. ra- = calcula, cogita.  $\supset$  (236). || G ar-ithmo, D re-de.  
 239. -ale = (235)  $\cap$  differenti-ale  $\cap$  integr-ale  $\cap$  radic-ale  $\cap$  ...  
 $\subset$  -a (4, vel alio desinentia -a) + -le (6).

## §10.

240. **integro** HI, A integer, F entier, H entero, I intero.  
 $\supset$  integr-ale ADFHIR.  $\subset$  in- + tage — -e + -ro (107).  
 -a- de thema fi-e in compositione, ante duo consonante:  
 cande, ac-cende; facto, per-fecto; capto, ac-cepto; ...  
 241. in- = ne (62).  $\supset$  (240), in-ertia. || G a-, an-, AD un-.  
 242. tage (L. antiquo)  $\supset$  (240), ta-n-ge, tac-to, con-tag-io  
 || G tag-, S tag'.  
 243. **fractione**, AF fraction, H fraccion, I frazione.  
 $\subset$  fracto — -o + -ione (118).  
 244. **fracto**. I fratto.  $\supset$  (243), fract-ura AdFHI.  
 $\subset$  frag- + -to (135). Vide nota (189).  
 245. frag-  $\supset$  (244), fra-n-ge, frag-ile, frag-mento ADFHI.  
 || L freg-i, A break, D breche, G reg-, S bhrag'.  $\subset$  E bhrege.  
 246. **denominatore** I, A denominator, F denominateur, H denominador  
 $\subset$  denomina + -tore (138).  
 247. **denomina** HI, A denomina-te.  $\subset$  de (21) + nomina.  
 248. **nomina** HI, A nomina-te, F nomme.  $\supset$  nomina-le, nomina-tivo, ...  
 $\subset$  nomine — -e + -a (92).  
 249. **nomen, nomine**, F nom, H nombre, I nome.  
 $\supset$  nomen-clatura DR. || G o-noma  $\supset$  onoma-stico, syn-onymo.  
 || AD name, R imja, imen-i, S naman.  
 $\subset$  gno- + -men (secundo Van.).  
 gn- initiale  $\supset$  n-: no-men, co-gno-men, co-gni-to; nato, co-gnato.  
 250. **gno-** = no-sce, co-gno-sce.  $\supset$  no-men, no-to, i-gno-to.  
 || G gno-, gno-si, gno-mone.  
 || A know, D kenne, kunst, R zna-ti, S g'na.  $\subset$  E gno.

Nota: E *g*  $\supset$  L *g* || G *g* || A *c, k* || D *k* || R *z* || S *g, g'*.  
 Exemplo: L *genu* || G *gonu* || A *knee* || D *knie* || S *g'anu*;  
 L *grano* || A *corn* || D *korn* || R *zerno* || S *g'irna*.

251. -men, -mine = (249)  $\cap$  flu-men  $\cap$  acu-men  $\cap$  li-men...  
 || G -ma (60), D -me = na-me  $\cap$  blu-me, R -mja, -men-, bre-mja,  
 vre-mja, sje-mja = L se-men = D sa-me, S -man.
252. **numeratore** I, A numerator, F numérateur, H numerador.  
 $\subset$  numero (105) - o + -a (92) + -tore (138).  
 §12.
253. **límite** FHI, A limit.  
 $\subset$  (secundo Van.) lic- + -mo (125) - o + -ite.  
 Nota: -c + m  $\supset$  -m-, et -c + n  $\supset$  -n-. luc- + -na  $\supset$  luna.
254. lic = es transverso.  $\supset$  (253), ob-liq-uo, li-mine, luc-satione.  
 || G *λέξ-ος*, loc-sodromia.
255. -ite = (253)  $\cap$  equ-ite  $\cap$  mil-ite  $\cap$  superst-ite  $\cap$  ...
256. **supero** || D obere.  $\subset$  super + -o (182).
257. **super, supra**, F sur, H sobre, I sopra, ADFHI super-  
 || A over, upper, D über, Gotico ufar, G hyper, S upari.  
 $\subset$  sup- (124) + -er (Brug. et Van. puta illo suffixo comparativo;  
 Fick suffixo locativo).
258. **supertore** I, ADH superior, F supérieur.  
 $\subset$  supero (256) - o + -iore (110).
259. **infero**  $\supset$  (261), infer-nale.  
 || S adhara, A under, D unter (in- de infero = ni, secundo Fick).
260. **ni** (thema E) = infra, sub. S ni, ni-tara, a-dhara = L infero,  
 a-dhama = L infimo, A un-der, D nie-der, un-ten, G ne-rthen,  
 nei-othi, R ni-zco, ni-z'e, L in-fra, in-fero, in-fimo.
261. **inferiore** IAFH.  $\subset$  infero (259) - o + -iore (110).
262. **quantitate**, A quantity, D quantität, F quantité, H cantidad,  
 I quantità.  $\subset$  quanto - o + -itate (8).
263. **quanto** I, F quant, H cuanto, LADF quantum.  
 $\subset$  quam (61) + -to (135). || G pant- = toto.
264. **infinito** HI, A infinite, F infini.  
 $\subset$  in- (241) + fini (82) + -to (135).
265. **radice** I, LA radix, F racine, H raiz.  
 || A root, D wurz-el, G riza.  $\subset$  rad- (vide: rad-io) + -ice.
266. **radicale** (L mathematico) I, ADFHR radical.  $\subset$  radic- + -ale.
267. **intervallo** (§13 q P12) I, A interval, D intervall, F intervalle,  
 H intervalo, R interval'.  $\subset$  inter + vallo.

268. **inter, intra, intro**, AFH entre, HI d-entro, I entro, ADFHIR inter-.  $\subset$  in (113) + -ter. || S antar, G enter-o, D unter = L inter, infra. D unter-scheide = L inter-scinde.
269. -ter, -tr = in-ter, u-tr-o, dex-ter-o, sinis-tr-o, al-ter-o, de-ter-iore, ex-ter-no, magis-tr-o, minis-tr-o. || G -ter-o, S -tar-a, R (co)-tor-(y). Indica comparativo = -iore.
270. vallo = palo || G helo, D wall.  $\supset$  (267).
- §14.
271. **logarithmo** introducto per Neper a.1614.  
 $\subset$  logo (33) - o + arithmo (103).  
 = numero (exponente) de ratione (basi).  
 In theoria de Logarithmo decimale:  
     E  $\text{Log}x$  es vocato « characteristic ».  
      $\beta$   $\text{Log}x$        »       « mantissa ».
272. **characteristica**, G  $\chi\alpha\rho\alpha\kappa\tau\eta\rho\iota\sigma\tau\iota\chi\eta$ , A characteristic, D charakteristik, F caractéristique, H caracteristica, I caratteristica, R characteristic'escij.  $\subset$  characteristico - o - a (37).
273. **characteristico** GADFHIR.  
 $\subset$  characteriza - a + -tico = carattere - e + -istico.
274. **characteriza** ADFHI.  $\subset$  caractere - e + -iza.
275. **caractere**, G  $\chi\alpha\rho\alpha\kappa\tau\eta\rho\epsilon$ , A character, D charakter, F caractère, H carактер, I carattere, R character'. = signo.  
 $\subset$  char- (sculpe) + -ac- (|| L -ace = rap-ace  $\wedge$  ten-ace) + -tere (|| L -tore 138).
276. -iza (L tardo) G -ίζε, A -ize, D -isire, F -ise, H -iza, I -izza.  
 $\supset$  (274), thesaur-iza.
277. -tico LG -τικός.  $\supset$  G mathema-tico  $\wedge$  analy-tico  $\wedge$  ...  
 $\supset$  L rus-tico  $\wedge$  silva-tico  $\wedge$  ...  
 $\subset$  -to (135, vel -te, -ti, ...) - o + -ico (35).
278. **mantissa**, vocabulo etrusco per origine.  
 (Non existe in commune vocabulario ADFHIR).
- §19.
279. **medito** HI, A medial, mean, D mediane, F moyen, mediane; ADFR medium. || A mid, midle, D mit, mittel, G messo, meso, R mes'du, mes'', S madhja.
- §21.
280. **derivata** HI, F dérivée, D derivierte, A derivative.  
 $\subset$  deriva + -to (135) - o + -a (126, suffixo de feminine; indica classe, functione).
281. **deriva** HI. A derive, D derivire, F dérive.  
 $\subset$  de- (21) + rivo - o + -a (92).

282. **riuo** I, A river, F ri-vière, H rio.  $\subset$  ri- + -vo (214).

ri- = flue. || G rhe-, rheu-ma, rhe-o-phoro,  
A strea-m = D stro-m = R stru-ja, S ri, aru.

E -sr-  $\supset$  ADR -str- :

E svesor, S svasar, L soror, A sister, D schwester, R sestra.

\*\*\*

In multo libro es adoptato nomenclatura sequente, introducto per G Cantor :

« classe *u* es clauso » .=.  $\delta u \supset u$  .=.  $u = \lambda u$

« » *u* es condensato in se » .=.  $u \supset \delta u$

« » *u* es perfecto » .=.  $u = \delta u$

« » *u* es isolato » .=.  $u \cap \delta u = \Lambda$ .

283. **clauso**, I chiuso. = F fermé, D abgeschlossen.

$\subset$  claude — -e + -to (135). Vide nota 174.

284. **claude**, I chiude.  $\subset$  clau- + -de.

clau- || G cleie.  $\supset$  L clave (F clef H llave I chiave), G clei-s, R cljuc'.  
-de = pen-de  $\cap$  ten-de  $\cap$  ar-de. || -de (120).

285. **condensato** in se I, F condensé en soi. = D insichdicht.

$\subset$  con- (47) + denso — -o + -a (4) + -to (135).

286. **densu** HI, AF dense. || G dasy.

287. **perfecto** H, A perfect, F parfait, I perfetto.

$\subset$  per (57, in sensu de ultra) + fac (137, nota 240) + -to (135).

288. **isolato** (non L) I, A isolate, D (scientifico, non commune) isoliert, F isolé, H aislato.  $\subset$  isola + -to (135).

289. **isola** (verbo, non L) I, A isolate, F isole, H aisla.

$\subset$  (290) — -a (126, suffixo de feminile) + -a (4, suffixo de verbo).

290. **isola** (nomen, non L) I, A isle, F île, H isla.  $\subset$  insula.

291. **insula**  $\supset$  (290), A insula-te, insula-r, ... || D insel.

$\subset$  in + sal (292, = mare) + -a (126 feminile, indica terra).

292. **sal, sale**, A sal, F sel, H sal, I sale.

|| A salt, D salz, G hal-s (= sale, mare), R solj.

### §23.

293. **probabilitate**, A probability, F probabilité, H probabilidad, I probabilità.  $\subset$  probabile — -e + -itate.

294. **probabile** AFHI.  $\subset$  proba + -bile (208).

295. **proba** (verbo) H, F preuve, I prova, D prüfe.

» (nomen), F épreuve, H prueba, I prova, A proof, D probe.  
 $\subset$  proba — -o + -a (4).

296. **probo** FI, = bono, vero.

## §24.

297. **complexo** H, AD complex, F complexe, I complesso.  
 ⊃ complex-ione DR. ⊂ com- (47) + plexo.
298. **plexo** ⊂ plecte — -e + -to (135, vide nota 203).
299. **plecte** || D flecte, R plesti. = plica.  
 ⊂ plect- (thema E = L plica, G plece) + -te.
300. -te = flecte ∩ plecte ∩ u-te ∩ verte ∩ nec-te. || GD -te, S -t.a.  
 ⊂ E -te, cum valore de præsente.
301. **ordo, ordine** I, A order, DHR orden, D ord-nung, F ordre.  
 ⊃ ordin-a I, ordin-ata ADR, ordin-ale, ordin-ario D, ⊂ or- + -dine.
302. **or-, ori-** ⊃ or-do, or-igine, or-iente, or-tu.  
 || G or-nymi, S ar.
303. -do, -dine = (299) ∩ dulce-dine ∩ cupi-dine.  
 -dine = -do — -o + -ine.
304. -ine = hom-ine (= homo) ∩ vorag-ine (= vorago) ∩ orig-ine  
 (= origo) ... ∩ consuetud-ine (= consuetudo).  
 -ine — -o in L transforma thema de nominativo singulare in thema  
 de alio casu.  
 || D, -n = blume-n ∩ zunge-n (transforma singulare in plurale).  
 I uoino, uoinini. || G -ne, -r, -r. Solo-ne ∩ Strabo-ne ∩ ..., S -na.
305. **unitate**, A unity, F unité, H unidad, I unità.  
 ⊂ uno (114) — -o + -itate (8).

## §25.

306. **determinante** ADFHI. ⊂ determina + -nte (142).
307. **determina** AFHI. ⊂ de- (21) + termina.
308. **termina** AFHI, = da termine. ⊂ termine — -e + -a (92).
309. **termo, termine** I, termino LH, AF terme, AL terminus, D termin.  
 || G terma, termon, S tarman ⊂ tere — -e + -mine (251).
310. **tere** = fini, consuma. ⊃ tere-bra, tri-to, at-trito.  
 || G tere-tro = L tere-bra.

## §26.

311. **lineare** I, A linear, D lineal, L linejnyj.  
 ⊂ linea — -a + -are (382).
312. **línea** HI, A line, D linie, F ligne, R linija.  
 ⊂ lino — -o + -eo (418) — -o + -a (126) (secundo Bréal; secundo  
 alios, de li- thema de li-ne, li-tera, li-mo,...).
313. **lino** (planta textile), D lein, F lin, HI lino, R len'.  
 ⊃ F linge, A linen. || G lino-n.
314. li- E ⊃ L li-ne, po-li, li-tera, li-mo, A li-me = D lehm = L li-mo,  
 G a-li-ne = L line, R li-ti = funde, S ri.



315. **invariante** ADFHI.  $\subset$  in (241) + variante.
316. **variante** D.  $\subset$  varia (206) + -nte (142).  
§27.
317. **imaginario** H, A imaginary, D imaginär, F imaginaire, I immaginario.  $\subset$  imagine — -e + -ario = imagina + -rio.
318. **imagina-** AFHI.  $\subset$  imagine — -e + -a (4).
319. **imago**, imagine, AF image, H imagen, I immagine.  
 $\supset$  imaginatione AFHI.  $\subset$  im- + -ago.
320. im-  $\supset$  im-ita-re, im-ago, sem-ulo. || S jama = gemino.
321. -ario, A -ary, D -är, F -aire, -ier, HI -ario, R -er'.  
 $\supset$  agr-ario, imagin-ario, caten-ari-o.  
 $\subset$  -a (finale de plure vocabulo) + -rio.
322. -rio  $\supset$  -a-rio, catena-rio, imagina-rio, corolla-rio, suaso-rio, contra-rio.
323. -ago, -agine  $\supset$  im-ago, vor-ago, farr-ago.  $\subset$  -a (finale de plure vocabulo) + -gine (377).
324. **reale** (L. scientifico) I, ADH real, F réel, R real'.  $\subset$  re + -ale.
325. **re** = proprietate, F chose.  $\supset$  qua-re, F car; re-publica ADFHIR.  
|| S ra. F rien  $\subset$  L re, cum valore negativo, ut F pas  $\subset$  L passu, F point  $\subset$  L puncto.
326. **conjugato** I, A conjugate, D conjugiert, F conjugué, H conjugado.  
 $\subset$  conjuga + -to (135).
327. **conjuga** HI, A conjugate, F conjugue.  
 $\subset$  con — (47) + jugo — -o + -a (92).
328. **jugo**, F joug, H juego, I giogo.  
|| A yoke, D joeh, G zygo, R igo, S juga.  $\subset$  jugs — -e + -o.
329. jugs (thema latino) = liga, jugs.  $\supset$  ju-n-ge, jug-o, con-jugs.  
|| G zyg-, S jug'.
330. **conjuncto**, AF conjoint, H conjunto, I congiunto.  
 $\subset$  con + jugs — -e + -to.
331. **jugs**  $\subset$  jug- + -n- (341).

IV

GEOMET



## IV. GEOMETRIA.

### §1 pnt (puncto) vct (Vectore)

#### \* 1.

« p » vel « pnt » significa « puncto ».

Nos non pote scribe aequalitate de forma:

$p =$  (expressione composito per signos de Logica, de Arithmetica et de Algebra considerato in partes I, II, III).

Ergo « puncto » non es definibile in modo logico; idea de puncto resulta de consideratione de mundo physico.

1 $p \in \text{Cls}$	2 $\exists p$	Pp
3 $a \in p \supset \exists p - a$		Pp

Punto es classe; existe aliquo puncto; dato puncto  $a$ , existe alio puncto differente de  $a$ , non coincidente cum  $a$ .

#### \* 2.

Relatione inter quatuor puncto  $a, b, c, d$ :

$$a-b = c-d$$

(lege ut in Arithmetica) indica  $a \rule{1.5cm}{0.4pt} b$   
 que puncto considerato habe  
 inter se positione ut in figura:  $c \rule{1.5cm}{0.4pt} d$

Si nos ute nomenclatura de Geometria elementare, relatione considerato significa que segmento  $ab$  et  $cd$  es aequale, parallelo, et in idem sensu.

Si nos ute nomenclatura de Geometria de positione, relatione considerato, si puncto  $a, b, c, d$  non jace super uno recta, significa que recta  $ab$  es parallelo ad recta  $cd$ , et recta  $ac$  es parallelo ad recta  $bd$ .

Si nos ute nomenclatura de Mechanica, relatione considerato significa que nos pote fac coincide systema de duo puncto  $a, b$  cum duo puncto  $c, d$ , per motu de translatione.

Omni explicatione praecedente exprime relatione considerato per plure idea primitivo.

Nos considera relatione  $a-b = c-d$  ut idea primitivo.

$a, b, c, d, e, f \in p \cdot \supset$ .

- |    |   |    |        |
|----|---|----|--------|
| ·1 | $a-b=a-b$   |    | Pp     |
| ·2 | $a-b=c-d \cdot \supset \cdot c-d=a-b$               |    | Pp     |
| ·3 | $a-b=c-d \cdot c-d=e-f \cdot \supset \cdot a-b=e-f$ |    | Pp     |
| ·4 | $a-b=c-d \cdot \supset \cdot a-c=b-d$               | Pp | Altern |

P ·1 ·2 ·3 dice que relatione  $a-b = c-d$ , que nos scribe sub forma de aequalitate, gaude de proprietates de aequalitate (I § 1).

P ·4 dice que relatione  $a-b = c-d$ , que nos scribe sub forma de aequidifferentia, gaude de proprietate fundamentale de aequidifferentia, id es, lice « alterna » elementos medio  $b$  et  $c$ .

P ·4 exprime propositione de Geometria elementare; « si segmento  $ab$  es aequale, parallelo et in idem sensu ad segmento  $cd$ , tunc segmento  $ac$  es aequale, parallelo et in idem sensu ad segmento  $bd$  »; EUCLIDES, I, P33:

*Αἱ τὰς ἴσας τε καὶ παραλλήλους ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη ἐπιξενγνύουσαι εὐθεῖαι καὶ αὐταὶ ἴσαι τε καὶ παραλλήλοι εἰσιν.*

- |    |                                   |    |
|----|-----------------------------------|----|
| ·5 | $a-c=b-c \cdot \supset \cdot a=b$ | Pp |
| ·6 | $\exists p \wedge x3(x-a=b-c)$    | Pp |

#### *Independentia de propositiones primitivo.*

Ut nos proba que Pp es independente, nos adduce interpretationes de idea primitivo « puncto, P1 », et « relatione inter quatuor puncto, P2 », que satisfac ad aliquo Pp et non ad omni.

·1. Si ad relatione nos tribue sensu: «  $a, b, c, d$  es elemento coincidente », tunc es vero Pp·2, que significa « si  $a, b, c, d$  es coincidente, et  $c, d, a, b$  es coincidente », et Pp·3, ·4, ·5, sed non Pp·1, nam non semper « duo elemento  $a, b$  arbitrario es coincidente ».

·2. Si ad relatione nos tribue sensu « distantia  $ab \leq$  distantia  $cd$  », tunc es satisfacto Pp·1, ·3, et non Pp·2.

·3. Si ad relatione nos tribue sensu «  $a, b, c, d$  es puncto complanare », tunc es satisfacto Pp·1, que significa « duo puncto semper jace in uno ».

plano », et P·2, que significa « si  $a, b, c, d$  es complanare, et  $c, d, a, b$  es complanare », sed non es satisfacto Pp·3; nam si  $a, b, c, d$  es complanare, et  $c, d, e, f$  es complanare, non semper  $a, b, e, f$  es complanare.

·4. Si ad relatione nos tribue valore « distantia  $ab =$  distantia  $cd$  », tunc es satisfacto Pp·1·2·3, que exprime proprietates de aequalitate, sed non Pp·4, que exprime proprietate de aequidifferentia.

·5. Si ad relatione fundamentale nos tribue sensu « relatione  $a' - b' = c' - d'$  subsiste inter projectiones de  $a, b, c, d$  super plano fixo », nos satisfac ad Pp·1·2·3·4 et non ad Pp·5. Nam ex Hyp. seque solo que  $a$  et  $b$  habe identico projectione.

·6. Si ad signo  $p$  nos tribue valore  $N_1$ , et ad relatione fundamentale valore que habe in Arithmetica, nos satisfac Pp·1·5, et non Pp·6.

### Historia.

Relatione de P2, vel idea de vectore, occurre in Euclide (vide citatione post P2·4), et in omni libro de Geometria, sub forma complexo.

Wessell in a.1797, vide que ce relatione habe proprietates de aequalitate, et indica illo per  $ab = cd$ .

Bellavitis, a.1832, funda super idem idea « Calculo de aequipollentias ».

H. Grassmann, a.1844 vide in relatione considerato proprietates de aequidifferentia; Werke t.1 p.303:

« ... ich sage also, dass  $B - A$  dann und nur dann gleich  $B_1 - A_1$  sei, wenn die geraden Linien von  $A$  nach  $B$  und von  $A_1$  nach  $B_1$  gleiche Länge und Richtung haben. »

Idem observatione occurre in W. Hamilton, a.1845, Cambridge J. t.1, p.47:

« ... the symbolic equation,  $D - C = B - A$ , may denote that the point  $D$  is ordinarily related (in space) to the point  $C$  as  $B$  is to  $A$ , and may in that view be expressed by writing the *ordinal analogy*,  $D::C::B::A$ : which admits of *inversion* and *alternation*. »

Ce notatione es implicito, non explicito, in Möbius a.1827, et a.1844 p.608; vide P10.

Ad notatione de Wessell:

$AB = -BA$ ,  $AB + BC = AC$ , de  $AB = CD \supset AC = BD$   
responde novo notatione:

$A - B = -(B - A)$ ,  $(A - B) + (B - C) = A - C$ ,  $A - B = C - D \supset A - C = B - D$ .  
conforme ad regulas de Algebra, et ad principio de oeconomia.

Hamilton a.1845 p.56 introduce vocabulo « vectore ».

### \* 3.

« Vectore », que nos indica per «  $v$  » vel «  $vct$  » es differentia de duo puncto.

Vectore nullo, indicato per 0, es differentia de duo puncto coincidente.

$$\cdot 0 \quad v = \text{vct} = \exists x [ \exists (a, b) \exists (a, b \varepsilon p . x = b - a) ] \quad \text{Df}$$

$$\cdot 01 \quad v = p - p$$

$$\cdot 1 \quad 0 = \exists x \exists (a \varepsilon p . \supset_a . x = a - a) \quad \text{Df}$$

$$\cdot 2 \quad 0 \varepsilon v \quad \cdot 3 \quad a \varepsilon p . \supset . a - a = 0$$

$$[ a, b \varepsilon p . P2.1 . \supset . b - a = b - a . \text{Altern} . \supset . b - b = a - a \quad (1)$$

$$b \varepsilon p . (1) . \supset : a \varepsilon p . \supset_a . b - b = a - a \quad (2)$$

$$b \varepsilon p . (2) . \supset . \exists x \exists (a \varepsilon p . \supset_a . x = a - a) \quad (3)$$

$$\{3\} \text{Elimb} . P1.2 . \supset . \text{-----} \quad (4)$$

$$a \varepsilon p . \supset . x = a - a . y = a - a . P2.3 . \supset . x = y \quad (5)$$

$$(4) . (5) . \S P2 . \supset . P2.3 ]$$

$$\cdot 4 \quad a, b \varepsilon p . \supset : a = b . \supset . a - b = 0$$

$$[ \text{Hp} . a = b . P3 . \supset . a - b = 0 \quad (1)$$

$$\text{Hp} . a - b = 0 . P3 . \supset . a - b = b - b . P2.5 . \supset . a = b \quad (2)$$

$$(1) . (2) . \supset . P ]$$

\* 4.  $a, b \varepsilon p . u, v \varepsilon v . \supset :$

$$\cdot 0 \quad a + u = \exists p \exists x (x - a = u) \quad \text{Df}$$

Si  $a$  es puncto et  $u$  es vectore,  $a + u$   $\frac{a}{\quad} \frac{u}{\quad} \frac{a+u}{\quad}$   
indica illo puncto  $x$  tale que  $x - a = u$ .

$$\cdot 1 \quad a + u \varepsilon p \quad \cdot 2 \quad (a + u) - a = u$$

$$[ P2.6 . \supset . \exists p \exists x (x - a = u) \quad (1)$$

$$x, y \varepsilon p . x - a = u . y - a = u . P2.3 . \supset . x - a = y - a . P2.5 . \supset . x = y \quad (2)$$

$$(1) . (2) . \S P2 . \supset . P1.2 ]$$

$$\cdot 21 \quad u = v . \supset . a + u = a + v$$

$$[ u = v . \supset . (a + u) - a = (a + v) - a . \supset . a + u = a + v ]$$

$$\cdot 3 \quad a + (b - a) = b$$

$$[ P2 . \supset . [a + (b - a)] - a = b - a . P2.5 . \supset P ]$$

$$\cdot 31 \quad a + 0 = a$$

$$[ (b/a)P3 . \supset P ]$$

$$\cdot 4 \quad b - a = u . \supset . b = a + u$$

Oper  $+a$

$$[ P21 . \supset . b - a = u . \supset . a + (b - a) = a + u . \supset . b = a + u ]$$

$$\cdot 5 \quad (a + u) - (b + u) = a - b$$

$$[ \text{Hp} . P2 . \supset . (a + u) - a = (b + u) - b . \text{Altern} . \supset . P ]$$

$$\cdot 51 \quad a + u = b + u . \supset . a = b$$

$$[ a + u = b + u . \supset . (a + u) - (b + u) = 0 . \supset . a - b = 0 . \supset . a = b ]$$

$$\cdot 6 \quad a+u+v = (a+u)+v \quad \text{Df}$$

$$\cdot 7 \quad a+u+v = a+v+u$$

$$[(a+u+v)-(a+v) = (a+u)-a = u \text{ . Oper+}(a+v) \text{ . } \supset \text{ . P }]$$

$$\cdot 8 \quad (a+u+v)-a = (b+u+v)-b$$

$$[ \text{P} \cdot 5 \text{ . } \supset \text{ . } (a+u+v)-(b+u+v) = (a+u) - (b+u) = a-b \text{ . Altern . } \supset \text{ . P } ]$$

\* 5.

$$\cdot 0 \quad u, v \varepsilon V \text{ . } \supset \text{ . } u+v = \iota x \exists [ a \varepsilon P \text{ . } \supset \text{ . } x = (a+u+v)-a ] \quad \text{Df}$$

Dato duo vectore  $u$  et  $v$ , sume puncto arbitrario  $a$ ; construe puncto  $a+u$  —————  $a+u+v$   
 $a+u$ ; et construe puncto  $(a+u)+v$ .  
 Vectore  $(a+u+v)-a$ , independente de  $a$   
 puncto  $a$ , vale, per definitione,  $u+v$ .

Idea de « vectore » pertine ad Geometria; illo habe plure applicatione ad Mechanica et ad Physica, et exprime omni elemento, que habe magnitudine, directione et sensu.

Si vectore repraesenta vi (fortia), summa de duo vectore repraesenta « resultante » de duo vi.

$$a, b, c \varepsilon P \text{ . } u, v, w \varepsilon V \text{ . } \supset \text{ .}$$

$$\cdot 1 \quad u+v \varepsilon V \quad \cdot 2 \quad u+v = (a+u+v)-a \quad [ \text{P} \cdot 8 \text{ . } \supset \text{ . P } ]$$

$$\cdot 3 \quad a+u+v = a+(u+v) \quad [ \text{P} \cdot 2 \text{ . Oper+} a \text{ . } \supset \text{ . P } ]$$

$$\cdot 4 \quad u+v = v+u \quad [ \text{P} \cdot 7 \text{ . } \supset \text{ . P } ] \quad \text{Comm+}$$

$$\cdot 5 \quad u+(v+w) = (u+v)+w \quad \text{Assoc+}$$

$$[ \text{P} \cdot 3 \text{ . } \supset \text{ . } a+[(u+v)+w] = [a+(u+v)]+w = [(a+u)+v]+w = (a+u)+(v+w) = a+[u+(v+w)] \text{ . } \supset \text{ . P } ]$$

$$\cdot 6 \quad (a-b)+(b-c) = a-c$$

$$[ \text{P} \cdot 7 \cdot 3 \cdot 4 \text{ . } \supset \text{ . } c+(a-b)+(b-c) = c+(b-c)+(a-b) = b+(a-b) = a ]$$

$$\cdot 7 \quad (a-b)+(b-a) = 0 \quad [ \text{P} \cdot 6 \text{ . } \supset \text{ . P } ]$$

$$\cdot 8 \quad u+v = u+w \text{ . } \equiv \text{ . } v=w$$

$$[ u+v = u+w \text{ . } \equiv \text{ . } a+(u+v) = a+(u+w) \text{ . } \equiv \text{ . } a+(u)+v = (a+u)+w \text{ . } \equiv \text{ . } v=w ]$$

$$\cdot 9 \quad u+0 = u \quad [ \text{P} \cdot 6 \text{ . } \supset \text{ . P } ]$$

\* 6.  $u, v \varepsilon V \text{ . } a, b \varepsilon P \text{ . } \supset \text{ .}$

$$\cdot 0 \quad -u = \iota v \text{ct} \wedge x \exists (u+v = 0) \quad \text{Df}$$

$$\cdot 01 \quad u+(-v) = u+(-v) \quad \text{Df}$$



Si  $u$  es vectore,  $-u$  indica illo vectore que addito ad  $u$  da pro resultatu 0. Es repetitione de definitione super numero relativo (I § 9 P 1·3).

- \*1  $-u \in V$       \*2  $u - u = 0$   
 [  $a, b \in P$  .  $u = b - a$  .  $x = a - b$  . P5·7  $\therefore u + x = 0$  (1)  
 (1)  $\therefore \exists v \in V (u + x = 0)$  (2)  
 $x, y \in V$  .  $u + x = 0$  .  $u + y = 0$  . P5·8  $\therefore x = y$  (3)  
 (1) . (2) . (3) . I §7 P2·2  $\therefore P$  ]  
 \*3  $-(-u) = u$       \*4  $-(a - b) = b - a$

\* 7.  $u, v \in V$  .  $m, n \in N_0$  .  $\therefore$ :

- \*0  $0u = 0$  .  $(m+1)u = mu + u$  .  $(-m)u = -(mu)$  Df

Producto de vectore per numero  $m$  integro positivo (P 7), aut negativo (P 8), aut fracto (P 9) es definitio ut in Arithmetica.

- \*1  $mu \in V$  [  $(m, x) \in (b, a)$  §× 1·1 Dm  $\therefore P$  ]  
 \*2  $(m+n)u = mu + nu$  Distrib( $\times$ , +)  
 [  $(m, x, y) \in (b, x, y)$  §× 1·2 Dm  $\therefore P$  ]  
 \*3  $m(u+v) = mu + mv$  Distrib( $\times$ , +)  
 [  $(m, u, v) \in (c, a, b)$  §× 1·3 Dm  $\therefore P$  ]  
 \*4  $u = mu$  Comm  $\times$  Df  
 \*5  $(mn)u = m(nu)$  Assoc  $\times$   
 [  $(m, n, u) \in (c, b, a)$  §× 1·5 Dm  $\therefore P$  ]

- \*6  $m \in N_1$  .  $mu = 0$  .  $\therefore u = 0$  Pp

Nos satisfac ad totos Pp precedente, et non ad Pp6, si  $p$  indica punctos de uno circulo inferentia, et nos dico que  $a - b = c - d$  si nos pote fer punctos  $a$  et  $b$  ad coincide cum  $c$  et  $d$  per uno rotatione circa centro. 0 representa identitate, et rotatione repetito pote producere identitate.

- \*7  $mu = mv$  .  $\therefore u = v$   
 [ Hp  $\therefore mu - mv = 0$  . P·3  $\therefore m(u - v) = 0$  . P·6  $\therefore$  Ths ]

\* 8.  $u, v \in V$  .  $m, n \in N$  .  $\therefore$  P7·1·2·3·4·5

\* 9.  $u, v \in V$  .  $m, n \in N_1$  .  $a, b \in P$  .  $\therefore$

- \*0  $u/m = v/n \iff n \in V \cap r\mathcal{R}(mr = u)$  Df  
 \*1  $\exists v \cap r\mathcal{R}(mr = u)$  Pp

Si nos substitue  $u/n$  ad  $v$  put  $v$ , omni Pp precedente, es satisfacto, sed non Pp1.

$$^{\circ}2 \quad u/m \in V \cdot m(u/m) = u$$

$$^{\circ}3 \quad p, q \in N \cdot p/n = q/n \cdot \supset \cdot (up)/m = (uq)/n$$

$$[ \text{Hp} \cdot \supset \cdot pn = qm \cdot \supset \cdot u(pn) = u(qm) \cdot \text{P8.5} \cdot \supset \cdot (up)n = (uq)m \cdot \text{P.2} \cdot \supset \cdot (up/m)mn = (uq/n)mn \cdot \text{P7.7} \cdot \supset \cdot \text{Ths} ]$$

$$^{\circ}4 \quad au = v \vee \exists [ m \in N_1 \cdot p \in N \cdot p/m = a \cdot \supset_{m,p} \cdot v = up/m ] \quad \text{Df}$$

$$^{\circ}5 \quad au \in V \cdot (a+b)u = au + bu \cdot a(u+v) = au + av \cdot \\ (ab)u = a(bu) = abu$$

$$^{\circ}6 \quad au = 0 \cdot \equiv \cdot a = 0 \cdot \wedge \cdot u = 0$$

### \* 10.

Si  $a$  es puncto et  $m$  es numero (rationale), tunc  $ma$  indica systema de numero  $m$  et de puncto  $a$ . Si  $m$  es mensura de « massa », tunc  $ma$  repraesenta puncto cum massa, vel « puncto materiale » de Physica.

Dato duo puncto  $a$  et  $b$ , et duo numero correspondente  $m$  et  $n$ , nos vol repraesenta per expressione  $(ma+nb)/(m+n)$  puncto vocato in Mechanica « barycentro de puncto  $a$  et  $b$ , cum pondo (pondere, massa)  $m$  et  $n$  ».

Expressione considerato, si  $a$  et  $b$  es numero, es vocato « valore medio arithmetico inter  $a$  et  $b$ , cum pondo  $m$  et  $n$  ».

Si nos pone  $(ma+nb)/(m+n) = x$ , et nos opera super  $ae$  aequalitate, nunc sine sensu, ut in Arithmetica, nos habe:

$$ma+nb = (m+n)x,$$

$$\text{et in fine:} \quad m(a-x) + n(b-x) = 0,$$

que habe sensu determinato. Ergo nos pone:

$$^{\circ}0 \quad a \in p \cdot m \in r \cdot \supset \cdot ma = (m, a) \quad \text{Df}$$

$$^{\circ}1 \quad a, b \in p \cdot m, n \in r \cdot m+n \neq 0 \cdot \supset \cdot \\ (ma+nb)/(m+n) = r \wedge \exists [ m(a-x) + n(b-x) = 0 ] \quad \text{Df}$$

$$^{\circ}2 \quad a, b \in p \cdot m \in r \cdot \supset \cdot ma - mb = m(a-b) \quad \text{Df}$$

$$^{\circ}3 \quad \text{Hp.1} \cdot \supset \cdot ma+nb = (m+n)[(ma+nb)/(m+n)] \quad \text{Df}$$

$$^{\circ}4 \quad m \in r \neq 0 \cdot a \in p \cdot u \in v \cdot \supset \cdot u+ma = ma+u = m(a+u/m) \quad \text{Df} \\ m \in N_1 \cdot a \in p \text{ fl } 1^{\dots m} \cdot x \in r \text{ fl } 1^{\dots m} \cdot \supset :$$

$$^{\circ}5 \quad p \in p \cdot \supset \cdot \Sigma(x, a, r, 1^{\dots m}) = \Sigma(x, 1^{\dots m})p + \Sigma[x(a-r) | r, 1^{\dots m}]$$

$$\cdot 6 \quad \Sigma(x, 1 \cdots m) = 0 \quad \supset \quad \Sigma(x, a_r | r, 1 \cdots m) \varepsilon v$$

$$\cdot 7 \quad \Sigma(x, \cdot) = 0 \quad \supset \quad \Sigma(\cdot) / \Sigma(x, 1 \cdots m) \varepsilon p$$

Si nos considera  $m$  puncto  $a_1, a_2, a_3, \dots, a_m$ , et  $m$  numero, aut pondo correspondente  $x_1, x_2, x_3, \dots, x_m$ , tunc expressio:

$$x_1 a_1 + x_2 a_2 + x_3 a_3 + \dots + x_m a_m$$

si summa de pondo  $x_1 + x_2 + \dots + x_m$  es nullo vale vectore. Si summa de pondo, vel pondo totale non es nullo, tunc summa de puncto cum pondo, diviso per pondo totale, repraesenta puncto, dicto « barycentro de puncto dato, cum pondo relativo ».

Archimede voca barycentro *κέντρον τοῦ βάρους*. Carnot a.1801 defini illo per solo idea geometrico et voca « centre des moyennes distances » (p.154). Expressio  $\Sigma x a / \Sigma x$  pro barycentro occurre in Möbius, *Barycentrische Calcul*, a.1827 t.1 p.37.

### \* 11.

Per duo idea primitivo praecedente nos pote defini plure objecto geometrico; sed nos non pote defini distantia de duo puncto. Occurre novo idea primitivo, que nos sume ab Mechanica.

Si vectore  $u$  repraesenta « fort-ia », et vectore  $v$  repraesenta spatio descripto per suo puncto de applicatione, tunc « labore de fortia  $u$ , respondente ad spatio  $v$  » vale « producto de  $u$  per projectione orthogonale de  $v$  super  $u$  ». Producto hic considerato habe signo. Nos indica ce producto per  $u \times v$ , que nos lege « producto interno, vel scalare » de vectore  $u$  per vectore  $v$ . Ergo, si  $v'$  es projectione de  $v$  super  $u$ :

$$u \times v = u \times v'$$

vel si per mod $u$  nos intellige suo valore numerico, et si nos adopta notatione de trigonometria:

$$u \times v = \text{mod} u \times \text{mod} v \times \cos(u, v).$$

Analysi de explicationes nunc exposito es longo; ergo nos sume  $u \times v$  ut idea primitivo, determinato per Pp sequeute:

$$u, v, w \varepsilon v \quad \supset.$$

$$\cdot 1 \quad u \times v \varepsilon q$$

Pp

$$\cdot 2 \quad u \times v = v \times u$$

Pp Comm  $\times$ 

$$\cdot 3 \quad (u + v) \times w = u \times w + v \times w$$

Pp Distrib( $\times, +$ )

$$\cdot 4 \quad u^2 = u \times u$$

Df

\*3  $u \in v=0 \rightarrow u^2 \in Q$

Pp

P·3 exprime que projectione super  $w$  de summa  $u+v$  vale summa de projectiones de  $u$  et de  $v$ .

Ergo subsiste calculo geometrico simile ad algebrico; omni identitate de secundo gradu super quantitate repraesenta aliquo theorema de Geometria. Plure exemplo in P 13, 14, 15, 16.

Coincidentia formale de novo calculo cum antiquo es multo comodo, et conveni elige notationes ita ut coincidentia fi magno. Novo calculo non pote coincide in omni suo parte cum antiquo. Ita calculo super numero relativo «  $n$  » es simile, quasi identico, ad calculo super numeros arithmetico  $N_0$ ; calculo super rationales  $R$ , et calculo super irrationales  $Q$  es simile ad praecedentes; sed semper existe aliquo differentia.

$u \times v = 0$ , quando duo vectore es orthogonale. Non es necesse, ut in theoria de  $N_0$ ,  $n$ ,  $r$ ,  $q$ , que uno factore es nullo. Productio de vectores non es associativo. Ergo identitates de Algebra de gradu tres non habe sensu in theoria actuale.

Euclide indica productio  $u \times v$  per longo periphrasi; vide P14.

H. Grassmann a.1846 t.1 p.345, vide proprietates commutativo (P·2) et distributivo (P·3), et voca illo « innere Product ». Notatione  $u \times v$  es adoptato per Resal a.1862, Somoff,...

Productio  $u \times v$  resulta quoque, in modo indirecto, de quaterniones de Hamilton (vide « quaternione »), et de productio alternato de Grassmann a.1862 (vide operatione  $\alpha$ ). Plure auctore de libro de electricitate voca  $a \times b$  « productio scalare », vocabulo derivato ab theoria de quaterniones, cum variatione de sensu.

\* 12.  $u, v \in V . m \in N_1 . p \in n . x \in r \rightarrow$

\*1  $0 \times u = 0$  [ Distrib( $\times$ ,  $+$ )  $\rightarrow 0 \times u + 0 \times u = 0 \times u \rightarrow P$  ]

\*2  $(mu) \times v = m(u \times v)$   
[  $m=1 \rightarrow P$  ] (1)

$m \in N_1 . (mu) \times v = m(u \times v) \rightarrow [(m+1)u] \times v = (mu + u) \times v =$   
 $(mu) \times v + u \times v = m(u \times v) + u \times v = (m+1)(u \times v)$  (2)  
(1) . (2) . Induct  $\rightarrow P$  ]

\*21  $(-u) \times v = -(u \times v)$  [  $u \times v + (-u) \times v = (u - u) \times v = 0$  ]

\*22  $(-mu) \times v = -m(u \times v)$  [ P·2 . P·21  $\rightarrow P$  ]

\*3  $(pu) \times v = p(u \times v)$  [ = P·1·2·22 ]

\*31  $(u/m) \times v = (u \times v)/m$  [  $m[(u/m) \times v] = (mu/m) \times v = u \times v$  ]

\*32  $(up/m) \times v = (u \times v)p/m$  [ P·3 . P·31  $\rightarrow P$  ]

\*4  $(xu) \times v = x(u \times v)$  [ P·32  $\rightarrow P$  ]

\* 13.  $u, v, w$  εν  $\cdot \cup$ .

$$\cdot 1 \quad (u+v)^2 = u^2 + 2u \times v + v^2$$

$$\cdot 2 \quad (u+r+w)^2 = u^2 + r^2 + w^2 + 2u \times r + 2u \times w + 2r \times w$$

$$\cdot 3 \quad (u+r) \times (u-r) = u^2 - r^2$$

$$\cdot 4 \quad u \times v = [(u+v)^2 - (u-v)^2] : 4$$

Dfp

Ergo, nos pote substituo  $u^2$  ad  $u \times v$  ut idea primitivo. Resulta simplificatione in Pp 11·1·2, sed complicatione in ·3.

$$\cdot 5 \quad (u+r)^2 + (u-r)^2 = 2(u^2 + r^2) \quad \text{LAGNY ParisM. a.1706 p.319:}$$

« Dans tout parallelogramme  $[a, a+u, a+v, a+u+v]$  la somme des quarrez des deux diagonales est égale à la somme des quarrez des quatre côtez ».

$$\cdot 6 \quad (u+v)^2 - (u-v)^2 = 4u \times v$$

$$\cdot 7 \quad (u+v+w)^2 + (u+v-w)^2 + (u+w-r)^2 + (r+w-u)^2 = 4(u^2 + r^2 + w^2)$$

LEGENDRE *Géom.* p.227:

« ... dans tout parallépipède, la somme des carrés des quatre diagonales est égale à la somme des carrés des douze arêtes. »

$$\cdot 8 \quad (u+v+w)^2 + u^2 + v^2 + w^2 = (u+v)^2 + (r+w)^2 + (w+u)^2$$

$$\cdot 9 \quad (u-r)^2 + (r-w)^2 + (w-u)^2 + (u+r+w)^2 = 3(u^2 + r^2 + w^2)$$

\* 14.  $a, b, c$  ερ  $\cdot \cup$ .

$$\cdot 1 \quad (a-b)^2 = (a-c)^2 + (b-c)^2 - 2(a-c) \times (b-c)$$

$$\cdot 2 \quad (a-b)^2 = (a-c)^2 + (b-c)^2 + 2(a-c) \times (c-b)$$

EUCLIDE II P12 P13 {

In omni triangulo, quadrato de uno latere aequa summa de quadrato de alio duo latere, plus aut minus duplo producto (interno) de duo latere, considerato ut vectore; vel duplo producto de uno latere per projectione de altero super primo; vel duplo producto de valore absoluto de duo latere per cosinus de angulo comprehenso.

$$\cdot 3 \quad (a-b) \times (b-c) = 0 \quad .\Rightarrow \quad (a-c)^2 = (a-b)^2 + (b-c)^2$$

PYTHAGORA; vide Plutarcho *Symp.* VIII c.4 {

$$\cdot 4 \quad (a-c) \times (b-c) = 0 \quad .\Rightarrow \quad (a-c)^2 = (a-c) \times (a-b)$$

$$\cdot 5 \quad 2[a-(b+c)/2]^2 = (a-b)^2 + (a-c)^2 - (b-c)^2/2$$

APOLLONIO: vide P15·7 {

Vectore  $a-(b+c)/2$  vocare « mediana » de triangulo  $abc$ .

$$\cdot 6 \quad 2(c-b) \times [a-(b+c)/2] = (a-b)^2 - (a-c)^2$$

\* 15.  $a, b, c, d, e, f$  ερ  $\cdot \cup$ .

$$\cdot 0 \quad (a-b) \times (c-d) + (b-c) \times (a-d) + (c-a) \times (b-d) = 0$$

« Si in tetrahedro  $abcd$  latere  $ab$  es orthogonale ad suo opposito  $cd$ , vel  $(a-b) \times (c-d) = 0$ , et si latere  $bc$  es orthogonale ad suo opposito  $ad$ , vel

$(b-c) \times (a-d) = 0$ , tunc  $(c-a) \times (b-d) = 0$ , et latere  $ca$  es orthogonale ad suo opposito  $bd$ .

Vel, « si in triangulo  $abc$ , puncto  $d$  jace super perpendiculare de  $c$  ad  $ab$ , et super perpendiculare de  $a$  ad  $bc$ , tunc illo jace etiam super perpendiculare de  $b$  ad  $ac$  ». ; Euler, pro punctos super recta.!

$$\cdot 1 \quad (a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-d)^2 + (d-a)^2 = (a-c)^2 + (b-d)^2 + 4[(a+c)/2 - (b+d)/2]^2 \quad \text{EULER PetrNC. a.1748 t.1 p.66}$$

$$\cdot 11 \quad 2(a-b) \times (c-d) = (a-d)^2 + (b-c)^2 - (a-c)^2 - (b-d)^2$$

; CARNOT a.1806; STAUDT JfM. a.1842 p.252

$$\cdot 2 \quad (x-a) \times (x-b) = 0 \Rightarrow [x - (a+b)/2]^2 = (b-a)^2/4$$

; THALETE; vide DIOGENE LAERTIO I 24: « *φησὶ Παμφίλη πρῶτον (THALETE) καταγράφει κύκλον τὸ τρίγωνον ὀρθογώνιον καὶ θύσαι βόυν.* »

« Si angulo  $axb$  es recto, tunc distantia de puncto  $x$  ad puncto  $(a+b)/2$  es constante ».

$$\cdot 3 \quad (x-a)^2 = (x-b)^2 \Rightarrow [x - (a+b)/2] \times (b-a) = 0$$

$$\cdot 4 \quad m \in \mathbb{R} \setminus 1 \quad \text{D:}$$

$$(x-a)^2 = m(x-b)^2 \Rightarrow [x - (mb-a)/(m-1)]^2 = (b-a)^2 m/(m-1)^2$$

; 3, 4 APOLLONIO t.2 p.116: « *ἐὰν ἀπὸ δύο δεδομένων σημείων εὐθελῶς κλασθῶσιν, καὶ ἡ τὰ ἀπ' αὐτῶν δοθέντι χωρίῳ διαφέροντα, τὸ σημεῖον ἄψεται θέσει δεδομένης εὐθείας.* »

*ἐὰν δὲ ὡσιν ἐν λόγῳ δοθέντι, ἦτοι εὐθείας ἢ περιφερείας.* »

$$\cdot 6 \quad n \in \mathbb{N}_1, a \in F^{1 \cdots n}, g = (\sum a)/n, x \in F \quad \text{D:}$$

$$\sum (x-a)^2 = n(x-g)^2 + \sum (g-a)^2$$

; APOLLONIO t.2 p.116: « *ἐὰν ἀπὸ δυνάμεων δεδομένων σημείων κλασθῶσιν εὐθελῶς πρὸς ἐνὶ σημείῳ, καὶ ἡ τὰ ἀπὸ πασῶν εἶδη ἴσα δοθέντι χωρίῳ, τὸ σημεῖον ἄψεται θέσει δεδομένης περιφερείας.* »

$$\cdot 7 \quad n \in \mathbb{N}_1, a \in p f^{1 \cdots n}, a \in q f^{1 \cdots n}, \sum(x, 1 \cdots n) = 0, g =$$

$$\sum(x, a_r | r, 1 \cdots n) / \sum(x, 1 \cdots n), p \in p \quad \text{D:}$$

$$\sum [x_r (p-a_r)^2 | r, 1 \cdots n] = \sum [x_r (g-a_r)^2 | r, 1 \cdots n] + \sum(x, 1 \cdots n) (p-g)^2$$

Si  $n$  es numero naturale, et si  $a$  es successione de  $n$  puncto, vel si  $a_1, a_2, \dots, a_n$  es puncto, et si  $x$  es successione de  $n$  quantitate, vel si  $x_1, x_2, \dots, x_n$  es quantitate, et summa de illos non es nullo, et si nos voca  $g$  barycentro de punctos  $a$  cum pondo  $x$ , et si nos suine puncto arbitrario  $p$ , tunc:

Summa de quadratos de distantias de puncto  $p$  ad differente puncto  $a$ , multiplicato per correspondente pondo  $x$ , vale summa analogo calculato pro barycentro, plus pondo totale multiplicato per quadrato de distantia de puncto  $p$  ad barycentro  $g$ .

Summa considerato es dicto « momento de inertia de systema  $x_1 a_1 \dots x_n a_n$  relativo ad puncto  $p$  ».

\* 16.1  $a, b, c \in p . m, n \in q . \supset$

$$[(m+n)a - (mb+nc)]^2 = m(m+n)(a-b)^2 + n(m+n)(a-c)^2 - mn(b-c)^2$$

} STEWART a.1746 {

\*2  $a, b, c, d \in p . m, n, p \in q . \supset$

$$[(m+n+p)a - (mb+nc+pd)]^2 = (m+n+p)[m(a-b)^2 + n(a-c)^2 + p(a-d)^2] - mn(b-c)^2 - mp(b-d)^2 - np(c-d)^2$$

mod dist

\* 21.  $u, r \in v . \supset$       ·0  $\text{mod } u = \sqrt{u^2}$       Df

·1  $\text{mod } 0 = 0$       ·11  $\text{mod } u = 0 . \supset . u = 0$

·2  $\text{mod}(-u) = \text{mod } u$

·3  $x \in r . \supset . \text{mod}(xu) = \text{mod } x \text{ mod } u$

[  $\text{mod}(xu) = \sqrt{[(xu)^2]} = \sqrt{x^2 u^2} = \sqrt{x^2} \sqrt{u^2} = \text{mod } x \text{ mod } u$  ]

·4  $\text{mod}(u \times v) \leq \text{mod } u \text{ mod } v$

[  $x \in r . \supset . (xu+v)^2 \leq 0 . \supset . x^2 u^2 + 2xu \times v + v^2 \leq 0 : \supset .$   
 $(\text{mod } u)^2 (\text{mod } v)^2 \leq (u \times v)^2 . \supset . P$  ]

·5  $\text{mod}(u+v) \leq \text{mod } u + \text{mod } v$

[ P·4 .  $\supset . \text{mod}(u+v) = \sqrt{u^2 + 2u \times v + v^2} \leq$   
 $\sqrt{(\text{mod } u)^2 + 2\text{mod } u \text{ mod } v + (\text{mod } v)^2} . \supset . P$  ]

\* 22.  $a, b \in p . u, r \in \text{Cls}'p . \supset$ :

·1  $d(a, b) = \text{dist}(a, b) = \text{mod}(b-a)$       Df

·2  $d(a, v) = 1, d(a, y) | y'v$        $d(u, b) = 1, d(x, b) | x'u$       Df

·3  $d(u, v) = 1, d(x, y) | (x, y)'(u, v)$       Df

$d(a, b)$ , vel  $\text{dist}(a, b)$ : indica distantia de  $a$  ad  $b$ ;  $a$  et  $b$  es puncto (P·1), aut classe de puncto vel figura (P·3).

\* 23.  $a, b, c, d \in p . \supset$       ·1  $d(a, b) \leq d(a, c) + d(c, b)$  [ = P21·5 ]  
 } EUCLIDE I P20:

« Παντός τριγώνου αἱ δύο πλευραὶ τῆς λοιπῆς μείζονές εἰσι. » {

·2  $d(a, b) = d(a, c) = d(b, c) = 1 . \supset$

$d[(a+b)/2, c] = \sqrt{3}/2$  .

$d[(a+b+c)/3, a] = \sqrt{3}$       } EUCLIDE XIII P12:

« Ἐὰν εἰς κύκλον τρίγωνον ἰσοπλευρον ἐγγραφῇ, ἡ τοῦ τριγώνου πλευρὰ δυνάμει τριπλασίων ἐστὶ τῆς ἐκ τῆς κέντρος τῶ κύκλου. » {

Mediana et radio de circulo circumscripto ad triangulo regulare.

- \*3  $d(a,b) = d(a,c) = d(a,d) = d(b,c) = d(b,d) = d(c,d) = 1$  .  
 $d[(a+b)/2, (c+d)/2] = \sqrt{2}$  .  $d[(a+b+c)/3, d] = \sqrt{2/3}$  .  
 $d[(a+b+c+d)/4, a] = \sqrt{3/8}$  } EUCLIDE XIII P13:  
 « ἡ τῆς σφαίρας διάμετρος δυνάμει ἡμιολία ἐστὶ τῆς πλευρᾶς τῆς  
 πυραμίδος. » }

Distanția de latere opozito, altitudo, radio de sphaera circumscripto ad tetrahedro regulare.

\* 24.

Si nos sume ut idea primitivo « puncto », et relatione inter tres puncto  $a, b, c$ , que nos indica per  $d(a, c) = d(b, c)$   
 lege «  $a$  et  $b$  es aequidistante de  $c$  », nos pote defini omni ente de Geometria.

Definitione de puncto medio de duo puncto  $a$  et  $b$ , indicato per  $(a+b)/2$ :

- \*1  $a, b \varepsilon p$  . $\supset$ .  $(a+b)/2 = i p \wedge x \exists [d(x, a) = d(x, b) :$   
 $y \varepsilon p . d(y, a) = d(x, a) . d(y, b) = d(x, b) . \supset y = x]$  Dfp

Df de aequalitate de duo vectore:

- \*3  $a, b, c, d \varepsilon p$  . $\supset$ .  $a-b = c-d$  . $\equiv$ .  $(a+d)/2 = (b+c)/2$  Dfp  
 Ergo habet sensu serie de Prop 1-10.

$u, v \varepsilon v$  . $\supset$ :

- \*4  $\text{mod } u = \text{mod } v$  . $\equiv$ .  $a \varepsilon p$  . $\supset_a$ .  $d(a, a+u) = d(a, a+v)$  Dfp  
 Df de aequalitate de modulo de duo vectore.

Tunc P22.1 defini distantia de duo puncto.

- \*5  $u \times v = 0$  . $\equiv$ .  $\text{mod}(u+v) = \text{mod}(u-v)$  Dfp

Df de relatione  $u \times v = 0$ , « vectores  $u$  et  $v$  es perpendicularare ».

- \*6  $u, v \varepsilon v$  . $\supset$ :

$\text{mod } u \leq \text{mod } v$  . $\equiv$ .  $\exists v' \exists z [u \times z = 0 . \text{mod } u = \text{mod}(v+z)]$  Dfp

Df de relatione  $\leq$  inter duo long-ore; unde nos deduce relatione  $>$ .

vct q

\* 25. (vct | cx) §cx P11  
 (pnt » »

- \*1  $u \varepsilon \text{Cls}'p$  . $\supset$ .  $\lambda u = p \wedge a \exists [d(a, u) = 0]$  Dfp

\* 26.1  $u \varepsilon v . x \varepsilon q$  . $\supset$ .  $xu = i \} \lambda [(r \wedge \theta x)u] \wedge \lambda [(r \wedge x/\theta)u] \}$  Df

Df de producto de numero irrationale per vectore.

- \*2  $x \varepsilon q \rightarrow r . u \varepsilon v$  . $\supset$ .  $xu \varepsilon v$  Pp

- \*3  $(q | r)$  P6.3.6, P7, P12.9



$$* \quad 27.1 \quad i \in v \neq 0 \quad \supset \quad \exists v = (qi) \quad \text{Pp}$$

$$2 \quad i \in v \neq 0 \quad . j \in v = (qi) \quad \supset \quad \exists v = (qi + qj) \quad \text{Pp}$$

$$3 \quad i \in v \neq 0 \quad . j \in v = (qi) \quad . k \in v = (qi + qj) \quad \supset \quad v = qi + qj + qk \quad \text{Pp}$$

Si  $i$  es vectore non nullo,  $qi$  significa « producto de aliquo numero reale per  $i$  » vel vectore parallelo ad  $i$ .

Pp.1 dice que existe vectores non parallelo ad vectore dato; ille ne es satisfacto si nos considera solo vectores pertinente ad recta dato.

Si  $i$  es vectore non nullo, et  $j$  es vectore non parallelo ad  $i$ , tunc  $qi + qj$  significa « vectore summa de duo vectore, uno parallelo ad  $i$ , et altero ad  $j$  »; vel « vectore complanare cum  $i$  et  $j$  ».

Pp.2 dice que existe vectores non complanare cum duo vectore non parallelo dato. Ille ne es satisfacto si nos considera solo vectores in plano dato.

Pp.3 dice que spatio que nos considera habe tres dimensione. Ille ne es satisfacto si nos substitue « vet » per « Cx4 ».

Ce tres Pp, necessario in aliquo casu, es minus interessante.

$$4 \quad \text{Hp.3} \quad . x, y, z \in q \quad . xi + yj + zk = 0 \quad \supset \quad x = 0 \quad . y = 0 \quad . z = 0$$

$$[ i, j, k \in v \quad . x, y, z \in q \quad . xi + yj + zk = 0 \quad . x = 0 \quad \supset \quad$$

$$i = -y/j \cdot xj + i - z/x \cdot k \quad \supset \quad i \in qj + qk \quad (1)$$

Hp. (1). Transp  $\supset$  P ]

$$5 \quad \text{Hp.3} \quad . x, y, z, x', y', z' \in q \quad . xi + yj + zk = x'i + y'j + z'k \quad \supset \quad$$

$$x = x' \quad . y = y' \quad . z = z'$$

$$6 \quad \text{Hp.3} \quad . o \in p \quad \supset \quad p = o + qi + qj + qk$$

Numeros  $x, y, z$  que figura in P.4.5 vocare « coordinatas de vectore  $xi + yj + zk$  relato ad vectores fundamentale  $i, j, k$  ». Illos et vocare « coordinatas de puncto  $o + xi + yj + zk$  relato ad origine  $o$  et ad ipsos vectore ».

Quantitates  $x, y, z, t$  es « coordinatas barycentric » de  $xa + yb + zc + td$ , si  $a, b, c, d$  es punct; et « projectivo », si  $a, b, c, d$  es summa de punctos.

\* 28.

$$o \in p \quad . i \in v \neq 0 \quad . j \in v = qi \quad . k \in v = (qi + qj) \quad . x, y, z, x', y', z', m \in q \quad \supset$$

$$1 \quad (xi + yj + zk) + (x'i + y'j + z'k) = (x + x')i + (y + y')j + (z + z')k$$

$$[ \text{Assoc} + \supset P ]$$

$$2 \quad m(xi + yj + zk) = mxi + myj + mzk \quad [ \text{Distrib}(m \times, +) \supset P ]$$

$$3 \quad (o + x'i + y'j + z'k) - (o + xi + yj + zk) =$$

$$(x' - x)i + (y' - y)j + (z' - z)k \quad [ \text{Assoc} + \supset P ]$$

$$4 \quad (xi + yj + zk) \times (x'i + y'j + z'k) = xx'i^2 + yy'j^2 + zz'k^2 + (xy' + x'y)$$

$$i \times j + (xz' + x'z)i \times k + (yz' + y'z)j \times k \quad [ \text{Distrib}(\times, +) \supset P ]$$

$$i^2 = j^2 = k^2 = 1 \quad . i \times j = j \times k = k \times i = 0 \quad \supset$$

$$5 \quad (xi + yj + zk) \times (x'i + y'j + z'k) = xx'i + yy'j + zz'k \quad [ \text{Distrib}(\times, +) \supset P ]$$

- 6  $(xi+yj+zk)^2 = x^2+y^2+z^2$  [ Distrib( $\times, +$ )  $\supset$  P ]  
 ·7  $\text{mod}(xi+yj+zk) = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$  [ Df mod . P.6 .  $\supset$  P ]  
 ·8  $\text{dist}(o+xi+yj+zk, o+x'i+y'j+z'k) = \sqrt{(x'-x)^2+(y'-y)^2+(z'-z)^2}$  [ Df dist . P.7 .  $\supset$  P ]  
 ·1 Coordinatas de summa de duo vectore.  
 ·2 „ de producto de vectore per numero.  
 ·3 „ de vectore differentia de duo puncto.  
 ·4 Producto de duo vectore de dato coordinatas.  
 ·5-8 Casu de coordinatas orthogonale.

pnt -

\* 29.  $a, b \in p \supset$ .

- 1  $a-b = a + \theta(b-a)$  .  $a \neg b = a + \theta(b-a)$  Df

Indica segmento de punctos comprehenso inter  $a$  et  $b$ . Existe Geometria de positione fundato super idea primitivo « pnt » et « segmento ». Vide « Peano *Principii di Geometria* a.1889 » et RdM. a.1894 p.51-90.

- 2  $a \in p$  .  $u \in \text{Cls}'p \supset$  .  $a \neg u = p \wedge x \exists u \wedge y \exists (x \in a \neg y)$  Df  
 ·3  $a, b \in p$  .  $c \in a \neg b \supset$  .  $d(a, c) + d(c, b) = d(a, b)$   
 ·4  $a, b, c \in p$  .  $d \in a \neg b \neg c \supset$  .  $d(d, b) + d(d, c) \leq d(a, b) + d(a, c)$   
 { EUCLIDE I P21 }  
 [ Hp .  $e \in a \neg c$  .  $d \in b \neg c \supset$  .  $d(d, c) \leq d(d, e) + d(e, c)$  . Oper +  $d(b, d) \supset$  .  
 $d(b, d) + d(d, c) \leq d(b, d) + d(d, e) + d(e, c)$  . P.3  $\supset$  .  $d(b, d) + d(d, c) \leq d(b, e) + d(e, c)$  .  $d(b, e) \leq d(b, a) + d(a, e) \supset$  .  $d(b, d) + d(d, c) \leq d(b, a) + d(a, e) + d(e, c) = d(b, a) + d(a, c)$  ]

U

\* 30.  $u \in v \neg 0 \supset$  .  $0 \neg Uu = u/\text{mod } u$  Df

- 1  $\text{mod } Uu = 1$  .  $U(-u) = -Uu$  .  $a \in Q \supset$  .  $Uau = Uu$   
 ·2  $i, j, k \in v$  .  $i^2 = j^2 = k^2 = 1$  .  $i \times j = j \times k = k \times i = 0$  .  $x, y, z \in q$  .  
 $x^2 + y^2 + z^2 > 0 \supset$  .  $U(xi+yj+zk) = (xi+yj+zk)/\sqrt{x^2+y^2+z^2}$   
 [ Df U  $\supset$  P ]

$Uu$ , lege « unitate de  $u$  », es introducto per Hamilton. Responde ad « signu » de Arithmetica pag.94.

vet lin Subst

\* 31.  $(v \mid Cx) \S \text{Subst}$ 

- 1  $u \in v \supset$  .  $(u \times v \mid v, v) \in (qFv) \text{lin}$

§2 recta  $p$ , plan  $p$ .

Ce § contine propositiones relativo ad symbolos, frequente in lingua commune, et minus importante pro calculo geometrico.

\* 1.1  $a \in p . u \in v \rightarrow 0 . \supset . \text{recta}(a, u) = a + qu$  Df  
Recta que transi per  $a$ , et es parallelo ad vectore  $u$ .

1.1  $\text{Hp} . 1 . m \in q \rightarrow 0 . \supset . \text{recta}(a, u) = \text{recta}(a, mu)$

2  $p = x \exists \{ \exists (a, u) \exists [a \in p . u \in v \rightarrow 0 . x = \text{recta}(a, u)] \}$  Df  
= « recta ».

3  $\text{Hp} . 1 . b \in p . \supset . d[b, \text{recta}(a, u)] = \sqrt{\{(b-a)^2 - [(b-a) \times Uu]^2\}}$

4  $a \in p . b \in p \rightarrow a . \supset . \text{recta}(a, b) = \text{recta}(a, b-a) = a + q(b-a)$  Df

\* 2.1  $a \in p . u \in v \rightarrow 0 . r \in v \rightarrow qu . \supset . \text{plan}(a, u, r) = a + qu + qv$  Df  
Plano determinato per uno puncto et duo vectore.

2  $p = x \exists \{ \exists (a, u, r) \exists [a \in p . u \in v \rightarrow 0 . r \in v \rightarrow qu . x = \text{plan}(a, u, r)] \}$  Df  
= « plano ».

3  $a \in p . b \in p \rightarrow a . c \in p \rightarrow \text{recta}(a, b) . \supset .$   
 $\text{plan}(a, b, c) = \text{plan}(a, b-a, c-a)$  Df

 $\text{cmp} \parallel \quad \text{cmp} \perp$ 

\* 3.  $u \in v \rightarrow 0 . v, w \in v . \supset . \quad \text{0} \quad (\text{cmp} \parallel u)r = (v \times Uu)Uu$  Df  
« componente parallelo ad  $u$  de  $v$  ».

0.1  $(\text{cmp} \perp u)v = v - (\text{cmp} \parallel u)v$  Df  
« componente normale ad  $u$  de  $v$  ».

1  $(\text{cmp} \parallel u)(v+w) = (\text{cmp} \parallel u)v + (\text{cmp} \parallel u)w$

1.1  $\text{ » } \perp \text{ » } \quad \text{ » } \perp \text{ » } \quad \text{ » } \perp \text{ » }$

2  $(\text{cmp} \parallel u)r = 0 . \equiv . u \times r = 0 \quad : \quad (\text{cmp} \perp u)r = 0 . \equiv . r \in qu$

3  $(\text{cmp} \parallel u, v), (\text{cmp} \perp u, v) \in (vFv)\text{lin}$

## proj

\* 4.1  $x \in p . a \in p . \supset .$   
 $(\text{proj} a)x = 1 \text{ or } y \exists [y \in a . \supset . (y-x) \times (y-x) = 0]$  Df  
= « projectione super recta  $a$  de  $x$  ».

- 2  $x \varepsilon p . a \varepsilon p . \supset$   
 $(\text{proj}a)x = \text{proj}a \cdot y \exists [z \varepsilon a . \supset z . (y-x) \times (y-z) = 0]$  Df  
 $=$  « projectione super plano  $a$  de  $x$  ».
- 3  $x \varepsilon p . a \varepsilon p . \supset$   $d(x, a) = d[x, (\text{proj}a)x]$  Dfp
- 4  $\text{ » } . a \varepsilon p . \supset$   $\text{ » } \text{ » }$  Dfp

\* 5. Transl

- $u, v \varepsilon v . \supset$  ·0  $\text{Transl}u = [(p+u)|p, p]$  Df  
 $=$  « translatione repraesentato per vectore  $u$  ».
- 1  $(\text{Transl}v)(\text{Transl}u) = \text{Transl}(u+v)$
- 2  $m \varepsilon N_1 . \supset$   $(\text{Transl}u)^m = \text{Transl}mu$
- 3  $(\text{Transl}u)^{-1} = \text{Transl}(-u)$

Sym

\* 6.  $a, b \varepsilon p . u \varepsilon v . \supset$ :

- 0  $\text{Sym}a = \{[a+(a-x)]|x, p\}$  Df  
 $=$  « symmetria relativo ad  $a$  ».
- 1  $(\text{Sym}a)^2 = (\text{idem}, p)$  ·2  $(\text{Sym}a)^{-1} = \text{Sym}a$
- 3  $(\text{Sym}b)(\text{Sym}a) = \text{Transl } 2(b-a)$
- 4  $\text{Transl}u = [\text{Sym}(a+u/2)](\text{Sym}a)$
- 5  $(\text{Transl}u)(\text{Sym}a) = \text{Sym}(a+u/2)$
- 6  $(\text{Sym}a)(\text{Transl}u) = \text{Sym}(a-u/2)$

\* 7.  $a \varepsilon p . \supset$  ·0  $\text{Sym}a = \{[2(\text{proj}a)x-x]|x, p\}$  Df

- 1  $(\text{Sym}a)^2 = (\text{idem}, p)$  ·2  $(\text{Sym}a)^{-1} = \text{Sym}a$
- 3  $a, b \varepsilon p . \supset$   $[(\text{Sym}a)(\text{Sym}b)]^{-1} = \text{Sym}b \text{Sym}a$

\* 8.  $a \varepsilon p . \supset$  P7·0·2

- 1  $a \varepsilon p . u, v \varepsilon v . v = 0 . a \times v = 0 . \supset$   
 $\text{Sym}(a+u/2+qv)\text{Sym}(a+qv) = \text{Transl}u$
- $a \varepsilon p . u, v, w \varepsilon v \rightarrow 0 . u \times v = u \times w = w \times u = 0 . \supset$
- 2  $\text{Sym}(a+qu) = \text{Sym}(a+qv) \text{Sym}(u+qv)$
- 3  $\text{Sym}(a+qu) \text{Sym}(a+qv+qv) = \text{Sym}a$
- 4  $\text{Sym}(a+qv+qv) \text{Sym}(a+u+qv+qv) = \text{Transl } 2u$

## \* 9.

## Motor

•0  $\text{Motor} = m\exists\{a(b)\exists[a,b\epsilon p_2 . m = (\text{Syma})(\text{Symb})]\}$  Df

« Motor » indica motu de corpore rigido, rato ut transformatione de puncto in puncto. Nos pote defini illo ut producto de duo symmetria.

•1  $u\epsilon v \supset \text{Translu} \epsilon \text{Motor}$  [ P8.1  $\supset$  P ]

•2  $a\epsilon p_2 \supset \text{Syma} \epsilon \text{Motor}$  [ P8.2  $\supset$  P ]

Translatione et symmetria circa axi es motor.

•3  $m,n\epsilon \text{Motor} \supset mn \epsilon \text{Motor}$

•4  $m\epsilon \text{Motor} \supset m^{-1} \epsilon \text{Motor}$  [ P7.3  $\supset$  P ]

•5  $m\epsilon p\text{Fp} : x,y\epsilon p . \supset_{x,y} d(mx,my) = d(x,y) : \supset$   
 $m\epsilon \text{Motor} : \supset a\epsilon p_2 \supset_a (\text{Syma})m \epsilon \text{Motor}$

Si  $m$  es transformatione de puncto in puncto, et si distantia de duo puncto  $x,y$  semper aequa distantia de correspondentes  $mx,my$ , tunc aut  $m$  es Motor, aut, si  $a$  es plano, producto de  $m$  per symmetria circa  $a$  es Motor.

•6  $m,n,p\epsilon \text{Motor} \supset$

$\exists(a,b,c)\exists[a,b,c\epsilon p_2 . (\text{Syma})m = (\text{Symb})n = (\text{Symc})p]$

{ HALPHEN a.1882 AnnN. s.2 t.1 p.299:

« Trois positions quelconques d'une même figure dans l'espace sont les symétriques d'une seule et même figure prise respectivement par rapport à trois droites ».

•7  $m\epsilon \text{Motor} \supset \exists p_2 \wedge \exists x(m\cdot x = x)$  { MOZZI a.1763 p.5:

« Il movimento si riduce a due altri, uno dei quali... di rotamento... e l'altro sarà rettilineo... e parallelo all'asse di rotazione ».

CHASLES a.1830 *Bulletin de Férussac* t.14 p.324:

« Quand on a dans l'espace un corps solide libre, si on lui fait éprouver un déplacement fini quelconque, il existera toujours dans ce corps, une certaine droite indéfinie, qui après le déplacement, se retrouvera au même lieu qu'auparavant ».

•8  $a\epsilon p . m\epsilon \text{Motor} . ma = a \supset \exists p_2 \wedge \exists x(x\epsilon y \supset_x mx = x)$

Omni motu que tene fixo puncto  $a$  es rotatione circa axi per  $a$ .

{ EULER, *Formulae generales pro translatione quacunque corporum rigidorum*, PetrNC. t.20 p.202 {

•9  $a,b,a',b'\epsilon p . d(a,b) = d(a',b') . b-a = b'-a' \supset \exists(n,y)\exists$   
 $[n\epsilon \text{Motor} . y\epsilon p_2 . na = a' . nb = b' : x\epsilon y \supset_x nx = x]$

Si distantia de punctos  $a$  ad  $b$  aequa distantia de  $a'$  ad  $b'$ , tum existe translatione aut rotatione circa axi, que fer  $a$  in  $a'$ , et  $b$  in  $b'$ .

## \* 10. Homot

 $a, b, c, p \in p . h, k \in q . u \in v . \supset$ 

·0  $\text{Homot}(c, k) = \{[c + k(p - c)] | p, p\}$  Df  
 $= \text{« Homothetia de centro } c \text{ et de ratione } k \text{ »} .$

·1  $\text{Homot}(c, 1)p = p . \text{Homot}(c, -1)p = (\text{Sym}c)p$

·2  $\text{Homot}(c, k)b - \text{Homot}(c, k)a = k(b - a)$

·3  $k \Leftarrow 1 . \supset . \text{Homot}(c, k)\text{Transl}u = \text{Homot}[c + uk/(1 - k), k]$

·4  $hk \Leftarrow 1 . \supset .$

$[\text{Homot}(b, k)][\text{Homot}(a, h)] = \text{Homot}[a + (b - a)(1 - k)/(1 - hk), hk]$

·5  $k \Leftarrow 0 . \supset . [\text{Homot}(b, /k)][\text{Homot}(a, k)] = \text{Transl}(b - a)(1 - /k)$

·6  $m \in \mathbb{N}_1 . \supset . [\text{Homot}(c, k)]^m = \text{Homot}(c, k^m)$

cos sin

\* 11.  $u, v \in v \neq 0 . \supset$  ·0  $\cos(u, v) = (Uu) \times (Ur)$  Df cos

·1  $\text{mod } \cos(u, v) = \text{mod}(\text{cmp} || u)Ur$

·2  $\cos(u, v) = \cos(v, u)$

$[\cos(u, v) = Uu \times Ur = Ur \times Uu = \cos u, v]$

·21  $\cos(-u, v) = -\cos(u, v)$

$[\cos(-u, v) = U(-u) \times Ur = (-Uu) \times Ur = -(Uu \times Ur) = -\cos(u, v)]$

·3  $\cos(-u, -v) = \cos(u, v)$  [P·21 .  $\supset$  . P]

·31  $-1 \leq \cos(u, v) \leq 1$

·4  $\cos(u, u) = 1 . \cos(u, -u) = -1$  [Df cos .  $\supset$  . P]

·5  $\cos(u, v) = (u \times r) / [\text{mod } u \times \text{mod } r]$

·6  $u \times v = \text{mod } u \text{ mod } v \cos(u, v)$

[P·5 . Oper  $\times$  (mod  $u$  mod  $v$ ) .  $\supset$  . P]

\* 12.  $u, v \in v \neq 0 . \supset$  ·1  $\sin(u, v) = \text{mod}(\text{cmp} \perp u)Ur$  Df sin

·2  $\sin(u, v) = \sin(v, u) = \sin(-u, v)$

·3  $\sin(u, u) = 0$  ·4  $0 \leq \sin(u, v) \leq 1$

·5  $[\sin(u, v)]^2 + [\cos(u, v)]^2 = 1$

$[u, v \in v \neq 0 . \supset . v = r \text{ cmp } \perp u . Ur \div r \text{ cmp } || u) . Ur$  (1)

(1) .  $\supset . 1 = [\text{cmp } \perp u . Ur]^2 + [\text{cmp } || u) . Ur]^2$  (2)

P11·1, 12·1. (2) .  $\supset$  . P

·6  $\sin(u, v) = \sqrt{[1 - \cos(u, v)]^2}$  Dfp

·7  $v \in q u . \supset . \sin(u, v) = \cos[r, (\text{cmp} \perp u)v]$  Dfp

\* 13.  $i, j, k \in v . i^2 = j^2 = k^2 = 1 . i \times j = j \times k = k \times i = 0 . x, y, z, x', y', z' \in q . -(x = y = z = 0) . -(x' = y' = z' = 0) . \supset$

$$\cdot 1 \quad \cos(xi + yj + zk, i) = x / \sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)} .$$

$$, j) = y / \sqrt{...}$$

$$, k) = z / \sqrt{...}$$

[ Df cos  $\supset$  P ]

$$\cdot 2 \quad \cos(xi + yj + zk, x'i + y'j + z'k) = (xx' + yy' + zz') / \sqrt{[(x^2 + y^2 + z^2)(x'^2 + y'^2 + z'^2)]} \quad [ \text{Df cos} \supset P ]$$

$$\cdot 3 \quad \sin(xi + yj + zk, x'i + y'j + z'k) = \sqrt{[(yz' - y'z)^2 + (zx' - x'z)^2 + (xy' - x'y)^2] / [(x^2 + y^2 + z^2)(x'^2 + y'^2 + z'^2)]} \\ [ \dots = \sqrt{1 - \cos^2(xi + yj + zk, x'i + y'j + z'k)} = \dots ]$$

Vide continuatione in § π.

\* 14. coord (coordinata)

$$i \in v \neq 0 . j \in v \neq qi . k \in v \neq (qi + qj) . u \in v . \supset :$$

$$\cdot 0 \quad \text{coord}(u; i, j, k) = \eta q \wedge x \exists (u - xi \in qj + qk) \quad \text{Df}$$

coord( $u; i, j, k$ ) significa « primo coordinata de vectore  $u$ , relato ad vectores  $i, j, k$  ».

$$\cdot 1 \quad \text{coord}(u + v; i, j, k) = \text{coord}(u; i, j, k) + \text{coord}(v; i, j, k)$$

$$\cdot 2 \quad \text{coord}(mu; i, j, k) = m \text{coord}(u; i, j, k)$$

$$\cdot 3 \quad u = [\text{coord}(u; i, j, k)]i + [\text{coord}(u; j, k, i)]j + [\text{coord}(u; k, i, j)]k$$

$$\cdot 4 \quad i \in v \neq 0 . j' \in v \neq qi' . k' \in v \neq (qi' + qj') . \supset$$

$$\text{coord}(u; i', j', k') = \text{coord}(u; i, j, k) \text{coord}(i; i', j', k') +$$

$$\text{coord}(u; j, k, i) \text{coord}(j; i', j', k') + \text{coord}(u; k, i, j) \text{coord}(k; i', j', k')$$

Transformatione de coordinatas. Euler t. 2, p. 17.

$$\cdot 5 \quad \text{coord}(u; i, j, k) = (1, 0, 0) (i, j, k) u \quad \text{Dfp}$$

$$\cdot 6 \quad i, j, k \in v . i^2 = j^2 = k^2 = 1 . i \times j = i \times k = j \times k = 0 . \supset :$$

$$u \in v . \supset . \text{coord}(u; i, j, k) = u \times i$$

## §3 A

\* 1.  $u, v \in V \neq 0$ .  $u^2 = v^2$ .  $u \times v =$

$$0 \quad v/u = (v, -u)/(u, v)$$

Si  $u$  et  $v$  es vectore, non nullo, a  
gonales, tunc  $v/u$  indica substitutio  
sponde vectores  $v$  et  $-u$ . Ce substitu  
id es complanare cum  $u$  et  $v$ ; et ha  
de Algebra.

Wessel a.1797 et Bellavitis a.  
nario, id es multiplica vectores in p

$$i = v/u \quad x, y, x', y' \in \mathbb{R} \quad \bigcup$$

$$1 \quad iu = v \quad iv = -u \quad i(xu + yv)$$

$$2 \quad \text{modi}(xu + yv) = \text{mod}(xu -$$

$$4 \quad (x' + iy')(xu + yv) = (x'x - y'y)$$

$$5 \quad \text{mod}(x + iy) = \sqrt{(x^2 + y^2)}$$

\* 2.

$$0 \quad A = i\mathbb{R} \cup (u, v) \mathbb{R} \quad (u, v \in V \neq 0)$$

$A =$  «absoluto», indica omni sub  
Cayley introduce vocabulo «al  
complexo «right radial».

$$1 \quad i \in A \quad \bigcup \quad i^2 = -1 \quad \text{modi} =$$

$$2 \quad x, y, x', y' \in \mathbb{R} \quad i, j \in A \quad x + iy$$

$$[ \quad iy = (x' - x) + jy' \quad \bigcup \quad -y^2 = (x' - x)$$

$$y'^2 - y^2 - (x' - x)^2 = 2(x' - x)(j - j')$$

$$\bigcup \quad (y'^2 - y^2)^2 - 2(y'^2 - y^2)(x' - x)$$

$$\bigcup \quad (y'^2 - y^2)^2 + 2(y'^2 + y'^2)(x' - x)$$

$$\bigcup \quad [(x' - x)^2 + y'^2 + y'^2]^2 - 4y'^2 y'^2$$

$$\bigcup \quad [(x' - x)^2 + (y' - y)^2][(x' - x)$$

$$\bigcup \quad (x' - x)^2 + (y' - y)^2 = 0 \quad \bigcup \quad x$$

$$\bigcup \quad x - x = 0 \quad y' - y = 0 \quad \bigcup \quad x$$

$$\bigcup \quad x' - x = 0 \quad y' - y = 0 \quad \bigcup \quad y$$

$$3 \quad \text{Hp}^2 \quad y = 0 \quad \bigcup \quad j = i \quad \text{sgn}$$



\* 3.0 quaternio = qtr =  $q + qA$  Df

« Quaternio » es omni expressione de forma  $x+iy$ , ubi  $x$  et  $y$  es numero reale, et  $i$  es uno unitate imaginario.

Hamilton introduce vocabulo « quaternio », nam illo es determinato per 4 numero reale (P6.1).

$a, b \in \text{qtr} . x, y \in q . i \in A . \supset$

·1  $\text{reala} = \text{! } q \wedge x \exists (a - x \in qA) .$

$\text{Imaga} = a - \text{reala} . Ka = \text{reala} - \text{Imaga}$  Df

$\text{reala} = Sa$  (lege: scalare de  $a$ ) de Hamilton.

(« Scalare » deriva ab L « scala ». Vide editione de a.1899 p. 11, non deriva de Anglo, contra opinione de aliquo Physico).

= Invariante de gradu 1 de substitutione  $a$ .

$\text{Imaga}$  lege « termine (parte) imaginario de  $a$  », responde ad  $i$  imaga de §q'.

=  $Va$  (lege: vectore de  $a$ ) de Hamilton. Nota que illo non es vectore, sed substitutione repraesentabile per vectore. Vide §  $a$ .

·2  $\text{real}(x+iy) = x . \text{Imag}(x+iy) = iy .$

$K(x+iy) = x-iy . \text{mod}(x+iy) = \sqrt{x^2+y^2}$

·3  $a = \text{reala} + \text{Imaga} .$

$\text{reala} = (a + Ka)/2 . \text{Imaga} = (a - Ka)/2$  Dfp

·4  $KKa = a$

·5  $\text{mod} a = \sqrt{(\text{real} a)^2 - (\text{Imag} a)^2} = \sqrt{a \times Ka}$  Dfp

·6  $a \neq 0 . \supset . Ua = a/\text{mod} a$  Df

·7  $\supset . Ka = /(a \text{mod} a)^2 . K/a = /Ka$

\* 4.  $a, b \in v . a \neq 0 . \supset . \text{! } 0 \ b/a = \text{! } qtr \wedge x \exists (b = xa)$  Df

·1  $b \in qa . \supset . b/a \in q$

·3  $(\text{comp } \_ | a)b = a \text{real}(b/a) . (\text{comp } \_ | a)b = a \text{Imag}(b/a)$

·4  $\text{real } b/a = (b \times a)/a^2$

·5  $\text{mod}(b/a) = (\text{mod} b)/(\text{mod} a)$

·6  $b \neq 0 . \supset . U(b/a) = (Ub)/(Ua)$

·7  $\supset . /(b/a) = a/b$

·8 quaternio =  $v/(v \neq 0)$  Dfp

\* 5.  $x, y \in \text{qtr} . \supset . \text{! } x+y =$   
 $\text{! } qtr \wedge x \exists (u \in \text{Variab} . x \wedge \text{Variab} y . \supset . zu = xu + yu)$  Df

·2  $yx =$

$\text{! } qtr \wedge x \exists (u \in \text{Variab} . x . xu \in \text{Variab} y . \supset . zu = yxu)$  Df

Summa et producto de duo quaternionio complanare, id es cum idem Variabilitate, es definito in §Subst. H a m i l t o n defini ce operationes super quaterniones non complanare.

Pro summa duo quaternionio  $x$  et  $y$ , sume uno vectore  $u$  pertinente ad ambo plano de  $x$  et de  $y$ . Tunc habe sensu  $xu$ ,  $yu$ , et  $xu+yu$ , que es vectore. Quaternionio que, operato super  $u$ , da idem resultatu, es summa quaesito.

Analogo es Df de producto.

$$a, b, c \in v. a = 0 \Rightarrow (b+c)/a = b/a + c/a$$

$$b = 0 \Rightarrow (c/b)(b/a) = c/a$$

$$\begin{aligned} x, y, z \in \text{qtr} \Rightarrow x+y &= y+x. x+(y+z) = x+y+z. \\ \text{real}(x+y) &= \text{real}x + \text{real}y. \text{Imag}(x+y) = \text{Imag}x + \text{Imag}y. \\ K(x+y) &= Kx + Ky \end{aligned}$$

$$x, y, z \in \text{qtr} \Rightarrow (x+y)z = xz + yz. x(y+z) = xy + xz. x(yz) = xyz$$

$$\ast 6. a, b, c \in v. a^2 = b^2 = c^2 = 1. a \times b = b \times c = c \times a = 0. i = c/b. j = a/c. k = b/a \Rightarrow$$

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1. ij = k. jk = i. ki = j. ji = -k. kj = -i. ik = -j. i(jk) = (ij)k = ijk = -1$$

$$qtr = q + qi + qj + qk$$

$$m, x, y, z, m', x', y', z' \in q. u = m + xi + yj + zk. u' = m' + x'i + y'j + z'k \Rightarrow$$

$$u = 0 \Rightarrow m = x = y = z = 0$$

$$u = u' \Rightarrow m = m'. x = x'. y = y'. z = z'$$

$$u + u' = (m + m') + (x + x')i + (y + y')j + (z + z')k$$

$$u'u = (mm' - xx' - yy' - zz') + (m'x + mx' + y'z - zy')i + (m'y + my' + z'x - x'z)j + (m'z + mz' + x'y - y'r)k$$

$$\begin{aligned} \text{real}u &= m. \text{Imag}u = ix + jy + zk. Ku = m - ix - jy - zk. \\ \text{mod}u &= \sqrt{m^2 + x^2 + y^2 + z^2}. \end{aligned}$$

$$u = 0 \Rightarrow$$

$$Uu = (m + ix + jy + kz) / \sqrt{m^2 + x^2 + y^2 + z^2}.$$

$$\text{real}Uu = m / \sqrt{m^2 + x^2 + y^2 + z^2}.$$

$$\text{mod} \text{Imag}Uu = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} / \sqrt{m^2 + x^2 + y^2 + z^2}.$$

$$/u = (m - ix - jy - kz) / (m^2 + x^2 + y^2 + z^2).$$

$$u'/u = [(mm' + xx' + yy' + zz') + (m.r' - m'x + y.z' - y'z)i + (m.y' - m'y + z.x' - z'x)j + (m.z' - m'z + x.y' - x'y)k] / (m^2 + x^2 + y^2 + z^2).$$

$$(xa + yb + zc) / (x'a + y'b + z'c) = [(x.r' + y.y' + z.z') + (zy' - y'z)i + (x.z' - z'x)j + (yx' - x'y)k] / (x'^2 + y'^2 + z'^2)$$

## §4 a (producto alterno)

\* 1°0  $u, v, w \in V . i \in V \neq 0 . j \in V \neq qi . k \in V \neq (qi + qj) . \supset \therefore$

$$(uavaw)/(iajak) =$$

$$\text{Dtrm}[\text{coord}(u; i, j, k), \text{coord}(u; j, k, i), \text{coord}(u; k, i, j)],$$

$$\begin{bmatrix} & v & & v & & v \\ & w & & w & & w \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} & v & & v & & v \\ & w & & w & & w \end{bmatrix} \} \quad \text{Df}$$

$u, v, w \in V . \supset \therefore$

$$^1 uavaw = 0 . \text{ : } i \in V \neq 0 . j \in V \neq qi . k \in V \neq (qi + qj) . \supset_{i,j,k}$$

$$(uavaw)/(iajak) = 0$$

Df

$$^2 uauav = 0$$

$$^3 uavaw = 0 . \text{ : } .$$

$$\exists(x, y, z) \exists[x, y, z \in q . \neg(x=y=z=0) . xu + yv + zw = 0] \quad \text{Dfp}$$

$$^4 \text{coord}(u; i, j, k) = [(uajak)/(iajak)]$$

$uavaw$  vocare « producto alterno » vel « producto exterior » de vectores  $u, v, w$ . Illo vocare etiam « trivettore » ( $v^3$ , vide P2°0).

$uavaw$  repraesenta parallelepipedo constructo super  $u, v, w$ , considerato in grand-ore et in sensu.

Grassmann, *Ausdehnungslehre* a.1844 indica illo per  $[uvw]$ .

Plure A. adopta notatione  $uvw$ . Pro majore claritate, me adde signo de multiplicatione sub forma  $a$ , initiale de « alterno ».

Idem operatione occurre in :

Hamilton a.1845, sub forma  $S(uvw)$ , vide P26°4.

De Saint Venant (ParisCR. a.1845 d.258).

Cauchy a.1853 s.1 t.11 p.444.

Vide bibliographia in RdM. a.1895 p.179.

°0 Ratione de duo trivettore  $uavaw$  et  $iajak$  vale determinante de coordinatas de  $u, v, w$  relato ad  $i, j, k$ .

°1 Df de trivettore nullo.

$$* \quad 2^0 \quad v^3 = [(uavaw) | (u; v; w)]^i (v^i v^j v^k) = vavav \quad \text{Df}$$

$$= \text{« trivettore »}$$

$a, b \in v^3 . m \in q . \supset \therefore$

$$^1 x \in v^3 \neq 0 . \supset . a \cdot x \in q$$

$$^2 a = b . \text{ : } x \in v^3 \neq 0 . \supset_x . a \cdot x = b \cdot x \quad \text{Df}$$

$$^3 a + b = v^3 \wedge c \exists [x \in v^3 \neq 0 . \supset_x . c \cdot x = a \cdot x + b \cdot x] \quad \text{Df}$$

$$^4 ma = \text{« } [ \quad \text{« } \quad \quad c \cdot x = m(a \cdot x) \quad \text{Df}$$

$$\cdot 5 \quad a+b, ma \in v^1 \quad \cdot 6 \quad a=0 \cdot \supset \cdot v^1 = qa$$

$v^1$  es systema lineare ad uno dimensione.

$$\cdot 7 \quad -a=(-1)a \quad . \quad a-b=a+(-b) \quad \text{Df}$$

$$* \quad 3. \quad u, u', v, w \in v \cdot m \in q \cdot \supset \cdot$$

$$\cdot 1 \quad uavaw = -vauaw = -uawav$$

$$\cdot 2 \quad (u+u')avaw = uavaw + u'avaw$$

$$\cdot 3 \quad (mu)avaw = m(uavaw)$$

$$* \quad 4. \quad u, v, w \in v \cdot \supset \cdot \quad \cdot 0 \quad (uav)aw = uaraw \quad \text{Df}$$

$$\cdot 01 \quad v^1 = [(uav) | (u;v)] \quad (v^1;v) = vav \quad \text{Df}$$

= « bivectore »

$$a, b \in v^1 \cdot m \in q \cdot \supset \cdot \quad \cdot 02 \quad aa \in v^1$$

$$\cdot 1 \quad a=0 \cdot \supset \cdot x \in v \cdot \supset \cdot ax = 0 \quad \text{Df}$$

$$\cdot 11 \quad uau = 0$$

$$\cdot 12 \quad uav = 0 \cdot \supset \cdot \exists(x,y) \exists[x,y \in q \cdot (x=y=0) \cdot xu+yr=0] \quad \text{Dfp}$$

$$\cdot 2 \quad a=b \cdot \supset \cdot x \in v \cdot \supset \cdot ax = bx \quad \text{Df}$$

$$\cdot 3 \quad a+b = v^1 \wedge c \exists[x \in v \cdot \supset \cdot cax = aax+bx] \quad \text{Df}$$

$$\cdot 4 \quad ma = \quad , \quad = m(aax)] \quad \text{Df}$$

$$\cdot 5 \quad a+b, ma \in v^1$$

$$\cdot 6 \quad (a+b)au = aau+baa \cdot (u+v)aw = uaw+vaw$$

$$\cdot 61 \quad m(aau) = (ma)au = aa(mu)$$

$$\cdot 7 \quad uav = -vau$$

$$\cdot 8 \quad uavaw = 0 \cdot \supset \cdot v^1 = qvaw+qwa+quav$$

$$\cdot 9 \quad uaa = aau \quad \text{Df}$$

Nos decompone trivectore  $uavaw$  in producto  $a$  de novo objecto  $uav$  per  $w$ .  $uav$  es « producto alternato » de vectores  $u, v$ . Vocare « bivectore ».

Nos repraesenta illo per parallelogrammo constructo super  $u$  et  $v$ , considerato in magnitudo et orientatione.

·2 Duo bivectore es aequales, si producto de illos per idem vectore es aequales, id es, si parallelogrammos es in plano parallelo, et habe idem grand-ore et sensu.

·8  $v^1$  es systema lineare ad 3 dimensione.

Bivectore in Mechanica vocare « copula » F. « couple » (Poinso 1803).

Calculo super areas cum orientatione occurre in Chelini, *Saggio di Geometria analitica trattata con nuovo metodo*, Roma a.1838.

\* 5.  $x \varepsilon p . y \varepsilon p \neg x . z \varepsilon p \neg \text{recta}(x, y) . t \varepsilon p \neg \text{plan}(x, y, z) .$   
 $a, b, c, d \varepsilon p \supset.$

$$\cdot 0 \quad (aabcad)(xaya zat) = (b-a)a(c-a)a(d-a) \cdot (y-x)a(z-x)a(t-x) \quad \text{Df}$$

$$\cdot 01 \quad aabcad = 0 \quad . = . \quad (b-a)a(c-a)a(d-a) = 0 \quad \text{Df}$$

= « punctos  $a, b, c, d$  es complanare ».

Si  $a, b, c, d \varepsilon p$ ,  $aabcad$ , producto alternato de quatuor punctos, repraesenta tetraedro que habe pro vertices ce punctos, considerato in grand-ore et in sensu.

$aabcad = 0$ , quando punctos es in uno idem plano.

Si tetraedro ne es nullo, dicere destrorso, vel positivo (Möbius), si homo cum caput in  $a$ , et pedes in  $b$ , vide  $c$  ad sinistra et  $d$  ad dextera.

Expressione  $aabcad$  vocare etiam momento de puncto  $a$  ad triangulo aut plano  $bacd$ , momento de segmento (vi)  $aab$  ad segmento (axi, recta)  $cad$ , momento de triangulo  $aabc$  ad puncto  $d$ .

\* 6.0  $p^* = papapap \quad \text{Df}$

= « quadripuncto » id es tetraedro considerato in grand-ore et in sensu.

$u, v \varepsilon p^* . \Psi \varepsilon p^* \neg 0 . m \varepsilon q \supset.$

$$\cdot 2 \quad u = r \quad . = . \quad u \Psi = v \Psi \quad \cdot 3 \quad (u+r) \Psi = u \Psi + v \Psi$$

$$\cdot 4 \quad u+r \varepsilon p^* \quad \cdot 5 \quad (mu) \Psi = m(u \Psi)$$

$$\cdot 6 \quad mu \varepsilon p^* \quad \cdot 7 \quad p^* = q \Psi$$

$$\cdot 8 \quad -u = (-1)u \quad . \quad u - v = u + (-v) \quad \text{Df}$$

·1 Si  $\Psi$  es un quadripuncto non nullo, ratio de quadripuncto  $u$  ad  $\Psi$ , vel mensura de  $u$ , pro unitate de mensura  $\Psi$ , es quantitate.

·7  $p^*$  constitue systema homogeneo ad  $\Psi$ .

\* 7.  $a, b, c, d, e \varepsilon p \supset.$

$$\cdot 1 \quad aabcad = -baaacad = +bacaaad = -bacadaa$$

$$\cdot 2 \quad aaaaabac = 0$$

$$\cdot 3 \quad aabcad - abacae + aabadae - aacudae + bacadae = 0$$

{·1·0 MÖBIUS, *Der barycentrische Calcul*, a.1827 §20{

Lege de commutatione in producto alternato: « si nos permuta duo factore, producto muta signo ».

\* 8.  $a, b, c, d \in p \supset$ 

$$\cdot 1 \quad (abac)ad = (aab)a(ad) = aa(bac)d = aabacad \quad \text{Df} \\ \text{Assoc } a$$

$$\cdot 2 \quad (ab)ac = aa(bac) = aabac \quad \text{Df}$$

$$\cdot 3 \quad p^3 = papap \quad . \quad p^2 = pap \quad . \quad p^1 = p \quad \text{Df} \\ p^3 = \text{« tripuncto »} . \quad p^2 = \text{« bipuncto »} .$$

$$\cdot 4 \quad r, s \in N_1 . r+s \leq 4 . x \in p^r . y \in p^s \supset . xay \in p^{r+s}$$

$$\cdot 5 \quad r, s, t \in N_1 . r+s+t \leq 4 . x \in p^r . y \in p^s . z \in p^t \supset . \\ xa(yaz) = (xay)az \quad \text{Assoc } a$$

$$\cdot 6 \quad u \in p^3 \supset . u=0 \quad . = : x \in p \supset . uax=0 \quad \text{Df} \\ = \text{« area de } u \text{ es nullo »} .$$

$$\cdot 7 \quad u, v \in p^3 \supset . u=r \quad . = : x \in p \supset . uax = vax \quad \text{Df} \\ = \text{« triangulos } u \text{ et } v \text{ jace in idem plano, et habe idem area et sensu »} .$$

$$\cdot 8 \quad u \in p^3 \supset . u=0 \quad . = : x \in p \supset . uax=0 \quad \text{Df} \\ = \text{« long-ore de } u \text{ es nullo »} .$$

$$\cdot 9 \quad u, v \in p^3 \supset . u=r \quad . = : x \in p \supset . uax = vax \quad \text{Df} \\ = \text{« lineas } u \text{ et } v \text{ habe commune recta, longore et sensu »} .$$

$$\cdot 9.0 \quad r, s \in N_1 . r+s \leq 4 . n \in N_1 . u \in p^{r+1 \dots n} . m \in qf1 \dots n . b \in p^s \supset . \\ [\Sigma(m, a_i | z, 1 \dots n)]ab = \Sigma[m, (a_i ab) | z, 1 \dots n] \quad \text{Df} \\ \text{Distrib}(a, +)$$

$$\cdot 1 \quad r \in 1 \dots 4 \supset . \varphi^r = x \exists \{ \exists (n, m, a) \exists [n \in N_1 . m \in qf1 \dots n . \\ a \in p^{r+1 \dots n} . x = \Sigma(m, a_i | z, 1 \dots n)] \} \\ \varphi^r = \text{« forma de gradu } r \text{ »} . \quad \text{Df}$$

$$\cdot 2 \quad \varphi^4 = p^4$$

$$\cdot 3 \quad r \in 1 \dots 3 . u \in \varphi^r . x \in p^{4-r} \supset . uax \in p^4 \\ r \in 1 \dots 3 . u, v \in \varphi^r . m \in q \supset .$$

$$\cdot 4 \quad u=0 \quad . = : x \in p^{4-r} \supset . uax=0 \quad \text{Df}$$

$$\cdot 5 \quad u=v \quad . = : x \in p^{4-r} \supset . uax = vax \quad \text{Df}$$

$$\cdot 5.1 \quad u=v \quad . = : (uax | x, q^{4-r}) = (vax | x, q^{4-r})$$

$$\cdot 6 \quad u+r = 1 \varphi^r \wedge \exists [x \in p^{4-r} \supset . zax = uax + vax] \quad \text{Df}$$

$$\cdot 7 \quad mu = 1 \varphi^r \wedge \exists [x \in p^{4-r} \supset . zax = m(uax)] \quad \text{Df}$$

$$\begin{aligned} \cdot 8 \quad r, s \in N_1 \cdot r+s \leq 4 \cdot n \in N_1 \cdot a \in \varphi^r \cdot b \in p^s f 1 \cdots n \cdot m \in q f 1 \cdots n \cdot \supset \\ aa[\sum(m_i b_i | z, 1 \cdots n)] = \sum[m_i(aab_i) | z, 1 \cdots n] \quad \text{Df} \\ \text{Distrib}(a, +) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cdot 9 \quad r, s, t \in N_1 \cdot r+s+t \leq 4 \cdot a \in \varphi^r \cdot b \in \varphi^s \cdot c \in \varphi^t \cdot \supset \\ aabac = (aab)ac \quad \text{Df} \end{aligned}$$

Nos suppose p. ex.  $r=1, s=3$ . Tunc P·0 considera serie de  $n$  punctos  $a_1, a_2, \dots, a_n$ , et serie de numeros reale, positivo vel negativo,  $m_1, m_2, \dots, m_n$ ;  $b$  es tripuncto; ce P pone per Df:

$$(m_1 a_1 + m_2 a_2 + \dots + m_n a_n)ab = m_1(a_1 ab) + m_2(a_2 ab) + \dots + m_n(a_n ab).$$

Secundo membro, summa de quadripunctos, es reductibile ad uno quadripuncto. Id es, nos pone per Df proprietate distributivo de signo  $a$  ad  $+$ . In Mechanica, systema de punctos cum numeros correspondente, dicto « massa », vocare « systema materiale ». Ergo per Df, momento de systema materiale  $m_1 a_1 + m_2 a_2 + \dots$  ad plano, vel tripuncto,  $b$ , vale summa de momentos de punctos, cum massa correspondente.

·1 Nos voca « forma de gradu 1 » omni expressione de forma  $m_1 a_1 + m_2 a_2 + \dots$ , id es systema materiale.

·4 Nos dice que uno forma de gradu 1 es nullo, si es nullo suo producto per tripuncto arbitrario: id es, si es nullo suo momento ad omni plano.

·5 Duo forma es aequale, per Df, si es aequale suo producto per tripuncto arbitrario.

Nunc nos suppose  $r=2, s=2$ . Nos habet serie de bipunctos; in Mechanica systema de vi, que nos considera applicato ad corpore rigido.

P·0 dice que, per Df, momento de systema de vi ad axi ( $p^2$ )  $b$ , es summa de momento de vi dato.

P·4 dice que systema de  $p^2$  es nullo vel que corpore es in equilibrio, si suo momento ad omni axi es nullo.

In modo analogo per forma de gradu 3. Forma de gradu 4 es reductibile ad uno  $p^4$ , secundo P·2.

P·8 da Df de producto alternato de duo forma. Exprime proprietate distributivo de operatione  $a$  ad secundo factore.

\* 10.  $a, b, c, d, e \in p \cdot \supset$ :

$$\cdot 1 \quad aaa = 0 \quad [ P7 \cdot 2 \cdot b, c \in p \cdot \supset_{b,c} aaaaabac = 0 : \text{Df} 9 \cdot 4 : \supset \cdot P ]$$

$$\cdot 2 \quad aab = -baa \quad [ P7 \cdot 1 \cdot c, d \in p \cdot \supset_{c,d} aabacad = -baaacad : \text{Df} 9 \cdot 7 : \supset \cdot P ]$$

$$\cdot 3 \quad aabac = -baaac = +baaca$$

$$\cdot 4 \quad aabacad = (aabac - aabad + aacad - baacad)ae \\ [ P7 \cdot 3 \cdot \text{Distrib}(a, +) : \supset \cdot P ]$$

$$\cdot 5 \quad aabacad = 0 \cdot \supset \cdot aabac - aabad + aacad - baacad = 0 \\ [ \text{Hp} \cdot P \cdot 4 : \supset : e \in p \cdot \supset \cdot (aabac - \dots + \dots - \dots)ae = 0 : \supset \cdot \text{Ths} ]$$

- \*6  $aabacad = 0 \Rightarrow aabac = (aab + bac + caa)ad$   
 [ P5·2 . Distrib(a,+) .  $\Rightarrow$  P ]
- \*7  $aabac = 0 \Rightarrow aab + bac + caa = 0$  .  $aab = (a-b)ac$  [ P6  $\supset$  P ]
- \*8  $aab = 0 \Rightarrow a = b$   
 [ Hp . P7 .  $\Rightarrow$  csp .  $\Rightarrow$  .  $(a-b)ac = 0 \Rightarrow a-b = 0 \Rightarrow a = b$  ]

\* 11.  $r \in 1 \dots 3$  .  $u, u', u'' \in \varphi^r$  .  $m, m' \in \varphi^r$  .  $\Rightarrow$  . \*0  $u + u' \in \varphi^r$

- \*1  $u + u' = u' + u$   
 [  $x \in p^{4-r} \Rightarrow (u+u')ax = uax + u'ax = u'ax + uax = (u'+u)ax$  ]
- \*2  $u + (u' + u'') = u + u' + u''$  \*3  $u + 0 = u$
- \*4  $mu \in \varphi^r$  \*5  $m(u + u') = mu + mu'$
- \*6  $(m + m')u = mu + m'u$  [  $r \in p^{4-r} \Rightarrow [(m+m')u]ax = (m+m')(uax) = m(uax) + m'(uax) = (mu)ax + (m'u)ax = (mu + m'u)ax$  ]

\* 12.  $r, s \in 1 \dots 3$  .  $r + s \leq 4$  .  $u, u' \in \varphi^r$  .  $v, v' \in \varphi^s$  .  $m \in \varphi^r$  .  $\Rightarrow$  :

- \*0  $uav \in \varphi^{r+s}$  \*1  $uav = (-1)^{rs}vau$  Comma
- \*2  $u = u'$  .  $v = v'$  .  $\Rightarrow$  .  $uav = u'av'$   
 [ P9·5 .  $u = u'$  .  $x \in p^{4-r} \Rightarrow uax = u'ax$  (1)
- $u = u'$  .  $r + s \leq 4$  .  $x \in p^s$  .  $y \in p^{4-r-s} \Rightarrow xay \in p^{4-r} \cdot (1) \Rightarrow$
- $ua(xay) = u'a(xay)$  . Assoc a .  $\Rightarrow$  .  $(uax)ay = (u'ax)ay$  (2)
- $u = u'$  .  $r + s \leq 4$  .  $x \in p^s \cdot (2) \Rightarrow y \in p^{4-r-s} \Rightarrow y \cdot (uax)ay = u'ax)ay$  (3)
- $u = u'$  .  $r + s \leq 4$  .  $x \in p^s \cdot (3) \Rightarrow uax = u'ax$  (4)
- $u = u'$  .  $r + s \leq 4$  .  $x \in p^s \cdot (1) \cdot (4) \Rightarrow uax = u'ax$  (5)
- $u = u'$  .  $n \in N_1$  .  $x \in p^s$  f  $1 \dots n$  .  $m \in q$  f  $1 \dots n$  .  $v = \Sigma(m_x x_x, z, 1 \dots n) \cdot (5) \Rightarrow$
- $uav = \Sigma(m_x uax_x, z, 1 \dots n) = \Sigma(m_x u'ax_x, z, 1 \dots n) = u'av$  (6)
- $u = u'$  .  $v = v'$  .  $\Rightarrow$  .  $uav = u'av$  .  $vau' = v'au'$  .  $u'av = (-1)^{rs}v'au' = (-1)^{rs}u'av'$  .  $\Rightarrow$  .  $uav = u'av'$  ]

P9·8 defini producto alterno de duo forma, per medio de repraesentatione de secundo; ce Df non es homogeneo; ergo nos debe demonstra P·2.

- \*3  $(u + u')av = uav + u'av$  .  $ua(v + v') = uav + u'av'$
- \*4  $m(uav) = (mu)av = ua(mv)$  \*5  $ua0 = 0$
- \*6  $t \in N_1$  .  $r + s + t \leq 4$  .  $w \in \varphi^t \Rightarrow (uav)aw = ua(vaw)$  Assoca

\* 13.  $v = p - p$  .  $v^2 = vav$  .  $v^3 = vavav$  Df

Relatione inter quatuor puncto  $a - b = c - d$ , que §vet 2·0 sume ut primitivo, resulta nunc definito ut casu particulare de aequalitate de duo formes de gradu 1. Vectore se praesenta quale summa de duo puncto cum coefficientes +1 et -1.

Formul. t. 5

13.



$$i, j, k \in V, iajk = 0 \quad \supset \quad v = qi + qj + qk$$

$$\begin{aligned} & \cdot 2 \quad x, y, z, x', y', z' \in q. \quad u = xi + yj + zk. \quad u' = x'i + y'j + z'k. \quad \supset \\ & \quad uau' = (yz' - y'z)jak + (zx' - z'x)kai + (xy' - x'y)iaj \end{aligned}$$

$$\cdot 3 \quad v^2 = q(iaj) + q(jak) + q(kai)$$

$$\begin{aligned} & \cdot 4 \quad \text{Hp} \cdot 2. \quad x'', y'', z'' \in q. \quad u'' = x''i + y''j + z''k. \quad \supset \\ & \quad uau'au'' = \text{Dtrm} \begin{bmatrix} (x, y, z), \\ (x', y', z'), \\ (x'', y'', z'') \end{bmatrix} iajak \end{aligned}$$

$$\cdot 5 \quad v^3 = q iajak$$

$$* \quad 14.1 \quad a, b, c, d \in V \quad \supset \quad aabacac = 0$$

$$\cdot 2 \quad a \in v=0. \quad b \in v^2. \quad aab = 0 \quad \supset \quad \exists v \wedge c \exists (b = aac)$$

$$\cdot 3 \quad a \in v^2=0. \quad b \in v^3 \quad \supset \quad \exists v \wedge c \exists (b = aac)$$

$$\cdot 4 \quad a, b \in v^2 \quad \supset \quad \exists v=0 \wedge x \exists (aax = 0, bax = 0)$$

$$\cdot 5 \quad a, b \in v^2 \quad \supset \quad a + b \in v^2$$

$$* \quad 15. \quad a_1, a_2, a_3, a_4 \in q^1. \quad \Psi = a_1 a_2 a_3 a_4. \quad \Psi = 0 \quad \supset:$$

$$\cdot 1 \quad q^1 = qa_1 + qa_2 + qa_3 + qa_4$$

$$\cdot 11 \quad x_1, x_2, x_3, x_4 \in q. \quad u = x_1 a_1 + x_2 a_2 + x_3 a_3 + x_4 a_4. \quad \supset$$

$$x_1 = (a_1 a_2 a_3 a_4) \Psi, \quad x_2 = a_1 a_2 a_3 a_4 \Psi, \quad \dots$$

$$[ \text{Hp. Oper } a_2 a_3 a_4 = x_1 \Psi \quad \supset \quad P ]$$

$$\begin{aligned} & \cdot 2 \quad \text{Hp} \cdot 11. \quad x'_1, x'_2, x'_3, x'_4 \in q. \quad u' = x'_1 a_1 + x'_2 a_2 + x'_3 a_3 + x'_4 a_4. \quad \supset \\ & \quad a a u' = (x_1 x'_2 - x_2 x'_1) a_1 a_2 + (x_1 x'_3 - x_3 x'_1) a_1 a_3 + (x_1 x'_4 - x_4 x'_1) a_1 a_4 + \\ & \quad (x_2 x'_3 - x_3 x'_2) a_2 a_3 + (x_2 x'_4 - x_4 x'_2) a_2 a_4 + (x_3 x'_4 - x_4 x'_3) a_3 a_4 \end{aligned}$$

$$\cdot 3 \quad q_2 = qa_1 a_2 + qa_1 a_3 + qa_1 a_4 + qa_2 a_3 + qa_2 a_4 + qa_3 a_4$$

$$\begin{aligned} & \cdot 31 \quad y_{12}, y_{13}, y_{14}, y_{23}, y_{24}, y_{34} \in q. \quad l = y_{12} a_1 a_2 + y_{13} a_1 a_3 + \dots \quad \supset \quad y_{12} = \\ & \quad la_3 a_4 / \Psi, \quad y_{13} = -la_2 a_4 / \Psi, \quad \dots \quad [ \text{Hp. Oper } a_2 a_3 a_4 \quad \supset \quad P ] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \cdot 4 \quad \text{Hp} \cdot 2. \quad x''_1, x''_2, x''_3, x''_4 \in q. \quad u'' = x''_1 a_1 + x''_2 a_2 + x''_3 a_3 + x''_4 a_4. \quad \supset \\ & \quad a a u' a u'' = \text{Dtrm} [(a_2 a_3 a_4, -a_1 a_2 a_4, a_1 a_3 a_4, -a_1 a_2 a_3), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \quad \begin{pmatrix} x_1 & , & x_2 & , & x_3 & , & x_4 & \end{pmatrix}, \\ & \quad \begin{pmatrix} x'_1 & , & x'_2 & , & x'_3 & , & x'_4 & \end{pmatrix}, \\ & \quad \begin{pmatrix} x''_1 & , & x''_2 & , & x''_3 & , & x''_4 & \end{pmatrix}] \end{aligned}$$

$$\cdot 41 \text{ Hp'11 . Hp'31 } \supset. aal = (x_2y_{24} - x_3y_{24} + x_4y_{23})a_2aa_3aa_4 + \dots$$

$$\cdot 5 \quad \varphi^3 = qa_1aa_3aa_2 + qa_1aa_2aa_4 + qa_2aa_3aa_4$$

$$\cdot 51 \quad z_1, z_2, z_3, z_4 \varepsilon q . l = z_1a_2aa_3aa_4 - z_2a_1aa_3aa_4 + z_3a_1aa_2aa_4 - z_4a_1aa_2aa_3 \\ \supset. x_1 = a_1at \Psi . x_2 = a_2at \Psi \dots \quad [ \text{Hp . Oper } aa_1 \supset. P ]$$

$$\cdot 6 \quad \text{Hp'4} . x_1''', x_2''', x_3''', x_4''' \varepsilon q . a''' = x_1'''a_1 + \dots \supset.$$

$$aaa'ad''ad''' = \text{Dtrm} [(x_1, x_2, x_3, x_4), \\ (x'_1, x'_2, x'_3, x'_4), \\ (x''_1, x''_2, x''_3, x''_4), \\ (x'''_1, x'''_2, x'''_3, x'''_4)] \Psi$$

$$\cdot 61 \text{ Hp'31} . y'_{12}, y'_{13}, y'_{14}, y'_{23}, y'_{24}, y'_{34} \varepsilon q . l = y'_{12}a_1aa_2 + \dots \supset.$$

$$lal' = (y_{12}y'_{34} - y_{13}y'_{24} + y_{14}y'_{23} + y_{23}y'_{14} - y_{24}y'_{13} + y_{34}y'_{12}) \Psi$$

$$\cdot 62 \text{ Hp'31 } \supset. lal = 2(y_{12}y_{34} - y_{13}y_{24} + y_{14}y_{23}) \Psi$$

$$\cdot 63 \text{ Hp'11 . Hp'51 } \supset. aal = (x_1z_1 + x_2z_2 + x_3z_3 + x_4z_4) \Psi$$

Es dato quatuor forma  $a_1, a_2, a_3, a_4$  de gradu 1, independentes, id es, pro ducto de que ne es nullo, tunc:

·1 Omni forma  $a$  de gradu 1 est reductibile ad forma  $x_1a_1 + x_2a_2 + x_3a_3 + x_4a_4$ .

Numeros  $x_1 \dots$  vocare « coordinatas » de  $a$ , ad formas  $a_1, a_2, a_3, a_4$ , que vocare « formas fundamentale ».

·11 Ce coordinatas exprimere ut ratione de  $p^4$ .

·2 Expressione de producto alternato de duo  $q^4$  de que nos nosce coordinatas.

·3 Omni forma de gradu 2 es reductibile ad summa de 6 producto ad 2 ad 2 de 4 forma fundamentale, multiplicato per coefficientes numerico. Ce 6 coefficiente vocare « coordinatas de forma de gradu 2 ».

P·31 exprime illos ut ratione de  $p^4$ .

·5 Omni forma de gradu 3 es summa de productos ad 3 ad 3 de 4 forma fundamentale. 4 coefficientes es « coordinatas de forma ».

Nos debe ce coordinatas generale (que plure A. tribue ad Cayley), ad Grassmann JfM. t.24 p.262-282, 372-380, et *Ausdehnungslehre* a.1844 §87:

« Ich nenne die  $n$  Strecken, welche ein System  $n$ -ter Stufe bestimmen [nos habe  $n=4$ ; Strecke  $= q^4$ ] ..., sofern jede Strecke des Systems durch sie ausgedrückt werden soll [exprime P·1], ... die Grundmasse dieses System, ... die Produkte von  $m$  Grundmassen Richtmasse  $m$ -ter Stufe ».

Vide et Werke, t.1. p.195 §§117-124.

Si formas fundamentale es uno puncto et tres vectore de modulo 1, tunc de 4 coordinatas de puncto, primo es unitate, et cetero 3 es coordinatas que Descartes a.1637, defini in generale, et applica solo ad plano.

Si formas fundamentale es 4 puncto, coordinatas de puncto es barycentrico, considerato par Möbius a.1827. §26, que da expressione ·11.

# IV. §4 a

inata de  $\varphi^2$ , considerato ut systema de fortia, si formas fun-  
 te es cartesiano, occurre in Poinsot a.1804; vocare «characteri-  
 systema». y a.1860 (vide Papers t.7 p.66) reinveni 6 coordinatas de  $\varphi^2$ .  
 er a.1865, re-introduce coordinatas de  $\varphi^2$ .

Df  $\omega$

$$\begin{aligned} \psi &= iajak \cdot \psi = 0 \cdot \psi = oap \cdot \psi \\ \omega a &= (aap) / \psi \\ &= \text{« massa de } a \text{ »} \\ \omega a &= i(aajak \cdot \psi) + j(aakai \cdot \psi) + k(aiaij \cdot \psi) \\ &= \text{« vectore de } a \text{ »} \\ &= jak(ai / \psi) + kai(aaj / \psi) + iaj(aak / \psi) \\ &= \text{« bivectore de } a \text{ »} \\ &= \psi(a / \psi) \end{aligned}$$

« trivectore de  $a \cdot \cdot$  »  
 articulare de « producto regressivo », theoria que  
 io. Vide meo *Calcolo geometrico*, a.1888, p.106.  
 homogeneo; secundo membro contine literas  
 no. Pro brevitate nos sume P.1-4 ut Df.

$$\begin{aligned} \omega(uo + xi + yj + zt) &= u \\ \omega(t(iaj) + u(jak) + v(kai)) &= xi + yj + zk \\ \omega(t(iaj) + u(jak) + v(kai)) &= x(iaj) + y(jak) + z(kai) \\ \omega(a) &= \omega a + \omega b \\ \omega(a) &= m(\omega a) \\ \omega a &= 1 \\ \omega a &= 0 \end{aligned}$$

ad vectore.  
 «  $\omega a$  » es puncto, dicto  
 aut vectore.

\* 18.0  $a\epsilon\varphi^3 \supset \omega a \epsilon v$

·1  $a, b\epsilon p \supset \omega(aab) = b - a$

·2  $a\epsilon p \cdot b\epsilon v \supset \omega(aab) = b$

·3  $a, b\epsilon\varphi^1 \supset \omega(aab) = (\omega a)b - (\omega b)a$

·4  $a\epsilon\varphi^3 \cdot \omega a = 0 \supset a\epsilon v^3$

·5  $a\epsilon\varphi^3 \cdot \omega a = 0 \cdot a\alpha a = 0 \supset a\epsilon p^3$

·6  $a\epsilon\varphi^3 \supset a\alpha a = 0 \cdot a\epsilon p^3 \vee v^3 \cdot a\epsilon\varphi^1 a\varphi^1$

·7  $\varphi^3 = p^2 + v^2$  } POINSOT n.68 :

« Tant de forces que l'on voudra appliquées d'une manière quelconque à un corps, peuvent toujours se réduire à une seule force et à un couple unique ».

·4 Si  $a$  es forma de gradu 2, et suo vectore es nullo, tunc  $a$  es reductibile ad bivectore.

·5 Si vectore de forma  $a$  non es nullo, et producto  $aaa$  es nullo, tunc  $a$  es reductibile ad bipuncto.

·6 Si producto  $aaa$  es nullo, tunc  $a$  es reductibile ad bipuncto aut ad bivectore, id es ad producto de duo forma de gradu 1; et vice-versa.

·7 Omni forma de gradu 2 es reductibile ad summa: bipuncto plus bivectore ».

\* 19.0  $a\epsilon\varphi^3 \supset \omega a \epsilon v^3$

·1  $a, b, c\epsilon p \supset \omega(aabac) = aab + bac + caa$

·2  $a, b, c\epsilon\varphi^1 \supset \omega(aabac) = (\omega a)bac + (\omega b)caa + (\omega c)aab$

·3  $a\epsilon\varphi^1 \cdot b\epsilon\varphi^3 \supset \omega(aab) = \omega(baa) = (\omega a)b + (\omega b)aa$

·4  $a\epsilon\varphi^3 \cdot \omega a = 0 \supset a\epsilon v^3$

·5  $a\epsilon\varphi^3 \cdot \omega a = 0 \supset a\epsilon p^3$

·6  $\varphi^3 = p^2 \vee v^2$

·4 Si  $a$  es forma de gradu 3, et suo bivectore es nullo, tunc  $a$  es reductibile ad trivectore.

·5 Si suo bivectore non es nullo,  $a$  es reductibile ad tripuncto.

·6 Ergo omni forma de gradu 3 es tripuncto vel trivectore.

\* 20.0  $a\epsilon\varphi^4 \supset \omega a \epsilon v^3 \cdot a^1 \Psi = \omega a^1 \varphi$

·1  $a\epsilon\varphi^1 \cdot b\epsilon\varphi^3 \supset \omega(aab) = (\omega a)b - a\alpha(\omega b)$

·2  $a, b\epsilon\varphi^2 \supset \omega(aab) = (\omega a)ab + a\alpha(\omega b)$

·3  $a, b, c, d\epsilon\varphi^1 \supset \omega(aabac) = (\omega a)bac + (\omega b)caa + (\omega c)aab + (\omega d)aaa$

\* 5.  $x \in p, y \in p \rightarrow x, z \in p \rightarrow \text{recta}(x, y), t \in p \rightarrow \text{plan}(x, y, z).$   
 $a, b, c, d \in p \rightarrow \supset.$

$$\cdot 0 \quad (a b a c a d) (x a y a z a t) = (b-a)a(c-a)a(d-a) : (y-x)a(z-x)a(t-x) \quad \text{Df}$$

$$\cdot 01 \quad a b a c a d = 0 \quad . = . \quad (b-a)a(c-a)a(d-a) = 0 \quad \text{Df}$$

= « punctos  $a, b, c, d$  es complanare ».

Si  $a, b, c, d \in p$ ,  $a b a c a d$ , producto alternato de quatuor punctos, repraesenta tetraedro que habe pro vertex ce punctos, considerato in grand-ore et in sensu.

$a b a c a d = 0$ , quando punctos es in uno idem plano.

Si tetraedro ne es nullo, dicere destrorso, vel positivo (Möbius), si homo cum caput in  $a$ , et pedes in  $b$ , vide  $c$  ad sinistra et  $d$  ad dextera.

Expressione  $a b a c a d$  vocare etiam momento de puncto  $a$  ad triangulo aut plano  $b a c a d$ , momento de segmento (vi)  $a a b$  ad segmento (axi, recta)  $c a d$ , momento de triangulo  $a a b a c$  ad puncto  $d$ .

\* 6.0  $p^4 = p a p a p a p \quad \text{Df}$

= « quadripuncto » id es tetraedro considerato in grand-ore et in sensu.

$u, v \in p^4, \Psi \in p^4 \rightarrow 0, m \in q \rightarrow \supset.$

$$\cdot 2 \quad u = r \quad . = . \quad u, \Psi = v, \Psi$$

$$\cdot 4 \quad u + r \in p^4$$

$$\cdot 6 \quad m u \in p^4$$

$$\cdot 8 \quad -u = (-1)u \quad . \quad u - v = u + (-v)$$

$$\cdot 1 \quad u, \Psi \in q$$

$$\cdot 3 \quad (u + r), \Psi = u, \Psi + r, \Psi$$

$$\cdot 5 \quad (m u), \Psi = m(u, \Psi)$$

$$\cdot 7 \quad p^4 = q \Psi$$

Df

·1 Si  $\Psi$  es un quadripuncto non nullo, ratio de quadripuncto  $u$  ad  $\Psi$ , vel mensura de  $u$ , pro unitate de mensura  $\Psi$ , es quantitate.

·7  $p^4$  constitue systema homogeneo ad  $\Psi$ .

\* 7.  $a, b, c, d, e \in p \rightarrow \supset.$

$$\cdot 1 \quad a a b a c a d = -b a a c a d = +b a c a a d = -b a c a d a a$$

$$\cdot 2 \quad a a a a b a c = 0$$

$$\cdot 3 \quad a a b a c a d - a a b a c a e + a a b a d a e - a a c a d a e + b a c a d a e = 0$$

{·1·0 MÖBIUS, *Der barycentrische Calcul*, a.1827 §20}

Lege de commutatione in producto alternato: « si nos permuta duo factore, producto muta signo ».

« Momento de vectore- $p^2$   $a$  ad puncto  $b$  » =  $I\omega(aab)$ .

« Momento relativo de duo vectore- $p^2$   $a$  et  $b$  » =  $aab$ .

Distributivitate de  $a$  ad  $+$  es dicto « theorema de Varignon ».

Königs, *Leçons de Cinématique*, Paris, a.1897 voca:

« Segment » =  $p^2$ .

« Système de segments » =  $\varphi^2$ .

« Automoment du système.  $a$  » =  $aaa$ .

« Vis » = « screw de Ball » =  $\varphi^2 \wedge x_3 (\text{mod } \omega x = 1)$ .

« Torseur (Ball) » = « Dyname (Plücker) » =  $\varphi^2$ .

« Complexe linéaire déterminé par  $a$ , forme de degré 2 » =  $\varphi^2 \wedge x_3 (aax = 0)$ ; illo es « système focal » de Chasles.

E. Carvallo, *Conférence sur les notions de calcul géométrique utilisées en Mécanique et en Physique*. AnnN. a.1902 p.333:

« Cycle » =  $v^2$ .

« Flux » =  $v^3$ .

« Produit superficiel de deux vecteurs  $a$  et  $b$  » =  $aab$ .

« Produit vectoriel » =  $I(aab)$ .

« Produit algébrique » =  $a \times b$ .

« Produit de trois vecteurs  $a, b, c$  » =  $aabac$ .

\* 22.  $u, r, t \in v \neq 0$  . $\supset$ .

1  $\sin(u, r) = \text{mod}(Uu a Ur)$  Dfp

2  $\sin(u, r, t) = (Uu a Ur a Ut) / \psi$  Df

« Sinu de trihedro ». Staadt, JfM. a.1842 t.24 p.255.

3  $-1 \leq \sin(u, r, t) \leq +1$

4  $(uarat) / \psi = \text{mod } u \times \text{mod } r \times \text{mod } t \times \sin(u, r, t)$

5  $[\sin(u, r, t)]^2 =$

$1 - \cos(u, r)^2 - \cos(r, t)^2 - \cos(t, u)^2 + 2\cos(u, r)\cos(r, t)\cos(t, u)$

} LAGRANGE a.1799, Oeuvres t.7 p.334, 341 {

\* 23.1  $a, b, c, d \in v$  . $\supset$ .  $(aab) \times (cad) = (a \times c)(b \times d) - (a \times d)(b \times c)$

2  $a, b \in v \neq 0$  . $\supset$ .  $[(a_1 a_2 a_3) / \psi] \times [(b_1 b_2 b_3) / \psi] =$   
Dtrm $[(a_r \times b_s) / (r, s), 1 \dots 3: 1 \dots 3]$

3  $a, b \in v \neq 0$  . $\supset$ . Dtrm $[(a \times b_s) / (r, s), 1 \dots 4: 1 \dots 4] = 0$   
} 1-3 STAUDT a.1842 JfM. t.24 p.255 {

\* 24.0  $r \in p^2 \neq 0$  . $\supset$ .  $\text{rectar} = p \wedge r_3 (rar = 0)$  Df

1  $a \in p$  .  $r \in p^2 \neq 0$  . $\supset$ .  $d(a, \text{rectar}) = \text{mod}(\omega aar) / \text{mod } \omega r$

2  $p \in p^2 \neq 0$  . $\supset$ .  $\text{planp} = p \wedge r_3 (rap = 0)$  Df

3  $a \in p$  .  $p \in p^2 \neq 0$  . $\supset$ .  $d(a, \text{planp}) = \text{mod } \omega (aap) / \text{mod } \omega p$

\* 25.  $a \in v . \supset$ .

$$\cdot 0 \quad Ia = [I(aax) | x, \forall x \exists (x \times a = 0)] \quad \text{Df}$$

$$\cdot 1 \quad \text{Variab } Ia = \forall x \exists (x \times a = 0) \quad \cdot 2 \quad (Ia)^2 = -a^2$$

$$[x \in v . x \times a = 0 . \supset . (Ia)^2 x = (Ia)[I(aax)] = Iaa[I(aax)] =$$

$$(a \times x)a - (a \times a)x = -a^2 x]$$

$\cdot 0$  Si  $a$  es vectore,  $Ia$ , lege «involutione de  $a$ », indica transformatione lineare scripto. Es operatione super vectores perpendicularare ad  $a$ . Suo quadrato vale numero  $-a^2$ . Nota que id es vero pro vectores perpendicularare ad  $a$ ; nam si  $\text{moda} = 1$ ,  $[I(aax)x, v]^2 = -(\text{comp } \perp a)$ .

$$\cdot 3 \quad qA = Iv \quad \cdot 4 \quad \text{quaternion} = q + Iv \quad \text{Dfp}$$

Omni involutione de forma  $Iu$ , ubi  $u$  es vectore, es producto de numero reale per substitutione indicato per  $A$  (absoluto) in §3, id es vale termine imaginario de quaternione. Relatione inter producto alternato de Grassman, et quaternione de Hamilton.

$$\cdot 5 \quad u \in Iv . \supset . Iu = v \wedge x \exists (u = Ix) \quad \text{Df}$$

Si  $u$  es involutione, vel imaginario de quaternione,  $Iu$ , lege «Indice de  $u$ », es vectore que repraesenta involutione.

Hamilton, N.133 et 286, introduce l'operatione  $I$ , et suo inverso  $I^{-1} = I$ .

In libro III, Hamilton tace signos  $I$  et  $I$ , et identifica quaternione recto cum suo vectore. Nos ne pote seque ce conventione, contra notatione de Grassmann; quare P.2 da ad  $a^2$  valore opposito ad illo de §1.

\* 26.  $a, b, c \in v . m, n \in q . \supset$ .

$$\cdot 1 \quad (m + Ia) + (n + Ib) = (m + n) + I(a + b)$$

$$[ \text{Hp} . w \in \text{Variab}(m + Ia) \wedge \text{Variab}(n + Ib) . \supset . w \in v . w \times a = 0 . w \times b = 0 .$$

$$(m + Ia)w + (n + Ib)w = mw + I(aaw) + nw + I(baw) =$$

$$(m + n)w + I[(a + b)aw] = [(m + n) + I(a + b)]w ]$$

$$\cdot 2 \quad \text{real}(m + Ia) = m . \text{Imag}(m + Ia) = Ia .$$

$$K(m + Ia) = m - Ia . \text{mod}(m + Ia) = \sqrt{m^2 + a^2}$$

$$\cdot 3 \quad (Ib)(Ia) = -b \times a + I(baa)$$

$$\cdot 4 \quad (Ic)(Ib)(Ia) = -(b \times a)Ic + (c \times a)Ib - (c \times b)Ia + (aabc)/\psi$$

$$\cdot 5 \quad a = 0 . \supset . b/a = [a \times b + I(aab)]/a^2$$

## \* 28. posit

$$\cdot 1 \quad a \in q^1 - v . \supset . \text{posita} = a (\omega a) \quad \text{Df}$$

$$\cdot 11 \quad a, b \in v - 0 . \supset : \text{posita} = \text{posit}b . = . a \in qb \quad \text{Df}$$

$$\cdot 12 \quad a, b \in q^1 - 0 . \supset : \text{ThsP} \cdot 11$$

- 13  $\text{posit}'(\varphi^1 \cdot v) = p$
- 2  $a \in \varphi^1 a \varphi^1 \cdot 0 \quad \supset \quad \text{posita} = \text{posit}'[\varphi^1 \cdot 0 \wedge x \exists (x a a = 0)] \quad \text{Df}$
- 21  $a, b \in \varphi^1 a \varphi^1 \cdot 0 \quad \supset \quad \text{posita} = \text{posit}b \quad \text{.} \text{.} \text{.} \quad a \in q b$
- 3  $a \in \varphi^1 \cdot 0 \quad \supset \quad \text{posita} = \text{posit}'[\varphi^1 \cdot 0 \wedge x \exists (x a a = 0)] \quad \text{Df}$
- 31  $a, b \in \varphi^1 \cdot 0 \quad \supset \quad \text{posita} = \text{posit}b \quad \text{.} \text{.} \text{.} \quad a \in q b$
- 4  $a, b \in p \quad a \cdot b \quad \supset \quad \text{posit}(a b) = \text{recta}(a, b) \vee \text{posit}(b - a)$
- 41  $a, b \in p \quad a \cdot b \quad \text{.} \text{.} \text{.} \quad c \in p \text{-recta}(a, b) \quad \supset \quad \text{posit}(a b a c) = \text{plan}(a, b, c) \vee \text{posit}(b - a) a (c - a)$

«Posit», lege «positione», es simbolo introducto per Prof. Burali-Forti, (*Il metodo di Grassmann nella Geometria proiettiva*, Palermo R. a.1896, 1897, 1901,) et *Lezioni di Geometria metrico proiettiva*, Torino a.1904, p. 95) pro defini elementos de Geometria de positione ope Calculo geometrico de Grassmann.

·1 Si  $a$  es forma de gradu 1, non reductibile ad vectore, suo «positione» vale forma diviso per massa, id es suo barycentro.

·11 Si  $a$  et  $b$  es vectore non nullo, nos dice que illos habe idem positione, si es parallelo.

«Positione» de vectore vocare et «directione», vel «puncto ad infinito».

·2 Si  $a$  es producto de duo forma de gradu 1, non nullo, suo «positione» vale positione de omni forma de gradu 1, non nullo, que habe cum  $a$  producto non nullo.

·21 Si  $a$  et  $b$  es producto de duo forma de gradu 1, nos dice que illos habe idem positione si  $a$  es producto de  $b$  per numero.

«Positione» de bivectore vocare et «recta ad infinito».

·31 «Positione» de trivectore vocare et «plano ad infinito».



## VOCABULARIO IV.

## §1.

332. **Geometria**, G γεωμετρία, A geometry, D geometrie, F géométrie, HI geometria, R geometrija.  $\subset$  ge + -o- + -metria.
333. ge G γῆ, γῆα = terra.  $\supset$  ge-o-daesia, ge-o-logia, ...  
 $\parallel$  ? D gau, S gau-s.
334. -o-  $\supset$  anth-o-logia, phil-o-sophia, ellips o-ide ...  
 Litera de unione in G, ut L -i- (9).
335. -metria  $\supset$  (332), stereo-metria, gonio-metria ...  
 $\subset$  metro — -o + -ia (143).
336. **metro** HI μέτρον, A meter, metre, D metrum, F mètre, R metr'.  
 $\supset$  dia-metro, peri-metro, sym-metr-ico.  
 $\parallel$  S matra.  $\subset$  me- + -tro (91).
337. ma-, me- (thema E), S mâ = mensura (verbo).  
 $\supset$  (secundo Van.) L ma-nu.  
 L ma-ter, matre, G μήτηρ, μητρί, G.dorico μάτηρ, ματρί, A mother,  
 D mutter, R mati, mater-, S matar, matre.  
 L me-ti-re, A mete, D messe, R mjeritj.  
 L mensura (nomen), D mass, G metro, R mjera.  
 L mense, G μήν, D monat, S mäsä.  
 A moon, D mond, R mjesjas = L luna.
338. **puncto**, AF point, D punct, HI punto, R (non Math.) punet'.  
 $\subset$  punge — -e + -to (135). Vide nota 189.
339. **punge** HI.  $\supset$  A punge-nt.  $\subset$  pug- + -n- + -e.
340. pug-  $\supset$  L punge, pu-pug-i, pug-ile, pug-no.  
 $\parallel$  G pyx, pyg-macho-s.  $\parallel$  ? A fist, D faust.
341. -n-, sub forma -ne es suffixo:  
 li-ne — li-(to) = sine — si-(to) = cer-ne — cre-(vi).  
 Es «infixo» in thema de verbo, sub forma -n-:  
 lin-n-que — (re)-lic-(to), ju-n-ge — juga, fra-n-ge — frac-(to), pi-n-ge  
 — pic-(to), stri-n-ge — stric-(to), sei-n-de — seis (so), ta-n-ge — tac-to,  
 ru-m-pe — rup-(to), la-m-be — lab (io), te-m-pore — tepore.  
 $\parallel$  G -ne, cri-ne = L cer-ne.  
 $\parallel$  S na-, ri-na-cti =  $\parallel$  L li-n-quit, ju-na-cti =  $\parallel$  L ju-n-git.
342. **vectore**, ADL vector, F vecteur, I vettore.  
 $\subset$  veh- — -e + -tore (138). Vide nota 164.

343. **vehe**  $\supset$  veh-iculo, vec-tore, via.  
 || A wag, D wage, wege, be-wege, R ves-ti, S vah-  $\subset$  E veghe.  
 G och-o = || A wag-on = || L veh-iculo.  
 Nota: E gh  $\supset$  L h, G ch, S h, gh. AD g, R s, z.
344. **barycentro** (P10) (vocabulo scientifico; non esiste in vocabularios.)  
 $\subset$  bary + centro. = centro de gravitate.
345. bary- G βαρύ-ς  $\supset$  bary-te (Chimica), bary-ono, bar-o-metro, ...  
 || L grave.
346. **grave** AFHI.  $\supset$  grav-itate. || G bary- (345), S guru.
347. **gravitate**, A gravity, D gravität, F gravité, H gravedad, I gravità  
 $\subset$  grave (316) - e + -itate (8).
348. **centro** HI, G κέντρο-ν, AF centre, DL centrum, R tsentr'.  
 $\subset$  cen- (= L punge, || S çnath = neca) + -tro (91).
349. **pondo, pondere**  $\supset$  ponder-a A, ponder-oso A, D pfund.  
 || L pende, penso, pensa. pondere  $\subset$  pondo - o + -ere (56).
350. **distantia** (P 21) AF distance, H distancia, I distanza, R distantsia.  
 $\subset$  distante - e + -ia (143).
351. **distante** HI, AF distant.  $\subset$  dista + -nte (142).
352. **dista** HI.  $\subset$  di- (51) + sta (77).
- §2.
353. **recta** (P1) H, F d-roite  $\subset$  di-recta, I retta. || A right.  
 $\subset$  recto - o + -a (126, linea).
354. **recto** H, F d-roit, I retto.  $\supset$  rect-i-fica Dr.  
 || A right, D recht.  $\subset$  rege - e + -to (135; vide nota 189).
355. **rege** H, F régir, I regge.  $\supset$  rege nte DR, reg-ula D.  
 || G orege, D recke, S r.g'u.
356. **piano** (P2) H, AF plan, plane, I piano, R plan'.  
 $\subset$  pla- + -no (160).
357. pla-  $\supset$  pla-no, pla-nta.  
 || G pla-ty-s  $\supset$  F plat, I piatto, D platt.  
 G pla-tea FI  $\supset$  I piazza, AF place, D platz.  
 || D fla-eh, A flat, S pra-thas, R plo-seij
358. **componente** (P3) DHI, A component, F composante.  
 $\subset$  compone + -nte (142).
359. **compone** HI, D componire.  $\subset$  com- (47) + pone (148).
360. **parallelo** I, AD parallel, F parallèle, H paralelo, R paralleli.  
 $\subset$  G παρὰλληλος  $\subset$  par- + allelo.

361. **para**, **par-** (ante vocale), *παρά* = contra, juxta, trans.  
 $\supset$  G para-bola  $\wedge$  para-metro  $\wedge$  para-grapho  $\wedge$ ... || L prae (57).
362. **allelo** G  $\subset$  allo + allo (per dissimilatione de secundo elemento).  
 || D ein-ander.
363. **allo** G, *ἄλλος* = || L alio.  $\supset$  G all-egoria, allo-tropia, par-all-axi.  
 Nota: G allo — L alio = G phyllo — L folio.
364. **normale** FI, ADFH normal, R normalı.  $\subset$  norma + -le (6).
365. **norma** HIR, D norm.  
 $\subset$  gno- (250; vide nota 249) + -ro (107) — o + -ma (secundo V a n.).
366. -ma  $\supset$  nor-ma  $\wedge$  fa-ma  $\wedge$  ani-ma  $\wedge$  for-ma  $\wedge$  spu-ma  $\wedge$  lacru-ma  $\wedge$ ...  
 || G -μή, gram-ma.  $\subset$  -mo (125) — o + -a (37).
367. **projectione** (P4), AF projection, H proyeeccion, I proiezione, R projectsija.  $\subset$  projecto — o + -ione (118).
368. **projecto**, A project, D projekt, F projet, H proyecto, I progetto, progetto.  $\supset$  project-ile, project-ivo.  
 $\subset$  pro- (134) + jac- (vide nota 240) + -to (135).
369. **jac-**, **jace**, (infinito: *jācere*).  
 $\supset$  ob-jec-to, ad-jec-tivo, con-jec-tura, -jec-ta = F jette, I getta  
 $\supset$  *jacere* (passivo de *jācere*)  $\supset$  F gèsir, H yacer, I giacère.  
 $\supset$  L jac-tura, jac-ulo, jac-ta,...
370. **translatione** (P5) ADFI.  
 $\subset$  trans (64) + lato (211) — o + -ione (118).
371. **symmetria** (P6) G *συμμετρία* ADFHIR.  
 $\subset$  sym- (32) + metro (306) — o + -ia (143).
372. **motore** (P9) I, LAH motor, F moteur.  $\subset$  mo- + -tore (138).
373. **motu** HI, F mouvement.  $\subset$  mo- + -tu (100).
374. **move**, mo-, AH move, F mouv-oir, I muove.  
 $\supset$  mo-bile, mo-mento, mo-tu, mo-tore, mu-ta.  
 || G a mey o-, S me = R mje-natı = L muta.  
 (Grassmann puta: move — mea = mone — mene).
375. **homothetia** (P10) (vocabulo scientifico).  
 $\subset$  homo + the (23) + -to (135) — o + -ia (143).
376. **homo-**, G *ὁμός*.  $\supset$  homo-logo, homo-nymo, homo-gen-eo, ...  
 = || L sim-ile (198).
377. **sinu**, LADFR sinus, HI seno.  
 traductione in L (anno 1500) de vocabulo Arabo *q'ib* = L sinu =  
 F pli, introducto per astronomo Al Battani a. 800, pro indica  
 chorda plicato in duo parte.

378. **chorda**, G χορδή, A cord, chord, D chorde, F corde, H cuerda, I corda, R chorda.  
 $u, v \in \mathcal{V} \Rightarrow \text{chorda}(u, v) = \text{mod}(Uu - Uv)$ .  
 Ptolemaeo a. 150 calcula chorda de arcus de  $0^\circ$  ad  $180^\circ$ .
379. **cosinu** = complementi sinu.
380. **coordinata** (P14) L scientifico, ADHIR, F coordonnée.  
 $\subset$  co- (47) + ordina + -to (135) - o + -a (126, linea).
381. **ordina** HI, A order, F ordonne, D ordne.  
 $\subset$  ordine (297) - e + -a (92).

\*\*

Ideographia repraesenta, ope paucis symbolis, innumero vocabulo commune.

Me exprime aliquo vocabulo de Geometria elementare:

$u \in \mathcal{V} \Rightarrow \text{qu} = \text{vectore parallelo ad } u$ .

$\text{Qu} = \text{vectore parallelo in idem sensu de } u$ .

$a \in \mathcal{P} \wedge b \in \mathcal{P} \Rightarrow$

$a + Q(b-a) = \text{radio de origine } a \text{ et que transi per } b$ .

$a + \theta(b-a) = \text{segmento inter } a \text{ et } b, \text{ sine extremos}$ .

$a + \theta(b-a) = \text{idem segmento cum extremos}$ .

384. **radio**, A ray, F rayon, H rayo, I raggio, LADR radius.  
 $\subset$  rad- + -io (43).
385. rad- = se dilata, extendit, irradia.  
 $\supset$  rad-io, rad-ice, ramo ( $\subset$  \*rad-mo).  $\subset$  E vrad, S vardh, vradh.
386. **origine**, FI, A origin, H origen.  $\subset$  ori- (298) + -gine.
387. -gine  $\supset$  ori-gine, vora-gine, lanu-gine, verti-gine.  
 $\subset$  (secundo Henry) -co (201) - o + -ine (302).
388. **segmento** HI, ADFR segment.  $\subset$  seca - a + -mento.  
 Nota: -c + m-  $\supset$  -gm-.
389. **seca** = divide. F scie, H sega, I sega, seca.  
 $\supset$  seca-nte, sec-tore, sec-tione.  
 $\parallel$  A saw, D säge, D sehe = L vide, R sjec'ī.
390. -mento  $\supset$  aug-mento, mo-mento.  
 $\parallel$  -mate G -mati, theore-mate, lem-mate, ... (60).  
 $\subset$  -men (251) + -to (135)  
 = -men; frag-mento = frag-men, medica-mento = medica-men,...
- $u \in \mathcal{V} \wedge v \in \mathcal{V} \Rightarrow \text{qu} + \text{qv} = \text{vectore coplanare cum } u \text{ et } v$
391. **coplanare**, com-planare. Vocabulo introdotto per Hamilton;  
 A complanar, F coplanaire.  $\subset$  co- (47) + plano (356) - o + -are.
392. -are = -ale (239). Suffixo -ale, post thema que contine litera l, sume forma -are: milit-are, popul-are, line-are, ..., per lege dicto « de dissimulatione ». In tardo latino existe forma: fili-ale.

$\alpha\epsilon\rho . u\epsilon v . v\epsilon v = qu \supset$ .

$a + Qu + Qv =$  (angulo de vertice  $a$  et de lateres  $a + Qu$  et  $a + Qv$ ).

suo supplemento  $= a + Qu - Qv$

suo opposito  $= a - Qu - Qv$

393. **angulo** H, AF angle, I angolo.  $\supset$  tri-angul-atione DR.

$\parallel$  R ugol'.  $\subset$  ange - e + -ulo (224).

394. **ange**  $\supset$  (393), ang-ore, ang-usto, ang-ustia, anxio,...  $\parallel$  D angst, enge, et G anc-ylosi, anc-yra  $\supset$  L anc-ora, D angel = L hamo,... L unc-o, un-ino = G oncino,... (V a n.).

395. **vertice** HI, LA vertex;  $\parallel$  R verch', vers'ina.

$\subset$  verte (204) - e + -ice.

396. -ice = vèrt-ice  $\wedge$  àp-ice  $\wedge$  ... rad-ice  $\wedge$  bisectr-ice  $\wedge$  ...  $\subset$  -i- (9) + ce.

397. -ce  $\supset$  fero-ce, mer-ce, fa-ce, -a-ce, velo-ce.

(Secundo Grassmann,  $\parallel$  -co N. 201).

398. **latere**, latus, H lado, I lato.  $\supset$  later-ale AD.

399. **supplemento** ADFHI.  $\subset$  sub (95) + ple (111) + -mento (390).

400. **opposito**, A opposite, F opposé, H oposito, I opposto.

$\supset$  opposit-ione DR.  $\subset$  ob- + posito (216).

401. ob = pro causa de, contra, ante.  $\supset$  ob-jecto, oc-curre.

$\parallel$  G epi = epi-tome  $\wedge$  epi-graphé  $\wedge$  ... S api, abhi, R o, ob',

A be- = be-get  $\wedge$  be-fore ..., D be .

$\alpha\epsilon\rho . u\epsilon v = qu . w\epsilon v = qu + qr \supset$ .

$a + qu + Qr + Qw =$  angulo dihedro.

$a + qu$  es latere, A edge  $\parallel$  L acie, F arête  $\subset$  L arista.

$a + qu + Qr$ ,  $a + qu + Qw$  es facie s.

$a + Qu + Qr + Qw =$  angulo trihedro;  $a$  es vertice,  $a + Qu$ ,  $a + Qr$ , ... es lateres, et  $a + Qu + Qr$ ,  $a + Qu + Qw$ , ... es facies.

402. **dihedro**, diedro (non L, non G).

A dihedron, F dièdre.  $\subset$  di (=duo, N. 114) + -hedro.

Si nos suppose ce vocabulo derivato ab vocabulo Graeco (quod non es), tunc nos debe scribe «diedro», sine  $h$ . Nam in G, in compositione de duo elemento, si secundo habe  $h$  ut initiale, ce  $h$  evanesce, si non seque  $t, p, c$ . Exemplo: an- + hydro  $\supset$  GL anydro. F anhydre, A anhydrous non deriva de vocabulo G, sed es composito moderno de duo elemento G.

403. -hedro  $\supset$  exa-hedro, tetra hedro ...  $\subset$  hedra - a + -o (182).

404. hedra G ἔδρα = L sede, facie.  $\supset$  ex-hedra, cat-hedra .

$\subset$  hed- + -ra.  $\parallel$  L sella, D sessel, A settle, R sjedlo.

405. hed- G ἔδ-,  $\parallel$  L sede.

406. **sede** (verbo),  $\parallel$  S sad-, G hed- 365), D sitze, setze, R saditj. E sede.

407. -ra G -qu = -ro (107) -- o + -a (37).

408. **acte** || A edge, D ecke.  $\subset$  ace — e + -ie.
409. **ace** = es acido; (in compositione) = es acuto.  
 $\supset$  ac-ido, ac u, ac-uto, ac-re.  
 || G ac-ro-poli, ac-ro-bata. S aç, D ähre = arista, R ostro.  $\subset$  E ace.
410. -ie  $\supset$  spec-ie, ser-ie, fac ie, progen-ie.
411. **facie**, AF face, H faz, I faccia.  $\supset$  super-ficie.  
 $\subset$  (secundo Van. et Grassmann) face — e + -ie (371). = apparentia  
 vel  $\subset$  (secundo Bréal) fac 137) + -ie. = factura.
412. **face** I.  $\supset$  fac ula, I fiaccola, D fäkel.  $\subset$  fa- + -ce.
413. fa- = vide-re, splende; clara, explicia, loque.  
 $\supset$  fa-cie, fa-villa, fe-nestra, fo-co; fa-nte, fa-to, af-fa-bile, pro-fe-ssa.  
 || G pha-, pha-si, dia-pha-no, epi pha-neia = L super-fi-cie, pha-o-nomeno, pho-s-phoro, pho-to; pro-phe-ta, eu phe-mismo, pho-no.  
 || R bjelyj = candido, S bhā = splende.  $\subset$  E bhā.
414. **parallelogrammo**, G παρὰλληλόγραμμο-ν, ADFHIR.  
 $\subset$  parallelo (330) + gramma — a + o (182).  
 Es figura  $a+ou+or$ .
415. **gramma** G γραμμή = L linea, G γράμμα = L litera.  
 $\supset$  grammat-ico, F.intn. gramme.  $\subset$  graphe — e + -ma (366).
416. graphe G  $\supset$  graph-ico, phono graph o,...  
 = L scribe eum quo es ligato, secundo Van...  
 || D kerbe = L sculpe.
417. **parallelepipedo** G παρὰλληλεπίπεδο-ν (Euclide l. 11 Prop. 25).  
 ADFHIR.  $\subset$  parallelo (330) — o + epipede.  
 Es figura  $a+ou+or+ow$ .
418. epipedeo G = L plano.  $\subset$  epi + pedo.
419. epi G = L supra, = || L ob.  $\supset$  epi-cyelo DR, epi-gramma. || S api.
420. pedo G = L agro campo, solo. || G podi = L pede.
421. **orthohedro**. Ita Mansion voca «parallelepipedo rectangulo».  
 $\subset$  ortho + hedro (363).
422. ortho G = L recto.  $\supset$  ortho gon ale, ortho-graphia, ...  
 kē Cls'q.  $\supset$ .
- $k+qu$  = cylindro, prisma, que projecta figura  $k$  secundo directione  $u$ .  
 $a+q(k-a)$  = cono, pyramide, que projecta  $k$  de puncto  $a$ .
423. **cylindro** G κύλινδρος, AD cylinder, F cylindre, HI cilindro,  
 R tsilindr'.  $\subset$  cylinde — e + -ro (107).
424. cylinde = L rota, rotula.  $\subset$  cyl- + -inde (= 0).
425. cyl- = rota.  $\supset$  G polo, L colu, R cole so  $\supset$  I calesse.
426. **prisma** G πρίσμα, A prism, DHIR prisma, F prisme.  
 $\subset$  prize (= L seca, trunca) + -ma (60).

427. **cono**,  $\kappa\acute{o}\nu\omicron\varsigma$  A cone, F cône, HI cono, LDR conus.  
 $\subset$  co- (thema G = L cu-) + -no (160).
428. **cuneo** I, H cuneo, cun̄o, AF coin.  $\subset$  cu- + no (160) - -o + -eo.
429. cu- = acue.  $\supset$  cuneo.  $\parallel$  G co-no, A ho-ne, S ça, ça-na.
430. -eo  $\supset$  aur-eo  $\cap$  ros eo.  $\parallel$  G -eo: chrys-eo.
431. **pyramide** DF, A pyramid, HI piramide, R piramida.  
 $\subset$  G  $\pi\upsilon\rho\alpha\mu\acute{\iota}\delta\iota$   $\subset$  Aegyptio. Simile ad G pyr = foco, G pyro = grano.  
 Angulo  $(u, v)$  es recto =  $(u \times v = 0)$   
 » » acuto =  $( * > 0)$   
 » » obtuso =  $( * < 0)$
432. **acuto** I, A acute, F aigu, H agudo.  $\subset$  acu + -to (135).
433. **acu**, F aigu-ille, H agu-ja, I ago  
 $\supset$  acu-e, acu-men, acu-leo.  $\subset$  ace (370) - -e + -u.
434. -u  $\supset$  ac-u, -tu (100), sens-u, flux-u, man-u, corn-u, sin-u, gen-u, gel-u, ...  $\parallel$  G -y = pol-y  $\cap$  bar-y  $\cap$  ...  
 Desinentia L -u in FHI coincide cum -o: L manu = I mano, ...;  
 sed mane in compositione, in vocabulos internationale:  
 man-u-ale, sens-u-ale, vis-u-ale, man-u-brio, flex-u-oso, luct-u-oso,  
 corn-u-to, sin-u-oso, Gen-u-a = I Genova, ...  
 Vocabulos que termina in -o: campo, naso, oculo, vento, ...  
 produce: camp-ale, nas-ale, ocul-are, vent-oso, ...
435. **obtusio** H, A obtuse, F obtus, I ottuso.  
 $\subset$  ob (401) + tud- + -to (135); vide nota 174.
436. tud-  $\supset$  tu-n-de, con-tuso.  $\parallel$  S tud, G typ-te, D stosse ?.
437. **sphaera** de centro  $o$  et de radio  $r$ , rato ut superficie =  
 $\{x \mid \text{mod}(x-o) = r\}$ .  
 G  $\sigma\phi\alpha\iota\tau\alpha$ , AF sphere, D sphäre, IR sfera, H esfera.
- §4.
438. **alterno**, altern-ato ADFHI.  $\subset$  altero - -o + -no (160).
439. **altero**, F autre, H otro, I altro.  $\parallel$  G allotero.  $\subset$  al- + -tero (269).
440. **alio**  $\parallel$  G allo (363), Gotico alja.  $\parallel$  ? S arja = socio.  
 $\subset$  al- + -io = ali + -o.
441. al-, ali (L. antiquo)  $\supset$  al-io, al-tero. =  $\parallel$  A el-se.  $\parallel$  D elend  $\subset$  D antiquo ali-lanti, D El-sass.
442. **indice** FHI, LAD index.  $\subset$  in (113) + -dice.
443. -dice  $\supset$  in-dice, ju-dice, vin-dice.  $\subset$  dic.
444. **dic, dice** (L. antiquo) I, F di-re, H dec-ir.  
 $\supset$  dicta ADR, dictione ADR.  $\parallel$  G deic- = indica, dicē = justitia,  
 dic-asterio, syn-dic-o, para-dig-ma.  $\parallel$  D zeihe, zeige, S diç.
445. **positione** ADFHIR.  $\subset$  posito (216) - -o + -ione (118).

V

## LIMITES

Formul. t. 5

14.





## V. LIMITES.

### §1 Lm lim

Vocabulo « limite » habet in Mathematica plures sensus. Idea plus simpliciter indicatur per  $l' =$  « limite superius » et  $l$ , « limite inferius ».  $l'$  facit correspondere ad omnem classem, uno numero determinato, finito aut infinito.

In secundo loco se praesentat classe indicata per  $\lambda =$  « classe limite »,  $A =$  « limite generale »,  $\delta =$  « classe derivata » (pag. 139-142), quae ad classem facit correspondere classem.

Nunc nos stude limite de successione et de functione.

Nos considera successione de quantitate, in numero infinito :

$$x_0 \ x_1 \ x_2 \ x_3 \dots x_n \dots$$

Id est, nos supponit quod littera  $x$  cum uno ex indice 0, 1, 2, ...  $n$ ... repraesentat quantitate. Indice, scripto ad dexteram et sub littera  $x$ , differt de variabile quae comitatur  $x$ , solo per formam typographicam. Ergo nos supponit quod

$$x_0, x_1, x_2, \dots x_n, \dots$$

est quantitate; quod nos exprimit per signum  $f$  de functione :

$$x \varepsilon \text{ qf} N_0$$

lege: «  $x$  est successione, vel serie, de quantitate ».

Nos considera valores de  $x$  respondente ad indice de  $m$  in post:  $x'(m+N_0)$ . Sui classe limite generale  $Ax'(m+N_0)$  varia cum  $m$ ; et sumit valores  $Ax'(m+N_0) | m' N_0$ . Me vocat « limes de  $x$  », et indicat per «  $\text{Lm}x$  », classem partem communem ad omnem classem  $Ax'(m+N_0)$ , pro  $m = 0, 1, 2, \dots$  Collecto diverso suo elemento, definitione de  $\text{Lm}$  sumit formam :

\* 1.  $x \varepsilon \text{ qf} N_0 \supset$

$$\cdot 0 \quad \text{Lm}x = \bigcap [Ax'(m+N_0) | m' N_0]$$

Df  $\text{Lm}$

Si nos eliminat signum  $\bigcap$ , vel substituit ad illo suo valore dato per definitionem,  $\text{P} \cdot 0$  fit :

$$\cdot 1 \quad \text{Lmx} = a\exists [m \in N_0 \cdot \supset_m . a \varepsilon A x'(m + N_0)] \quad \text{Dfp}$$

[ III. §5 P1.0 Df  $\cap$   $\supset$  P ]

« Classe limes de  $x$ , es classe composito ex omni objecto  $a$  tale que, si nos sume numero arbitrario (indice)  $m$ , semper  $a$  pertine ad classe limite generale de valores sumpto per  $x$ , de  $m$  in post ».

Nos pote elimina symbolo  $A$ , cum introductione de signo  $\lambda$ ,  $\lambda'$ ,  $\lambda$ , que occurre in Df de  $A$ . Tunc definitione se decompone in tres propositione  $\cdot 2 \cdot 4 \cdot 3$  :

$$\cdot 2 \quad q\wedge \text{Lmx} = a\exists [m \in N_0 \cdot \supset_m . a \varepsilon \lambda x'(m + N_0)] \quad \text{Dfp}$$

$$\begin{aligned} [ \text{Distrib}(\varepsilon, \wedge) \cdot \supset . q\wedge \text{Lmx} &= a\exists [a \varepsilon q \cdot a \varepsilon \text{Lmx}] \\ \text{Df Lm} \cdot \supset . &= a\exists [a \varepsilon q : m \in N_0 \cdot \supset_m . a \varepsilon A x'(m + N_0)] \\ \S 2.6 \cdot \supset . &= a\exists [m \in N_0 \cdot \supset_m . a \varepsilon q \cdot a \varepsilon A x'(m + N_0)] \\ \text{Distrib}(\varepsilon, \wedge) \cdot \supset . &= a\exists [m \in N_0 \cdot \supset_m . a \varepsilon q\wedge A x'(m + N_0)] \\ \S A \cdot 2 \cdot \supset . &= a\exists [\lambda x'(m + N_0)] \end{aligned}$$

« Limes finito de  $x$  es omni objecto (numero)  $a$  tale que, si nos sume numero  $m$ , seque, pro omni valore de  $m$ , que  $a$  es uno ex valores limite de classe de valores de  $x$ , de  $m$  in post ».

Et si nos vol elimina signo  $\lambda$ , nos habe definitione sequente, expresso per solo signo elementare :

$$\cdot 3 \quad a \varepsilon q \cdot \supset . a \varepsilon \text{Lmx} . = : m \in N_0 \cdot h \varepsilon Q \cdot \supset_{m,h} . \exists (m + N_0) \wedge n \exists [\text{mod}(x_n - a) < h] \quad \text{Dfp}$$

$$\begin{aligned} [ \text{P.1} \cdot \supset . a \varepsilon \text{Lmx} &= m \in N_0 \cdot \supset_m . a \varepsilon \lambda x'(m + N_0) \\ \text{Df } \lambda \cdot \supset . &= m \in N_0 \cdot \supset_m : h \varepsilon Q \cdot \supset_h . \exists x'(m + N_0) \wedge y \exists [\text{mod}(y - a) < h] \\ \text{Import} \cdot \supset . &= m \in N_0 \cdot h \varepsilon Q \cdot \supset_{m,h} . \exists (m + N_0) \wedge n \exists [\text{mod}(x_n - a) < h] \\ \S 1.6 \cdot \supset . &= m \in N_0 \cdot h \varepsilon Q \cdot \supset_{m,h} . \exists (m + N_0) \wedge n \exists [\text{mod}(x_n - a) < h] \end{aligned}$$

« Si  $x$  es successione de quantitate, et si  $a$  es quantitate (finito), tunc nos dice que  $a$  es uno ex limes de successione  $x$ , quando, si nos sume ad arbitrio numero integro (indice)  $m$ , et ad arbitrio quantitate positivo  $h$ , seque pro omni valore de  $x$  ed de  $h$ , que nos pote determina aliquo indice, sequente  $m$ , et tale que differentia inter elemento correspondente in successione et quantitate  $a$  es, in valore absoluto, minore de  $h$  ».

Casu de limes  $\pm \infty$  es plus simpliciter:

$$\cdot 4 \quad +\infty \varepsilon \text{Lm}x \text{ .} \equiv \text{I}' x' N_0 = \infty \quad \text{Dfp}$$

$$[ \text{Df Lm} \supset \cdot +\infty \varepsilon \text{Lm}x \text{ .} \equiv m \varepsilon N_0 \supset m \cdot +\infty \varepsilon A x'(m+N_0) \quad (1)$$

$$\text{Df } A \supset \cdot \text{ .} \equiv m \varepsilon N_0 \supset m \cdot \text{I}' x'(m+N_0) = \infty \quad (1)$$

$$m \varepsilon N_0 \supset \text{I}' x'(m+N_0) = \infty \text{ .} \equiv \text{I}' x' N_0 = \infty \quad (2)$$

$$(1) \cdot (2) \supset P ]$$

$$\cdot 5 \quad -\infty \varepsilon \text{Lm}x \text{ .} \equiv \text{I}_1 x' N_0 = -\infty \quad \text{Dfp}$$

«  $+\infty$  es limes de successione  $x$ , quando limite supero de valores de  $x$  vale  $+\infty$ . Et in modo analogo pro  $-\infty$  ».

\* 2.  $x \varepsilon \text{qf} N_0 \supset$ :

$$\cdot 1 \quad \text{I}'_1 [\text{I}' x'(m+N_0)] | m' N_0 \varepsilon \text{Lm}x$$

$$[ \text{Hp} \cdot y = \text{I}' x'(m+N_0) | m \cdot a = \text{I}' y' N_0 \supset$$

$$m, n \varepsilon N_0 \supset m+n+N_0 \supset m+N_0$$

$$\cdot \text{Oper } x' \supset x'(m+n+N_0) \supset x'(m+N_0)$$

$$\cdot \text{Oper } \text{I}' \supset y(m+n) \leq ym \quad (1)$$

$$m \varepsilon N_0 \cdot (1) \supset a = \text{I}' y'(m+N_0) \supset a \varepsilon A y'(m+N_0) \quad (2)$$

$$m, n \varepsilon N_0 \supset y(m+n) \varepsilon A x'(m+n+N_0) \cdot (1) \supset y(m+n) \varepsilon A x'(m+N_0)$$

$$\supset y'(m+N_0) \supset A x'(m+N_0) \quad (3)$$

$$m \varepsilon N_0 \cdot (2) \cdot (3) \supset a \varepsilon A x'(m+N_0) \quad (4)$$

$$(4) \cdot \text{Df Lm} \supset a \varepsilon \text{Lm}x ]$$

« Si in successione  $x$  de quantitates, nos considera limite supero de valores de  $x$  de  $m$  in post, illo depende de  $m$ . Limite infero de valores de limite supero præcedente es limes de  $x$  ».

$$\cdot 2 \quad \text{I}'_1 [\text{I}' x'(m+N_0)] | m' N_0 = \max \text{Lm}x$$

$$\cdot 3 \quad \text{I}'_1 [ \text{I}'_1 \cdot \cdot \cdot \cdot \min \cdot ]$$

$$\cdot 4 \quad \exists \text{Lm}x \quad [ \text{P2.1} \supset P ]$$

« Omni successione de quantitates habe limes ».

$$\cdot 5 \quad \lambda(\text{qfLm}x) = \text{qfLm}x$$

$$[ \S 1.1 \supset \text{qfLm}x \supset \lambda(\text{qfLm}x) \quad (1)$$

$$m \varepsilon N_0 \cdot y \varepsilon \lambda(\text{qfLm}x) \cdot \text{P1.1} \cdot \text{P1.1} \supset y \varepsilon \lambda x'(m+N_0) \quad (2)$$

$$\cdot \cdot \cdot (2) \cdot \S 1.2 \supset y \varepsilon \lambda x'(m+N_0) \quad (3)$$

$$(3) \cdot \text{Export} \supset m \varepsilon N_0 \supset m \cdot y \varepsilon \lambda x'(m+N_0) \quad (4)$$

$$y \varepsilon \lambda(\text{qfLm}x) \cdot (4) \cdot \text{P1.0} \supset y \varepsilon \text{qfLm}x \quad (5) \quad (1) \cdot (5) \supset P ]$$

\* 3.  $x \in \text{qf} N_0 \supset \cdot 0 \lim x = \cdot \text{Lm} x$  Df lim

Si classe limes de successione  $x$ , que semper existe, consta ex uno solo individuo, casu multo interessante, tunc nos indica per  $\lim x$ , lege: limite de  $x$ , ce limes unico.

Per eliminatione de signo « Lm », Df gene propositiones '1'2:

'1  $a \in \text{q} \supset \therefore a = \lim x :=$

$h \in \text{Q} \supset h \cdot \exists N_0 \wedge m \exists [n \in m + N_0 \supset_n \text{mod}(x_n - a) < h]$  Dfp

[  $a = \lim x :=$

$x_n - x = \varepsilon \text{ Lm} x \cdot a = \text{L}[1, x^*(m + N_0) \mid m \in N_0] = \text{L}_c[1, x^*(m + N_0) \mid m \in N_0] :=$

$h \in \text{Q} \supset h \cdot \exists N_0 \wedge m \exists \forall x^* m + N_0 < a + h] \cdot \exists N_0 \wedge m \exists [1, x^*(m + N_0) > a - h] :=$

"  $\exists N_0 \wedge m \exists [a - h > 1, x^*(m + N_0) \leq 1, x^*(m + N_0) > a - h] :=$

"  $[n \in m + N_0 \supset_n a + h > x_n > a - h] :=$

"  $\text{mod}(x_n - a) < h]$  ]

« Si  $a$  es quantitate finito, tunc affirmatione de propositione «  $a$  vale limite de successione  $x$  », significa que, si nos sume ad arbitrio quantitate positivo  $h$ , semper nos pote determina indice  $m$ , tale que, pro omni indice  $n$ , superiore ad  $m$ , differentia inter  $x_n$  et  $a$  semper fi in valore absoluto minore de  $h$  ».

Membro definiente, vel secundo membro, contine literas  $h, m, n$ , que non occurre in membro definito, vel primo membro. Ce literas debe es apparente in secundo membro; in vero  $h$  es apparente quare figura ut indice ad primo signo  $\supset$ ;  $m$  es apparente quare figura cum signo  $\exists$ ; et  $n$  es apparente quare figura ut indice ad secundo signo  $\supset$ .

'2  $+ \infty = \lim x := h \in \text{Q} \supset h \cdot \exists N_0 \wedge m \exists [n \in m + N_0 \supset_n x_n > h]$   
 $- \infty \text{ ----- } x_n < -h]$

«  $+ \infty$  es limite de successione  $x$ , quando ad omni quantitate positivo  $h$  responde aliquo indice  $m$ , de que in post, semper termine de serie supera  $h$  ». In modo analogo pro limite  $- \infty$ .

'3  $\lim x \in \text{q} \cup \infty \cup - \infty := \max \text{Lm} x = \min \text{Lm} x$

« Conditione necessario et sufficiente, ut limite de  $x$  es quantitate finito aut infinito, es que maximo suo limes coincide cum minimo limes ».

·4  $\lim x \varepsilon q . = :$

$$h \varepsilon Q . \supset h . \exists N_0 \wedge m \exists [ n \in N_0 . \supset n . \text{mod}(x_m - x_{m+n}) < h ]$$

{ BOLZANO a.1817 p.35: « Wenn eine Reihe von Grössen

$$F^1x, F^2x, \dots F^nx, \dots F^{n+r}x \dots$$

von der Beschaffenheit ist, dass der Unterschied zwischen ihren  $n$ ten Gliede  $F^nx$  und jedem späteren  $F^{n+r}x$ , sey dieses von jenem auch noch so weit entfernt, kleiner als jede gegebene Grösse verbleibt, wenn man  $n$  gross genug angenommen hat: so giebt es jedesmahl eine gewisse *beständige* Grösse und zwar nur *eine*, der sich die Glieder dieser Reihe immer mehr nähern ... » }

Versione: Si uno serie de grossia habe proprietate, que differentia inter suo membro de loco  $n$  et omni ultra, ... minore que omni dato grossia mane, quando  $n$  grosso satis sumpto es; tunc existe semper uno determinato grossia. et uno solo, ad que membro de serie semper plus es prope.

·5  $\lim x \varepsilon q . = :$

$$h \varepsilon Q . \supset h . \exists N_0 \wedge m \exists [ p, q \varepsilon m + N_0 . \supset p, q . \text{mod}(x_p - x_q) < h ]$$

·4.5 Alio forma de conditione ut limite existe.

·6  $\lim x = l \wedge \exists [ u \varepsilon \text{Cls } N_0 . l' u = \infty . \supset u . a \varepsilon l x' u ]$  Dfp

### NOTA

Idea de limite (non vocabulo), occurre in Euclide in mensura de pyramide (libro 12, P5), et in Archimede; ce limite es exprimibile per symbolo  $l'$ .

Pro functione crescente idea « lim » es reductibile ad «  $l'$  » per P4.1.

Definitione de Wallis, a.1655 t.1 p.383, que quantitate variabile ad suo limite « continue propius accedere ita ut differentia tandem evadat quavis assignata minor; adeoque in infinitum continuata evanescet » conveni ad casu particulare de functione crescente, vel decrescente.

Definitio completo de « lim » es recente, a. 1860 circa. Vide citatione ad P42.1, et Formul. t. 4, p. 148.

Classe « Lm » occurre in Cauchy a.1821 p.30:

« ..... si l'on suppose que la variable  $x$  converge vers zéro, on aura .

$$\lim \left( \left( \sin \frac{1}{x} \right) \right) = M ((-1, +1)),$$

attendu que l'expression  $\lim \left( \left( \sin \frac{1}{x} \right) \right)$  admettra une infinité de valeurs comprises entre les valeurs extrêmes  $-1$  et  $+1$ . »

Versione:  $\text{Lim}[\sin(1/x) | x, q \neq 0, 0] = (-1)^{-1}$

Vide et P22.5, P24.5.

Me defini « Lm » in RdM. a.1892 p.77, et *Sur la définition de la limite d'une fonction*, AJ. a.1894, t.17 p.38-68.

446. **limite** (Vide N. 253) AFHI.  $\subset$  lime — e + -ite (255).  
 447. **lime** (L antiquo), **limo** = que es limite, es obliquo, transverso.  
 $\subset$  lic- (284) + -mo (125).  
 448. **limes** = Lm, es plurale de « lime ».  $\subset$  lime + -s.  
 Et es nominativo de « limite ».  
 Ita me indica idea « Lm ».  
 Formul. t.4, lege symbolos « Lm » et « lim » per « classe limite », et « valore limite ».  
 Scriptura commune  $\lim_{y=x} fy$ , in loco de  $\lim(f, u, x)$  (P40), contine litera  
 apparense  $y$ , et non contine litera reale  $u$ . Es symbolo incompleto.

✱ 4. const cres decr

0 «  $\varepsilon$  Cls'q  $\supset$  ».

$$\begin{aligned} f \varepsilon (qfu) \text{const} &::= f \varepsilon qfu : x, y \varepsilon u \supset_{x,y} fx = fy \quad \text{Df} \\ f \varepsilon (qfu) \text{cres} &::= \text{ } : x, y \varepsilon u . x < y \supset_{x,y} fx < fy \quad \text{Df} \\ \text{ } \text{cres}_0 &::= \text{ } \leq \text{ } \quad \text{Df} \\ \text{ } \text{decr} &::= \text{ } > \text{ } \quad \text{Df} \\ \text{ } \text{decr}_0 &::= \text{ } \geq \text{ } \quad \text{Df} \end{aligned}$$

Ces P defini expressiones : « functione constante », « functione crescente », « functione crescente, quando varia », « functione decrescente », et « functione decrescente, quando varia ».

449. **constante** DFH, A constant, I costante.  $\subset$  consta + -nte (142).  
 450. **consta** HI = sta, es composito, habet per pretio.  
 $\supset$  HI costa = A cost = F coût = D koste.  $\subset$  con- (47) + sta (77).  
 451. **crescente** I, A crescent, F croissante, H creciente.  
 $\subset$  cresce + -nte (142).  
 452. **cresce** I, H crece, F crot-t.  $\subset$  cre- + -sce.  
 453. **cre-**  $\supset$  cre-sce, in-cre-mento, cre-a = fac cre.  
 $\parallel$  G cra-, demo-cra-tia, S car.  
 454. -sce = cre-sce  $\wedge$  no-sce  $\wedge$  pa-sce  $\wedge$  na-sce  $\wedge$  adole-sce-nte AFHI.  
 albe-sce = fi albo, albe = es albo, I fini-sce = L fini.  
 $\parallel$  G -sce, S -cc'a, A -sh, wa-sh, wi-sh, D -sch, for-sche, mi-sche.  
 455. **decrescente** I, A decrescent, F décroissante.  $\subset$  decresce + -nte.  
 456. **decresce** I, A decrease, F décroi-t, H descrece.  $\subset$  de + cresce.

$$1 \quad f \varepsilon (qf N_0) \text{cres}_0 \supset \lim f = l'f'N_0 . \lim f \varepsilon qv \iota(+\infty)$$

$$2 \quad \text{ } \text{decr}_0 \text{ } \text{ } l'f'N_0 \text{ } \text{ } \iota(-\infty)$$

« Si  $f$  es successione crescente de quantitates, suo limite vale limite supero de suo valores; ergo es semper determinato, finito aut infinito ».

- \*1  $\text{Lm}(a+x_s)|s = a + \text{Lm}x$
- \*2  $+ \infty, -\infty \rightarrow \text{Lm}x \cup \text{Lm}y \Rightarrow$
- \*3  $\lim x \text{ eq } \Rightarrow \text{Lm}(x+y_s)|s = \lim$
- \*4  $\lim x, \lim y \text{ eq } \Rightarrow \lim(x+y_s)|s =$
- \*5  $\lim x = \infty, -\infty \rightarrow \text{Lm}y \Rightarrow \lim$

[illegible]

- 1  $a \in \mathfrak{q} \neq 0 \Rightarrow \text{Lm}(a \times x) = a \times \text{Lm} x$
- 2  $\infty \in \mathfrak{E} \text{ Lm mod } x \cup \text{Lm mod } y \Rightarrow \text{Lm}(x \times y) = \infty$
- 3  $\lim x, \lim y \in \mathfrak{q} \Rightarrow \lim(x \times y) = \lim x \times \lim y$
- 4  $\lim x = \infty, 0 \in \mathfrak{E} \text{ Lm } y \Rightarrow \lim(x \times y) = \infty$

- \*1  $x \in \text{QfN}_0, 0, \infty \text{ Lm} x \Rightarrow \text{Lm} x$
- \*2  $x \in (\text{q} \neq 0) \text{fN}_0, \lim x \in \text{q} \neq 0 \Rightarrow \text{Lm} x$
- \*3  $\quad \quad \quad = 0 \quad \quad \quad$
- \*4  $\quad \quad \quad \infty \quad \quad \quad$
- \*5  $x \in \text{qfN}_0, \lim(x_{n+1} - x_n) | n \in \text{q} \Rightarrow \text{Lm} x$   
 $\lim(x_n/n) | n = \lim(x_{n+1} - x_n) | n$









459. **convergente** FHI, AD convergent.  $\subset$  converge + -nte (142).  
 460. **converge** (L scientifico) AFHI, D convergire.  $\subset$  con- (47) + verge.  
 461. verge I.  $\supset$  con-verge, di-verge || L urge, S varg'.  
 462. ad-verge (Leibniz) = converge.  $\subset$  ad (41) + verge.  
 463. **convergentia**, AF convergence, D convergenz, I convergenza.  
 $\subset$  converge + -ntia (144).  
 464. di-verge AFHI, D divergire.  $\subset$  di- (51) + verge.  
 Habe plure sensu in differente auctore. Serie es divergente:  
 1<sup>o</sup>. Si non es convergente.  
 2<sup>o</sup>. Si  $\infty = \lim \Sigma(u, 0 \cdots n) | n$ .  
 3<sup>o</sup>. Si  $\infty \varepsilon \text{Lm } \Sigma(u, 0 \cdots n) | n$ .

•01  $h \varepsilon \text{Cls}' N_0 . u \varepsilon \text{qf} h . \supset . \Sigma(u, h) = \Sigma(u \text{min}_{i+r} k | r, N_0)$  Df  
 Si functio  $u$  es considerato in aliquo classe  $k$  de numeros, nos reduce  $\Sigma(u, k)$  ad casu praecedente.

•1  $u \varepsilon \text{Qf} N_0 . \supset . \Sigma(u, N_0) = \text{I}' \Sigma(u, 0 \cdots n) | n \varepsilon N_0 . \Sigma(u, N_0) \varepsilon \text{Q} \vee \infty$   
 [ Hp  $\supset . \Sigma(u, 0 \cdots n) | n \varepsilon (\text{Qf} N_0) \text{cres} . \S \text{lim } 4 \cdot 2 . \supset . \text{Ths} ]$

« Si  $u$  es serie de quantitate positivo, suo summa jam considerato in Arithmetica III §15  $\Sigma$  P12, es semper numero determinato finito aut infinito ».

•2  $u \varepsilon \text{qf} N_0 . \Sigma(u, N_0) \varepsilon \text{q} . \supset . \lim u = 0$   
 [ Hp .  $n \varepsilon N_1 . \supset . u_n = \Sigma(u, 0 \cdots n) - \Sigma(u, 0 \cdots (n-1))$  (1)  
 Hp . (1) .  $\supset . \lim u = \Sigma(u, N_0) - \Sigma(u, N_0) = 0 ]$

« In serie convergente, limite de terminc generale vale 0 ».  $\lim u = 0$  es conditio necessario de convergentia, sed non sufficiente. Per ex. serie de reciprocos de numeros naturale, considerato in P23·1, habe suo terminc generale que tende ad 0, et non es convergente.

•3  $u \varepsilon \text{qf} N_0 . \Sigma(u, N_0) \varepsilon \text{q} . h \varepsilon \text{Q} . p \varepsilon N_1 . \supset .$   
 $\exists N_1 \wedge m \exists \{ n \varepsilon m + N_0 . \supset . \text{mod} \Sigma[u, (n+1) \cdots (n+p)] < h \}$   
 [ Hp . P·1  $\supset . \lim u = 0 . \supset . \lim \Sigma[u, (n+1) \cdots (n+p)] = 0 . \supset . \text{Ths} ]$

Si  $u$  es serie convergente, tunc pro omni valore de quantitate positivo  $h$  (parvo ad arbitrio), et pro omni valore de numero  $p$  (magno ad arbitrio), semper existe indice  $m$  tale que pro omni indice  $n \geq m$ , semper summa de  $p$  termine sequente termine de loco  $n$ , es in valore absoluto minore de  $h$ .

Aequivale ad P·2; exprime conditio necessario pro convergentia, sed non sufficiente. Per exemplo, in serie de reciprocos de numeros naturale,  $\Sigma[1/(n+1) \cdots (n+p)] < p/n$ , que fi  $< h$ , si  $n > h/p$ . Et serie non converge.

•4  $u \varepsilon \text{qf} N_0 . \supset . \Sigma(u, N_0) \varepsilon \text{q} . =: h \varepsilon \text{Q} . \supset . \exists N_1 \wedge m \exists \{ n \varepsilon m + N_0 .$   
 $p \varepsilon N_1 . \supset . \text{mod} \Sigma[u, (n+1) \cdots (n+p)] < h \}$  ; P3·4  $\supset . \text{P}$  ;  
 Conditio necessario et sufficiente pro convergentia de serie.

Differentia de P.3 et P.4 es notato in tractatos de Catalan, Mansion, Hagen; sed confusione mane hodie in aliquo tractato.

$$\cdot 5 \quad u, r \in \text{Qf} N_0. \Sigma(u, N_0), \Sigma(r, N_0) \varepsilon \text{Q} \cdot \bigcup.$$

$$\begin{aligned} \Sigma[(u+r)|s, N_0] &= \Sigma(u, N_0) + \Sigma(r, N_0) && \text{Distrib}(\Sigma, +) \\ [P.0 \cdot \bigcup. \Sigma[us+rs|s, N_0] &= \lim \Sigma[us+rs|s, 0 \cdots n] |n \\ \text{Distrib}(\Sigma, +) &= \lim [\Sigma u, 0 \cdots n] + \Sigma[v, 0 \cdots n] |n \\ \text{Distrib}(\lim, +) &= \lim \Sigma[u, 0 \cdots n] |n + \lim \Sigma[v, 0 \cdots n] |n \\ P.0 &= \Sigma(u, N_0) + \Sigma(v, N_0) \end{aligned}$$

$$\cdot 6 \quad u, a \varepsilon \text{Qf} N_0. \Sigma(u, N_0) \varepsilon \text{Q} \cdot l'(a'N_0) \varepsilon \text{Q} \cdot \bigcup. \Sigma(a, u_r | r, N_0) \varepsilon \text{Q} \\ [ \text{Hp} \cdot \bigcup. \Sigma a r u_r | r, N_0 \leq \Sigma[l'(a'N_0) \times u_r | r, N_0] = l'(a'N_0) \times \Sigma(u, N_0) ]$$

$$\ast \quad 22.1 \quad u \varepsilon \text{qf} N_0. \Sigma(u, N_0) \varepsilon \text{q} \cdot a \varepsilon \text{q} \cdot \bigcup. \Sigma(au, N_0) = a \Sigma(u, N_0) \\ [ \text{Hp} \cdot \bigcup. \Sigma(au, N_0) = \lim \Sigma(au, 0 \cdots n) |n = \lim a \Sigma(u, 0 \cdots n) |n = \\ a \lim \Sigma(u, 0 \cdots n) |n = a \Sigma(u, N_0) ] \quad \text{Comm}(\Sigma, a \times)$$

$$\cdot 2 \quad u, r \varepsilon \text{Qf} N_0. \Sigma(u, N_0), \Sigma(r, N_0) \varepsilon \text{Q} \cdot \bigcup. \\ \Sigma[\Sigma(u_m v_{n-m} | m, 0 \cdots n) | n, N_0] = \Sigma(u, N_0) \times \Sigma(v, N_0) \\ \{ \text{CAUCHY a.1821 p.127 } \} \\ [ p \varepsilon N_1 \cdot \bigcup. \Sigma[u, 0 \cdots E p/2] \times \Sigma[v, 0 \cdots E p/2] < \Sigma[\Sigma(u_m v_{n-m} | m, 0 \cdots n) | n, \\ 0 \cdots p] < \Sigma(u, 0 \cdots p) \times \Sigma(v, 0 \cdots p) \cdot \bigcup. P ]$$

Si  $u$  et  $r$  es serie de quantitate positivo, ambo convergente, tunc serie  $u_0 r_0 + (u_0 r_1 + u_1 r_0) + (u_0 r_2 + u_1 r_1 + u_2 r_0) + \dots$  ubi nos multiplica omni termine de primo serie pro omni termine de secundo, et collige productos que habe identico summa de indice, es convergente ad producto de summas de duo serie dato.

In vero, summa de termines de serie que resulta, de 0 ad  $p$ , es comprachenso inter productos de summas de termines de serie dato, de 0 ad  $p$ , et de 0 ad maximo integro in  $p/2$ . Ambo ee quantitates tende ad producto de summas de duo serie dato, quando  $p$  verge ad  $\infty$ . Ergo, quantitate comprachenso verge ad idem limite.

$$\cdot 3 \quad u, r \varepsilon \text{qf} N_0. \Sigma(u, N_0), \Sigma(v, N_0), \Sigma[\Sigma(u_m v_{n-m} | m, 0 \cdots n) | n, N_0] \varepsilon \text{q} \\ \cdot \bigcup. \text{Ths P.2} \quad \{ \text{ABEL a.1826 t.1 p.226 } \}$$

$$\cdot 4 \quad a \varepsilon (\text{Qf} N_0) \text{decr}_0. \Sigma(a, N_0) = \infty. n \varepsilon N_1. h \varepsilon 0 \cdots (n-1) \cdot \bigcup. \\ \Sigma(a, n \times N_0 + h) = \infty$$

$$\cdot 5 \quad u \varepsilon \text{Qf} N_0. \Sigma(u, N_0) \varepsilon \text{Q} \cdot \bigcup. 0 = \min \text{Lm } n u_n |n \\ \{ \text{ABEL t. 2, p. 199:}$$

« pour qu'une série  $\Sigma u_n$  soit convergente, il faut que la plus petite des limites de  $n u_n$  soit zéro ».

$$\cdot 6 \quad u \in (QfN_0)_{\text{decr}} \cdot \Sigma(u, N_0) \varepsilon Q \cdot \supset \cdot 0 = \lim u_n | n \quad [P \cdot 3 \supset P] \\ \} \text{CATALAN, ParisCR. a.1886 \}$$

$$\cdot 7 \quad u \in qfN_0 \cdot \text{Lm } \Sigma(u, 0 \cdots n) | n \supset q \cdot a \varepsilon (QfN_0)_{\text{decr}} \cdot \text{lima} = 0 \cdot \supset \cdot \\ \Sigma(a, N_0) \varepsilon q \quad \} \text{ABEL t.1 p.222 \}$$

$$\ast \quad 23 \cdot 0 \quad u \in \text{Cls}'Q \cdot \supset \cdot \Sigma u =$$

$$= \text{I}' x \exists \text{I}' \text{Cls}'u \cap r \exists (\text{Num } r \varepsilon N_1 \cdot x = \Sigma r) \quad \text{Df}$$

Summa de quantitate positivo (in numero infinito) es limite supero de summas de numero finito de quantitates.

$$\cdot 01 \quad u \in \text{Cls}'Q \cdot \text{I}'u \cdot \supset \cdot \Sigma u \varepsilon Q \cup \infty$$

$$\cdot 02 \quad x \varepsilon (QfN_0)_{\text{sim}} \cdot \supset \cdot \Sigma(x, N_0) = \Sigma(x, N_0)$$

$$\cdot 1 \quad \Sigma N_1 = \infty \quad \} \text{LEIBNIZ a.1673 MathS. t.1 p.49 \} \\ [u \varepsilon N_1 + 1 \cdot \supset \cdot \Sigma [1 \cdots (2^n)] > 1 + n \cdot 2 \cdot \supset \cdot P]$$

$$\cdot 2 \quad a, b \varepsilon Q \cdot \supset \cdot \Sigma / (a + N_0 b) = \infty$$

$$\cdot 3 \quad m \varepsilon 1 + Q \cdot \supset \cdot \Sigma N_1^{-m} \varepsilon Q$$

$$\cdot 4 \quad \quad \quad / (m-1) < \Sigma N_1^{-m} < 1 + / (m-1)$$

Stieltjes AM. a.1887 t.10 p.299, da valores de  $\Sigma N_1^{-m}$ , si  $m \varepsilon 2 \cdots 70$ , cum 32 cifra decimale. Vide V. §4  $\pi$  P11.1.

$$\cdot 5 \quad m \varepsilon 1 + Q \cdot \supset \cdot \Sigma (2N_0 + 1)^{-m} = (1 - 2^{-m}) \Sigma N_1^{-m}$$

$$\} \text{Joh. BERNOULLI t.4 p.11 \}$$

$$[ \Sigma N_1^{-m} = \Sigma (2N_1)^{-m} + \Sigma (2N_0 + 1)^{-m} \cdot \Sigma (2N_1)^{-m} = 2^{-m} \Sigma N_1^{-m} \cdot \supset \cdot P ]$$

$$\ast \quad 24. \quad u \varepsilon QfN_0 \cdot \supset \cdot$$

$$\cdot 0 \quad h \varepsilon \theta : n \varepsilon N_0 \cdot \supset \cdot u_{n+1} / u_n < h \cdot \supset \cdot \Sigma(u, N_0) < u_0 / (1-h) \\ [\text{Hp} \cdot \supset \cdot n \varepsilon N_0 \cdot \supset \cdot u_n < u_0 h^n \cdot \supset \cdot \Sigma(u, N_0) < u_0 \Sigma(h^n | n, N_0) \cdot \S\S P12 \cdot 1 \cdot \supset \cdot P]$$

Si in uno serie de termine positivo, ratione de uno termine ad praecedente es semper minore de uno quantitate  $h$  minore de uno, tunc summa de serie habe valore (determinato et finito) minore de numero scripto.

Resto in serie considerato es summa de serie de idem natura; ergo es minore di  $u_n / (1-h)$ , si  $u_n$  es primo termine relicto.

Seque criterio de convergentia P.1. Hp de P.1 contine literas  $h$  et  $m$  que non figura in Ths. Si nos elimina  $h$ , criterio sume forma P.2. Si nos elimina  $m$ , nos habe P.3, de que P.4 es casu particulare.

$$\cdot 1 \quad h \varepsilon \theta : m \varepsilon N_1 : n \varepsilon m + N_0 \cdot \supset \cdot u_{n+1} / u_n < h \cdot \supset \cdot \Sigma(u, N_0) \varepsilon Q$$

$$\text{Hp} \cdot P \cdot 0 \cdot \supset \cdot \Sigma(u, N_0) = \Sigma(u, 0 \cdots (m-1)) + \Sigma(u, m + N_0) \cdot \Sigma(u, m + N_0) \varepsilon Q \cdot \supset P$$

$$\cdot 2 \quad m \varepsilon N_1 \cdot \text{I}'[u(s+1) / us | s'(m + N_0)] \varepsilon \theta \cdot \supset \cdot \Sigma(u, N_0) \varepsilon Q \\ [P \cdot 1 \cdot \text{Elim } h \cdot \supset P]$$

$$\cdot 3 \quad \max \text{Lm } (u_{n+1}/u_n) | n < 1 \quad \supset \quad \Sigma(u, N_0) \varepsilon Q$$

[ P.2 . Elim  $m$   $\supset$  P ]

$$\cdot 4 \quad \lim (u_{n+1}/u_n) | n \varepsilon \theta \quad \supset \quad \Sigma(u, N_0) \varepsilon Q \quad [ P.3 \supset P ]$$

$$\cdot 41 \quad \lim (u_{n+1}/u_n) | n \varepsilon 1+Q \quad \supset \quad \Sigma(u, N_0) = \infty$$

[ Hp  $\supset$   $\lim u = \infty$   $\supset$  Ths ]

} CAUCHY a.1821 p.123:

\* Si pour des valeurs croissantes de  $n$ , le rapport  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$  converge vers une limite fixe  $k$ , la série sera convergente toutes les fois que l'on aura  $k < 1$ , et divergente toutes les fois que l'on aura  $k > 1$ .

$$\cdot 5 \quad u \varepsilon QfN_0 . \max \text{Lm } \sqrt[n]{u_n} | n < 1 \quad \supset \quad \Sigma(u, N_0) \varepsilon Q$$

$$\cdot 51 \quad \text{-----} > 1 \quad \supset \quad \text{-----} = \infty$$

} CAUCHY a.1821 p.121:

\* Cherchez la limite ou les limites vers lesquelles converge, tandis que  $n$  croît indéfiniment, l'expression  $(u_n)^{\frac{1}{n}}$ , et désignez par  $k$  la plus grande de ces limites, ou, en d'autres termes, la limite des plus grandes valeurs de l'expression dont il s'agit. La série sera convergente si l'on a  $k < 1$ , et divergente si l'on a  $k > 1$ .

Versione: quare limite aut limes verso que converge, dum  $n$  cre ad infinito, expressione  $u_n \sqrt[n]{n}$ , et indica per  $k$  plus grande limes. Serie converge, si  $k < 1$ , et diverge si  $k > 1$ .

$$[ \text{Hp} \cdot 5 \supset \exists (h; m) \exists (h \varepsilon \theta . m \varepsilon N_1 : n \varepsilon m + N_1 \supset \sqrt[n]{u_n} < h ) \quad (1)$$

$$\text{Hp} \cdot 5 . h \varepsilon \theta . m \varepsilon N_1 : n \varepsilon m + N_1 \supset \sqrt[n]{u_n} < h : \supset$$

$$\Sigma(u, m + N_0) < \Sigma(h^n | n, m + N_0) = h^m / (1 - h) \quad (2)$$

$$(1) . (2) \supset P \cdot 5 ]$$

$$[ \text{Hp} \cdot 51 . m \varepsilon N_1 \supset \exists (m + N_0) \wedge n \varepsilon u_n > 1 \supset \lim u = \infty \supset P \cdot 51 ]$$

$$\ast \quad 25 \cdot 1 \quad u \varepsilon (QfN_0)_{\text{decr}} . \lim u = 0 \supset \Sigma[(-1)^n u_n | n, N_0] \varepsilon \theta u_0$$

Si  $u$  es successione de quantitate positivo, decrescente, ad limite 0, tunc serie  $u_0 - u_1 + u_2 - \dots$  converge ad fractione de primo termine  $u_0$ . Id es:

Serie de quantitate alterno positivo et negativo, que decresce, et verge ad 0, es convergente.

$$\text{ } \{ \text{LEIBNIZ a.1713 MathS. t.3 p.987:}$$

« quandocunque series constat ex membris alternatim positivis et privativis et membra ipsa decrescunt in infinitum, series est advergens »

Resto de serie considerato, post plure termine, es serie de idem natura; suo primo termine es primo termine relicto. Ergo resto de serie considerado es fractione de primo termine relicto.

- \* 26.1  $u \varepsilon \text{ qf } N_0 . \Sigma(\text{mod } u, N_0) \varepsilon Q . \supset . \Sigma(u, N_0) \varepsilon q$   
 [ Hp  $\supset . \Sigma[(\text{mod } u + u) + (\text{mod } u - u), N_0]/2 = \Sigma(\text{mod } u, N_0) \varepsilon Q . \supset .$   
 $\Sigma(\text{mod } u + u, N_0), \Sigma(\text{mod } u - u, N_0) \varepsilon Q_0 . \supset .$   
 $\Sigma[(\text{mod } u + u) - (\text{mod } u - u), N_0]/2 = \Sigma(u, N_0) \varepsilon q ]$   
 { CAUCHY a.1821 p.129 }

Si  $u$  es serie de quantitate relativo, et si serie formato per valores absoluto de  $u$  converge, tunc et serie dato converge.

In vero, serie  $u$  es differentia inter summa de suo termines positivo  $(\text{mod } u + u)/2$ , et de summa de suo termines negativo, considerato in valore absoluto  $(\text{mod } u - u)/2$ . Summa de ce duo serie es finito, tunc etc.

2.  $u \varepsilon \text{ qf } N_0 . \Sigma(\text{mod } u, N_0) \varepsilon Q . v \varepsilon (N_0 \text{ f } N_0) \text{ rcp } . \supset . \Sigma(uv, N_0) = \Sigma(u, N_0)$   
 { DIRICHLET JfM. a.1829 t.4 p.157 }
3.  $u \varepsilon \text{ qf } N_0 . \Sigma(u + \text{mod } u, N_0) = \infty . \Sigma(u - \text{mod } u, N_0) = -\infty .$   
 $\lim u = 0 . h \varepsilon q \cup u \pm \infty . \supset . \exists (N_0 \text{ f } N_0) \text{ rcp } \wedge v \exists [\Sigma(uv, N_0) = h]$   
 { RIEMANN a.1854 p.221 }

- \* 27.1  $u, v \varepsilon \text{ qf } N_0 . \Sigma(\text{mod } u, N_0), \Sigma(\text{mod } v, N_0) \varepsilon Q . \supset .$   
 $\Sigma(u, N_0) \times \Sigma(v, N_0) = \Sigma[ \Sigma(u_m v_{n-m} | m, 0 \cdots n) | n, N_0 ]$   
 { CAUCHY a.1821 p.132 }
- [  $p \varepsilon N_1 . \supset . \text{mod} | \Sigma(u, 0 \cdots p) \times \Sigma(v, 0 \cdots p) - \Sigma[ \Sigma(u_m v_{n-m} | m, 0 \cdots n) | n, 0 \cdots p ] |$   
 $< \Sigma(\text{mod } u, 0 \cdots p) \times \Sigma(\text{mod } v, 0 \cdots p) -$   
 $\Sigma[ \Sigma(\text{mod } u_m \text{ mod } v_{n-m} | m, 0 \cdots m) | n, 0 \cdots p ]$  (1)  
 (1) . P22.2  $\supset . \lim | \Sigma(n, 0 \cdots p) \times \Sigma(v, 0 \cdots p) -$   
 $\Sigma[ \Sigma(u_m v_{n-m} | m, 0 \cdots n) | n, 0 \cdots p ] | : p = 0 . \supset . P ]$

Si serie  $u$  et  $v$  converge in valore absoluto, tunc lice multiplica illos cum regula P22.2.

2.  $u, v \varepsilon \text{ qf } N_0 . \Sigma(\text{mod } u, N_0) \varepsilon Q . \Sigma(v, N_0) \varepsilon q . \supset . \text{ThsP.1}$   
 { MERTENS a.1875 JfM. t.79 p.182 }
3.  $a, b \varepsilon (\text{Qf } N_0) \text{ decr } . \lim a = \lim b = 0 . \supset :$   
 $\Sigma[(-1)^r a_r | r, N_0] \times \Sigma[(-1)^r b_r | r, N_0] = \Sigma[ \Sigma[(-1)^n a_r b_{n-r} | r, 0 \cdots n] | n, N_0 ]$   
 $\equiv . \lim b_n \Sigma(a, 0 \cdots n) | n = \lim a_n \Sigma(b, 0 \cdots n) | n = 0$   
 { PRINGSHEIM AmericanT. a.1901 p.411 }

Ths P.1 subsiste et in alio Hp. Vide Pringsheim, Encykl. IA3 p.96.

## \* 28.

1.  $u \varepsilon \text{ Qf } N_0 . h \varepsilon Q . \infty - \varepsilon \text{ Lm } n^{1+h} u_n | n . \supset . \Sigma(u, N_0) \varepsilon Q$   
 { CAUCHY id. }





Hoc es importante theorema, ita exposito per suo inventore:

{ NEWTON 13 Junii a.1676 :

« Sed Extractiones Radicum multum abbreviantur per hoc Theorema.

$$P + \overline{PQ} \Big| \frac{m}{n} = P \frac{m}{n} + \frac{m}{n} AQ + \frac{m-n}{2n} BQ + \frac{m-2n}{3n} CQ + \frac{m-3n}{4n} DQ + \&c.$$

ubi  $P + \overline{PQ}$  significat Quantitatem cujus Radix, vel etiam Dimensio quævis, vel Radix Dimensionis, investiganda est,  $P$  primum terminum quantitatis ejus;  $Q$ , reliquos terminos divisos per primum. Et  $\frac{m}{n}$  numeralem Indicem dimensionis ipsius  $P + \overline{PQ}$ : Sive dimensio illa integra sit; sive (ut ita loquar) fracta; sive affirmativa, sive negativa.

Nam, sicut analystae, pro  $aa$ ,  $aaa$ , &c. scribere solent  $a^2$ ,  $a^3$ , &c. sic ego, pro  $\sqrt{a}$ ,  $\sqrt[3]{a^3}$ ,  $\sqrt[5]{Ca^5}$  &c. scribo  $a^{\frac{1}{2}}$ ,  $a^{\frac{3}{2}}$ ,  $a^{\frac{5}{3}}$ , ...

Et sic pro  $\frac{aa}{\sqrt{C : a^3 + b\overline{bx}}}$ , scribo  $aa \times \frac{1}{\sqrt{C : a^3 + b\overline{bx}}} = \frac{1}{3}$

... Denique, pro terminis inter operandum inventis in quoto, usurpo  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $D$ , &c. Nempe  $A$  pro primo termino  $P \frac{m}{n}$ ;  $B$  pro secundo  $\frac{m}{n} AQ$ ; & sic deinceps. » {

#### Demonstratio.

Nos considera valore absoluto de ratione de termine de gradu  $n+1$  ad praecedente. Suo limite, pro  $n = \infty$ , vale  $\text{mod} x$ , et es, per hypothesi, minore de uno :

$$\text{Hp. } \bigcirc. \lim \text{mod} : [C(m, n+1)x^{n+1}] / [C(m, n)x^n] : | n = \lim \text{mod} [x(m-n)/n] | n = \text{mod} x < 1 \quad (1)$$

Tunc, per theorema « si in uno serie ad terminos positivo, ratione de uno termino ad praecedente habe limite minore de uno, serie es convergente », nos deduce que serie formato per valores absoluto de terminos de serie dato es convergente :

$$\text{Hp. } (1) . P25.4 . \bigcirc. \Sigma [\text{mod} C(m, n)x^n | n, N_0] \varepsilon Q \quad (2)$$

Et per theorema « si serie formato per valore absoluto de terminos de serie dato es convergente, tunc et serie dato es convergente », seque convergentia de serie binomiale :

$$\text{Hp. } (2) . P26.1 . \bigcirc. \Sigma [C(m, n)x^n | n, N_0] \varepsilon q \quad (3)$$

Summa de serie binomiale depende de valore de  $m$ . Nos pone

$$fm = \Sigma [C(m, n)x^n | n, N_0]$$

vel nos voca  $f$  expressione considerato, in quo varia  $m$ ; tunc pro omni valore de  $m$ ,  $fm$  es quantitate (determinato et finito); et  $f1 = 1+x$  :

$$x \varepsilon q . \text{mod} x < 1 . f = \Sigma [C(m, n)x^n | n, N_0] | m . (3) . \bigcirc. f \varepsilon q f q . f1 = 1+x \quad (4)$$

Nos conserva ad  $f$  valore dato per (4); si  $m$  et  $n$  es quantitate, tunc lice multiplica duo serie  $fm$  et  $fn$ , ambo convergente in valore absoluto, cum regula P27.1. Theorema de Vandermonde dice que coefficiente de  $x^r$  vale  $C(m+n, r)$ , unde producto vale  $f(m+n)$ :

Hp(4) .  $m, n \in \mathbb{Q}$  . P27.1 . §2 15.4 .  $\supset$ .

$$\begin{aligned}(fm) \times (fn) &= \sum_s \sum_r [C(m, r) C(n, s-r) x^s] [r, 0 \cdots s] [s, N_0] \\ &= \sum_s [C(m+n, s) x^s] [s, N_0] \\ &= f(m+n)\end{aligned}\quad (5)$$

Si  $m$  varia inter 0 et 1, et  $x$  es positivo, serie, de secundo termine in post, habe termine de signo alterno, decrescente in modo continuo et indefinito; ergo summa de serie es minore de  $1+mx$ :

$$x \in \mathbb{Q} . m \in \theta . \text{P25.1} . \supset . fm < 1+mx \quad (6)$$

Et si  $x$  es negativo, summa de serie es minore de 1:

$$x \in -\mathbb{Q} . m \in \theta . \supset . fm < 1 \quad (7)$$

In omni casu, limite supero de valores de  $f$  in intervallo de 0 ad 1 es finito:

$$(6) . (7) . \supset . l'f \theta \in \mathbb{Q} \quad (8)$$

Ergo functione  $f$  satisfac ad relatione  $f(m+n) = (fm) \times (fn)$ , pro omni valore de  $m$  et  $n$ . De theorema noto super ce proprietate functionale nos deduce que, pro omni valore de  $m$ , es  $fm = (f1)^m$ :

$$\text{Hp(4)} . (5) . (8) . \S \text{q P12.4} . m \in \mathbb{Q} . \supset . fm = (1+x)^m \quad (9)$$

Demonstratione de Euler, a.1774 PetrNC. t.19 p.109.

Suo expressione in symbolo es dato per formula (1) (2) (3) (4) (5) ... (9)

$$\cdot 2 \quad m \in -1 + \mathbb{Q} . \supset . 2^m = \sum [C(m, n) | n, N_0] \{ \text{ABEL a.1826 t.1 p.245} \}$$

$$\cdot 3 \quad m \in \mathbb{Q} . \supset . 0 = \sum [(-1)^n C(m, n) | n, N_0]$$

$$\cdot 4 \quad \text{Hp.1} . \supset . (1-x)^{-m} = \sum [C(m+n-1, n) x^n | n, N_0] \\ [(-m, -x) | (m, x) \text{P.1} . \supset . P]$$

$$\cdot 5 \quad m \in \mathbb{Q} . x \in \mathbb{Q} - / 2 . \supset . (1+x)^m = \sum [C(m+n, n) [x/(1+x)]^n | n, N_0]$$

$$\cdot 6 \quad m \in \mathbb{Q} . x \in \mathbb{Q} . n \in \mathbb{N}_1 . n > m . \supset . \\ (1+x)^m = \sum [C(m, r) x^r | r, 0 \cdots n] \varepsilon \theta C(m, n+1) x^{n+1}$$

$$\ast \quad 32.0 \quad u \in \text{qf } N_0 . \sum (u, N_0) \varepsilon \mathbb{Q} . \supset . \\ \sum (u, N_0) = \sum_s \sum_r [C(n, r) u_r | r, 0 \cdots n] / 2^{n+1} | n, N_0 \}$$

### \* 35. PRODUCTO INFINITO.

$$\cdot 0 \quad u \in \text{qf } N_0 . \supset . \Pi(u, N_0) = u_0 u_1 \dots = \lim \Pi(u, 0 \cdots n) | n \quad \text{Df}$$

$$\cdot 1.3 \quad (\Pi | \sum) \text{P21.4.3}$$

Producto considerato es infinito per forma. In valore pote es finito, tum vocare «convergente».



- \*3  $x \varepsilon q . \text{mod } x < 1 \supset \prod (1-x) = (1+x)(1+x^2)(1+x^4)(1+x^8) \dots$   
 $= \prod \{ [1+x^{2^n}] | n, N_0 \} \quad \{ \text{EULER a.1748 p.273} \}$   
 $[ x \varepsilon q . n \varepsilon N_1 \supset 1 - x^{2^{n+1}} = (1-x) \prod [1+x^{2^r}] | r, 0 \dots n ] \supset P ]$
- \*4  $(1-1/4)(1-1/9)(1-1/16) \dots = \prod [(1-n^{-2}) | n, N_1+1] = 1/2$   
 $[ n \varepsilon N_1 \supset \prod [(1-n^{-2}) | n, 2 \dots 2n] = (2n+1)/(4n) \supset P ]$
- \*5  $p \varepsilon 1+N_1 \supset \prod [(1-p^{-n}) | n, N_1] \varepsilon Q-R$   
 $\{ \text{EISENSTEIN JfM. a.1844 t.28 p.39} \}$
- \*6  $m \varepsilon 1+Q_0 \supset \sum N_1^{-m} = \prod [1/(1-n^{-m}) | n, N_p]$   
 $\{ \text{EULER a.1744 PetrC. t.9 p.172 ; a.1748 p.225} \}$
- \*7  $a \varepsilon \theta \supset \prod [(1+a^n) | n, N_1] \times \prod [(1-a^n) | n, 2N_1+1] = 1$

\* 38.  $x, y \varepsilon q . \text{mod } x < 1 \supset$

$$\prod [(1+x^n y) | n, N_1] = 1 + \sum \{ x^n [n(n+1)/2] / \prod [(1-x^r) | r, 1 \dots n] y^n | n, N_1 \} .$$

$$/ \prod [(1-x^n) | n, N_1] = 1 + \sum \{ (-1)^n x^n [n(3n-1)/2] + x^n [n(3n+1)/2] | n, N_1 \}$$

$$\{ \text{EULER a.1748 t.1 p. 259-270} \}$$

$$\prod [(1-x^n)(1+x^n) | n, N_1] = 1 - 2 \sum \{ (-1)^n x^n | n, N_1 \}$$

$$\prod [(1-x^{2n})/(1-x^{2n-1}) | n, N_1] = 1 + \sum \{ x^n [n(n+1)/2] | n, N_1 \}$$

$$\prod [(1-x^{2n})^3 | n, N_1] = 1 + \sum \{ (-1)^n (2n+1) x^n [n(n+1)/2] | n, N_1 \}$$

$$\{ \text{JACOBI, } \textit{Fundamenta} \text{ §66. Werke t.1 p.237} \}$$

\* 40. LIMES ET LIMITE DE FONCTIONE.

$$u \varepsilon \text{Cls}'q . x \varepsilon f'u . f \varepsilon qf'u \supset$$

$$*0 \text{ Lm}(f, u, x) = a \{ r \varepsilon \text{Cls}'q . x \varepsilon f'r \supset a \varepsilon A f^r(u-r, x) \} \text{ Df}$$

$u$  es classe de quantitates;  $x$  es elemento finito aut infinito de classe derivata des  $u$ ;  $f$  es quantitate functio des  $u$ .

Tunc signo  $\text{Lm}(f, u, x)$ , lege « limes de functio  $f$ , quando variabile varia in  $u$ , et tende ad  $x$  » indica omni elemento  $a$  tale que, si  $r$  es classe que non habe  $x$  ut elemento de classe derivata, semper  $u$  es limite generale de classe de valores de  $f$  in classe des  $u$ , non  $r$  ».

Si nos elimina signo  $A$ , definitio sume plure forma respondente ad differente casu particulare :

$$*1 u, x \varepsilon q \supset \therefore a \varepsilon \text{Lm}(f, u, x) =:$$

$$h, k \varepsilon Q . \bigcup_{h, k} \exists u-r \wedge \exists [ \text{mod}(y-r) < h . \text{mod}(fy-a) < k ] \quad \text{Dfp}$$

« Si  $a$  et  $x$  es finito, tunc  $a$  es limes de functio  $f$ , pro variabile in classe  $u$ , tendente ad  $x$ , quando, si nos sume ad arbitrio duo quantitate positivo  $h$  et  $k$ , semper nos pote determina elemento  $y$ , pertinente ad classe  $u$ , diverso de  $x$ , differente de  $x$  de quantitate in valore absoluto minore de  $h$ , et que redde differentia  $fy - a$  minore in valore absoluto de  $k$  ».

- 2  $+ \infty \varepsilon \text{Lm}(f, u, x) :=$   
 $h, k \varepsilon Q. \supset h, k. \exists u \wedge y \exists [\text{mod}(y - x) < h \cdot fy > k]$  Dfp
- 3  $+ \infty \varepsilon \text{Lm}(f, u, x) :=$   
 $h \varepsilon Q. \supset h. \{ f^u \wedge y \exists [\text{mod}(y - x) < h] \} = \infty$  Dfp  
 [ Df Lm  $\supset$  P·1·2·3 ]

Nota homogeneitate de omni definitione possibile de signo Lm. In P40·0, membro definiente contine literas variabile  $a, r, x, f, u$ , Signos  $\varepsilon, q, \text{Cls}', \wedge, \perp$  es symbolo constante. Litera  $a$  es apparente, quare praecede signo  $\exists$ . Litera  $r$  es apparente, quare es indice ad signo  $\supset$ . Ergo secundo membro contine literas reale  $x, f, u$ , et nos pote repraesenta illo per membro definito, scripto sub forma de functione de  $f, u, x$ .

In P40·1 secundo membro contine literas apparente  $h, k, y$ , et literas reale  $u, x, f, a$ , que occurre in primo membro.

- 31  $a, b \varepsilon q. a = b. f \varepsilon qf(a - b) \supset$

$$\text{Lm}(f, a - b, a) = \bigcap [Af^*(x - a) \mid x \neq b - a]$$

- 4  $\exists \text{Lm}(f, u, x)$

« Omni functione semper habe limes ».

- 5  $r \varepsilon \text{Cls}'u. x \varepsilon r \supset \text{Lm}(f, r, x) \supset \text{Lm}(f, u, x)$

$$u \varepsilon \text{Cls}'q. \text{Oper} \supset$$

$$r = u \supset u = u$$

$$\text{Oper } f^* \supset$$

$$f^*(r = u) \supset f^*(u = u)$$

$$\text{Oper } \wedge \supset$$

$$\wedge f^*(r = u) \supset \wedge f^*(u = u)$$

$$\text{Oper } a \varepsilon \supset$$

$$a \varepsilon Af^*(r = u) \supset$$

$$a \varepsilon Af^*(u = u)$$

$$\text{Syll} \supset$$

$$u \varepsilon \text{Cls}'q \supset u. a \varepsilon Af^*(r = u) \supset u \varepsilon \text{Cls}'q \supset u. a \varepsilon \wedge$$

$$\text{Oper } a \exists \supset a \exists$$

$$u \varepsilon \text{Cls}'q \supset u. a \varepsilon Af^*(r = u) \supset u \varepsilon \text{Cls}'q \supset u. a \varepsilon \wedge \supset a \exists$$

$$\text{Df Lm} \supset \text{P}$$

- 6  $u, r \varepsilon \text{Cls}'q. x \varepsilon r \wedge r \supset f \varepsilon qf(u, r) \supset$

$$\text{Lm}(f, u, r, x) = \text{Lm}(f, u, x) \cup \text{Lm}(f, r, x)$$

P·5 et ·6 exprime variatione de  $\text{Lm}(f, u, r)$ , cum variatione de campo  $u$  de variabilitate.

$$\cdot 7 \quad \text{Lm}(f, u, x) \supset \Delta f' u$$

$$\cdot 8 \quad a \in \mathcal{P} f' u \cdot \supset \cdot \exists \mathcal{P} u \wedge x \exists [a \in \text{Lm}(f, u, x)]$$

$$[x = \text{! } q \wedge \exists z; u = \mathcal{P} f' [u \wedge (z - Q)] \cdot \supset \cdot$$

$$x \in \mathcal{Q} \cdot h \in \mathcal{Q} \cdot \supset \cdot a = \mathcal{P} f' [u \wedge (x - h - Q)] \cdot a \in \mathcal{P} f' [u \wedge (x + h - Q)] \cdot \supset \cdot$$

$$a \in \mathcal{P} f' [u \wedge (x - h) \neg (x + h)] \cdot \supset \cdot x \in \mathcal{P} u \cdot a \in \text{Lm}(f, u, x) \quad (1)$$

$$x = \pm \infty \cdot \supset \cdot \text{Ths } (1) \quad (2)$$

$$(1) \cdot (2) \cdot \supset \cdot P ]$$

$$\cdot 9 \quad f \in \text{qf} N_0 \cdot \supset \cdot \text{Lm} f = \text{Lm}(f, N_0, \infty) \quad \text{Dfp}$$

Si  $x$  es successione de quantitates, tunc  $\text{Lm } f$ , definito per P1·0, coincide cum limes de functione  $f$ , quando variabile sume valores  $N_0$ , et tende ad  $\infty$ .

$$\ast 42. \quad u \in \text{Cls}' q \cdot x \in \mathcal{P} u \cdot f \in \text{qf} u \cdot \supset \cdot$$

$$\cdot 0 \quad \text{lim}(f, u, x) = \text{! } \text{Lm}(f, u, x) \quad \text{Df}$$

Si classe limes de functione  $f$ , in campo  $u$ , pro valore  $x$ , consta de uno solo individuo, nos voca illo: limite de functio  $f$ , in campo  $u$ , pro valore  $x$ .

Eliminatione de signo  $\text{Lm}$  porta ad definitiones sequente:

$$\cdot 1 \quad a, x \in \mathcal{Q} \cdot \supset \cdot a = \text{lim}(f, u, x) \cdot =:$$

$$k \in \mathcal{Q} \cdot \supset \cdot k \cdot \exists \mathcal{Q} \wedge h \exists [y \in u \neg x \cdot \text{mod}(y - x) < h \cdot \supset \cdot y \cdot \text{mod}(fy - a) < k] \quad \text{Dfp}$$

Primo, in ordine de tempore, ennucciato completo de definitione de limite.  
O. Bonnet BD. a.1871. t. 2 p.215:

« Étant donnée une fonction réelle .... bien déterminée,  $[fy]$  d'une variable réelle ...  $[y]$ , on dit... que cette fonction tend vers une limite finie et déterminée  $[a]$ , à mesure que  $[y]$  tend vers une valeur particulière  $[x]$  (nous supposons  $x$  fini... ), lorsqu'après avoir fixé arbitrairement un nombre réel et positif  $k$  aussi petit que l'on veut, il est possible de trouver un autre nombre réel et positif  $h$ , tel que, pour toute valeur de  $y$ , dont la différence avec  $x$  a un module différent de zéro, mais inférieur à  $h$ , la valeur correspondante de  $fy$  ait avec  $a$  une différence dont le module soit compris entre zéro et  $k$ . »

$$\cdot 2 \quad \infty = \text{lim}(f, u, x) \cdot =: k \in \mathcal{Q} \cdot \supset \cdot k \cdot$$

$$\exists \mathcal{Q} \wedge h \exists [y \in u \neg x \cdot \text{mod}(y - x) < h \cdot \supset \cdot fy > k] \quad \text{Dfp}$$

$$\cdot 3 \quad \text{lim}(f, u, x) \in \mathcal{Q} \cdot =: k \in \mathcal{Q} \cdot \supset \cdot k \cdot \exists \mathcal{Q} \wedge h \exists [y, z \in u \neg x \cdot$$

$$\text{mod}(y - x) < h \cdot \text{mod}(z - x) < h \cdot \supset \cdot y, z \cdot \text{mod}(fy - fz) < k]$$

$$\cdot 4 \quad \text{lim}(f, u, x) \in \text{qf} u \neg x \cdot r \in \text{Cls}' u \cdot x \in \mathcal{P} r \cdot \supset \cdot$$

$$\text{lim}(f, r, x) = \text{lim}(f, u, x) \quad [P40\cdot 5 \supset P]$$

$$\cdot 5 \quad h, k \in \text{Cls}'q . f \varepsilon kfh . g \varepsilon qfk . x \varepsilon \nabla h . \lim(f, h, x) \varepsilon \nabla k \supset . \\ \lim(gf, h, x) = \lim[g, k, \lim(f, h, x)]$$

$$\cdot 6 \quad \lim(f, u, x) = \imath a \exists [v \in \text{Cls}'u . x \varepsilon \nabla v \supset . a \varepsilon \Delta f'v] \quad \text{Dfp}$$

$$\cdot 7 \quad \lim(f, u, x) = \imath z \exists (\eta \varepsilon u \cap N_0 . \lim \eta = x \supset . z = \lim f \eta) \quad \text{Dfp}$$

Definitioe possibile de limite de functione, ope limite de successione.

\* 43.1  $u \in \text{Cls}'q . a \varepsilon \nabla u . f \varepsilon qf(u; N_0) :$

$$n \varepsilon N_0 . \supset n . \lim [f(x, n) | x, u, a] \varepsilon q :$$

$$\Sigma [l' \bmod f(x, n) | x, u, a] | n, N_0 \varepsilon Q : \supset .$$

$$\lim \{ \Sigma [f(x, n) | n, N_0] | x, u, a \} = \Sigma \{ \lim [f(x, n) | x, u, a] | n, N_0 \} \\ \text{Comm}(\lim, \Sigma)$$

$$[ h = \{ l' \bmod f(x, u) | x, u \} | n \supset :$$

$$\Sigma (h, N_0) \varepsilon Q . \lim \Sigma (h, m + N_0) | m = 0 \quad (1)$$

$$x \varepsilon u . n \varepsilon N_0 \supset . \bmod f(x, n) \leq h_n \quad (2)$$

$$n \varepsilon N_0 . (2) \supset . \bmod \lim [f(x, n) | x, u, a] \leq h_n \quad (3)$$

$$(3) . P26.1 \supset . \Sigma \lim [f(x, n) | x, u, a] | n, N_0 \varepsilon q \quad (4)$$

$$x \varepsilon u . m \varepsilon N_1 \supset . \Sigma [f(x, n) | n, N_0] = \Sigma [f(x, n) | n, 0 \cdots (m-1)] \\ + \Sigma [f(x, n) | n, m + N_0] \quad (5)$$

$$m \varepsilon N_1 . (5) . \text{Oper } \text{Lm} [x \supset .$$

$$\text{Lm} \{ \Sigma [f(x, n) | n, N_0] | x, u, a \} = \Sigma \{ \lim [f(x, n) | x, u, a] | n, 0 \cdots (m-1) : +$$

$$\text{Lm} \{ \Sigma [f(x, n) | n, m + N_0] | x, u, a \} \quad (6)$$

$$m \varepsilon N_1 . (2) \supset . \text{Lm} \Sigma [f(x, n) | n, m + N_0] \supset \pm \theta \Sigma (h, m + N_0) \quad (7)$$

$$m \varepsilon N_1 . (6) . (7) \supset . \text{Lm} \Sigma [f(x, n) | n, N_0] | x, u, a \supset \Sigma \{ \lim [f(x, n) | x, u, a] | n, \\ 0 \cdots (m-1) : \pm \theta \Sigma (h, m + N_0) \quad (8)$$

$$(8) . \text{Oper } \lim [m . (4) \supset .$$

$$\text{Lm} \{ \Sigma [f(x, n) | n, N_0] | x, u, a \} \supset \Sigma \lim [f(x, n) | x, u, a] | n, N_0 + a \quad (9)$$

$$(9) \supset . \text{Lm} \{ \Sigma [f(x, n) | n, N_0] | x, u, a \} = \imath \Sigma \lim [f(x, n) | x, u, a] | n, N_0 \quad (10)$$

$$(10) . \text{Oper } \imath \supset . P ]$$

Nos considera  $f(x, n)$ , functio reale de duo variabile  $x$  et  $n$ , ubi  $x$  varia in aliquo campo  $u$ , et  $n$  sume valores integro  $N_0$ . Tunc serie  $\Sigma [f(x, n) | n, N_0]$ , si converge, habe summa que depende de  $x$ . Limite de ee summa, quando  $x$  varia in  $u$ , et tende ad aliquo valore  $a$ , prope alios  $u$ , vale, in generale, serie de limites, ut pro summa de numero finito de termine. Id es, es ee mutabile operatione  $\lim$  cum  $\Sigma$ .

Existe ullo casu de exceptione. Pro elimina illos, nos si que serie formato per limites supere de valores absolute termines de serie dato, quando  $x$  sume omni valore convergente. Nos suppose etiam que omni terminus dato habe limite determinato et finito.



In vero, si nos voca  $h_0, h_1, h_2, \dots$  serie formato per limites supero de valores absoluto de termines de serie dato, serie  $h$  es convergente, per hypothesi. (1)

Et omni termine de serie dato es inferiore in valore absoluto, ad termine correspondente de serie  $h$ , non excluso casu de aequalitate. (2)

Idem fi pro limites de termines de serie dato. (3)

Ergo serie de limites de termines es convergente. (4)

Nos decompone serie dato in summa de primos  $m$  termine, plus serie de termines sequente, vel resto. (5)

Tunc classe limes de summa de serie dato vale summa de limites de primos  $m$  termine, plus limes de serie resto. (6)

Serie resto es minore de resto in serie  $h$ ; ergo serie resto es fractione positivo aut negativo de resto in serie  $h$ . (7)

Si nos substitue in formula (6), nos obtine (8); et si nos sume limite per  $m$ , resulta que classe limes de serie dato consta de solo numero summa de serie de limites. (9)

Ergo, limite de serie dato vale serie de limites.

Non in omni casu operatione  $\sum \lim$  es commutabile cum  $\lim \sum$  serie. Per exemplo de propositione:

$$x \in \mathbb{Q}, \text{ mod } x < 1 \Rightarrow 1/(1-x) = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$$

seque:

$$x \in \mathbb{Q}, \text{ mod } x < 1 \Rightarrow 1 = (1-x) + x(1-x) + x^2(1-x) + \dots$$

Limite de summa de serie in secundo membro quando  $x$  tende ad 1, vale 1. Serie formato per limites de termine de serie considerato vale

$$0 + 0 + 0 + \dots = 0.$$

Ergo limite de summa de serie non vale summa de limites.

Serie  $\sum [f(x, n) \mid n, N_0]$

es convergente, pro totos valore de  $x$  in campo  $u$ , quando (P3.4):

$$x \in u \Rightarrow x : h \in \mathbb{Q} \Rightarrow h, \exists N_0 \wedge p \in \mathbb{N} \wedge q \in \mathbb{N} \wedge p > N_0 \Rightarrow q, \text{ mod } \sum [f(x, r) \mid r, p \dots q] < h!$$

Serie es de convergentia « gleichmässig » (Weierstrass a.1841 t.1 p.6,7) uniforme, aequabile, si satisfac conditione

$$h \in \mathbb{Q} \Rightarrow h, \exists N_0 \wedge p \in \mathbb{N} \wedge x \in u, q \in \mathbb{N} \wedge p > N_0 \Rightarrow x, q, \text{ mod } \sum [f(x, r) \mid r, p \dots q] < h!$$

que differ de praecedente per positione de  $x$ .

Abel (t.1 p.221) nota valore differente de duo conditione.

Vide Cauchy ParisCR. a.1853 t.36 p.454; (Euvres s.1 t.12 p.34.

Theorema praecedente, in quasi omni tractato de Analysis, consta de duo parte:

1.<sup>o</sup> Si serie formato per limites supero de termines de serie dato es convergente, tunc serie dato es de convergentia uniforme.

2.<sup>o</sup> Si serie es de convergentia uniforme, limite de serie vale serie de limites.

Aliquo Auctore voca «serie de convergentia uniforme simpliciter» (Dini), vel «de convergentia uniforme in sensu lato» (Tannery), serie que satisfac

$$h\mathfrak{e}Q \cdot \supset_h \cdot \exists N_0 \wedge p \exists x \exists u \cdot \supset_x \cdot \text{mod} \Sigma[f(x, u) | u, p \vdash N_0] < h$$
$$x \in -1^{-1} \supset 1/(1-x) = 1+x+x^2+x^3+\dots,$$

Substitutione ad convergentia uniforme, de conditione plus simple de  
linea 3 de theorema es indicato per Weierstrass a.1880 Werke t.2  
p.202. Vide Form. t.4, pag.325.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} Cx = \text{Subst}$$

\* 51.  $m, n \in \mathbb{N}_1, u \in \text{Cls}' Cx, x \in f u, f \in Cx m f u, \supset$   
 §lim P40-43

Definitione de limite, et suo proprietates subsiste si nos considera numero complexo de ordine  $m$  functione de numeros complexo de ordine  $n$  in aliquo campo  $\mathcal{U}$ .

$$1 \quad a \in \mathbb{C}_{Xm} \quad \supset: a \in \text{Lm}(f, u, x) \quad . = . \quad 0 \in \text{Lm}[\text{mod}(fy - a) | y, u, x]$$

$$2 \quad \gg \quad a = \lim \quad \gg \quad 0 = \lim \quad \gg \quad \gg$$

$$3 \quad x \in \text{Lm}(f, u, x) \implies x \in \text{Lm}(\text{mod} f, u, x)$$

$$4 \quad \infty = \lim(f, u, x) \quad . = . \quad \infty = \lim(\text{mod } f, u, x)$$

$$\ast \quad 52.1 \quad n \in N_1, u \in Cx n \cap N_0, \Sigma(\text{mod } u, N_0) \in Q, \bigcup \Sigma(u, N_0) \in Cx n$$

$$\{r \in N_0 : s \in 1 \cdots n, \bigcup_s \text{mod}(u_r)_s \subseteq \text{mod} u_r\} \quad (1)$$

$$g \in 1 \cdots n \rightarrow \bigcup_{r=1}^n \Sigma[(u_r)_s : r, N_0] \in Q \quad (2)$$

$$(2) \exists_i \Sigma_i[\Sigma(ur)_{|s} \text{unit}(n,s)]_{|s, 1 \cdots n} r, N_0 \vdash \varepsilon Q \quad (4)$$

(4) .  $\exists x P2.1 \supset P$  ]

« Si  $u$  es serie de numero complexo de ordine  $n$ , et serie de modulos es convergente, tunc serie  $u$  es convergente ».

$$2 \quad m, n \in \mathbb{N}, m \geq n \Rightarrow \sum_{i=0}^n ((\text{mod } r)^{-m}) x, Cx^n = 0 \in \mathbb{Q}$$

{ EINSENSTEIN JCM, t. 35 }

Super limite de déterminante, et déterminante de ordre infini, vide Formul. t. 4 p. 211.

\* 53.  $a\mathcal{E}(\text{Subst}n)fN_n \rightarrow$

$$^{*0} \quad \lim a = a \text{ (Subst } n) \wedge \text{base}(Un) \rightarrow \bigcup_{i \in \mathbb{N}} \lim(a_i) = a \quad \text{In}$$

$$4 \quad \lim a = 0 \iff \lim \operatorname{mod} a = 0 \quad \text{Def}$$

$$b \in \text{Substn} \cup \emptyset: \lim a = b \iff \lim(a-b) = 0 \quad \text{Def}$$

\* 60.

lim  $q'$ 

$$1 \quad u \varepsilon q' f N_0 . a \varepsilon q' . \Sigma(u_n a^n | n, N_0) \varepsilon q' . x \varepsilon q' . \text{mod } x < \text{mod } a . \supset .$$

$$\Sigma(u_n x^n | n, N_0) \varepsilon q' \quad \quad \quad \} \text{ABEL t.1 p.223} \{$$

$$2 \quad u \varepsilon q' f N_0 . a \varepsilon q' . \infty - \varepsilon \text{Lm}[\text{mod}(u_n a^n)] | n . x \varepsilon q' . \text{mod } x < \text{mod } a$$

$$. \supset . \Sigma(u_n x^n | n, N_0) \varepsilon q'$$

$$3 \quad u \varepsilon q' f N_0 . x \varepsilon q' . \supset :$$

$$\text{mod } x < / \max \text{Lm}^n \sqrt[n]{(\text{mod } u)} . \supset . \Sigma(u_n x^n | r, N_0) \varepsilon q' .$$

$$* > * * * * = \infty$$

{ CAUCHY Œuvres s.1 t. 5 p.360:

« Une série ordonnée suivant les puissances ascendantes et entières d'une variable  $x$ , soit réelle, soit imaginaire, est convergente ou divergente suivant que le module de la variable est inférieur ou supérieur à l'unité divisée par la plus grande des limites vers lesquelles converge la racine  $n^{\text{ième}}$  du coefficient de  $x^n$  ».

Radio de convergentia de serie  $\Sigma(u_n a^n | n, N_0)$  $= \text{l'mod}; q' \wedge a \varepsilon [\Sigma(u_n a^n | n, N_0) \varepsilon q']$ circulo de convergentia  $= q' \wedge x \varepsilon (\text{mod } x < \text{radio de convergentia})$ .

$$4 \quad u \varepsilon q' f N_0 . a \varepsilon q' . \Sigma(u_n a^n | n, N_0) \varepsilon q' . \supset .$$

$$\lim[\Sigma(u_n x^n | n, N_0) | x, \theta a, a] = \Sigma(u_n a^n | n, N_0) \quad \} \text{ABEL t.1 p.223} \{$$

$$5 \quad a, b \varepsilon q' . \text{real } a < \text{real } b . b - \varepsilon - N_0 . \supset . \Pi[(a+r) : (b+r) | r, N_0] = 0$$

$$6 \quad u \varepsilon q' = (u-1) f N_0 . \Sigma \text{mod } u \varepsilon Q . \supset . \Pi[(1+u_n) | r, N_0] \varepsilon q' = 0$$

$$\quad \quad \quad \} \text{WEIERSTRASS a.1856 t.1 p.176} \{$$

lim vect

\* 70.  $(v | Cx) P51$   
 $(p | Cx) —$

Nos extendere Df de limite ad vectores et ad punctos.

\* 71.  $k \in \text{Cls}'(q \cup Cx \cup p \cup v) . x \in Ak . f \in (0$

·1  $\lim(f, k, x) = p \wedge a \exists \lim[d(a, fz) | z, k, x]$

Si  $f$  es classe de punctos, vel figura, figura reale, vel complexa, vel puncto, vel vectore aliquo classe  $k$ , proximo ad  $x$ , tunc limite  $a$  in classe  $k$ , pro valore  $x$ , es omni puncto distantia de  $a$  ad figura  $fz$ , quando  $z$  variat tendente ad  $x$ , vale zero.

Ex. § rectaT, planO, ...

·2  $a \in p . u \in (v \neq 0)fk . \lim(u, k, x) \in v \neq 0 . \supset$

$\lim[\text{recta}(a, ux) | x, k, x] = \text{recta}[a, \lim$

[ Hp .  $v = \lim(u, k, x) . \supset . \lim[\text{recta}(a, ux) | x, k, x$

$p \wedge a \exists \lim[d(z, \text{recta}(a, ux)) | x, k, x] = 0) =$

$p \wedge a \exists \lim[(\sqrt{(z-a)^2 - [(z-a) \times Uu]^2}) / (\text{mod } ux), a$

$p \wedge a \exists \lim[\sqrt{(z-a)^2 - [(z-a) \times Uv]^2} / (\text{mod } v) = 0] = p$

$= \text{recta}(a, v) ]$

Limite de recta passante per puncto et vectore variabile, es recta passante per puncto paralelo ad limite de vectore variabile. Nos si vectore variabile habet valore non nullo, in campo suo limite es determinatus et non nullo.

In modo simile, nos determinamus limite de vectores, vel de coordinatas, reduce illos ad punctum.

·3  $a \in p . l \in (v \neq 0) . u \in (v \neq 0)fk . \lim(u, k, x) \in v$

$\lim[\text{plan}(a, l, ux) | x, k, x] = \text{plan}[a, l, \lim$

·4  $\text{Lm}(f, k, x) = p \wedge a \exists 0 \in \text{Lm}[d(a, fz) | z, k, x]$

Generalizatione de Df.1. Ex. §Tang.

·5  $a \in \text{Cls}'p . x \in p . \supset . \lim[d(y, a) | y, p, x]$

\* 72.  $k \in \text{Cls}'q . x \in \delta k . r \in 1 \dots 3 . u \in \varphi'fk .$

$\lim(u, k, x) = r \wedge b \exists \lim[p' | c \in p' . \supset . \lim[(u, ca$

Df de limite de forma geometrico, analogo ad D

## §2 cont

\* 1.  $m, n \in \mathbb{N}_1 . u \in \text{Cls}' \text{ Cxn} . u \supset \delta u . \supset .$

•0  $f \in (\text{Cxm f } u) \text{cont} . =: f \in (\text{Cxm f } u) : x \in u . \supset_x . \lim(f, u, x) = fx$   
Df

•01  $\quad \quad \quad . =: \quad \quad \quad : k \in \mathbb{Q} . x \in u . \supset_{k, x} .$

$\exists Q h \exists [ y \in u . \text{mod}(y-x) < h . \supset_y . \text{mod}(fy-fx) < k ]$  Dfp

Si  $u$  es classe de numeros reale aut complexo de ordine quocumque, et si omni  $u$  es proximo ad alio  $u$ , tunc nos dice que  $f$  es complexo functio des  $u$  continuo,  $f \in (\text{Cxm f } u) \text{cont}$ , si  $f$  es complexo functio des  $u$ , et si pro omni  $x$  pertinente ad classe  $u$ , semper limite de  $f$ , in campo  $u$ , pro valore  $x$ , es æquale ad valore de  $f$  pro valore  $x$  de variabile  $x$ .

Si nos elimina signo « lim », Df sume forma :

«  $f$  es functio continuo in campo  $u$ , quando, fixato ad arbitrio quantitate positivo  $k$ , si  $x$  es individuo de classe  $u$ , nos semper pote inveni quantitate positivo  $h$ , tale que, si  $y$  es individuo de classe  $u$ , differente de  $x$  minus que  $h$  in valore absoluto, semper fi differentia inter  $fy$  et  $fx$  minore in valore absoluto de  $k$  ».

Definitione P-0 occurre in Abel t.1 p.223.

465. **continuo** HI, AF continue.  $\sqsubset$  con- (47) + tene -e + -uo (214).

Nota. Vocale -e- de thema, ante uno solo consonante, fi -i- in compositione :

tene, con-tine, at-tine, abs-tine, ob-tine, re-tine, per-tine, ... ;  
preme, op-prime; ...

466. **tene**, F tien-t, HI tiene. || L ten-de, S tan, G teine, hypo-tein-usa, D dehne.

L ten-ue = A thin = D dünn = G tany- = R ton-crj = S tanu.

In L con-tin-uo, per-tine, ... « tene » = « se extende ».

•1  $u = \nabla u . f \in (\text{Cxm f } u) \text{cont} . \supset . A f' u = f' u$

[  $a \in \nabla f' u . \S \lim \text{ P41.8 } . \supset . \exists \nabla u \wedge x \exists [ a \in \text{Lim } f, u, x ] ] . \supset .$

$\exists u \wedge x \exists [ a = \lim(f, u, x) ] . \supset . \exists u \wedge x \exists (a = fx) . \supset . a \in f' u$

(1)  $\supset . \nabla f' u \supset f' u . \supset . A f' u = f' u$  ] (1)

$$\cdot 2 \quad u = \Gamma u . f \varepsilon (qf u) \text{cont} . \supset . \max f' u , \min f' u \varepsilon q$$

$$[ \text{I}' f' u , \text{I}' f' u \varepsilon A f' u . \text{P} \cdot 1 \supset . \text{P} ]$$

Functio continuo in aliquo campo  $u$ , coincidente cum suo classe derivata, sume valore maximo et valore minimo. Si  $u = \Gamma u$ , campo  $u$  es finito, et contine classe limite.

$$\cdot 3 \quad u = \Gamma u . f \varepsilon (\text{Cxn } f u) \text{cont} . k \varepsilon Q \supset .$$

$$\exists Q \wedge h \exists [ x, y \varepsilon u . \text{mod}(y-x) < h . \supset x, y . \text{mod}(f y - f x) < k ]$$

$$[ x \varepsilon u . g x = \text{I}' \Theta \wedge h \exists y, z \varepsilon u . \text{mod}(y-x) < h .$$

$$\text{mod}(z-x) < h . \supset y, z . \text{mod}(f y - f z) < k' \supset :$$

$$x, y \varepsilon u . \text{mod}(y-x) < g x + g y \supset . g x \leq g y + \text{mod}(y-x) . g y \leq g x +$$

$$\text{mod}(y-x) \supset . \text{mod}(g y - g x) \leq \text{mod}(y-x)$$

$$(1) \supset . g \varepsilon (Q f u) \text{cont} \quad (2)$$

$$(2) . \text{P} \cdot 2 \supset . \min g' u \varepsilon Q \quad (3)$$

$$h = \min g' u . x, y \varepsilon u . \text{mod}(y-x) < h \supset . \text{mod}(f x - f y) < k ]$$

Theorema de « continuitate uniforme ». Differ de Df de functio continuo, P·01, per positione de  $y \varepsilon u$ .

Vide Heine, JfM. a.1870 t.71 p.361 JfM. a.1871 t.74 p.188, Lüroth, MA. t.6 a.1873 p.319.

$$\cdot 4 \quad f \varepsilon \text{Cxn } f(u; N_0) : n \varepsilon N_0 . \supset_n . f(x, n) | x \varepsilon (\text{Cxn } f u) \text{cont} :$$

$$\Sigma \text{I}' [ \text{mod}(f(x, n) | x : u) | n, N_0 \} \varepsilon Q \supset . \Sigma [ f(x, n) | n, N_0 ] | x \varepsilon (\text{Cxn } f u) \text{cont}$$

$$[ \S \text{lim } 43 \cdot 1 \supset . \text{P} ]$$

Nos considera serie, que habe  $f(x, n)$  pro termine de ordine  $n$ .  $x$  es numero complexo in aliquo campo  $u$ . Si omni termine de serie es functio continuo de  $x$ , et si serie formato per limites supero de valores absoluto de termines de serie dato, dum  $x$  varia in suo campo, es convergente, tum summa de serie es functio continuo de  $x$ . Seque de theorema super limite de serie.

$$* \quad 2. \quad a, b \varepsilon Q . a = b . f \varepsilon (qf a^{-} b) \text{cont} . \supset :$$

$$\cdot 1 \quad f a < 0 . f b > 0 \supset . 0 \varepsilon f'(a^{-} b) \quad \} \text{CAUCHY a.1821 note 3 \{}$$

$$[ y = \text{I}' a^{-} b \wedge x \exists (f x < 0) \supset . y \varepsilon a^{-} b . f y = 0 ]$$

$$\cdot 2 \quad f a^{-} f b \supset f'(a^{-} b)$$

$$* \quad 3. \quad n \varepsilon N_1 . \supset . \exists (\text{Cxn } f q) \text{cont} \wedge f \exists (f' q = \text{Cxn})$$

Existe complexo de ordine  $n$ , vel puncto in spatio ad  $n$  dimensiones, functio continuo de variabile reale, vel de tempore, tale que trajectory de puncto mobile ple toto spatio. Id es, existe linea continuo, que transi per omni puncto de plano, et existe linea, que transi per omni puncto de spatio, etc. Ce resultatu habe interesse in studio de principio de Geometria; nam non existe caractere specifico, que distingue linea ab superficie.

Si nos vol que, dum variabile  $t$  varia de 0 ad 1, puncto de coordinatas  $x$  et  $y$ , functiones de  $t$ , describe toto quadrato  $(\Theta : \Theta)$ , nos evolve  $t$  in fractione decimale, vel analogo ad decimale, in aliquo basi :

$$t = 0 \cdot a_1 a_2 a_3 \dots$$

ubi  $a_1, a_2, a_3, \dots$  es cifras. Si cum cifras de ordine pari nos forma numero  $x$ , et cum cifras de ordine dispari nos forma numero  $y$ , nos habe correspondentia reciproco inter uno fractione decimale et duo alio fractione decimale. Sed duo fractione decimale de forma differente, ut  $0 \cdot 0999\dots$  et  $0 \cdot 1000\dots$  pote habe idem valore; et correspondentia inter numero  $t$  et numeros  $x$  et  $y$  non es continuo. Si nos decompone quadrato de latere 1 in 100 quadratos de latere  $1/10$ , tunc si  $t$  transi de valores  $0 \cdot 0900\dots$  —  $0 \cdot 0999\dots$  ad valores  $0 \cdot 1000\dots$  —  $0 \cdot 1099\dots$ , puncto  $(x, y)$  transi de ultimo quadrato in primo columna ad primo quadrato de secundo columna, et ce duo quadrato non es adjacente.

Nos pone quadratos partiale, ut illo fi adjacente. In basi 2 de numeratione, nos sume 4 quadratos partiale in ordine ut in figura (a), et in basi 3 ut in figura (b).

Tunc me divide omni quadrato partiale in alios quadrato, et ita ad infinito. Fig. (c) repraesenta successione de 16 quadratos in basi 2; fig. (d) successione de 8 quadratos in basi 3.


Si nos repraesenta per signo  $\sqcap$  successione  $\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{smallmatrix}$ , vel figura (a), tunc figura (e) repraesenta successione de 64 quadratos in basi 2.

$$\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{smallmatrix}$$


(a)

$$\begin{smallmatrix} 2 & 3 & 8 \\ 1 & 4 & 7 \\ 0 & 5 & 6 \end{smallmatrix}$$

(b)



(c)



(d)



(e)

In scripto *Sur une courbe qui remplit toute une aire plane*, MA. a.1890 t.37 p.132, me da expressione analytico de correspondentia continuo inter numero reale  $t$ , et numero complexo  $(x; y)$ .

Vide Hilbert a.1891 MA. t.38 p.459, Cesàro, Darboux B. a.1897 t.21 p.257, Moore American T. a.1900 p.72, Lebesgue, *Leçons sur l'intégration*, Paris a.1904 p.45.

## §3 e

$$\ast 1.0 \quad e = l'[(1+1/m)^m | m' Q]$$

Df e

«e» indica limite supero de valores de  $(1+1/m)^m$ , quando varia  $m$ , in campo de quantitate positivo.

$$\ast 1 \quad e = l'[(1+1/m)^{m+1} | m' Q]$$

Dfp

$$[ m, n \in Q. \S Q 31.8 \quad \supset. (1+1/m)^m < (1+1/n)^{n+1} \quad (1)$$

$$(1) \quad \supset. l'[(1+1/m)^m | m' Q] \leq l'[(1+1/m)^{m+1} | m' Q] \quad (2)$$

$$m \in Q \quad \supset. (1+1/m)^{m+1} = [(1+1/m)^m](1+1/m) \quad (3)$$

$$(3) \quad \supset. (1+1/m)^{m+1} \leq l'[(1+1/m)^m | m' Q] \times (1+1/m) \quad (4)$$

$$(4) \quad \supset. l'[(1+1/m)^{m+1} | m' Q] \leq e \quad (5)$$

$$(2) \cdot (5) \quad \supset. P.]$$

Idem numero es limite infero de valores de  $(1+1/m)^{m+1}$ , pro  $m$  positivo. In vero, omni valore de  $(1+1/m)^m$  es minore de omni valore de  $(1+1/m)^{m+1}$ . Ergo limite supero de primos es inferiore vel aequale ad limite infero de secundos. Ratione de uno numero de secundo classe ad correspondente numero de primo classe vale  $1+1/m$ , que es proximo ad 1 ad arbitrio. Tunc limite supero de primo classe aequa limite infero de secundo.

$$\ast 2 \quad m \in Q \quad \supset. (1+1/m)^m < e < (1+1/m)^{m+1} \quad [ P \cdot 0.1 \supset P ]$$

$$\ast 3 \quad 2 < e < 3 \quad [ (1/m)^{P \cdot 2} \cdot (5/m)^{P \cdot 2} \supset P ]$$

Si nos pone, in loco de  $m$ , 1 et 5, nos deduce parte integro de numero  $e$ . Pro  $m = 20$ , nos habe:

$$(1.05)^{20} < e < (1.05)^{21},$$

id es, numero  $e$  supera valore de 1 franco ad interesse composito de 5 pro 100, per 20 anno, et es superato ab valore de 1 franco ad idem taxu de interesse, per 21 anno. Pro  $m = 25$ , nos deduce, ab tabulas de interesse:

$$2.665 < e < 2.772.$$

$e = 2.71828 \ 18284 \ 59045 \ 23536 \ 02874 \ 71352 \ 66249 \ 77572$   
 $47093 \ 69995 \ 95749 \ 66967 \ 62772 \ 40766 \ 30353 \ 54759$   
 $45713 \ 82178 \ 52516 \ 64274 \ 27466 \ 39193 \ 20030 \ 59921$   
 $81741 \ 35966 \ 29043 \ 57290 \ 03342 \ 95260 \ 59563 \ 07381$   
 $32328 \ 62794 \ 34907 \ 63233 \ 82988 \ 07531 \ 95251 \ 01901$   
 $15738 \ 34187 \ 93070 \ 21540 \ 89126 \ 94937 \ 99405 \ 34631$   
 $93819 \ 87250 \ 90567 \ 36251 \ 50082 \ 37715 \ 27509 \ 03586$   
 $67692 \ 05047 \ 15575 \ 85094 \ 92906 \ 45748 \ 86005 \ 84299$   
 $93465 \ 94757 \ 59371 \ 00435 \ 26480 \ 0...$





\* 3.1  $e = \lim[(1+m)^m | m, q = -\theta, \pm\infty]$  Dfp

[ §Q 31.2  $\supset$ .  $(1+m)^m | m \in (Q \setminus Q) \text{ cres.}$  §lim 4.1  $\supset$ .

$$\lim[(1+m)^m | m, Q, \infty] = e \quad (1)$$

$$\lim[(1+m)^m | m, -1-Q, \infty] = \lim[(1-m)^{-m} | m, 1+Q, \infty] =$$

$$\lim[(1-(m+1)^{-(m+1)} | m, Q, \infty] = \lim \{ [m/(m+1)]^{-(m+1)} | m, Q, \infty \}$$

$$= \lim [(m+1)/m]^{(m+1)} | m, \dots] = \lim[(1+m)^m (1+m) | m, \dots] = e \quad (2)$$

$$(1) \quad (2) \supset P \quad ]$$

Numero  $e$ , que es definitio ut limite supero, vel infero de classe, P1.0.1, pote es definitio ut limite de functione. Nota que idea de limite supero, indicato per  $l'$ , pertine ad algebra elementare, et es multo plus simplice que idea de limite, indicato per  $\lim$ .

$$\cdot 2 \quad e = \lim[(1+x)^{1/x} | x, -1+Q, 0] \quad [= P.1]$$

$$\cdot 3 \quad x \varepsilon q \supset \lim (1+x/m)^m | m = e^x$$

{ EULER Berol. Misc. a.1743 t.7 p.177:

$$« e^x = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \text{ existente } n \text{ numero infinito. »}$$

$$[ \text{Hp} \supset \lim (1+x/m)^m | m = \lim [(1+x/m)^{1/(m/x)}] | x | m =$$

$$\lim [(1+1/n)^n | n | x | n = [ \lim (1+1/n)^n | n ] | x = e^x ]$$

Functio  $e^x$ , que vocare «functio exponentiale», es limite de functio algebrico  $(1+x/m)^m$ , quando  $m$  varia (et tende ad infinito, per valore integro).

Ce propositio demonstra-re ab Eulero ut seque:

Expressio considerato vale  $(1+x/m)^{1/(m/x)}$ , toto ad  $x$ ; sed  $(1+x/m)^{1/(m/x)}$  habe forma  $(1+1/n)^n$ , que tende ad  $e$ ; ergo...

\* 4.

$$\cdot 1 \quad x \varepsilon q \supset e^x = \Sigma(x^n/n! | n, N_0)$$

$$[ \text{P2.3} \supset e^x = \lim (1+x/m)^m | m$$

$$\S\S 15.1 \supset \cdot = \lim \Sigma[C_m, r, x^r / m^r | r, N_0] | m \quad (1)$$

$$\lim C(m, r) x^r / m^r | m = x^r / r! \lim [1 - s/m]^{s, 0 \dots (r-1)} | m = x^r / r! \quad (2)$$

$$l' \text{ mod } \cdot \cdot \cdot \cdot N_1 = (\text{mod } x)^r / r! \cdot \Sigma[(\text{mod } x)^r / r! | r, N_0] \varepsilon Q_0 \quad (3)$$

$$(1) \cdot (2) \cdot (3) \cdot \text{Comm}(\lim, \Sigma) \supset P \quad ]$$

Pro omni valore de quantitate  $x$ :

$$e^x = 1 + x + x^2/2! + x^3/3! + \dots$$

Demonstratio:  $e^x$  vale limite de  $(1+x/m)^m$ , quando  $m$  varia, per propositio praecedente.

Formula de binomio da evolutione de  $(1+x/m)^m$ , secundo formula (1).

Termine de gradu  $r$ , in ce evolutione quando  $m$  varia, habe pro limite  $x^r/r!$  (2)

Es satisfacto conditione, ita ut limite de serie vale serie de limite. (3)

Ergo subsiste propositio.

{ NEWTON, 13 junii, a.1676:

• (Area hyperbolae) =  $\frac{z}{b} + \frac{zz}{2abb} + \frac{z^3}{6aab^2} + \frac{z^4}{24a^2b^3} + \frac{z^5}{120a^3b^4}$  etc. ubi coefficients denominatorum prodeunt multiplicando terminos hujus arithmeticae progressionis, 1, 2, 3, 4, 5 etc. in se continuo; et hinc ex logarithmo dato potest numerus ei competens inveniri. »

$$\cdot 2 \quad e = 1 + \Sigma / (N_i!) = \Sigma (/n! | n, N_0) \quad [ P \cdot 1 . x=1 . \supset . P ] \quad \text{Dfp}$$

$$\cdot 21 \quad P4 \cdot 2 \supset . P4 \cdot 1$$

$$[ f = \Sigma x^n / n! | n, N_0) . x, y \in q . \S \lim P27 \cdot 1 . \supset . fx \times fy = f(x+y) . f1 = e . \\ \S q P13 \cdot 4 (\text{pag. 118}) \supset . fx = e^x ]$$

Si in serie  $\cdot 1$  nos pone  $x = 1$ , ori serie multo convergente pro numero e. Vice-versa, si nos sume ce serie pro definitione de e, seque serie generale  $\cdot 1$ .

$$\cdot 3 \quad n \in N_i . \supset . e \in \Sigma (/r! | r, 0 \cdots n) + \theta / (n!n)$$

{ FOURIER; Vide Stainville, *Mélanges d'Analyse*, a.1815 p.339; CAUCHY a.1821 p.118 }

$$[ P \cdot 2 . n \in N_i . \supset . e = \Sigma (/r! | r, 0 \cdots n) + \Sigma (/r! | r, n + N_i) \quad (1)$$

$$\Sigma (/r! | r, n + N_i) = / (n+1)! ; 1 + / (n+2) + / [(n+2)(n+3)] + \dots \\ < / (n+1)! [1 + / (n+1) + / (n+1)^2 + / (n+1)^3 + \dots] \\ = / (n+1)! (n+1)/n = / (n!n) \quad (2)$$

$$(1) . (2) . \supset . P ]$$

Resto in serie  $\cdot 2$ , truncato post  $n+1$  termine, es minore de ultimo termine scripto, diviso per  $n$ .

Si, per exemplo, nos pone  $n = 10$ , et calcula primos termine, cum 8 cifra decimale, in defectu, nos habe :

$$\begin{array}{rcl} 1 + 1 & = & 2 \cdot 00000000 , \\ 1/2 ! & = & 0 \cdot 50000000 , \\ 1/3 ! & = & 0 \cdot 16666666 , \\ 1/4 ! & = & 0 \cdot 04166666 , \\ 1/5 ! & = & 0 \cdot 00833333 , \\ 1/6 ! & = & 0 \cdot 00138888 , \\ 1/7 ! & = & 0 \cdot 00019841 , \\ 1/8 ! & = & 0 \cdot 00002480 , \\ 1/9 ! & = & 0 \cdot 00000275 , \\ 1/10 ! & = & 0 \cdot 00000027 \end{array}$$

$$\text{Summa} \quad = \quad 2 \cdot 71828177$$

Ergo  $e > 2 \cdot 71828177$ , nam nos calcula termines in defectu, et supprime resto. Si nos calcula termines in excessu, id es, si nos adde  $8 \times 10^{-8}$ , et si nos adde  $3 \times 10^{-8}$ , que supera resto, id es ultimo termine scripto diviso per 10, seque  $e < 2 \cdot 71828188$ .

Unde, cum errore minore de  $10^{-7}$ :

$$e = 2 \cdot 7182818.$$

Si in serie 1 nos pone  $x=1/2$ ,  $x=1/3, \dots$ , nos obtine:

$$\sqrt{e} = 1 + 1/2 + 1/(2 \times 4) + 1/(2 \times 4 \times 6) + \dots,$$

$$\sqrt[3]{e} = 1 + 1/3 + 1/(3 \times 6) + 1/(3 \times 6 \times 9) + \dots,$$

serie multo commodo pro calculo numerico.

Si nos muta  $x$  in  $-x$ , resulta:

$$e^{-x} = 1 - x + x^2/2! - x^3/3! + \dots$$

serie cum terminis de signo alterno (per  $x > 0$ ). Resto es minore de primo termine relicto:

$$4 \quad x \in \mathbb{Q}, n \in \mathbb{N}_0. \supset. e^{-x} = \sum [(-x)^r / r! | r, 0 \dots n] \varepsilon \theta(-x)^{n+1} / (n+1)!$$

Quod resulta de §lim P25.1, si termines de serie es decrescente, id es si  $n < 1$ . Sed ce limitatione non es necessario.

$$5 \quad n \in \mathbb{N}_1, a \in \mathbb{R} \text{ f } 1 \dots n. \supset. e^n + \sum (a_r e^{n-r} | r, 1 \dots n) = 0$$

{ HERMITE a.1873 Paris CR. t.77; cfr. GORDAN a.1893 MA. t.43 }

Eulero proba que  $e$ , et suo quadrato, es irrationale (P1.6). Lambert demonstra que, si  $x$  es rationale tunc  $e^x$  es irrationale (P1.7). In fine Hermite proba que  $e$  non es irrationale algebrico, id es, que numero  $e$  es radice de nullo aequatio algebrico, ad coefficientes rationale. Numero que non es «algebrico» vocare «transcendente».

$$6 \quad n \in \mathbb{N}_1, x \in \mathbb{Q} \neq 0. \supset.$$

$$(e^{nx} - 1) / (e^x - 1) = \sum \{ x^r \sum [0 \dots (n-1)]^r / r! | r, \mathbb{N}_0 \}$$

$$7 \quad \lim n / \sqrt[n]{(n!)} | n = e$$

Dfp

$$[ \dots = \lim^n \sqrt[n]{n^n / n!} | n$$

$$\S \text{lim P11.5} \supset. \dots = \lim [(n+1)^{n+1} / (n+1)! / n^n \times n!] | n$$

$$= \lim [(n+1)/n]^n | n = \lim (1 + 1/n)^n | n = e ]$$

$$8 \quad \lim n / \sqrt[n]{(2n)! / n!} | n = e, 4$$

$$* \quad 5.1 \quad a \in \mathbb{Q}. \supset. \lim [(e^{ax} - 1) / x | x, q, 0] = a$$

$$[ \dots = \lim (1 + ax + (ax)^2/2! + \dots - 1) / x | x, q, 0 ]$$

$$= a + \lim [x \times (a^2/2! + a^3/3! + \dots) | x, q, 0]$$

$$= \dots \dots \dots [x, \pm \theta, 0]$$

$$= a + \lim [\pm \theta x \times (\text{mod } a^2/2! + \text{mod } a^3/3! + \dots) | x, \dots]$$

$$= a + \lim [\pm \theta x \times (e^{\pm \text{mod } a} - 1 - \text{mod } a) | x, \dots] = a ]$$

$$2 \quad a \in \mathbb{Q}. \supset. \log a = \lim [(a^x - 1) / x | x, q, 0]$$

Dfp

$$[ (\log a | a) P.1 \supset P ]$$

$$3 \quad a \in \mathbb{Q}. \supset. \log a = \lim n (\sqrt[n]{a} - 1) | n$$

$$[ P.2 \supset P ] \quad [ P.4 \supset P ]$$

$$4 \quad \lim (\log, Q, \infty) = x$$

$$5 \quad \lim (\log x / x | x, Q, \infty) = 0$$

- 6  $m, n \in \mathbb{Q} \Rightarrow \lim[(\log x)^m / x^n | x, \mathbb{Q}, \infty] = 0$   
 •7  $x \in \mathbb{Q} \Rightarrow \lim(\log, \mathbb{Q}, x) = \log x \quad \text{Comm}(\lim, \log)$   
 •8  $\log \varepsilon \text{ (qf } \mathbb{Q}) \text{ cont} \quad [P.7. \text{ Df cont } \supset P]$

\* 6.1  $x \in \mathbb{Q}, -1 < x \leq 1 \Rightarrow \log(1+x) = \sum [(-1)^{r-1} x^r / r | r, \mathbb{N}_1]$   
 $= x - x^2/2 + x^3/3 - \dots$

{ MERCATOR a.1668 p.32:

• Hinc posito ..... 0[1 = numero terminorum: invenio, .....

Versione: Me pone 0.1 =  $x$  et inveni

aream ... = numero terminorum = 0[1, minus summa eorumdem

$\log(1+x) = x = 0.1 - \int x dx = x^2/2$

terminorum = 0|005, plus summa quadratorum ab iisdem =  
 $= 0.005 + \int x^2 dx = x^3/3 - \text{etc.}$

0|000333333, minus summa cuborum = 0|000025, plus summa

quadrato - quadratorum = 0|000002, minus summa quadrato

cuborum = 0|000000116, plus summa cubo - cuborum =

0|000000013, &c. » {

$$[x \in \mathbb{Q}, \text{mod } x < 1. P.3.1 \Rightarrow \log(1+x) = \lim n[ \sqrt[n]{1+x} - 1 ] | n$$

$$\S \lim 41.1 \Rightarrow \quad \quad \quad = \lim n; \Sigma [C(n, r)x^r | r, N_0] - 1 | n$$

$$\quad \quad \quad = \lim \Sigma [n C(n, r)x^r | r, N_1] | n \quad (1)$$

$$r \in \mathbb{N}_1 \Rightarrow \lim n C(n, r)x^r | n = (-1)^{r-1} x^r / r \quad (2)$$

$$\quad \quad \quad \text{I' mod } \quad \quad \quad | n^r N_1 = (\text{mod } x)^r / r \quad (3)$$

$$\text{mod } x < 1 \Rightarrow \Sigma [(\text{mod } x)^r / r | r, N_1] \in \mathbb{Q}_0 \quad (4)$$

$$\quad \quad \quad (1).(2).(3).(4) \cdot \text{Comm}(\lim, \Sigma) \Rightarrow \text{Ths} \quad (5)$$

$$\S \lim 25.4 \Rightarrow \Sigma [(-1)^{r-1} / r | r, N_1] \in \mathbb{Q} \cdot \S \lim 60.4 \Rightarrow$$

$$\Sigma [(-1)^{r-1} / r | r, N_1] = \lim; \Sigma [(-1)^{r-1} x^r / r | r, N_1] | x, \theta, 1$$

$$= \lim [\log(1+x) | x, \theta, 1] = \log 2 \quad (6)$$

$$(5) \cdot (6) \Rightarrow P]$$

•2  $x \in \theta \Rightarrow \log[(1+x)(1-x)] = 2(x + x^2/3 + x^4/5 + \dots)$

[P.1  $\Rightarrow \log(1+x) = x - x^2/2 + x^3/3 - \dots \cdot \log(1-x) = -x - x^2/2 - \dots \Rightarrow P]$

•3  $x \in \mathbb{Q} \Rightarrow \log(x+1) - \log x = 2/[2x+1] + /3(2x+1)^3 + \dots \{$   
 $= 2\Sigma /[(2n+1)(2x+1)^{2n+1}] | n, N_0 \}$   
 { GREGORIO a.1668 p.12 {

[ /2x+1 | x P.2  $\Rightarrow P]$

•4  $\log 2 = 1 - /2 + /3 - /4 + \dots$

$\log 2 = /2 + / (2 \times 2^3) + / (3 \times 2^5) + \dots$

$\log 2 = 2[ /3 + / (3 \times 3^3) + / (5 \times 3^5) + / (7 \times 3^7) + \dots$

[ 1/x P.1  $\cdot (-/2 | x P.1 \cdot 1/x P.3 \Rightarrow P]$

P.1-3 permette calculo numerico de logarithmo naturale de dato numero, P. ex. pro calculo de  $\log 2$ , nos deduce tres serie convergente; primo converge in modo lento. Ultimo es rapido. Me calcula 8 termine :

$$\begin{aligned} 2/3 &= 0.666\ 666\ 666 \\ 2/81 &= 0.024\ 691\ 358 \\ 2/1215 &= 0.001\ 646\ 090 \\ 2/15309 &= 0.000\ 130\ 642 \\ 2/177147 &= 0.000\ 011\ 290 \\ 2/1948617 &= 0.000\ 001\ 026 \\ 2/20726199 &= 0.000\ 000\ 096 \\ 2/215233605 &= 0.000\ 000\ 009 \end{aligned}$$

$$\text{Summa} = 0.693\ 147\ 177$$

que es valore de  $\log 2$  per defectu.

Nunc me calcula termines per excessu, id es me adde  $8 \times 10^{-3}$ . Calcula resto per excessu :

$$\begin{aligned} &2/17 \times 3^{17} + 2/19 \times 3^{19} + \dots \\ &< 2/15 \times 3^{17} + 2/15 \times 3^{19} + \dots \\ &= 2/15 \times 3^{15} \times (1/9 + 1/9^2 + \dots) \\ &= 2/15 \times 3^{15} \times 1/8 = 0.000\ 000\ 001 \end{aligned}$$

Valore per defectu, plus  $10 \times 10^{-9}$  es valore per excessu de  $\log 2$ . Unde, cum 8 cifra decimale :  $\log 2 = 0.69314718, \dots$

Si in P.3,  $x = 4$ , seque

$$\log 5 = 2\log 2 + 2[1/9 + 1/3 \times 9^2 + 1/5 \times 9^4 + \dots] = 1.60943791$$

et  $\log 10 = \log 2 + \log 5 = 2.30258509$ .

Suo reciproco es modulo de logarithmos decimale P.2.2, id es factore que transforma logarithmos naturale in decimale.

Pro ultimo exemplo, me quaere logarithmo decimale de 11.

$$\log 11 = \log(10 \times 1.1) = \log 10 + \log 1.1 = 1 + \log 1.1,$$

Si me voca  $m$  modulo de logarithmos decimale :

$$m = / \log 10 = 0.43429, \dots$$

et si me evolve in serie  $\log 1.1$ , secundo formola 6.1, seque

$$\log 1.1 = m \log 1.1 = m \times 0.1 - m \times 0.01/2 + m \times 0.001/3 - m \times 0.0001/4 +$$

Me calcula cum 8 cifra primos termine :

$$\begin{aligned} 1^{\circ} \text{ termine} &= 0.04342944, \\ 2^{\circ} &= -0.00217147, \\ 3^{\circ} &= 0.00014476, \\ 4^{\circ} &= -0.00001085, \\ 5^{\circ} &= 0.00000086, \\ 6^{\circ} &= -0.00000007. \end{aligned}$$

$$\text{Summa} = 0.04139267.$$

Errore, vel differentia inter  $\log 1.1$  et summa praecedente classes :

$$\begin{aligned} &0 \times 10^{-8} \text{ (errore in } 1^{\circ} \text{ termine)} - 0 \times 10^{-8} \text{ (errore in} \\ &0 \times 10^{-8} - 0 \times 10^{-8} + 0 \times 10^{-8} - 0 \times 10^{-8} \text{ (errore} \end{aligned}$$

$+0 \times 10^{-8}$  (errore in suppressione de resto de serie; nam per §lim P25.1, resto es fractione de primo termine relicto, que vale  $10^{-8}$ ) =  $(-3^{-}+4)10^{-8}$ . Ergo, summa praecedente minus 3, aut plus 4 unitate de ultimo ordine es valore per defectu et per excessu de  $\text{Log}1.1$ :

$$0.04139264 < \text{Log}1.1 < 0.04139271$$

unde

$$\text{Log}11 = 1.0413927$$

cum errore  $< 10^{-7}$ .

3  $a, b \in \mathbb{Q} \cdot \supset$

$$\log[(a+b)/2] = (\log a + \log b)/2 + \sum \{ [(a-b)/(a+b)]^{2n} / (2n) \mid n, N_1 \}$$

$$\{ (a+b)/2 = \sqrt{(ab)} \cdot \sqrt{1 - [(a-b)/(a+b)]^2} \mid P4.1 \cdot \supset \cdot P \}$$

Si es noto logarithmo de numeros 2, 3, 7, 11, 13, ce formula, ubi serie es reducto ad suo primo termine, da logarithmo di omni numero cum errore inferiore ad  $(10^{-7})/2$ , (Koralek a. 1851, Cauchy s.1 t.11 p.383).

6  $x \in \mathbb{Q} \cdot n \in \mathbb{N}_0 \cdot \supset$

$$\log(1+x) = \sum [(-1)^r x^r / r \mid r, 1 \cdots n] \pm (-1)^n \theta x^{n+1} / (n+1)$$

7  $x \in \mathbb{Q} \cdot \text{mod } x < 1 \cdot \supset \cdot \log[x + \sqrt{1+x^2}] =$

$$\sum [(-1)^r C(r-1/2, r) x^{2r+1} / (2r+1) \mid r, N_0]$$

8  $x \in \mathbb{Q} \cdot n \in \mathbb{N}_0 \cdot \supset$

$$\log[x + \sqrt{1+x^2}] = \sum [(-1)^r C(r-1/2, r) x^{2r+1} / (2r+1) \mid r, 0 \cdots n]$$

$$\pm \theta (-1)^{n+1} C(n+1/2, n+1) x^{2n+3} / (2n+3)$$

\* 7.1  $m \in \mathbb{N}_1 \cdot \supset \cdot \lim \sum / (n \cdots mn) \mid n = \log m$

2  $m, n \in \mathbb{N}_1 \cdot m < n \cdot \supset \cdot \lim \sum / (mp \cdots np) \mid p = \log(m/n)$

{ Joh. BERNOULLI II a.1729 CorrM. t.2 p.300:

« Si l'on coupe la progression harmonique  $1/x \dots$  en deux parties ... soit la raison du nombre des termes dans la première et seconde partie comme  $m$  à  $n$ , la somme de tous les termes de cette seconde partie sera  $= \log[(m+n)/n]$ . »

3  $a \in (e^{-1}/e)^{-1} \cdot \supset$

$$\lim (a^n)^{1/n} \mid n = \sum (n+1)^{n-1} (\log a)^n / n! \mid n, N_0 \}$$

{ EULER PetrA. a.1777 t.1 {

4  $x \in \mathbb{Q} \cdot \supset$

$$\log x = [(x-x^{-1})/2] \cdot \Pi [(x^{\uparrow} 2^{-r} + x^{\downarrow} 2^{-r})/2 \mid r, N_1]$$

$$\log x = [(x-1)/\Pi [(1+x^{\uparrow} 2^{-r})/2 \mid r, N_1] =$$

$$(1-x^{-1})/\Pi [(1+x^{\downarrow} 2^{-r})/2 \mid r, N_1]$$

{ SEIDEL JfM. a.1871 t.73 p.276, 278 {

\* 8.1  $\min(x^n \mid x \in \mathbb{Q}) = e^{N(-)/e}$

2  $\max[(x^{\uparrow} \mid r) \mid x \in \mathbb{Q}] = e^{N/e}$

$$E \beta * 9.1 \quad E e = 2 \cdot E / \beta e = 1$$

$$n \in N_1 \cdot \supset. E(\beta)^{2n-1} e = 2n \cdot E(\beta)^{2n} e = E(\beta)^{2n+1} e = 1$$

{ COTES a.1714 *Logometria*, p.7:

« Dividatur ... 2,71828 &c. per 1, ... & rursus minor per numerum qui reliquus est, & hic rursus per ultimum residuum, atque ita porro pergatur: & prodibunt quotientes 2, 1, 2, 1, 1, 4, 1, 1, 6, 1, 1, 8, 1, 1, 10, 1, 1, 12, 1, 1, 14, 1, 1, 16, 1, 1, &c. »

$$*2 \quad n \in N_1 \cdot \supset. E(\beta)^n [(e-1)/(e+1)] = 2+4(n-1)$$

{ EULER a.1748 p.319 }

Super alio fractio continuo relativo ad numero e, vide §Fc P11.

$$Np * 10.1 \quad a \varepsilon \theta \cdot \supset.$$

$$\lim \{ [\text{Num}(Np \wedge 2^{n-1}) - \Sigma / \log(2^{n-1})] \times n^{\wedge} (a+1/2) \} | n = 0$$

{ JENSEN AM. a.1899 t.22 p.364 }

$$*2 \quad n \in N_1 \cdot \supset.$$

$$\lim \{ [\text{Num}(Np \wedge 1^{n-1}) / x - \Sigma [r! / (\log x)^{r+1} | r, 0^{n-1}] \} (\log x)^{n+1} | x = (n+1)!$$

{ TCHEBYCHEF JdM. a.1848 t.17 p.384, Œuvres t.1 p.44 }

Subst e

$$* 11. \quad n \in N_1 \cdot a, b \varepsilon \text{Subst } n \cdot \supset.$$

$$*0 \quad e^a = \Sigma [ (a^n / n!) | n, N_0 ]$$

Df

Si  $a$  es substitutione de ordine  $n$ ,  $e^{\wedge} a$  indica summa de serie P5.1, semper convergente.

$$*1 \quad e^a \varepsilon \text{Subst } n$$

$$[ \quad r \varepsilon N_1 \cdot \S \lim 2.4 \cdot \supset. \quad \text{mod}(ar / r!) \leq (\text{mod } a^r / r!) \quad (1)$$

$$P5.1 \cdot \supset. \quad \Sigma [ (\text{mod } a)^r / r! | r, N_0 ] \varepsilon Q \quad (2)$$

$$(1) \cdot (2) \cdot \supset. \quad \Sigma [ \text{mod}(ar / r!) | r, N_0 ] \varepsilon Q \quad (3)$$

$$(3) \cdot \S \lim 51.4 \cdot \supset. \quad \Sigma [ (ar / r!) | r, N_0 ] \varepsilon \text{Subst } n \quad (4)$$

$$(4) \cdot P.0 \cdot \supset. \quad P ]$$

$$*2 \quad e^a = \lim (1+a/n)^n | n \quad [ (\text{Subst}|q)P5.1 \supset P ]$$

$$*3 \quad ab = ba \cdot \supset. \quad e^{a+b} = e^a e^b$$

$$[ \quad P.0 \cdot \supset. \quad e^a e^b = \Sigma (ar / r!) | r, N_0 ] \cdot \Sigma (br / r!) | r, N_0 ]$$

$$\S \lim 35.1 \cdot \supset. \quad = \Sigma [ \Sigma (ar \cdot sb^s / s! (n-s)! s!) | s, 0^{n-1} ] | n, N_0$$

$$\S 2 15.1 \cdot \supset. \quad = \Sigma [ (a+b)^n / n! | n, N_0 ]$$

$$P.0 \cdot \supset. \quad = e^{a+b} ]$$

$$*4 \quad \text{Dtrm } e^{\wedge} a = e^{\wedge} \text{Invar } a$$



2  $x \in q . m \in N_1 + 1 . \supset$

$$\begin{aligned} s(2mx) &= cx \sum \{ (-1)^r 2^{2r+1} C(m+r, 2r+1) (sx)^{2r+1} | r, 0 \dots (m-1) \} \\ s[(2m+1)x] &= (2m+1) \sum \{ [(-1)^r 2^{2r} / (2r+1)] C(m+r, 2r) (sx)^{2r+1} | r, 0 \dots m \} \\ s(mx) &= sx \sum \{ (-1)^r C(m-r-1, r) (2cx)^{m-2r-1} | r, 0 \dots E[(m-1)/2] \} \\ c(2mx) &= 1 - 2m \sum \{ (-1)^r 2^{2r} / (r+1) C(m+r, 2r+1) (sx)^{2r+2} | r, 0 \dots (m-1) \} \\ c[(2m+1)x] &= cx \sum \{ (-1)^r 2^{2r} C(m+r, 2r) (sx)^{2r} | r, 0 \dots m \} \\ 2c(mx) &= (2cx)^m - \\ &\quad m \sum \{ [(-1)^r / (r+1)] C(m-r-2, r) (2cx)^{m-2r-2} | r, 0 \dots E[(m-2)/2] \} \\ &\quad \{ \text{EULER a.1748 t.1 p.206} \} \end{aligned}$$

3  $m \in 2N_1 . x \in q . \supset$

$$\begin{aligned} (cx)^m &= \sum \{ C(m, r) c[(m-2r)x] | r, 0 \dots (m-2)/2 \} / 2^{m-1} + C(m, m/2) / 2^m \\ (sx)^m &= (-1)^{(m/2)} \sum \{ (-1)^r C(m, r) c[(m-2r)x] | r, 0 \dots (m-2)/2 \} / 2^{m-1} \\ &\quad + C(m, m/2) / 2^m \end{aligned}$$

4  $m \in 2N_0 + 1 . x \in q . \supset$

$$\begin{aligned} (cx)^m &= \sum \{ C(m, r) c[(m-2r)x] | r, 0 \dots (m-1)/2 \} / 2^{m-1} \\ (sx)^m &= (-1)^{(m-1)/2} \sum \{ (-1)^r C(m, r) s[(m-2r)x] | r, 0 \dots (m-1)/2 \} / 2^{m-1} \end{aligned}$$

5  $x, y \in q . \sin y = 0 . m \in N_1 . \supset$

$$\begin{aligned} \sum [s(x+2ry) | r, 0 \dots m] &= s(x+my) s[(m+1)y] / sy \\ \sum [c(x+2ry) | r, 0 \dots m] &= c(x+my) s[(m+1)y] / sy \\ [ \sum [c(x+2ry) + is(x+2ry) | r, 0 \dots m] = \\ &\quad \sum [e^{i(x+2ry)} | r, 0 \dots m] = e^{i(x)} [e^{i2(m+1)y} - 1] / [e^{i2y} - 1] \\ &= e^{i(x+my)} [e^{i(m+1)y} - e^{-i(m+1)y}] / [e^{iy} - e^{-iy}] \\ &= e^{i(x+my)} s[(m+1)y] / sy ] \\ &\quad \{ \text{ARCHIMEDE, de Sphaera et cylindro I 21} \} \end{aligned}$$

6  $x \in q . \sin x = 0 . m \in N_1 . \supset$

$$\begin{aligned} 2 \sum [s(rx)^2 | r, 0 \dots m] &= m - c[(m+1)x] s(mx) / sx \\ 2 \sum [c(rx)^2 | r, 0 \dots m] &= m + c(mx) s[(m+1)x] / sx \end{aligned}$$

\* 16.  $x \in q . \supset$

$$1 \quad sx = x - x^3/3! + x^5/5! - \dots = \sum \{ (-1)^n x^{2n+1} / (2n+1)! \} | n, N_0 \}$$

$$2 \quad cx = 1 - x^2/2! + x^4/4! - \dots = \sum \{ (-1)^n x^{2n} / (2n)! \} | n, N_0 \}$$

$$[ e^{i(x)} = 1 + ix - x^2/2 - i x^3/3! + x^4/4! + \dots \text{ Oper real . Oper imag } \supset . \text{ P.1.2} ]$$

{ NEWTON a.1676 }

3  $n \in N_1 . \supset$

$$sx = \sum \{ (-1)^r x^{2r+1} / (2r+1)! | r, 0 \dots n \} \varepsilon (-1)^{n+1} \theta x^{2n+3} / (2n+3)!$$

$$cx = \sum \{ (-1)^r x^{2r} / (2r)! | r, 0 \dots n \} \varepsilon (-1)^{n+1} \theta x^{2n+2} / (2n+2)!$$

Hp.  $x \varepsilon \theta x 2$ , que occorre in plure tractato, es inutile.

Dm in Peano *Lezioni* a.1893 t.1 p.83.

Notatione  $\sin^2 x$  pro indica  $(\sin x)^2$  es in Legendre a.1811 Exercices t.1 p.9; adoptato per Jacobi a.1827.

Gauss, que adopta et notatione de Formul., dice: einige neuere mathematische Schriftsteller für das Quadrat von  $\cos A$ ,  $\cos^2 A$  gebrauchen, ganz gegen alle Analogien ».

$x \mathcal{E} q . \supset$ :

$$4 \quad c x = (e^{ix} + e^{-ix})/2 \quad . \quad s x = (e^{ix} - e^{-ix})/(2i) \quad \text{Dfp}$$

$$5 \quad e^{ix} = c x + i s x \quad . \quad e^{-ix} = c x - i s x$$

{ EULER a.1748 p.104 } [ Df s, c  $\supset$  P.4.5 ]

$$6 \quad s 0 = 0 \quad . \quad c 0 = 1 \quad . \quad s -x = -s x \quad . \quad c -x = c x \quad [ P.4 \supset P ]$$

$$7 \quad c x^2 + s x^2 = 1 \quad [ P.5 \quad . \quad \text{Oper } \times . \supset . P ]$$

$$8 \quad -1 \leq s x \leq 1 \quad . \quad -1 \leq c x \leq 1 \quad [ P.7 \supset P ]$$

\* 14.  $x, y, z, t \mathcal{E} q . \supset$ .

$$1 \quad s(x+y) = s x c y + c x s y \quad . \quad c(x+y) = c x c y - s x s y$$

" - " - " " - " + "

[  $e \mathcal{N}(ix) e \mathcal{N}(iy) = e \mathcal{N}[i(x+y)]$  . Oper real . Oper imag .  $\supset$  . P ]

{ ABU'LEWEFA a.998; *Journal Asiatique* a.1892 s.8 t.19 p.419 }

$$2 \quad s(x-y) s(z-t) + s(y-z) s(x-t) + s(z-x) s(y-t) = 0$$

{ PTOLEMAEO t.1 p.36 }

$$[ \text{Sn 6.2.} \supset . (e^{2xi} - e^{2yi})(e^{2zi} - e^{2ti}) + (e^{2yi} - e^{2xi})(e^{2zi} - e^{2ti}) + (e^{2xi} - e^{2zi})(e^{2yi} - e^{2ti}) = 0 . \supset .$$

$$e(x+y)i e(x-y)i - e(x-y)i e(x+y)i \quad e(z+t)i e(z-t)i - e(z-t)i e(z+t)i + \dots = 0 .$$

$$\supset . (e^{ix-y)i} - e^{-(x-y)i})(e^{iz-t)i} - e^{-(z-t)i}) + \dots = 0 . \supset . P ]$$

\* 15.1  $x \mathcal{E} q . m \in \mathbb{N}_1 . \supset$ .

$$c(mx) = \text{real}(cx + i s x)^m$$

$$= \sum (-1)^r C(m, 2r) (cx)^{m-2r} (s x)^{2r} |r, 0 \dots E[(m/2)] .$$

$$s(mx) = \text{imag}(cx + i s x)^m$$

$$= \sum (-1)^r C(m, 2r+1) (cx)^{m-2r-1} (s x)^{2r+1} |r, 0 \dots E[(m-1)/2]$$

[  $e \mathcal{N} m i x = [e \mathcal{N}(ix)]^m$  . Oper real . Oper imag .  $\supset$  . P ]

{ VIETA a.1615 p.11 : « Si fuerint duo triangula quorum angulus acutus primi  $[x]$ , sit submultiples ad angulum acutum secundi  $[mx]$  ...

Ad similitudinem laterum circa rectum ... efficitur a base  $[\cos x]$  et perpendicularo  $[\sin x]$  primi ut binomia radice potestas aequae-alta  $[(\cos x \pm \sin x)^m]$ , et singularia facta homogenea distribuuntur in duas partes successive, utrobique primum affirmata, deinde negata, et harum primae parti similis fit basis secundi  $[\cos mx]$ , perpendicularum  $[\sin mx]$  reliquae. »

P.1 vocare saepe « formula de Mémoire ».

§4  $\pi$ 

\* 1.0  $\pi = 2 \min Qx3(cx=0)$

Df $\pi$ 

Numero  $\pi/2$  pote es definitio, in modo analytico, ut minimo radice positivo de aequatione  $\cos x = 0$ , id es de aequatione  $1 - x^2/2! + x^4/4! - \dots = 0$ .

Numero  $\pi$  se praesenta ut ratione de circumferentia ad diametro. Ce signo, introducto per Jones, adoptato per Euler, es hodie de usu generale. Illo es litera initiale de *περίμετρος*.

$$1 \quad \cos(\pi/2) = 0$$

[ Df  $\pi \supset P$  ]

$$2 \quad x \in \theta\pi/2 \quad \therefore \quad \cos x > 0$$

[ Df  $\pi \supset P$  ]

$$3 \quad x \in \theta\pi \quad \therefore \quad \sin x > 0$$

$$[ \sin x = 2 \sin(x/2) \cos(x/2) \cdot \cos(x/2) > 0 \quad \therefore \quad \operatorname{sgn} \sin x$$

$$(1) \cdot n \in \mathbb{N}_1 \quad \therefore \quad \operatorname{sgn} \sin x = \operatorname{sgn} \sin(x/2^n)$$

$$(2) \quad \therefore \quad \operatorname{sgn} \sin x = \lim \operatorname{sgn} \sin(x/2^n) | n$$

$$P16.5 \quad \therefore \quad \operatorname{sgn} \sin x = 1 ]$$

$$4 \quad \sin(\pi/2) = 1$$

$$[ \sin(\pi/2)^2 + \cos(\pi/2)^2 = 1 \cdot \cos(\pi/2) = 0 \cdot \sin(\pi/2) > 0$$

$$5 \quad e^{\pi i/2} = i$$

$$6 \quad e^{\pi i} = -1 \quad . \quad e^{2\pi i} = 1$$

\* 2.1  $\pi/4 \in (8/9)^2 - \theta X^{-1}$

{AH

$$N.41. \quad \ll 9 \cdot 9/9 = 1 \cdot 9 - 1 = 8 \cdot 8 \times 8 = 64 \gg$$

$$N.42. \quad \ll 10 \cdot 10/9 = 1 + 9 \cdot 10 - (1 + 9) = 8 + 2/3 + 6 + 8 + 2/3 + 6 + 1/18^2 = 79 + 108 + 324 \gg$$

Papyro de mathematico aegyptio Ahamesu, de anni vulgare, es toto composito ut duo linea transcripto. ... da ad cifra forma attuale. Interpretatione, que nos debe adde, es :

N. 41: Si nos suppose que 9 es diametro de circulo, tunc divide illo per 9, et habe 1; subtrahe ce nono de illo, et habe 8; eleva ad potestate 2, et habe (circa) area de circulo.

N. 42: Si 10 es diametro de circulo, tunc divide illo per 9, et habe  $1 + 1/9$ ; subtrahe ce nono de illo, et habe  $8 + 2/3 + 6 + 1/18$  (secundo methodo aegyptio, ubi omni fractione de denominatore  $> 3$ , habe 1 ut numeratore). Eleva ce fractione ad quadrato, et resulta fractio scripto, que exprime area.

$$\cdot 4 \quad \lim(\sin x/x | x, q, 0) = 1$$

$$[ \lim[(e^{ix}-1)/x | x, q, 0] = i . \text{ Oper imag } \cdot \supset . P ]$$

$$\cdot 5 \quad \lim[\operatorname{sgn} \sin x | x, Q, 0] = 1$$

$$[ x \in Q \cdot \supset . \operatorname{sgn} \sin x = \operatorname{sign}(\sin x/x) . P \cdot 4 \cdot \supset . P ]$$

$$\cdot 6 \quad x \in q . r \in Q . \operatorname{mod} r < 1 \cdot \supset .$$

$$(1 - r \cos x)/(1 - 2r \cos x + r^2) = \sum [r^n \cos(nx) | n, N_0] .$$

$$r \sin x/(1 - 2r \cos x + r^2) = \sum [r^n \sin(nx) | n, N_1]$$

$$[ \sum [(re^{ix})^n | n, N_0] = 1/(1 - re^{ix}) . \text{ Oper real } . \text{ Oper imag } \cdot \supset . P ]$$

$$\cdot 7 \quad a, x, n \in q . \operatorname{mod} a < 1 \cdot \supset .$$

$$(1 + 2a \cos x + a^2)^n = \sum [C(n, r)^2 a^{2r} | r, N_0]$$

$$+ 2 \sum [a^r \cos(rx) \sum [a^s C(n, s) C(n, r+s) | s, N_0] | r, N_1]$$

$$* \quad 17. \quad x \in q . cx = 0 \cdot \supset . \quad \cdot 0 \quad \operatorname{tng} x = tx = sx/cx \quad \text{Df}$$

$$\cdot 1 \quad tx = (e^{2ix} - 1)/[i(e^{2ix} + 1)] \quad . \quad t0 = 0 \quad . \quad t - x = -tx$$

Nos non introduce alio functione trigonometrico :

$$\operatorname{cotang} = / \operatorname{tng}, \quad \sec = / \cos, \quad \operatorname{cosec} = / \sin.$$

TABULA DE  $e^x$

$x =$	·0	·1	·2	·3	·4	·5	·6	·7	·8	·9
$e^x =$	1·00	1·10	1·22	1·34	1·49	1·64	1·82	2·01	2·22	2·45
$x =$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$e^x =$	2·71	7·38	20·0	54·5	148	403	1096	2980	8103	22026

§4  $\pi$ 

\* 1.0  $\pi = 2 \min Q(x) \text{ (} x=0 \text{)}$

Df $\pi$

Numero  $\pi/2$  pote es definitio, in modo analytico, ut minimo radice positivo de aequatione  $\cos x = 0$ , id es de aequatione  $1 - x^2/2! + x^4/4! - \dots = 0$ .

Numero  $\pi$  se praesenta ut ratione de circumferentia ad diametro. Ce signo, introducto per Jones, adoptato per Euler, es hodie de usu generale. Illo es litera initiale de *περίμετρος*.

$$\cdot 1 \quad \cos(\pi/2) = 0$$

[ Df  $\pi \supset P$  ]

$$\cdot 2 \quad x \in \theta\pi/2 \quad \supset \quad \cos x > 0$$

[ Df $\pi \supset P$  ]

$$\cdot 3 \quad x \in \theta\pi \quad \supset \quad \sin x > 0$$

$$[ \sin x = 2 \sin(x/2) \cos(x/2) \cdot \cos(x/2) > 0 \quad \supset \quad \operatorname{sgn} \sin x =$$

$$(1) \cdot n \in N_1 \quad \supset \quad \operatorname{sgn} \sin x = \operatorname{sgn} \sin(x/2^n)$$

$$(2) \quad \supset \quad \operatorname{sgn} \sin x = \lim \operatorname{sgn} \sin(x/2^n) | n$$

$$P16.5 \quad \supset \quad \operatorname{sgn} \sin x = 1 ]$$

$$\cdot 4 \quad \sin(\pi/2) = 1$$

$$[ \sin(\pi/2)^2 + \cos(\pi/2)^2 = 1 \cdot \cos(\pi/2) = 0 \cdot \sin(\pi/2) > 0 \quad \supset ]$$

$$\cdot 5 \quad e^{\pi i/2} = i$$

$$\cdot 6 \quad e^{\pi i} = -1 \quad \cdot \quad e^{2\pi i} = 1$$

\* 2.1  $\pi/4 \in (8/9)^2 - \theta X^{-2}$

{ AHAMI

$$N.41. \quad \ll 9 \cdot 9/9 = 1 \cdot 9 - 1 = 8 \cdot 8 \times 8 = 64 \gg$$

$$N.42. \quad \ll 10 \cdot 10/9 = 1 + 9 \cdot 10 - (1 + 9) = 8 + 2/3 + 6 + 1/8$$

$$= 8 + 2/3 + 6 + 1/8 = 79 + 108 + 324 \gg$$

Papyro de mathematico aegyptio Ahamesu, de anno ci vulgare, es toto composito ut duo linea transcripto, ubi ad cifra forma actuale. Interpretatione, que nos debe adde, es:

N. 41: Si nos suppose que 9 es diametro de circulo, tunc divide illo per 9, et habe 1; subtrahe ce nono de illo, et habe 8; eleva ad potestate 2, et habe (circa) area de circulo.

N. 42: Si 10 es diametro de circulo, tunc divide illo per 9, et habe  $1 + 1/9$ ; subtrahe ce nono de illo, et habe  $8 + 2/3 + 6 + 1/8$  (secundo methodo aegyptio, ubi omni fractione de denominatore  $> 3$ , habe 1 ut numeratore). Eleva ce fractione ad quadrato, et resulta fractio scripto, que exprime area.

$$\cdot 2 \quad 3 + 1/7 > \pi > 3 + 10/71$$

{ ARCHIMEDE, *Κύκλου μετρήσις* P3:

*Παντὸς κύκλου ἡ περίμετρος τῆς διαμέτρου τριπλασίῳ ἐστὶ, καὶ ἔτι ὑπερέχει ἐλάσσονι μὲν ἢ ἑβδόμῳ μέρει τῆς διαμέτρου, μείζονι δὲ ἢ δέκα ἑβδομηκοστομόνοις.* }

Versione: « Perimetro de panto cyclo es triplice de diametro, et quod super es minore que septimo parte de diametro, majore que decem diviso 71 ».

$$\cdot 3 \quad \pi \varepsilon 3 + 8 \times 60^{-1} + 30 \times 60^{-2} - \theta 60^{-2} \quad \{ \text{PTOLEMAEO t.1 p.512:}$$

...τοῦ λόγου τῶν περιμέτρων πρὸς τὰς διαμέτρους ὄντος, ὃ ἔκει τὰ  $\frac{\gamma}{\eta} \frac{\lambda}{\iota}$  πρὸς τὸ ἔν. }

$$\cdot 4 \quad \pi \varepsilon 62832/20000 - \theta X^{-4}$$

{ ARYABHATA p.399 (Versione de Rodet):

« Ajoutez 4 à 100, multipliez par 8, ajoutez encore 62000, voilà pour un diamètre de deux myriades (ayutàs) la valeur approximative de la circonférence du cercle »!

$$\cdot 5 \quad 377/120 > \pi > 333/106$$

{ A. ANTHONISZ, voir BM. a.1888 p.36; a.1889 p.84 }

$$\pi \varepsilon 355/113 - \theta X^{-4} \quad \{ \text{A. METIO a.1625 p.88 }$$

$$\cdot 8 \quad \pi \varepsilon \sqrt{2} + \sqrt{3} - 5\theta X^{-4} \quad \{ \text{IdM. a.1901 p.269 }$$

$$\cdot 81 \quad \pi \varepsilon \sqrt{1 + \sqrt{6}} + \sqrt{9 - 3\sqrt{6}} - \theta X^{-4} \quad \{ \text{MASCHERONI a.1798 p.248 }$$

$$\cdot 82 \quad \pi \varepsilon 9.5 + 3/\sqrt{5} - \theta X^{-4} \quad \{ \text{VIETA a.1593 Opera p.393 }$$

$$\cdot 83 \quad \pi \varepsilon \sqrt{40/3 - 2\sqrt{3}} + 7\theta X^{-4} \quad \{ \text{KOCHANSKI AErud. a.1685 p.398 }$$

$$\cdot 84 \quad \pi \varepsilon (13\sqrt{146})/50 + \theta X^{-4} \quad \{ \text{SPECHT JfM. a.1828 t.3 p.83 }$$

$$\cdot 85 \quad \pi \varepsilon (501 + 80\sqrt{10})/240 - \theta X^{-4}$$

{ GERGONNE Ann. a.1817 t.8 p.252 }

$$\cdot 86 \quad \pi \varepsilon 4 - 2\sqrt{2} + 2\sqrt{3}/3 + \sqrt{6}/3 - 2\theta X^{-4}$$

{ George PEIRCE, AmericanB. a.1901 p.426 }

$\pi = 3 \cdot$

14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510  
 58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 70679  
 82148 08651 32823 06647 09384 46095 50582 23172 53594 08128  
 48111 74502 84102 70193 85211 05559 64462 29489 54930 38196  
 44288 10975 66593 34461 28475 64823 37867 83165 27120 19091  
 45648 56692 34603 48610 45432 66482 13393 60726 02491 41273  
 72458 70066 06315 58817 48815 20920 96282 92540 91715 36436  
 78925 90360 01133 05305 48820 46652 13841 46951 94151 16094  
 33057 27036 57595 91953 09218 61173 81932 61179 31051 18548  
 07446 23799 62749 56735 18857 52724 89122 79381 83011 94912  
 98336 73362 44065 66430 86021 39501 60924 48077 23094 36285  
 53096 62027 55693 97986 95022 24749 96206 07497 03041 23668  
 86199 51100 89202 38377 02131 41694 11902 98858 25446 81639  
 79990 46597 00081 70029 63123 77381 34208 41307 91451 18398  
 05709 85...

Vieta, <i>Canon mathematicus</i> , Lutetiae, a.1579 p.15,	calcula	$E(10 \uparrow 9 \pi)$
Adriano Romano, <i>Ideæ Math.</i> , Anvers, a.1613	"	" 15 "
Ludolpho a Ceulen (D. Cöln, L. Colonia) a.1615 p.144	"	" 32 "
Grienberger, <i>Elementa Trigonometrica</i> , Romæ a.1630	"	" 39 "
Sharp a.1699 (edito per H. Sherwin, <i>Mathematical tables</i> a.1705 p.59)	"	" 71 "
Machin, (edito per Jones, <i>Synopsis Palmarium Matheseos</i> a.1706 p.243, que designa illo per $\pi$ )	"	" 100 "
Lagny, <i>Hist. de l'Acad. des Sc. de Paris</i> , a.1719 p.144	"	" 112 "
Vega, <i>Thesaurus Logarithmorum</i> , a.1794 p.633	"	" 136 "
Thibaut, <i>Grundriss der reinen Math.</i> , 4. ed. a.1822 p.312	"	" 156 "
Dahse a.1840; JfM. a.1844 t.27. p.198	"	" 200 "
Clausen a.1847 (edito per Schuhmacher, <i>Astronomische Nachrichten</i> t.25 col.207)	"	" 248 "
Richter, <i>Archives Math. de Grunert</i> , a.1853, t.21, p.119	"	" 330 "
Rutherford, LondonP. a.1853	"	" 440 "
Shanks,	"	" 530 "
" " " a.1874, t. 23, p.45	"	" 707 "

$\pi = !! \cdot ...!! \cdot ...!!!!!! \cdot ...!!!!$

Calculo de  $\pi$  in basi 2, proposito per Leibniz (Opera a.1768 t.3 p.521, 547,...), facto per Jacob Bernoulli (a.1705, Leibniz MathS. t.3 p.97).

\* 3.1  $\pi \in \mathbb{Q}-\mathbb{R}$  } LAMBERT Ber

2  $\pi^2 \in \mathbb{R}$  } LEGENDRE Gé

3  $n \in \mathbb{N}_1, x \in \mathbb{R} \text{ rf } 1 \dots n \text{ . } \bigcup. \pi^n + \sum(x, \pi^n)$   
 } LINDEMANN a 1882 MA. t.20 p.21  
 cfr. GORDAN a.1893 MA. t.43 p.22

\* 4.  $x \in \mathbb{Q} \text{ . } \bigcup. \text{ si } sx = 0 \text{ . } \text{ . } x \in \pi$

2  $s(\pi - x) = sx \text{ . } s(2\pi + x) = s$

3  $cx = 0 \text{ . } \text{ . } x \in \pi/2 + n\pi$

4  $c(\pi - x) = -cx \text{ . } c(2\pi + x) =$

5  $cx = s(\pi/2 - x) \text{ . } sx = c(\pi/2 -$

\* 5.1  $e^{\pi i/3} = (1 + i\sqrt{3})/2$

$e^{\pi i/5} = [1 + \sqrt{5} + i\sqrt{(10 - 2\sqrt{5})}]/4 \text{ . } e$

$e^{\pi i/8} = [\sqrt{(2 + \sqrt{2})} + i\sqrt{(2 - \sqrt{2})}]/2$

$e^{\pi i/10} = [\sqrt{(10 + 2\sqrt{5})} + i(\sqrt{5} - 1)]/4$

$e^{\pi i/12} = [\sqrt{6 + \sqrt{2}} + i(\sqrt{6 - \sqrt{2}})]/4$

$e^{\pi i/15} = e^{\pi i/6} \times e^{-\pi i/10}$

$= [\sqrt{(30 + 6\sqrt{5})} + \sqrt{5} - 1 + i\sqrt{(10 + 2\sqrt{5})}]/4$

$e^{\pi i/16} = [\sqrt{(2 + \sqrt{(2 + \sqrt{2})})} + i\sqrt{(2 - \sqrt{(2 + \sqrt{2})})}]/2$

Constructione de polygonos regulare, correspondente, es in Euclide IV P6-16.

$e^{\pi i/17} = \{[15 + \sqrt{17} + \sqrt{(34 - 2\sqrt{17})} + 2\sqrt{(17 + 3\sqrt{17})} + 4i\sqrt{(34 - 2\sqrt{17} - 2\sqrt{(34 - 2\sqrt{17})})} - 4\sqrt{(17 + 3\sqrt{17})}]/4\}$   
 } GAUSS a.1801 t.1 p.462 }

$e^{\pi i/20} = \{\sqrt{(3 + \sqrt{5})} + \sqrt{(5 - \sqrt{5})} + i[\sqrt{(3 + \sqrt{5})} - \sqrt{(5 - \sqrt{5})}]\}/2$

$e^{\pi i/30} = \{\sqrt{(18 + 6\sqrt{5})} + \sqrt{(10 - 2\sqrt{5})} + i[\sqrt{(30 + 6\sqrt{5})} - \sqrt{(10 - 2\sqrt{5})}]\}/4$

$e^{\pi i/60} = \{\sqrt{(5 + \sqrt{5})} + \sqrt{(9 - 3\sqrt{5})} + \sqrt{(15 + 3\sqrt{5})} + i[\sqrt{(5 + \sqrt{5})} - \sqrt{(9 - 3\sqrt{5})} - \sqrt{(15 + 3\sqrt{5})}]\}/2$

\* 6.0  $n \in \mathbb{N}_1 \text{ . } \bigcup. \sqrt[n]{*1} = [e^{(2m\pi i/n)}] | m$

1  $n \in \mathbb{N}_1, x \in \mathbb{Q}' \text{ . } \bigcup.$

$x^n - 1 = H[\{x - e^{(2m\pi i/n)}\} | m, 0 \dots n-1]$

$x^n + 1 = H[\{x - e^{(2m+1)\pi i/n}\} | m, 0 \dots n-1]$

} COTES Rogero a.1722 p.114 }



$$\cdot 2 \quad n \in 2N_1 \cdot x \in q' \cdot \supset.$$

$$x^n - 1 = (x^2 - 1) \prod_{j=1}^n [x^2 - 2x \cos(2m\pi/n) + 1] \mid m, 1 \dots (n-2) \{.$$

$$x^n + 1 = \prod_{j=1}^n [x^2 - 2x \cos((2m+1)\pi/n) + 1] \mid m, 0 \dots (n-2)/2 \{$$

$$\cdot 3 \quad n \in 2N_1 + 1 \cdot x \in q' \cdot \supset.$$

$$x^n - 1 = (x-1) \prod_{j=1}^n [x^2 - 2x \cos(2m\pi/n) + 1] \mid m, 0 \dots (n-1)/2 \{.$$

$$x^n + 1 = (x+1) \prod_{j=1}^n [x^2 - 2x \cos((2m+1)\pi/n) + 1] \mid m, 0 \dots (n-3)/2 \{$$

$$\mid = P \cdot 1 \}$$

$$\cdot 4 \quad n \in N_1 \cdot \supset. \prod_{j=1}^n [r\pi(2n)] \mid r, 1 \dots n \{ = \sqrt[n]{n} \cdot 2^{n-1}$$

Dem. in Heinrich Weber. Lehrbuch der Algebra, Braunschweig, 1895, t. I, p. 578.

$$\cdot 5 \quad n \in N_1 \cdot a \in qF 0 \dots n \cdot \supset.$$

$$\text{Dtrm} \{a[\text{rest}(r+s, n)] \mid (r;s), (0 \dots n : 0 \dots n) \{ =$$

$$\prod_{j=1}^n \sum (a_j x^j \mid r, 0 \dots n) \mid x, {}^{n+1}\sqrt{1} \{$$

$$\{ \text{J. W. GLAISHER a.1879 QJ. t.16 p.31 \}$$

Determinante tabulari que figura in ce P dicere « circulante ».

$$\ast \quad 7 \cdot 1 \quad \pi/4 = \sum_{j=1}^n (-1)^j / (2n+1) \mid n, N_0 \{ \mid \text{stang}^{-1} P 7 \cdot 1 \cdot y = 1 \cdot \supset. P \}$$

$$\{ \text{LEIBNIZ a.1682 MathS. t.5 p.120:}$$

« Quadrato Diametri existente 1,

$$\text{Circuli arcum fore } \frac{1}{1} - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} - \frac{1}{15} + \frac{1}{17} - \frac{1}{19} \text{ etc.,}$$

nempe quadratum diametri integrum demta (ne nimius fiat valor) ejus tertia parte, addita rursus (quia nimium demsimus) quinta, demtaque iterum (quia nimium re-adjecimus) septima, et ita porro. »

$$\cdot 2 \quad \pi/4 = \sum_{j=1}^n [C(2, n)]^2 \mid n, N_0 \{ = \sum_{j=1}^n [1 + 4 + (2 \times 4)^2 + \dots]$$

$$\{ \text{GAUSS, Werke, t.3 \}$$

$$\cdot 3 \quad \pi^2/6 = \sum N_1^{-2}$$

$$\{ \text{EULER a.1736, PetrC. a.1734-35 t.7 (edito a.1740) \}$$

$$\cdot 4 \quad \pi^4/90 = \sum N_1^{-4}$$

$$\cdot 41 \quad m \in N_1 \cdot \supset. \sum N_1^{-2m} \in R\pi^{2m}$$

$$\{ \text{Joh. BERNOULLI t.4 p.24 \}$$

$$\cdot 5 \quad \pi^2/8 = 1 + 3^{-2} + 5^{-2} + 7^{-2} + \dots$$

$$\cdot 6 \quad \pi^3/32 = 1 - 3^{-3} + 5^{-3} - \dots \quad 5\pi^5/1536 = 1 - 3^{-5} + 5^{-5} - \dots$$

$$\{ \text{EULER a.1748 p.137 \}$$

$$\cdot 7 \quad -\log(\pi/4) = \sum (2N_1+1)^{-2} + \sum (2N_1+1)^{-4}/2 + \sum (2N_1+1)^{-6}/3 + \dots$$

$$\{ \text{EULER a.1748 p.150 \}$$

$$\cdot 8 \quad \log(\pi^2/6) = \sum Np^{-2} + \sum Np^{-4}/2 + \sum Np^{-6}/3 + \dots$$

$$\{ \text{EULER a.1748 p.235 \}$$

$$\begin{aligned} \cdot 9 \quad \pi &= 1 + 2 + 3 + 4 - 5 + 6 + 7 + 8 + 9 - 10 + \dots \\ &= \Sigma \{ (n) \times (-1)^n [\text{mp}(r, n) | r, \text{Np}(4N_1 - 1)] | n, N_1 \} \\ &\{ \text{EULER CM. t.1 p.557 } \} \end{aligned}$$

$$* \quad 8 \cdot 1 \quad x \varepsilon q = n \quad \cdot \supset \quad \pi^2 [s(\pi x)]^2 = \Sigma [(x+n)^2 | n, n]$$

$$\begin{aligned} \cdot 2 \quad x \varepsilon q = n \quad \cdot \supset \quad \pi / t(\pi x) &= /x + 2x \Sigma [/(x^2 - n^2) | n, N_1] \\ &= \lim [ \Sigma / (x-r) | r, -n \dots n ] | n \quad \{ \text{EULER a.1748 p.159 } \} \end{aligned}$$

$$\cdot 3 \quad x \varepsilon q' = n \quad \cdot \supset \quad \pi [e^{\pi x} + e^{\pi(-\pi x)}] / [e^{\pi x} - e^{\pi(-\pi x)}] =$$

$$/x + \Sigma \{ 2x / (n^2 + x^2) | n, N_1 \}$$

$$\cdot 4 \quad a \varepsilon \theta \pi / 2 \quad \cdot \supset \quad /a = /ta + \Sigma \{ 2^{-r} t(2^{-r} a) | r, N_1 \}$$

$$\{ \text{EULER a.1746 CorrM. t.1 p.371 } \}$$

\* 9.

$$\cdot 1 \quad x \varepsilon q = 2n\pi \quad a \varepsilon (Qf N_0) \text{decr} \quad \cdot \lim a = 0 \quad \cdot \supset \quad \Sigma (a_r e^{r\pi} | r, N_0) \varepsilon q'$$

$$\begin{aligned} \cdot 2 \quad a \varepsilon (Qf N_0) \text{decr} \quad \cdot \lim a = 0 \quad \cdot \supset \quad & \\ x \varepsilon q = 2n\pi \quad \cdot \supset \quad \Sigma [a_r c(r\pi) | r, N_0] \varepsilon q & : \quad x \varepsilon q \quad \cdot \supset \quad \Sigma [a_r s(r\pi) | r, N_0] \varepsilon q \\ & [ = P \cdot 1 ] \end{aligned}$$

\* 10.

$$\begin{aligned} \cdot 1 \quad \pi &= 2(2/1) (2/3) (4/3) (4/5) (6/5) (6/7) \dots \\ &= 4\Pi[(1-n^{-2}) | n, 2N_1+1] = 2/\Pi[(1-n^{-2}) | n, 2N_1] \\ &= 2\Pi\{2E[(n+1)/2] / [2E(n/2)+1] | n, N_1\} \\ &\{ \text{WALLIS a.1655 t.1 p.469:} \} \end{aligned}$$

«Dicimus, fractionem illam  $\frac{3 \times 3 \times 5 \times 5 \times 7 \times 7 \times \&c.}{2 \times 4 \times 4 \times 6 \times 6 \times 8 \times \&c.}$  seu  $\frac{9 \times 25 \times 49 \times 81 \&c.}{8 \times 24 \times 48 \times 80 \&c.}$  in infinitum continuatam, esse ipsissimum quaesitum numerum  $\square$  praece ad quem ita se habet 1, ut Circulus ad Quadratum Diametri » {

$$\begin{aligned} \cdot 2 \quad n \varepsilon N_1 \quad \cdot \supset \quad C(2n, n) &< 2^{2n} / \sqrt{(n\pi)} \\ &> 2^{2n} / \sqrt{[(n+1/2)\pi]} \quad [ P \cdot 1 \cdot \supset P \cdot 2 ] \end{aligned}$$

$$\cdot 3 \quad x \varepsilon q \quad \cdot \supset \quad s x = x \Pi [(1 - x^2 n^{-2} \pi^{-2}) | n, N_1] \quad \{ \text{EULER a.1748}$$

$$\cdot 4 \quad \quad \quad c x = \Pi [(1 - 4x^2 n^{-2} \pi^{-2}) | n, 2N_0 + 1] \quad \text{p.120}$$

$$\begin{aligned} \cdot 5 \quad x \varepsilon \theta \pi / 2 \quad \cdot \supset \quad \Pi \{ \cos(x/2^n) | n, N_1 \} &= \sin x / x \\ &\{ \text{EULER a.1737 PetrC. t.9 p.235 } \} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cdot 6 \quad x \varepsilon q' \quad \cdot \supset \quad (e^x - e^{-x}) / 2 &= x(1 + x^2 \pi^{-2})(1 + x^2 2^{-2} \pi^{-2}) \dots \\ &= x \Pi [(1 + x^2 \pi^{-2} n^{-2}) | n, N_1] \end{aligned}$$

$$\cdot 7 \quad x \varepsilon q' \supset (e^x + e^{-x})/2 = (1 + 4x^2\pi^{-2})(1 + 4x^23^{-2}\pi^{-2})\dots$$

$$\hline = \prod (1 + 4x^2\pi^{-2}n^{-2}) \mid n, 2N_0 + 1 \}$$

$$\} \text{EULER a.1748 p.119,120 \}$$

Functiones in P.6 et .7 dicere sinu et cosinu « hyperbolico » et indicare per  $\text{Sh}x$ ,  $\text{Ch}x$  (Riccatti a.1757).

$$\cdot 8 \quad \lim(n! n^{-n} e^n / \sqrt{n}) \mid n = \sqrt{2\pi} \quad \} \text{STIRLING a.1730 p.137 \}$$

B  $\pi$ 

$$\ast \quad 11 \cdot 4 \quad n \varepsilon N_1 \supset \Sigma(N_1^{-2n}) = 2^{2n-1} \pi^{2n} B_n / (2n)! \quad .$$

$$2\Sigma(2N_0+1)^{-2n} = -\Sigma[(-1)^r / r^{2n} \mid r, N_1] = (2^{2n}-1) \pi^{2n} B_n / (2n)! \quad .$$

$$\} \text{JOH. BERNOULLI t.4 p.21 \}$$

$$\cdot 2 \quad \lim(n^2 B_n / B_{n+1}) \mid n = \pi^2$$

$$\cdot 3 \quad \lim B_n (\pi e / n) \backslash (2n+2) \mid n = 4\pi \sqrt{e}$$

$$\cdot 4 \quad x \varepsilon q' \neq 0 \cdot \text{mod } x < 2\pi \supset$$

$$x / (e^x - 1) = 1 - x/2 + \Sigma[(-1)^r B_r x^{2r} / (2r)! \mid r, N_1]$$

$$\cdot 5 \quad a \varepsilon N_1 \cdot n \varepsilon N_1 + 1 \supset \log a! \varepsilon (\log 2\pi)/2 - a + (a+2)\log a$$

$$+ \Sigma[(-1)^r B_{r+1} / [(2r+1)(2r+2)] a^{-2r+1} \mid r, 0 \dots (n-1)] +$$

$$\theta(-1)^n B_{n+1} / [(2n+1)(2n+2)] a^{-2n+1} \quad \} \text{STIRLING a.1730 \}$$

$$\ast \quad 12 \cdot 1 \quad x \varepsilon q \neq 0 \cdot \text{mod } x < \pi \supset$$

$$/\sin x = /x + \Sigma[2(2^{2n+1}-1) B_{n+1} x^{2n+1} / (2n+2)! \mid n, N_1]$$

$$\cdot 2 \quad x \varepsilon q \cdot \text{mod } x < \pi/2 \supset$$

$$\text{tng} x = \Sigma[2^{2n} (2^{2n}-1) B_n x^{2n-1} / (2n)! \mid n, N_1]$$

$$= x + x^3/3 + 2x^5/(3 \times 5) + 17x^7/(5 \times 7 \times 9) + \dots$$

$$\cdot 3 \quad \text{Hp} \cdot 1 \supset x / \text{tng} x = 1 - \Sigma[2^{2n} B_n x^{2n} / (2n)! \mid n, N_1]$$

$$\cdot 4 \quad \text{Hp} \cdot 1 \supset \log(\sin x / x) = -\Sigma[2^{2n-1} B_n x^{2n} / (n(2n)!) \mid n, N_1]$$

$$\cdot 5 \quad x \varepsilon q \cdot \text{mod } x < \pi/2 \supset$$

$$\log \cos x = -\Sigma[(2^{2n}-1) 2^{2n-1} B_n / (n(2n)!) x^{2n} \mid n, N_1]$$

$$= -x^2/2! - 2x^4/4! - 16 \times 17 x^6/8! - \dots$$

$$\cdot 6 \quad x \varepsilon q \neq 0 \cdot \text{mod } x < \pi/2 \supset$$

$$\log(\text{tng} x / x) = \Sigma[(2^{2n-1}-1) 2^{2n} B_n / (n(2n)!) x^{2n} \mid n, N_1]$$

$$\} \text{EULER a.1748 p.152 \}$$

§5  $\log^* \sin^{-1} \cos^{-1} \text{tng}^{-1}$ 

- \* 1.1  $x \in \mathbb{C} \setminus \{0\} \Rightarrow \log^* x = q' \wedge y \exists (e^y = x)$  Df
- 2  $\log x = r (\log^* x) \wedge y \exists (-\pi < \text{imag} y \leq \pi)$  Df
- 3  $\sin^{-1} = s^{-1} = [s, (-\pi/2)^{\neg} (\pi/2)]^{-1}$  Df
- 4  $\cos^{-1} = c^{-1} = [c, \Theta\pi]^{-1}$  Df
- 5  $\text{tang}^{-1} = t^{-1} = [t, (-\pi/2)^{\neg} (\pi/2)]^{-1}$  Df

$\log^* x$  indica classe de solutiones de equatione  $e^y = x$ .

$\log x =$  « valore principale de logarithmo », indica solutione que habet coefficiente de unitate imaginario inter  $-\pi$  et  $+\pi$ .

Si  $y$  es quantitate inter  $-1$  et  $+1$ ,  $\sin^{-1} y$  indica quantitate, minimo in valore absoluto, de que sinu es  $y$ . Idem per  $\cos^{-1} y$ , quem nos sume inter limite  $0$  et  $\pi$ ; et  $\text{tng}^{-1} y$ , inter limite  $-\pi/2$  et  $\pi/2$ .

Ce functiones es inverso de  $\sin$ ,  $\cos$ ,  $\text{tang}$ .

Notatione que nos adopta es de usu generale in Anglia. Vige et notatione  $\text{arc} \sin y$ ,  $\text{arc}(\sin = y)$ .

Euler, BerolMisc. a.1743 t.7 p.167, adopta notatione:  $\sin Ax$ ,  $A \sin x$ , per:  $\sin x$ ,  $\sin^{-1} x$ ;  $A$  es litera initiale de Arcu.

Logarithmo imaginario occurrit in:

{ COTES a.1714 LondonT. t.29 p.32:

« ... si quadrantis circuli quilibet arcus  $x$ , radio CE [1] descriptus sinum habeat CX [ $\sin x$ ], sinumque complementi ad quadrantem XE [ $\cos x$ ]: sumendo radio CE pro Modulo, arcus erit rationis inter EX+XC  $\sqrt{-1}$  et CE [ $\cos x + i \sin x$ ] mensura ducta in  $\sqrt{-1}$ . »

{ EULER a.1728 (Vide BM. a.1899 p.46):

« Sit radius circuli  $a$  ... habebis quadrans circuli  $= \frac{aa}{4\sqrt{-1}} \log(-1)$ . »

- \* 2.1  $r \in \mathbb{Q} \setminus \{0\} \Rightarrow \log(re^{ix}) = \log r + i r$   
 $\text{imag} \log x$  vocare « argumento, amplitudo, azimuth, anomalia, ... » de  $x$   
 Numero imaginario, de modulo  $r$ , et de argumento  $x$ , vale  $re^{ix}$ .

- 2  $x \in \mathbb{C} \setminus \{0\} \Rightarrow \log^* x = \log x + 2n\pi i$   
 $[y \in \log^* x \Rightarrow e^{\neg} (y - \log x) = 1 \Rightarrow y - \log x \in 2n\pi i]$
- 3  $\log i = i\pi/2 \quad \log(-1) = \pi i$

- \* 3.  $y \in (-1)^{\neg} 1 \Rightarrow$

- 1  $s^{-1} y = r \wedge x \exists (s r = y, -\pi/2 \leq x \leq \pi/2)$  Dfp
- 11  $c^{-1} y = r \wedge x \exists (c x = y, 0 \leq x \leq \pi)$  Dfp

$$\cdot 2 \quad q \wedge x3(sx=y) = (2n\pi+s^{-1}y) \vee (\pi+2n\pi-s^{-1}y)$$

$$\cdot 21 \quad q \wedge x3(cx=y) = (2n\pi+c^{-1}y) \vee (2n\pi-c^{-1}y)$$

$$\cdot 3 \quad s^{-1}y+c^{-1}y=\pi/2 \quad \cdot 31 \quad cs^{-1}y=\sqrt{1-y^2}$$

$$\cdot 4 \quad s^{-1}y = -i \log[\sqrt{1-y^2} + iy] \quad \text{Dfp}$$

$$\cdot 41 \quad c^{-1}y = -i \log[y + i\sqrt{1-y^2}] \quad \text{Dfp}$$

$$\cdot 3 \quad p, q \varepsilon q. q^2 < p^2. \supset.$$

$$q \wedge x3(x^2-3px+2q=0) = 2\sqrt{p}c/[c^{-1}(qp-3/2)+(0\cdots 2)\pi]. 3\{$$

} VIETA Opera a.1615 p.159 }

Resolutio trigonometrica de aequatione de gradu 3.

\* 4.  $y \varepsilon q. \supset$ :

$$\cdot 1 \quad t^{-1}y = i q \wedge x3(tx=y, -\pi/2 < x < \pi/2) \quad \text{Dfp}$$

$$\cdot 2 \quad t^{-1}y = \log[(1+yi)/(1-yi)]/(2i) \quad \text{Dfp}$$

} Joh. BERNOULLI t.1 p.409; EULER a.1748 p.105 }

$$\cdot 3 \quad q \wedge x3(tx=y) = n\pi + t^{-1}y$$

$$\cdot 4 \quad y \varepsilon Q. \supset. t^{-1}y + t^{-1}/y = \pi/2$$

$$\cdot 5 \quad x \varepsilon Q. y \varepsilon q. \supset. \log(x+iy) = \log \sqrt{x^2+y^2} + i t^{-1}(y/x)$$

\* 5.

$$\cdot 1 \quad x, y \varepsilon q. \text{mod}(xy) < 1. \supset. t^{-1}[(x+y)/(1-xy)] = t^{-1}x + t^{-1}y$$

$$\cdot 2 \quad a \varepsilon N_1, x, y \varepsilon N_1, xy = a^2 + 1, b = a+x, c = a+y. \supset.$$

$$t^{-1}/a = t^{-1}/b + t^{-1}/c$$

$$[a, b, c \varepsilon N_1. \supset: t^{-1}/a = t^{-1}/b + t^{-1}/c. \Rightarrow, bc = a(b+c) + 1. \Rightarrow, \\ (b-a)(c-a) = a^2 + 1]$$

$$\cdot 3 \quad \pi = 4t^{-1}1$$

$$\cdot 4 \quad \pi = 4(t^{-1}/2 + t^{-1}/3)$$

$$\cdot 41 \quad \pi = 8t^{-1}/3 + 4t^{-1}/7 \quad \text{ } \} \text{EULER a.1737 PetrC. t.9 p.231 }$$

$$[ (f/3, f/7) | (x, y) \text{P.1. } \supset. \text{tng}^{-1}/2 = \text{tng}^{-1}/3 + \text{tng}^{-1}/7 \quad (1)$$

$$(1), \text{P.3. } \supset. \text{Ths } ]$$

$$\cdot 42 \quad \pi = 8t^{-1}/2 - 4t^{-1}/7 \quad \text{ } \} \text{BERTRAND a.1855 p.301 }$$

$$\cdot 43 \quad \pi = 16t^{-1}/5 - 4t^{-1}/239 \quad \text{ } \} \text{MACHIN; v. JONES a.1706 p.263 }$$

$$[ (f/5, f/5) | (x, y) \text{P.1. } \supset. \text{tng}^{-1} 5/12 = 2\text{tng}^{-1}/5 \quad (1)$$

$$[ 5/12, 5/12 ] | (x, y) \text{P.1. (1). } \supset. \text{tng}^{-1} 120/119 = 4\text{tng}^{-1}/5 \quad (2)$$

$$(120/119, -1) | (x, y) \text{P.1. } \supset. \text{tng}^{-1} 239 = \text{tng}^{-1} 120/119 - \text{tng}^{-1} 1 \quad (3)$$

$$(2), (3), \text{P.6. } \supset. \text{Ths } ]$$

- \*5  $\pi = 4(t^{-1}/2 + t^{-1}/5 + t^{-1}/8)$  } DANSE a.1844 p.198 {  
 \*6  $\pi = 20t^{-1}/7 + 8t^{-1}/79$  } VEGA a.1794 p.633 {  
 \*7  $\pi = 16 t^{-1}/5 - 4 t^{-1}/70 + 4 t^{-1}/99$   
 } EULER a.1737 PetrC. t.9 p.232 {  
 \*8  $(m, n, r, y) \in \{m, n \in \mathbb{N}, x, y \in \mathbb{N}, x < y, m t^{-1}/r + n t^{-1}/y = \pi/4\}$   
 $= \{ (1, 1, 2, 3) \cup \{ (2, -1, 2, 7) \cup \{ (2, 1, 3, 7) \cup \{ (4, -1, 5, 239) \}$   
 } STÖRMER BsF. a.1899 t.27 p.170 {

\* 6.1  $x \in \mathbb{Q}' \cdot \text{mod } x \leq 1 \cdot x = -1 \cdot \bigcup$ .

$$\log(1+x) = x - x^2/2 + x^3/3 - \dots \quad [ (q|q) \text{ Dem §6.1 } ]$$

Serie de  $\log(1+x)$  considerato in §6.1, subsiste pro  $x$  imaginario, si suo modulo es minore de 1, et si suo modulo vale 1, exceptuato  $x = -1$ ; da valore principale de logarithmo.

Contine, ut casu particolare P6.2 ... 9 et P7.1. P6.1 es successivo es noto ad Eulero a.1748.

$$*2 \quad x \in \mathbb{Q} = n\pi \cdot \bigcup \cdot \log[2c(x/2)] = c \cdot x - c(2x)/2 + c(3x)/3 - \dots$$

$$*3 \quad x \in (-\pi)^{-\pi} \cdot \bigcup \cdot x/2 = s \cdot x - s(2x)/2 + s(3x)/3 - \dots$$

} EULER PetrNC. a.1760 t.5 p.204 {

[  $e|x$  P.1. Oper real. Oper imag.  $\bigcup$ . P.2.3 ]

$$*4 \quad x \in 2\theta\pi \cdot \bigcup \cdot s \cdot x + s(2x)/2 + s(3x)/3 + \dots = (\pi - x) \cdot 2$$

[  $(\pi - x)|x$  P.3  $\bigcup$ . P ]

} EULER PetrNC. a.1774 t.19, *Calc. Int.* a.1794 t.4 p.235 {

$$*5 \quad x \in \theta\pi \cdot \bigcup \cdot s \cdot x + s(3x)/3 + s(5x)/5 + \dots = \pi \cdot 4$$

[ P.3.4. Oper+  $\bigcup$ . P ]

} EULER, *Calc. Diff.*, Pars II, Art. 57-93 {

$$*6 \quad x \in \mathbb{Q} = n\pi \cdot \bigcup \cdot \log[2s(x/2)] = -c \cdot x - c(2x)/2 - c(3x)/3 - \dots$$

[  $(\pi - x)|x$  P.2  $\bigcup$ . P ]

$$r \in \mathbb{Q} \cdot \text{mod } r < 1 \cdot x \in \mathbb{Q} \cdot \bigcup$$

$$*7 \quad \log \sqrt[3]{(1 + 2r \cdot c \cdot x + r^3)} = r \cdot c \cdot x - r^3 c(2x)/2 + r^3 c(3x)/3 - \dots$$

$$*8 \quad t^{-1}[r \cdot s \cdot x / (1 - r \cdot c \cdot x)] =$$

$$r \cdot s \cdot x + r^3 s(2x)/2 + r^3 s(3x)/3 + \dots = \sum [r^n s(n \cdot x)/n \mid n, N_1]$$

[  $r \in \mathbb{Q} | x$  P.1  $\bigcup$  P.7.8 ]

Delambre a.1808 applica P.7.8 ad quaestiones de Geodæsia.

$$* 7.1 \quad y \in \mathbb{Q} \cdot -1 \leq y \leq 1 \cdot \bigcup \cdot t^{-1}y = y - y^3/3 + y^5/5 - \dots$$

} LEIBNIZ a.1673-74, *MathS.* t.5 p.401 {

[  $(y, \pi/2) \mid (r, x)$  P6.8.3  $\bigcup$ . P ]

*Commercio epistolico*, etc., publicato in 1722, tribue ce P ad Jac. Gregory, secundo copia de litera de 1671 ad Collins.

Sed, secundo Joh. Bernoulli, (Leibniz MathS. t.3 p.917,934), authenticitate de ce litera es dubio.

$$^2 y \varepsilon q . n \varepsilon N_1 . \supset .$$

$$t^{-1}y \varepsilon y - y^3/3 + y^5/5 - \dots \mp y^{2n-1}/(2n-1) \pm \theta y^{2n-1}/(2n+1)$$

\* 8.

$$^1 y \varepsilon \theta . \supset . s^{-1}y = y + 1/(2 \times 3) y^3 + (1 \times 3)/(2 \times 4 \times 5) y^5 + (1 \times 3 \times 5)/(2 \times 4 \times 6 \times 7) y^7 + \dots \quad \{ \text{NEWTON a.1676} \}$$

$$^2 y \varepsilon q . \text{mod } y < 1 . m \varepsilon q . \supset .$$

$$s(ms^{-1}y) = my + \sum m \Pi [(2r+1)^2 - m^2] |r, 0 \dots n| y^{2n+8}/(2n+3)! |n, N_1\{$$

$$^3 \text{Hp}^2 . \supset . c(ms^{-1}y) =$$

$$1 + \sum (-1)^{n+1} \Pi [(m^2 - 4r^2) |r, 0 \dots n| y^{2n+2}/(2n+2)! |n, N_0\{$$

\{ EULER Calc. integr. p.101-106 \}

$$^4 m \varepsilon Q . x \varepsilon \theta \pi/2 . \supset . \tan^{-1}(m \tan x) =$$

$$x + \sum [(m-1)/(m+1)]^n \sin(2nx)/n |n, N_1\{$$

$$* \quad ^1 \pi = 4 \sum t^{-1}/(2n^2) |n, N_1\{$$

\{ PEACOCK a.1820 *Er. of the diff. Calc.*, Cambridge p.67 \}

$$^2 \pi = 4 \sum t^{-1}(2^n - 1) |n, N_1 + 1\{ = 4(t^{-1}/3 + t^{-1}/7 + t^{-1}/15 + \dots)$$

\{ PEACOCK a.1820 p.68 \}

$$^3 \pi = 4 \sum t^{-1}/(n^2 + n + 1) |n, N_1\{ \quad \{ \text{EULER PetrNC. a.1764 t.9} \}$$

## §6 ang

$$* \quad 1. \quad u, r, w \varepsilon v \neq 0 . \supset . \quad ^0 \quad \text{ang}(u, r) = \cos^{-1}[\cos(u, r)] \quad \text{Df}$$

$$^1 \quad \text{ang}(u, r) \varepsilon \theta \pi \quad \text{ang}$$

$$^2 \quad \text{ang}(u, r) = \text{ang}(r, u) = \text{ang}(-u, -r) = \text{ang}(Uu, Ur) \\ = \pi - \text{ang}(u, -r) \quad \{ \text{EUCLIDE I P15 13} \}$$

$$^3 \quad \text{ang}(u, w) \leq \text{ang}(u, r) + \text{ang}(r, w) \quad \{ \quad * \quad \text{XI P20} \}$$

$$^4 \quad \text{ang}(u, r) + \text{ang}(r, w) + \text{ang}(w, u) \leq 2\pi \quad \{ \quad * \quad 21 \}$$

$$[ \text{P}^3 . \supset . \text{ang } r, w \leq \text{ang } -u, v + \text{ang } -u, w) . \supset .$$

$$\text{ang}(u, r) + \text{ang}(u, w) + \text{ang}(r, w) \leq [\text{ang } u, r] + \text{ang}(-u, r) + [\text{ang}(u, w) \\ + \text{ang } -u, w] = \pi + \pi ]$$

$$\cdot 5 \quad \cos(u, v) = \cos \text{ang}(u, v) \quad . \quad \sin(u, v) = \sin \text{ang}(u, v) \quad \text{Dfp}$$

$\text{ang}(u, v)$  es angulo des vectore  $u$  et  $v$ , rato ut numero.

Angulo de vertice puncto  $o$ , rato ut loco de punctos, es  $o + Qu + Qv$ .

Geometria et considera angulos ut systema de grandore homogeneo.

Nostro  $\text{ang}(u, v)$  es ratione de angulo de vectores  $u$  et  $v$ , ut grandore, ad angulo dicto « radiante », que es angulo clauso per arcu de circulo aequale ad radio. Unde:

$$(\text{angulo recto}) = \pi/2(\text{radiante})$$

$$\text{gradu sexagesimale: } 1^\circ = (\text{angulo recto})/90 \quad , \quad 1' = 1^\circ/60 \quad , \quad 1'' = 1'/60$$

$$\text{gradus centesimalis } 1^s = (\text{angulo recto})/100$$

$$\text{seque: } \text{radiante} = 57^\circ, 29577951308 \quad (\text{Calculato per Cotes, a.1722 p.95})$$

$$= 3437', 7467707849$$

$$= 206264'', 806247$$

$$* \quad 2. \quad p, q \in p \cdot p = q \cdot r \in p = \text{recta}(p, q) \cdot a = d(q, r) \cdot b = d(r, p) \cdot$$

$$c = d(p, q) \cdot a' = \text{ang}(p-q, p-r) \cdot b' = \text{ang}(q-r, q-p) \cdot$$

$$c' = \text{ang}(r-p, r-q) \cdot s = (a+b+c)/2 \quad \cdot \bigcirc \cdot$$

$$\cdot 1 \quad a=b \quad . \quad a'=b' \quad \quad \quad \{ \text{EUCLIDE I P 5, 6} \}$$

$$\cdot 2 \quad a < b \quad . \quad a' < b' \quad \quad \quad \{ \quad \quad \quad \cdot \quad \quad 18, 19 \}$$

$$\cdot 3 \quad a' + b' + c' = \pi \quad [ \text{P1.4} ] \quad \quad \quad \{ \text{EUCLIDE I P32} \}$$

$$\cdot 4 \quad a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos a' \quad \quad \quad [ = \text{IV §vet P13.1} ]$$

$$\cdot 5 \quad \sin a'/a = \sin b'/b = \sin c'/c$$

$$\{ \text{NASÎR EDDIN ATTÛSÎ a.1260 l.III} \}$$

$$[ \quad p-r = (p-q) + (q-r) \quad \cdot \bigcirc \cdot \quad [\text{cmp } \perp \quad p-q] \quad p-r = [\text{cmp } \perp \quad (p-q)](q-r)$$

$$\text{Oper mod } \cdot \bigcirc \cdot \quad \text{P} \quad ]$$

$$\cdot 6 \quad bc \sin a' = 2 \sqrt{[s(s-a)(s-b)(s-c)]} \quad \{ \text{HERONE a.-150 p.286} \}$$

$(bc \sin a')/2$  es area de triangulo  $pqr$ .

$$\cdot 7 \quad \sin(a'/2) = \sqrt{[(s-b)(s-c)(bc)]} \quad . \quad \cos(a'/2) = \sqrt{[s(s-a)(bc)]} \quad .$$

$$\text{tng}(a'/2) = \sqrt{[(s-b)(s-c)[s(s-a)]]}$$

$$\cdot 8 \quad \text{tng}[(a'-b')/2] / \text{tng}[(a'+b')/2] = (a-b)/(a+b)$$

$$* \quad 3. \quad u \in v = 0 \cdot r \in v = qu \cdot w \in v = (qu + qr) \quad \cdot \bigcirc \cdot$$

$$\cdot 0 \quad \text{ang}(u; r, v) = \text{ang}[(\text{cmp } \perp \quad u)v, (\text{cmp } \perp \quad u)w]$$

Df

= angulo dihedro determinato per planos  $ur$  et  $uw$ .

$$a = \text{ang}(r, v) \cdot b = \text{ang}(v, u) \cdot c = \text{ang}(u, r) \cdot a' = \text{ang}(u; r, v) \cdot b' = \text{ang}$$

$$(r; v, u) \cdot c' = \text{ang}(v; u, r) \cdot s = (a+b+c)/2 \cdot s' = (a'+b'+c')/2 \quad \cdot \bigcirc \cdot$$

$$\cdot 01 \quad a < b+c \quad . \quad a+b+c < 2\pi \quad \quad \quad [ = \text{P53.5.6} ]$$



$$\cdot 02 \quad a=b \Rightarrow a'=b' \qquad \cdot 03 \quad a < b \Rightarrow a' < b'$$

$$\cdot 04 \quad a' > b' + c - \pi \quad . \quad \pi < a' + b' + c' < 3\pi$$

$$\cdot 1 \quad \cos a = \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos a'$$

$$\begin{aligned} [ \cos c, w ] &= U r \wedge U w \\ &= [ \text{emp} [ a \wedge r - \text{emp} \_ u \wedge r ] \wedge [ \text{emp} [ a \wedge w - \text{emp} \_ u \wedge w ] \\ &= [ \text{emp} [ a \wedge r ] \wedge [ \text{emp} [ u \wedge r ] - [ \text{emp} \_ u \wedge r ] \wedge [ \text{emp} [ a \wedge w ] \wedge [ \text{emp} \_ u \wedge w ] \supset P ] \\ & \quad \} \text{AL BATTANI a.929; vide BD. a.1892 p.147; } \\ & \quad \} \text{REGIOMONTANUS a.1533 p.127:} \end{aligned}$$

\* In omni triangulo sphaericali ex arcibus circulorum magnorum constante, proportio sinus versi anguli cuiuslibet  $[1 - \cos a]$  ad differentiam duorum sinuum versorum, quorum unus est lateris eum angulum subtendentis  $[1 - \cos a]$ , alius vero differentiae duorum arcuum ipsi angulo circumiacentium  $[1 - \cos b \cos c - \sin b \sin c]$  est tanquam proportio quadrati sinus recti totius  $[1]$  ad id, quod sub sinibus arcuum dicto angulo circumpositorum continetur rectangulum  $[\sin b \sin c]$ . -;

Demonstratione de ce P, dicto theorema fundamentale de trigonometria de sphaera, es traductione de illo dato per Cauchy (s.1 t.9 p.264), per methodo de projectiones. Substitutione de projectiones per productos  $\wedge$ , reduce duo pagina de Cauchy ad duo linea.

$$\cdot 11 \quad \text{Dm P1} \cdot 3 \qquad [ P \cdot 1 \supset \cos a \geq \cos b \wedge c \quad . \text{ Oper } \cos^{-1} \supset P ]$$

$$\cdot 2 \quad \sin a' / \sin a = \sin b' / \sin b = \sin c' / \sin c$$

$$\} \text{ABŪ' LWĒFA a.940-998; vide } Journal \text{ Asiatique a.1892 s.8 t.19 p.423; }$$

$$\} \text{REGIOMONTANO a.1533 p.95:}$$

\* In omni triangulo ... sinus laterum ad sinus angulorum eis oppositorum eandem habent proportionem ...;

$$\cdot 3 \quad \cos a' = - \cos b' \cos c' + \sin b' \sin c' \cos a$$

$$\cdot 4 \quad \cos b \cos c' = \sin b \operatorname{tnga} - \sin c' \operatorname{tnga'}$$

$$\cdot 5 \quad \sin b \sin c \sin a' = 2 \sqrt{[\sin s \sin(s-a) \sin(s-b) \sin(s-c)]} \quad .$$

$$\cdot 6 \quad \sin(a' \cdot 2) = \sqrt{[\sin(s-b) \sin(s-c) (\sin b \sin c)]} \quad . \qquad \} \text{NEPER}$$

$$\cos(a' \cdot 2) = \sqrt{[\sin s \sin(s-a) (\sin b \sin c)]} \quad . \qquad \text{a.1614 p.48}$$

$$\sin(a \cdot 2) = \sqrt{[-\cos s' \cos(s'-a') (\sin b' \sin c')]} \quad .$$

$$\cos(a \cdot 2) = \sqrt{[\cos(s'-b') \cos(s'-c') (\sin b' \sin c')]} \quad .$$

$$\sin[(a'-b') \cdot 2] \sin(c \cdot 2) = \sin[(a-b) \cdot 2] \cos(c' \cdot 2) \quad .$$

$$\cos[(a'-b') \cdot 2] \sin(c \cdot 2) = \sin[(a+b) \cdot 2] \sin(c' \cdot 2) \quad .$$

$$\sin[(a'+b') \cdot 2] \cos(c \cdot 2) = \cos[(a-b) \cdot 2] \cos(c' \cdot 2) \quad .$$

$$\cos[(a'+b') \cdot 2] \cos(c \cdot 2) = \cos[(a+b) \cdot 2] \sin(c' \cdot 2) \quad .$$

$$\} \text{DELABRE } Connaitss. des temps, \text{ a.1807; }$$

$$\begin{aligned} \operatorname{tng}[(a'+b')/2] &= [\operatorname{tng}(c'/2) \cos[(a-b)/2] \cos[(a+b)/2] \cdot \\ \operatorname{tng}[(a'-b')/2] &= \quad \sin \quad \sin \quad \cdot \\ &\quad \} \text{ NEPER a.1614 p.48 } \{ \\ \operatorname{tng}[(a+b)/2] &= \operatorname{tng}(c/2) \cos[(a'-b)/2] / \cos[(a'+b)/2]. \\ \operatorname{tng}[(a-b)/2] &= \quad \sin \quad \sin \quad \cdot \end{aligned}$$

$$\cdot 7 \quad [\sin(u, r, w)]^2 = 4 \sin s \sin(s-a) \sin(s-b) \sin(s-c)$$

Vide alios formula de trigonometria de sphaera in Formul. t.4 p.336.

$$\ast \quad 4.1 \quad a, b, c \varepsilon p. \quad d(a, b) = d(a, c) = d(b, c) = 1 \quad \cdot \cup.$$

$$\begin{aligned} \cos(b-a, c-a) &= \sin[a-b, a-(b+c)/2] = \sqrt{2} \cdot \\ \sin \quad \quad \quad &= \cos \quad \quad \quad = \sqrt{3} / 2 \end{aligned}$$

$$\cdot 2 \quad a, b, c, d \varepsilon p. \quad d(a, b) = d(a, c) = d(a, d) = d(b, c) = d(b, d) = d(c, d) = 1 \quad \cdot \cup.$$

$$\begin{aligned} \cos[(a+b)/2 - c, (a+b)/2 - d] &= \sqrt{3} \\ \sin \quad \quad \quad &= 2\sqrt{2} / 3 \\ \cos[(a+b)/2 - c, (a+b)/2 - (c+d)/2] &= \sqrt{2/3} \\ \sin \quad \quad \quad &= \sqrt{3} \end{aligned}$$

Angulos de triangulo et de tetrahedro regulare.

$$\ast \quad 5. \quad a, b \varepsilon p. \quad \cdot \cup.$$

$$\cdot 0 \quad \operatorname{ang}(a, b) = \min x \exists [p, q \varepsilon a \cdot p \equiv q \cdot r, s \varepsilon b \cdot r \equiv s \cdot x = \operatorname{ang}(p-q, r-s)]$$

Df

$$\cdot 1 \quad \operatorname{ang}(a, b) \varepsilon \Theta \pi / 2$$

$$\ast \quad 6. \quad a \varepsilon p. \cdot b \varepsilon p. \quad \cdot \cup. \quad P5 \cdot 0 \cdot 1$$

$$\cdot 2 \quad \operatorname{ang}(a, b) = \operatorname{ang}[a, (\operatorname{proj} b)'a]$$

Dfp

$$\ast \quad 7. \quad a, b \varepsilon p. \quad \cdot \cup.$$

$$\cdot 0 \quad \operatorname{ang}(a, b) = \max x \exists [r \varepsilon p. \cdot r \supset a \cdot x = \operatorname{ang}(r, b)]$$

Df

$$\cdot 1 \quad = P5 \cdot 1$$

P5-7. Angulo de duo recta, de recta cum plano, et de duo plano.

TABULA DE SIN ET TANG

Gradu	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
sin	·000	·173	·342	·500	·642	·766	·866	·939	·984	1·000
tang	·000	·176	·363	·577	·839	1·191	1·732	2·747	5·671	∞

§7 Rotat vel  $\mu$ 

Si  $a, b$  es vectore unitario et orthogonale, et nos voca  $i$  rotatione que fer  $a$  in  $b$ : et si  $t$  es quantitate reale, et  $u$  es vectore in plano  $a, b$ , tunc  $e^{it}u$  repraesenta vectore  $u$  rotato in plano  $a, b$ , de angulo que habe  $t$  pro mensura in radiantes.

$e^{i^2}a$  indica vectore  $a$  rotato de uno radiante. Unde resulta constructione simplice de radiante.

Per definitione:

$$e^i a = (1 + i + i^2/2! + i^3/3! + \dots)a$$

Contrue puncto  $o+a$ , adde  $ia$ , et resulta puncto  $o+a+ia$ . Adde  $(ia) \times i/2$ , id es termine praecedente rotato de angulo recto, et diviso per 2, et habe  $o+a+ia+i^2a/2$ . Adde  $i^3a/3! = (i^2a/2)i/3$ ,

id es termine praecedente rotato de angulo recto et diviso per 3. Et ita porro. Successione de punctos  $o, o+a, o+a+ia, \dots$  verge in modo rapido ad limite  $o+e^i a$ , extremo de arcu de centro  $o$ , et aequale ad radio  $a$ .

Signo  $e^{it}$  es multo importante in applicationes de Calculo ad Geometria. Signos Rotat, vel,  $\mu$  occurre solo in praesente §, que es exercitio.

\* 1.

$a, b \in V, a^2 = b^2 = 1, a \times b = 0, i = b'a, o \in p, q, r \in o+qa+qb, t, t' \in \mathbb{R}, m \in \mathbb{N}_1, u \in qa+qb \quad \supset$

0 Rotat( $o, i, t$ ) =  $[o + e^{it}(p - o) \mid p, o + qa + qb]$  Df  
= rotatione de punctos in plano  $o+qa+qb$ , circa  $o$ , de angulo de radiante.

1 Rotat( $o, i, t'$ ) Rotat( $o, i, t$ ) = Rotat( $o, i, t+t'$ )

2 Rotat( $o, i, t$ )<sup>m</sup> = Rotat( $o, i, mt$ )

3 Rotat( $q, i, -t$ ) Rotat( $p, i, t$ ) = Transl $[(1 - e^{-it})(q - p)]$

4 Rotat( $q, i, t$ ) = Transl $[(1 - e^{it})(q - p)]$  Rotat( $p, i, t$ )

5  $e^{it} = 1 \quad \supset$  Transl $u$  Rotat( $p, i, t$ ) = Rotat $[p + u/(1 - e^{it}), i, t]$

6 " Rotat( $p, i, t$ ) Transl $u$  = Rotat $[p - u/(1 - e^{it}), i, t]$

$$\cdot 7 \quad e^{i(t+t')} \Leftarrow 1 \quad \cdot \supset \quad \text{Rotat}(q, i, t') \text{ Rotat}(p, i, t) =$$

$$\text{Rotat}[p + (q - p)(1 - e^{it}) / (1 - e^{i(t+t')}), i, t + t']$$

·3·7 Producto de duo rotatione, in plano considerato, vale translatione vel rotatione.

·5·6 Producto de translatione per rotatione vale rotatione.

$$\ast \quad 2\cdot 0 \quad a \varepsilon \varphi^3 \quad \cdot \supset \quad \text{vela} = [I\omega(aax)|x, \varphi^1]$$

$$\cdot 1 \quad a \varepsilon \varphi^3 \quad \cdot \supset \quad \text{vela } \varepsilon \text{ (vf}\varphi^1\text{)lin}$$

$$\cdot 2 \quad a, b \varepsilon \varphi^3 \quad \cdot \supset \quad \text{vel}(a+b) = \text{vela} + \text{velb} \quad \text{Distrib}(\text{vel}, +)$$

$$\cdot 3 \quad a \varepsilon \varphi^3 \quad \cdot h \varepsilon q \quad \cdot \supset \quad \text{vel}(ha) = h \text{vela}$$

$$\cdot 4 \quad u \varepsilon v \quad \cdot \supset \quad (\text{vela})u = I[(\omega a)au] \quad [ \text{Df vel} \cdot \text{IV}\S\text{aP18}\cdot 3 \quad \cdot \supset \quad P ]$$

$$\cdot 5 \quad u \varepsilon v \quad \cdot \supset \quad u \times (\text{vela})u = 0 \\ [ u \times (\text{vela})u = u \times I[(\omega a)au] = ua(\omega a)au \cdot \psi = 0 ]$$

$$\cdot 6 \quad x, y \varepsilon p \quad \cdot \supset \quad (x-y) \times [(\text{vela})x] = (x-y) \times [(\text{vela})y]$$

$$\cdot 7 \quad n \varepsilon N_1, a \varepsilon p \text{ f1} \cdots n, u \varepsilon \text{ v f1} \cdots n, l \varepsilon \varphi^3 \quad \cdot \supset \quad \\ \Sigma[u, \times (\text{vel})a_r | r, 1 \cdots n] = la \Sigma(a_r au_r | r, 1 \cdots n) / \Psi$$

·0 Si  $a$  es forma de gradu 2, nos indica per  $\text{vela}$ , lege: «velocitate repraesentato per forma  $a$ », transformatione indicato. Determina motu infinitesimo de corpore rigido.

·2 Lege de compositione des motus infinitesimo.

·6 Resal, *Traité de Cinématique pure* a.1862 p.28: «Lorsqu'un [segment de longueur invariable] se meut dans l'espace, les projections des vitesses des deux [extrémités sur le segment] sont égales et de même sens».

·7 Summa considerato in primo membro es labore de systema de fortia  $u$  applicato ad pnnetos  $a$ , quando ce puntos sume motu repraesentato per forma  $l$ . Peano, Torino A. a.1895 d.125.

Königs, *Cinématique*, p.435: «Le travail virtuel est égal au produit du temps écoulé  $\delta t$  par le moment des deux systèmes de segments qui représentent, l'un le dynam des forces, et l'autre le système de rotations».

$$\ast \quad 3\cdot 0 \quad a \varepsilon \varphi^3 \quad \cdot \supset \quad \mu a = e \nabla (\text{vela}) \quad \text{Df}$$

$\mu a$  es «motu repraesentato per  $a$ , forma de gradu 2». Ce exponentiale es definito in §e P11.

$$\cdot 1 \quad a \varepsilon p^3 \quad \cdot \text{mod } \omega a = 1 \quad \cdot \supset \quad \mu(\pi a) = \text{Sym}(\text{rect} a a)$$

Si  $t \varepsilon q$ ,  $\mu(ta)$  repraesenta rotatione de  $t$  radiante circa axi  $a$ .

$$\cdot 2 \quad a \varepsilon v^3 \quad \cdot x \varepsilon p \quad \cdot \supset \quad (\mu a)x = x + Iu$$

$$\cdot 3 \quad a \in \mathbf{v}^3 \cdot \supset (\mu a, p) = \text{Transl}(Ia)$$

Si  $a$  es bivettore, substitutione  $\mu a$ , super punctos es translatione indicato per vectore  $Ia$ .

$$\cdot 4 \quad a \in \varphi^3 \cdot \supset (\mu a, p) \in \text{Motor}$$

$$\cdot 5 \quad m \in \text{Motor} \cdot \supset \exists \varphi^3 a \exists [m = (\mu a, p)]$$

Omni motu habet formam  $\mu a$ .

$$\cdot 6 \quad u, r \in \mathbf{v} \cdot \mu ar = 0 \cdot o \in p \cdot \supset$$

$$(\text{Sym } ou)(\text{Sym } or) = \mu[2\text{ang}(u, r) o \text{UI}(\mu ar)]$$

$$\cdot 7 \quad o \in p \cdot u, r, w \in \mathbf{v} \cdot \mu araw = 0 \cdot \supset$$

$$\mu[2\text{ang}(u, r) o \text{UI}(\mu ar)] \mu[2\text{ang}(r, w) o \text{UI}(\mu arw)] \mu[2\text{ang}(w, u) o \text{UI}(\mu awu)] = 1$$

Si  $o$  es puncto,  $u, r, w$  vectore non coplanare tunc: producto de tres rotatione circa axi per  $o$ , perpendiculari ad facie de trihedro  $(u, r, w)$ , et de angulo duplo de angulo de facie, vale identitate.

### §8 Fc (fractio continuo)

$$\ast \quad 1. \quad a \in \text{qfN}_1 \cdot n \in \mathbf{N}_1 \cdot \supset \cdot 0 \quad \text{Fc}(a, 1 \cdots 1) = a_1 \quad \text{Df}$$

$$\cdot 01 \quad \text{Fc}(a, 1 \cdots (n+1)) = [a_1 + \text{Fc}(a_{1+r}, r, 1 \cdots n)] \quad \text{Df}$$

$$\cdot 1 \quad \text{Fc}(a, \mathbf{N}_1) = \lim \text{Fc}(a, 1 \cdots n) | n \quad \text{Df}$$

$a$  es successione de quantitate, et  $n$  es numero.  $\text{Fc}(a, 1 \cdots n)$  indica fractio continuo formato per elementos  $a_1, a_2, \dots, a_n$ . Df per inductione.

$$\text{Notatione} \quad \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3 + \dots}}} \quad \text{non es commodo.}$$

Cataldi, *Trattato del modo brevissimo di trouare la Radice quadra...* a.1613 p.70:

« Notisi, che non si potendo comodamente nella stampa formare i rotti, & rotti di rotti come andariano,... noi da qui inanzi gli formaremo tutti à questa similitudine

$$\text{Di 18. la R sia } 4. \& \frac{2}{8} \& \frac{2}{8} \& \frac{2}{8} \& \frac{2}{8}$$

facendo vn punto all'8 denominatore di ciascun rotto, à significare, che il seguente rotto è rotto d'esso denominatore. »

J. Müller *Allg. Arithm.* a.1838 introduce notatione  $\frac{1}{a_1} \cdot \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}$ , modificato in  $\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_2} + \dots$  per alios.



- \* 10.  $a \in N_1, n \in N_1, \supset$ .  $\cdot 1 \quad Fc(a, N_1) \in \theta - R$   
 $\cdot 2 \quad Fc(a, N_1) - Fc(a, 1 \cdots n) \in \theta(-1)^n \cdot \{dt Fc(a, 1 \cdots n)\}^2$   
 $\cdot 3 \quad Fc(a, 1 \cdots 2n) < Fc(a, N_1) < Fc(a, 1 \cdots (2n-1))$   
 $\cdot 4 \quad b, c \in N_1, \text{ mod } [Fc(a, N_1) - b/c] < \text{mod } [Fc(a, N_1) - Fc(a, 1 \cdots n)]$   
 $\supset b > nt Fc(a, 1 \cdots n) \cdot c > dt Fc(a, 1 \cdots n) \quad \{EULER a.1748 \S 382\}$

- \* 11.  $x \in Q-R, \supset x = Ex + Fc(E(\beta)^* x | n, N_1)$   
 $\cdot 2 \quad (\sqrt{5}-1)/2 = Fc(1, 1, 1, \dots) = Fc(1; N_1)$   
 nt de ce fractio continuo forma « serie de Fibonacci »: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...  
 $\cdot 3 \quad a \in N_1, \supset \sqrt{a^2+1} = a + Fc(2a, 2a, 2a, \dots)$

- \* 12.  $a \in Q \cap N_1, \supset Fc(a, N_1) \in Q, \therefore \Sigma(a, N_1) = \infty$   
 ; Seidel, Untersuchungen über die Konvergenz und Divergenz der Kettenbrücke, München a.1846. ;

- \* 13.  $e = 2 + Fc(1, 2, 1, 1, 4, 1, 1, 6, 1, 1, 8, \dots)$   
 $(e-1)/(e+1) = Fc(2, 6, 10, 14, 18, \dots) = Fc[(4x-2) | x, N_1]$   
 $2/(e^2-1) = Fc(3, 5, 7, \dots) = Fc[(2x+1) | x, N_1]$   
 $(\sqrt{e}-1)/2 = Fc(3, 12, 20, 28, 54, \dots)$   
 $\sqrt{e}-1 = Fc(1, 1, 1, 5, 1, 1, 9, 1, 1, 13, \dots)$   
 $(\sqrt[3]{e}-1)/2 = Fc(5, 18, 30, 42, 54, \dots)$   
 $\{EULER a.1737 PetrC. t.9 (edito in 1744) p.121 \}$   
 $n \in N_1, \supset$   
 $(\sqrt[n]{e}-1)/(\sqrt[n]{e}+1) = Fc(2n, 6n, 10n, \dots) = Fc[(4x-2)n | x, N_1]$   
 $2(\sqrt[n]{e}-1) - 2n + 1 = Fc(6n, 10n, \dots) = Fc[(4x+2)n | x, N_1]$   
 $\{EULER a.1737 PetrC. t.9 (edito in 1744) p.132 \}$

- \* 14.  $\pi = 3 + Fc[7, 15, 1, 292, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 14, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 84, 2, 1, 1, 15, 3, 13, 1, 4, 2, 6, 6, 1, \dots]$   $\{WALLIS t.2 p.51\}$   
 Reductione in fractio continuo de valore de  $\pi$  dato per Ludolff.

*See after p. 336 for*

An improved form of this  
section was published in the  
next fascicle -

Save

VI

## CALCULO DIFFERENTIALE





## VI. CALCULO DIFFERENTIALE.

### §1 D (derivata)

Derivata de functione es limite de ratione de incremento de functione ad incremento de variabile, quando incremento de variabile tende ad 0.

Ergo nos considera functione  $f$ , que es dato pro valores de variabile pertinente ad aliquo classe  $u$ . Classe  $u$  pote coincide cum classe de numeros reale  $q$ , vel cum intervallo, vel habe forma plus complexo :

$$u \in \text{Cls}'q . f \in qf''u.$$

Nos sume in classe  $u$  uno numero  $x$ , que nos suppose proximo ad alios valore de classe  $u$  :

$$x \in u \wedge \delta u.$$

Ratione  $(fy-fx)/(y-x)$  depende de  $y$ . Suo limite, quando  $y$  varia in  $u$  et tende ad  $x$ , es vocato « derivata ».

\* 1.  $u \in \text{Cls}'q . f \in qf''u . x \in u \wedge \delta u . \supset$

$$D(f, u, x) = \lim[(fy-fx)/(y-x) | y, u, x]$$

Df D

Si  $u$  es classe de quantitate, si  $f$  indica quantitate functione des  $u$ , et si  $x$  pertine ad classe  $u$ , et ad suo derivata, tunc  $D(f, u, x)$ , que nos lege « derivata de functione  $f$ , in campo  $u$ , pro valore  $x$  » vale limite de  $(fy-fx)/(y-x)$  ubi varia  $y$ , in campo  $u$ , et tende ad  $x$ .

Membro definiente derivata, contine literas reale  $f$ ,  $u$ ,  $x$  et litera  $y$  apparente, nam seque signo de inversione  $|$ . Ergo nos indica derivata quaesito per signo  $D(f, u, x)$ , ubi figura omni litera variabile reale.

Campo  $u$  de variabilitate es necessario in notatione de derivata, nam derivata pote depende de campo  $u$ . Vide P66. In aliquo casu non tace illo, justa conventiones 1-4:

$$1 \quad D(f, u) = [D(f, u, x)|x, u] \quad Df$$

Nos indica per  $D(f, u)$  lege « derivata de  $f$  in campo  $u$  » functione  $D(f, u, x)$  ubi  $x$  varia in campo  $u$ .

$$2 \quad D(f, u)x = D(f, u, x) \quad [P.1 \supset P.]$$

Si nos indica per uno litera  $h$  systema  $(f, u)$  de functione et de campo de variabilitate relativo, tunc  $h$  es « functione definitio », et suo derivata pro valore  $x$  resulta indicato per  $Dhx$ , que significa  $(Dh)x$  « valore de derivata, pro valore  $x$  de variabile », et non  $D(hx)$ , « derivata de numero  $hx$  », que non habe sensu.

$$3 \quad u, v \in \text{Cls}'q . f \in \text{qf}(u, v) . x \in \text{inu} \cap \text{inv} . \supset . \\ D(f, u, x) = D(f, v, x)$$

$$4 \quad u \in \text{Cls}'q . f \in \text{qfu} . x \in \text{inu} . \supset . \\ D(f, x) = Dfx = \eta x \{ v \in \text{Cls}'u . x \in \text{inr} . \supset_r . y = D(f, v, x) \}$$

Si  $x$  es interno ad campo  $u$ , tunc nos tace campo  $u$ , et per  $D(f, x)$  vel  $Dfx$  nos intellige valore constante de  $D(f, v, x)$ , ubi  $v$  es classe arbitrario, que contine  $x$  in suo interno.

#### NOTA.

Leibniz indica derivata de  $y$  relativo ad  $x$ , per signo  $\frac{dy}{dx}$  ubi « recta aliqua pro arbitrio assumpta vocetur  $dx$  » (MathS. t.5 p.220) et « ipsas  $dx, dy$ , ut ipsarum  $x, y$  differentiis sive incrementis, vel decrementis momentaneis proportionales haberi posse » (p.169). Acta Erud. Lips. a.1684:

« *Additio et Subtractio*: si sit  $z = y + w + x$  æqu.  $v$ , erit  $dz = dy + dw + dx$  seu  $dv$  æqu.  $dz - dy + dw + dx$ .

*Multiplicatio*:  $d\overline{rv}$  æqu.  $xdr + vdx$

*Potentia*:  $dx^a = a.x^{a-1}dx$ .

*Radices*:  $d\sqrt[b]{x^a} = \frac{a}{b}dx \sqrt[b]{x^{a-b}}$

Suffecisset autem regula potentiae integrae tam ad fractas tam ad radices determinandas. »

In aliquo casu ille pone  $d\bar{x} = 1$ ; tunc signo  $d$  indica derivata:

$$d\bar{x} = 1, d\bar{x}^2 = 2x, d\bar{x}^3 = 3x^2 \text{ etc.} \quad d\sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \text{ etc.}$$

(Briefwechsel t.1 p.226)

Newton indica derivata per uno puncto supra functione (vide Taylor in P15); Lagrange per uno accentu (vide P17); Arbogast per  $Dfx$ .

Cauchy (*Œuvres* s.1 t.4 p.255) indica derivatas per  $D_x, D_y, \dots$  ubi indice designa variabile respectu que nos deriva.

Jacobi, Werke, t.3 p.396 a.1841:

« quando sine graviore incommodo licet, quanquam maxime affectanda sunt signa, quibus et omnis ambiguitas tollatur, et formulae sine omni interpretatione verbali adjecta, per se clarae et intelligibiles fiant, in hoc tamen casu... ».

distingue derivatas de functione de plure variabile, per signo  $\partial$ ; ce derivatas vocare « partiale ».

Ce notatione ne suffice, quare si nos habe functione de 3 variabile  $f \in \text{qf}(q; q; q)$ , et si  $u \in \text{qf} q$ ,  $w \in \text{qf}(q; q)$ , es necesse plure specie de  $d$  pro indica 4 derivata respectu  $x$ :

$$Df(x, y, z)|x, \quad Df(x, ux, z)|x, \quad Df[x, y, w(x, y)]|x, \quad Df[x, ux, w(x, ux)]|x.$$

467. **derivata.** Vide 280.

468. **differentiale**, AD differentiale, F différentielle, H diferencial, I differenziale, R differentsial'. Es  $dx$  de Leibniz.

$\subset$  differentia (166) + -le (6)

De textu praecedente resulta que in scriptura  $dy/dx$  de Leibniz, hodie multo diffuso,  $dx$  et  $dy$  es quantitate finito,  $dx$  es arbitrario, non nullo; in casu particulare  $dx = 1$  (Leibniz),  $dy = Dy$ . In applicationes de Calculo ad praxi, aliquo Auctore considera differentiale ut quantitate satis parvo, vel infinite parvo.

## \* 2.

$u \in \text{Cls}'q \cdot f, g \in \text{qf} u \cdot x \in u \wedge \delta u \cdot D(f, u, x), D(g, u, x) \in q \cdot a \in q \cdot \supset$ .

$$1 \quad D[(a + f)x] | x, u, x] = D(f, u, x)$$

« Derivata de summa de quantitate constante et de functione vale derivata de functione ».

$$2 \quad D[(fx + gx) | x, u, x] = D(f, u, x) + D(g, u, x) \quad \text{Distrib}(D, +)$$

« Derivata de summa de duo functione vale summa de derivatas de functiones ».

[  $DfD \cdot \supset \cdot D[(fx + gx) | x, u, x] = \lim [(fy + gy) - (fx + gx)] / (y - x) | y, u, x$ ;  
Distrib(+, +)  $\cdot \supset \cdot = \lim [(fy - fx) / (y - x) + (gy - gx) / (y - x)]$ ;  
Distrib(lim, +)  $\cdot \supset \cdot P$  ]

$$3 \quad x \in q \cdot \supset \cdot D(ax | x, x) = a$$

$$4 \quad D(ax | x, u, x) = a \times D(f, u, x)$$

« Derivata de producto de quantitate constante per functione vale quantitate constante per derivata de functione ».

$$^{\circ}3 \quad D(fx \times gx \mid x, u, x) = fx \times D(g, u, x) + gx \times D(f, u, x)$$

« Derivata de producto de duo functione vale primo factore per derivata de secundo, plus secundo factore per derivata de primo ».

$$\begin{aligned} [ Dfx \times gx \mid x, u, x ] &= \lim [ (fy \times gy - fx \times gx) / (y - x) \mid y, u, x ] \\ &= \lim [ fx \times (gy - gx) / (y - x) + gx \times (fy - fx) / (y - x) + \\ &\quad (fy - fx) \times (gy - gx) / (y - x) \times (y - x) \mid y, u, x ] \\ &= fx \times D(g, u, x) + gx \times D(f, u, x) + 0 \end{aligned}$$

$$* \quad 3.1 \quad u \in \text{Cls} . f, g \in \text{qFu} . \supset . f + g = [(fx + gx) \mid x, u] \quad \text{Df}$$

$$^{\circ}2 \quad u \in \text{Cls} . f \in \text{qFu} . a \in \text{q} . \supset . a \times f = (a \times fx \mid x, u) \quad \text{Df}$$

$$^{\circ}3 \quad u, r, w \in \text{Cls} . f \in \text{rFu} . g \in \text{wFr} . \supset . gf = [g(fx) \mid x, u] \quad \text{Df}$$

$$^{\circ}4 \quad u \in \text{Cls}' \text{q} . u \supset \delta u . f, g, Df, Dg \in \text{qFu} . \supset . D(f + g) = Df + Dg \\ [ = P2.2 ]$$

$$^{\circ}5 \quad \text{Hp}^{\circ}4 . a \in \text{q} . \supset . D(a \times f) = a \times (Df) \quad [ = P2.4 ]$$

Df. 1-3 simplifica aliquo formula praecedente. Df. 1 jam occurre in III §20 Cx P1.2.

$$* \quad 4.1 \quad u, r \in \text{Cls}' \text{q} . f \in \text{rFu} . g \in \text{qFr} . x \in u \wedge \delta u . fx \in \delta r . \\ Dfx, Dg(fx) \in \text{q} . \supset . D(gf)x = Dg(fx) \times Dfx$$

$u$  et  $r$  es classe de quantitates;  $f$  es functio definitio, que ad omni  $u$  fac corresponde aliquo  $r$ ;  $g$  es quantitate functio definitio de  $r$ ;  $x$  pertine ad classe  $u$  et ad suo derivata; nos suppose  $fx$ , que es  $r$ , proximo ad alios  $r$ . Functio  $f$  habe derivata pro valore  $x$ , et  $g$  habe derivata pro valore  $fx$ . Tunc derivata de functio  $gf$  (functio composito de  $g$  et  $f$ , productio functionale de  $g$  et de  $f$ ) vale derivata de  $g$  pro valore  $fx$  multiplicato per derivata de  $f$ , pro valore  $x$ .

$$[ D(gf)x = \lim [ (gfy - gfx) / (y - x) \mid y, u, x ] \quad (1)$$

$$\begin{aligned} &\lim [ (gfy - gfx) / (y - x) \mid y, u \wedge \exists (fy = fx), x ] \\ &= \lim [ (gfy - gfx) / (fy - fx) \times (fy - fx) / (y - x) \mid y, u, x ] \\ &= Dg(fx) \times Dfx \quad (2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y \in u . fy = fx . \supset . gfy = gfx . \supset . \\ (gfy - gfx) / (y - x) = Dg(fx) \times (fy - fx) / (y - x) \quad (3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) . \text{Oper } \lim . \supset . \lim [ (gfy - gfx) / (y - x) \mid y, u \wedge \exists (fy = fx), x ] \\ = Dg(fx) \times Dfx \quad (4) \end{aligned}$$

$$(1) . (2) . (4) . \supset . \text{P} \quad ]$$

$$^2 \quad u, v \in \text{Cls}' q . f \in (vFu) \text{rep} . x \in u \wedge \delta u . Df x \in q \neq 0 . y = fx \\ \supset . Df^{-1}y = /Df x$$

Si  $u$  et  $v$  es classe de quantitates, et si  $f$  es  $v$  functio definita des  $u$ , et reciproco (III §1 P4.6), si  $x$  pertine ad classe  $u$  et ad suo classe derivata, et si derivata de functio  $f$  pro valore  $x$ , habe valore determinato finito non nullo, et si nos voca  $y$  valore  $fx$ , tunc derivata de functio inverso de  $f$  (definito in III §4 P3), pro valore  $y$ , vale reciproco de derivata de  $f$  pro valore  $x$ .

In modo plus breve, si nos tace plure conditione:

« Derivata de functio inverso es reciproco de derivata de functio directo ».

$$\begin{aligned} [ D(f^{-1}, v, y) &= \lim[(f^{-1}z - f^{-1}y)(z - y) | z, v, y] \\ &= \lim[(w - f^{-1}y)(fw - y) | w, u, x] \\ &= \lim[fw - fx | (w - x) | w, u, x] \\ &= /D(f, u, x) ] \end{aligned}$$

$$\ast \quad 5.1 \quad x \in q \neq 0 . \supset . D(/, x) = -/x^2 \\ [ D(/, x) = \lim[(/y - /x) | y - x | y, q \neq 0, x] \\ = \lim[-/(y \cdot x) \mid \cdot \cdot \cdot ] = -/x^2 ]$$

$$^2 \quad \text{Hp P2} . 0 \neq f'u . \supset . D(/f, u, x) = -D(f, u, x) / (fx)^2 \\ [ (q \neq 0, /) | (v, g) \text{ P4.1} . \supset . \cdot \cdot \cdot = D(/, fx) \times D(f, u, x) . \text{P.1} . \supset \text{P} ]$$

$$^3 \quad \text{Hp}^2 . \supset . D(gx/fx | x, u, x) = \\ [fx \times D(g, u, x) - gx \times D(f, u, x)] / (fx)^2$$

Dem. 1 [ P2.5 . P5.2 .  $\supset$  . P ]

$$\begin{aligned} \text{Dem. 2} [ D(gx/fx | x, u, x) &= \lim[(gy/fy - gx/fx) | (y - x) | y, u, x] \\ &= \lim[(fx \times gy - gx \times fy) | (y - x) \times fx \times fy | y, \dots] \\ &= \lim[fx \times (gy - gx) - gx \times (fy - fx) | (y - x) \times fx \times fy | y, \dots] \\ &= \lim[fx \times (gy - gx) | (y - x) - gx \times (fy - fx) | (y - x) | (fx \times fy) | y, \dots] \\ &= (fx Dgx - gx Dfx) / (fx)^2 ] \end{aligned}$$

« Derivata de quotiente de duo functio vale denominatore per derivata de numeratore, minus numeratore per derivata de denominatore, toto diviso per quadrato de denominatore ».

$$\ast \quad 6.1 \quad m \in \mathbb{N}_1 . x \in q . \supset . D(x^m | x, x) = mx^{m-1}$$

$$\begin{aligned} \text{Dem. 1} [ D(x^m | x, x) &= \lim[x^m - x^m | y - x | y, q, x] \\ &= \lim[\sum q^{m-r} x^{r-1} | r, 1 \dots m | y, q, x] = mx^{m-1} ] \end{aligned}$$

$$\text{Dem. 2} [ m=1 . \supset \text{P} \quad (1)$$

$$m \in \mathbb{N}_1 . D(x^m | x, x) = mx^{m-1} . \text{P2.5} . \supset .$$

$$D(x^{m+1} | x, x) = D[(x^m \times x) | x, x] = mx^{m-1} \times x + x^m = (m+1)x^m \quad (2)$$

$$(1) . (2) . \text{Induct} . \supset . \text{P} ]$$

Si  $m$  es numero naturale, et  $x$  es quantitate, tunc derivata de  $x^m$ , ubi varia  $x$ , in campo de numeros reale, pro valore  $x$  de variabile, vale  $mx^{m-1}$ .

Nota que in formula  $x^m | x$ , litera  $x$  es apparente; formula vale  $x^m | z$ , et indica « potestate  $m$  »; litera  $x$  non es idem litera  $x$ , que occurre in Hp. Si nos pone  $m = 2$ , formula fi:

$$x \in \mathbb{Q} \supset D(x^2 | x, x) = 2x,$$

et si nos pone  $x = 1$ , formula fi:

$$D(x^2 | x, 1) = 2.$$

« derivata de quadrato, in campo de valores reale, pro valore 1, vale 2 ».

In formula incompleto  $Dx^2 = 2x$ , que occurre in plure libro, non lice substitutione materiale de valore numerico ad  $x$ .

Demonstratione 1. In vero, ratione de incremento de functione ad incremento de variabile es summa de  $m$  termine, que omni tende ad  $x^{m-1}$ .

Demonstratione 2. Potestate es casu particulare de producto, et regula deriva ex regula de derivatione de producto.

P.2.3.4.5 extende regula ad alio valore de exponente.

$$\begin{aligned} \cdot 2 \quad m \in \mathbb{N} \cdot x \in \mathbb{Q} \supset D(x^m | x, x) &= mx^{m-1} \\ [m \in \mathbb{N}_0 \cdot P.1 \supset P] & \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} n \in \mathbb{N}_1 \cdot m = -n \supset D(x^{-n} | x, x) &= D(1/x^n | x, x) = \\ &= -nx^{n-1}/x^{2n} = -nx^{-n-1} = mx^{m-1} \\ (1) \cdot (2) \supset P] & \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \cdot 3 \quad x \in \mathbb{Q} \supset D(\sqrt{x} | x, x) &= 1/(2\sqrt{x}) \\ [ \quad \quad \quad = \lim (\sqrt{y} - \sqrt{x}) / (y - x) &= \lim 1/(\sqrt{y} + \sqrt{x}) ] \end{aligned}$$

$$\cdot 4 \quad m \in \mathbb{N}_1 \cdot x \in \mathbb{Q} \supset D(\sqrt[m]{x} | x, x) = 1/[m \sqrt[m]{x^{m-1}}]$$

$$\begin{aligned} \text{Dm. 1 } [D(x^{1/m} | x, x) &= \lim [(y^{1/m} - x^{1/m}) / (y - x)] | y, Q, x] \\ &= 1/\lim [ (y^{1/m} - x^{1/m}) / (y - x) ] \\ &= 1/[m(x^{1/m} - x^{1/m-1})] \end{aligned}$$

$$\text{Dm. 2 } [(x^{1/m}, Q) = (z^m | z, Q)^{-1} \supset$$

$$D(x^{1/m}, Q, x) = 1/D(z^m | z, Q, \sqrt[m]{x}) = 1/[(mz^{m-1} | z) \sqrt[m]{x}] = 1/[m(x^{1/m} - x^{1/m-1})]$$

$$\begin{aligned} \cdot 5 \quad m \in \mathbb{R} \cdot x \in \mathbb{Q} \supset D(x^m | x, x) &= mx^{m-1} \\ [P.1 \cdot P.4 \supset P] & \end{aligned}$$

$$\cdot 6 \quad x \in \mathbb{Q} \supset D(\text{mod}, x) = \text{sgn } x.$$

$$D(\text{mod}, Q_0, 0) = 1 \quad D(\text{mod}, -Q_0, 0) = -1$$

Derivata de functione « mod » depende de campo de variabilitate.

$$\begin{aligned} \cdot 7 \quad a, b, c, d \in \mathbb{Q} \cdot x \in \mathbb{Q} \cdot a + bx \neq 0 \supset \\ D[(c+dx)/(a+bx) | x, x] &= (ad-bc)/(a+bx)^2 \end{aligned}$$

$$\cdot 8 \quad x \in \mathbb{Q} \supset D[x/\sqrt{1+x^2} | x, x] = (1+x^2)(-3/2)$$





Valore de  $x$  que satisfac ad aequatione es unico, et es valore quaesito. Ergo duo parte debe es proportionale ad exponentes, ut es noto per Algebra, III §12 P30.

*Applicationes de theorema praeedente ad Geometria. (Exercitio).*

1. Rectangulo inscripto in triangulo, et maximo in area, habe altitudine aequale ad altitudine de triangulo  $\sqrt{2}$ .
2. Cylindro in sphaera, maximo in volumen, habe altitudine  $= 2r/\sqrt{3}$ , radio basi  $= r\sqrt{2/3}$ ;  $r$  es radio de sphaera.
3. Cylindro in sphaera, maximo in superficie laterale, habe diametro de basi  $=$  altitudine  $=$  (radio sphaera)  $\times \sqrt{2}$ .
4. Idem, maximo in superficie totale, habe altitudine  $=$  (radio sphaera)  $\times \sqrt{2} \sqrt{1 - \sqrt{5}}$ .
5. Cono in sphaera, maximo in volumen, habe altitudine  $=$  (radio sphaera)  $\times \sqrt{4/3}$ . (Fermat a.1636).
6. Idem, maximo in superficie laterale, idem.
7. Idem, maximo in superficie totale, habe altitudine  $=$  radio  $\times (23 - \sqrt{17})/16$ .
8. Cylindro inscripto in cono, et maximo in volumen, habe altitudine aequale ad altitudine de cono  $\sqrt{3}$ .
9. Idem, maximo in superficie laterale, habe altitudine aequale ad altitudine de cono  $\sqrt{2}$ .

\*3  $a, b \in q . a \equiv b . f, Df \in qFa^{-1}b . \supset . f \in (qFa^{-1}b) \text{cont}$

Funcione que habe derivata in dato intervallo, es continuo.

$$[ \text{Hp} . x \in a^{-1}b . \supset . \lim[fy - fx | y, a^{-1}b, x] = \\ \lim[(fy - fx) | y - x] \times (y - x | y, a^{-1}b, x) = (Dfx) \times 0 = 0 ]$$

\* 8.

THEOREMA DE ROLLE.

\*1  $a, b \in q . a \equiv b . f, Df \in qFa^{-1}b . fa = fb \equiv 0 . \supset .$   
 $\exists a^{-1}b \wedge x \exists (Dfx = 0)$

Si functione  $f$ , habente derivata in toto intervallo de  $a$  ad  $b$ , es nullo pro valores  $a$  et  $b$ , tunc existe valore interno ad intervallo de  $a$  ad  $b$ , que redde derivata nullo.

ROLLE a.1689 p.127 :

« Les racines de chaque cascade (derivata) seront prises pour les hypotheses moyennes de la cascade suivante » .

$$[ \text{Hp} . P7-3 . \supset . f \in qFa^{-1}b \text{cont} \quad (1)$$

$$\text{Hp} . 1 . \S \text{cont } 2-3 . \supset . \max f \cdot a^{-1}b, \min f \cdot a^{-1}b \in q \quad (2)$$

$$\text{Hp} . \exists Q \wedge f \cdot a^{-1}b . \supset . \max f \cdot a^{-1}b \in Q \quad (3)$$

$$. x \in a^{-1}b . fx = \max f \cdot a^{-1}b . \supset . x \in a^{-1}b \quad (4)$$

3 . P7-1 .  $\supset .$  Ths

Hp.  $\exists (-Q \wedge f' a^{-1} b \supset \exists Q \wedge (-f' a^{-1} b \vee 1) \supset \text{Ths}$  (5)

Hp.  $\neg \exists Q \wedge f' a^{-1} b \cdot \neg \exists (-Q \wedge f' a^{-1} b \supset f \varepsilon \text{d} F a^{-1} b \supset \text{Ths}$  (6)

(4) . (5) . (6)  $\supset P$  ] Ex. Dm P9.1.2, P31.1

Functio  $f$ , que habet derivatam, per theorema praecedente est continuu.

Ergo existit suo maximo et suo minimo valore in toto intervallo. Si functio  $f$  sumit valores positivos, tunc maximo intra illos est positivus, et respondet ad valore interno ad intervallo. Ergo per theorema super maximo, derivata est nullo. In modo analogo, si functio sumit valores negativos, vel si est semper nullo.

### \* 9. THEOREMA DE VALORE MEDIO.

\*1  $a, b \varepsilon q \cdot a \equiv b \cdot f, Df \varepsilon q F a^{-1} b \supset (fb - fa)/(b - a) \varepsilon Df' a^{-1} b$

[ Hp.  $y = [fx - fa - (x - a)(fb - fa)/(b - a)]/x \supset$

$ga = gb = 0 \cdot Dg = Df - (fb - fa)/(b - a) \cdot P8 \supset$

$\exists a^{-1} b \wedge x [Dfx - (fb - fa)/(b - a) = 0] \supset \text{Ths} ]$

« Si  $a, b$  es quantitate differente inter se, et functio  $f$  habet derivatam in toto intervallo de  $a$  ad  $b$ , tunc ratione de incremento de functione ad incremento de variabile est uno de valores de derivata in interno de intervallo ».

Invero, nos considera functionem  $fx - (px + q)$ , ubi varia  $x$ , et determinat coefficientes  $p$  et  $q$ , in modo que haec functione est nullo pro  $x = a$  et  $x = b$ .

Tunc functione  $g$  habet formam scripto. Per theorema de Rolle, sua derivata est nullo pro valore interno ad intervallo, unde sequitur  $P$ .

Theorema praecedente est multo importante in calculo differentiale, et vocare « Theorema de valore medio ».

In geometria significat « si arcus de curva, in plano, habet tangentem in omni suo puncto interno ad arcum, in aliquo puncto de arcu tangens est parallelus ad chordam.

{ CAVALIERI a.1635 LVII p.15.

« Si curva linea quaecunque data tota sit in eodem plano, cui occurrat recta in duobus punctis.... poterimus aliam rectam lineam praefatae aequidistantem ducere, quae tangat portionem curvae lineae inter duos praedictos occursus continuatam ».

Exemplo. Si nos considera radicem secundo, et duo valores de variabile 100 et 101, theorema dicit:

$$\sqrt{101} - \sqrt{100} \varepsilon 1 [2\sqrt{100 + \theta}]$$

$$\text{vel } \sqrt{101} < 10 + 1/20 = 10.050$$

$$\text{et } \sqrt{101} > 10 + 1/21 = 10.047 \dots$$

\*2  $a, b \varepsilon q \cdot a \equiv b \cdot f, Df, g, Dg \varepsilon q F a^{-1} b \cdot 0 \varepsilon Dg' a^{-1} b \supset$   
 $(fb - fa)/(gb - ga) \varepsilon [(Dfx)/(Dgx)]|_{x' a^{-1} b}$



\*6  $h \in Q \supset \exists (n, x) \exists ! n \in N_1 . x \in (a^{-1} b f 0 \dots n) \text{ cres} .$

$x_0 = a . x_n = b : r \in 0 \dots (n-1) \supset_r$

$\text{mod}[Df x_r - (f x_{r+1} - f x_r) / (x_{r+1} - x_r)] < h$

Derivata de uno functione, et quando non es continuo, habe plure proprietate de functiones continuo; p. ex.: si pro valore  $a$  derivata habe valore negativo, et pro  $b$  valore positivo, derivata sume valore nullo inter  $a$  et  $b$ . Vide meo scripto Ann.N. a.1884 p: 45, 153, 252; Goursat AM. a.1884, p. 49, 316.

## \* 12. THEOREMA DE DE L'HOSPITAL.

\*1  $a, b \in q . a = b . f, g \in qFa^{-1}b . fa = ga = 0 . Df, Dg \in qFa^{-1}b .$   
 $0 \neq Dg'a^{-1}b \supset \text{Lm}(fx/gx|x, a^{-1}b, a) \supset \text{Lm}(Dfx/Dgx|x, a^{-1}b, a)$

$| x \in a^{-1}b . ga = 0 . gx = 0 . P8 \supset . 0 \in Dg'a^{-1}b \supset . 0 \in Dg'a^{-1}b$  (1)

Hp . (1) .  $x \in a^{-1}b \supset . gx = 0$  (2)

(2)  $\supset . fx/gx | x \in q(a^{-1}b)$  (3)

$x \in a^{-1}b \supset . fz/gz = (fz - fa) / (gz - ga)$  (4)

$h = Dfx/Dgx | x \supset :$

$x \in a^{-1}b . (4) . P9 \supset . fz/gz \in h'a^{-1}z$  (5)

$x \in a^{-1}b . (5) \supset . fz/gz | x'a^{-1}x \supset h'a^{-1}x$  (6)

\* . (6)  $\supset . A fz/gz | x'a^{-1}x \supset . Ah'a^{-1}x$  (7)

(7)  $\supset . \bigcap \{ A fz/gz | x'a^{-1}x \} \supset \bigcap \{ A h'a^{-1}x | x'a^{-1}b \}$  (8)

(8) . Df Lm  $\supset . \text{Lm}(fz/gz | z, a^{-1}b, a) \supset \text{Lm}(h, a^{-1}b, a)$

Es dato duo numero  $a$  et  $b$ , distincto, et duo functione  $f$  et  $g$  reale definito in intervallo de  $a$  ad  $b$ , ambo nullo pro valore  $a$ , et habente derivatas, et derivata de denominatore  $g$  non es nullo in interno de intervallo de  $a$  ad  $b$ . Tunc omni valore limite de ratione  $fz/gz$ , ubi varia  $z$  in intervallo de  $a$  ad  $b$ , et tende ad  $a$ , es valore limite de ratione de duo derivata.

Demonstratione. Si functio  $g$  es nullo pro valore  $a$ , et pro aliquo valore  $x$  interno ad intervallo considerato, pro theorema de Rolle, suo derivata es nullo inter  $a$  et  $x$ , vel inter  $a$  et  $b$ , quod es contra hypothesis. (1)

Ergo, in hypothesis nostro, functio  $g$  habe semper valore non nullo in interno de intervallo de  $a$  ad  $b$ . (2)

Et ratione  $fx/gx$ , pro omni valore de  $x$  in  $a^{-1}b$  habe semper valore determinato et finito. (3)

Si  $z$  es valore inter  $a$  et  $b$ , ratione  $fz/gz$  vale ratione de incrementos  $fz - fa$  ad  $gz - ga$ ; nam  $fa = ga = 0$ . (4)

Si nos voca  $h$  functio  $Df/Dg$ , ubi varia  $x$ , si  $z$  es inter  $a$  et  $b$ , de P(4), et de secundo theorema super valore medio, nos deduce que  $fz/gz$  es uno ex valores de  $h$  in intervallo de  $a$  ad  $z$ . (5)

Si nos sume valore  $x$  inter  $a$  et  $b$ , tunc omni valore de  $fz/gz$ , ubi  $z$  es inter  $a$  et  $x$ , es uno ex valores de  $h$  in intervallo de  $a$  ad  $x$ . (6)

Et classe limite generale de valores de  $fz/gz$ , ubi varia  $z$  inter  $a$  et  $x$  continere in classe limite generale de valores de  $h$ , in idem intervallo. (7)

Ergo parte commune ad omni classe praecedente, ubi  $x$  varia inter  $a$  et  $b$  continere in parte commune ad classes correspondente pro functione  $h$ . (8)

Unde, per definitione, classe limite de functione  $fz/gz$  ubi varia  $z$ , continere in classe limite de functione  $h$ . Quod era demonstrando.

$$\begin{aligned} & 2 \quad a, b \in \mathbb{Q} \cdot a \neq b \cdot f, g, Df, Dg \in \mathcal{QF}(a \neg b) \cdot x \in a \neg b \cdot fx = gx = 0 \\ & \quad \cdot 0 \neq \varepsilon Dg'(a \neg b \neg x) \cdot \lim(Dfz / Dgz \mid z, a \neg b, x) \in \mathcal{Q} \cup \pm \infty \\ & \quad \cdot \supset \cdot \lim(fz/gz \mid z, a \neg b, x) = \lim(Dfz / Dgz \mid z, a \neg b, x) \\ & \quad \quad \quad \mid P.1 \supset P \mid \end{aligned}$$

Es dato duo numero distincto  $a$  et  $b$ , et duo functio  $f$  et  $g$  reale definitio in intervallo de  $a$  ad  $b$ , simul cum derivatas  $Df$  et  $Dg$ , et pro aliquo valore  $x$  de intervallo de  $a$  ad  $b$ , interno aut extremo, ambo functione es nullo.

Si derivata de  $g$  non es nullo pro valores de variabile in intervallo considerato, differentes de valore  $x$ , et si ratione de derivatas, quando variabile tende ad  $x$ , habe limite determinato finito aut infinito, tunc limite de ratione de duo functione aequa limite de ratione de duo derivata.

Vel, si nos suppose implicito plure conditione:

« Limite de ratione de duo functione, ambo nullo pro idem valore de variabile, aequa limite de ratione de derivatas ».

Seque de theorema praecedente.

{ DE L'HOSPITAL, *Analyse des infiniment petits* a.1696 p.145:

« si l'on prend la différence du numérateur, et qu'on la divise par la différence du dénominateur, après avoir fait  $x=a$ , l'on aura la valeur cherchée ».

$$\begin{aligned} * \quad 13.1 \quad & a \in \mathbb{Q} \cdot f, g, Df, Dg \in \mathcal{QF}(a+Q) \cdot \text{Lm}(f, a+Q, \infty) = \\ & \lim(g, a+Q, \infty) = 0 \cdot 0 \neq Dg'(a+Q) \cdot \supset \cdot \\ & \text{Lm}(fx/gx \mid x, a+Q, \infty) \supset \text{Lm}(Dfx/Dgx \mid x, a+Q, \infty) \\ & [ \text{Lm}(fx/gx \mid x, a+Q, \infty) = \text{Lm}(f(a+z)/g(a+z)) \mid z, Q, 0 : P.12 \cdot \supset \cdot P ] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & 2 \quad a \in \mathbb{Q} \cdot f, Df \in \mathcal{QF}(a+Q) \cdot \supset \cdot \\ & \quad \text{Lm}[(fx)/x \mid x, a+Q, \infty] \supset \text{Lm}(Df, a+Q, \infty) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & 3 \quad a \in \mathbb{Q} \cdot f, g, Df, Dg \in \mathcal{QF}(a+Q) \cdot \lim(g, a+Q, \infty) = \infty \cdot \\ & \quad 0 \neq Dg'(a+Q) \cdot \supset \cdot \\ & \quad \text{Lm}(fx/gx \mid x, a+Q, \infty) \supset \text{Lm}(Dfx/Dgx \mid x, a+Q, \infty) \end{aligned}$$

\* 14.  $u \in \text{Cls}'q . u \supset \delta u . m \in N_1 . f \in qf u . h \in qFu . x \in u . \supset$ .

$$\cdot 0 \quad D^m h x = (D^m h)x \quad . \quad D^m(f, u, x) = D^m(f, u)x \quad \text{Df}$$

Si  $h$  es functio definitio in campo  $u$  condensato, ad que pertine  $x$ , tunc  $Dh$  es alio functio definitio, et si  $m$  es numero naturale,  $D^m h$  habe valore determinato per III §1 P9, et es vocato « derivata de ordine  $m$  de functio  $h$  ». Nos scribe  $D^m h x$ , lege « derivata de ordine  $m$  de  $h$ , pro valore  $x$  », in loco de  $(D^m h)x$ , et non de  $D^m(hx)$ , que non habe sensu.

Si  $f$  es operatio, et non es fixato suo campo de variabilitate, tunc  $(f, u)$  es functio definitio, et  $D^m(f, u, x)$  indica « derivata de ordine  $m$  de functio  $f$ , in campo  $u$ , pro valore  $x$  ».

$$g, D^m g, h, D^m h \in qFu . a \in q . \supset$$

$$\cdot 1 \quad D^m(g+h) = D^m g + D^m h$$

$$\cdot 2 \quad D^m(a \times g) = a D^m g$$

$$\cdot 3 \quad D^m(gx \times hx) | x, u, x = \Sigma [C(m, r) (D^{m-r} g x) \times (D^r h x) | r, 0 \dots m] \\ \text{LEIBNIZ MathS. t.5 p.380}$$

$$\cdot 4 \quad u \in m + N_0 . x \in q . \supset \quad D^m(x^n | x, x) = m! [n - 0 \dots (m-1)] \times x^{n-m} \\ \begin{array}{ccccccc} u \in q . x \in q & & & & & & \\ u \in n . x \in q = 0 & & & & & & \end{array}$$

$$\cdot 5 \quad x \in q . \supset \quad D^m[x^m(1-x)^m | x, x] = \\ m! \Sigma (-1)^r [C(m, r)]^2 x^r (1-x)^{m-r} | r, 0 \dots m$$

$$\cdot 6 \quad \text{Num } \theta \wedge \epsilon \exists D^m[x^m(1-x)^m | x, x] = 0! = m$$

·5·6 Polynomio de Legendre. Vide P 21.

\* 15. THEOREMA DE BERNOULLI-TAYLOR.

$$a, b \in q . a = b . x \in a-b . m \in N_1 . f, D^m f \in qF a-b . D^{m+1} f x \in q . \supset$$

$$\lim [f(x+z) - \Sigma \{z^r / r! (D^r f x) | r, 0 \dots m\}] / z^{m+1} | z, a-b-x, 0 \\ = (D^{m+1} f x) / (m+1)!$$

$$[ \text{P12·1 } \supset \quad \lim [f(x+z) - \Sigma \{z^r / r! D^r f x | r, 0 \dots m\}] / z^{m+1} | z, \dots \\ = \lim Df(x+z) - \Sigma \{z^{r-1} / (r-1)! D^r f x | r, 1 \dots m\}] / [(m+1)z^m] | z, \dots \\ = \lim (D^m f(x+z) - D^m f x) / [(m+1)! z] | z, \dots$$

$$\text{DfD } \supset \quad * = (D^{m+1} f x) / (m+1)! ]$$

Dato duo quantitate differente  $a$  et  $b$ , si  $x$  pertine ad intervallo de  $a$  ad  $b$ , et si  $f$  es functione reale definitio in intervallo  $a-b$ , simul cum derivata de ordine  $m$ , (et cum prae-

cedentes) et si derivata de ordine  $m+1$  de  $f$  pro valore  $x$  existe, tunc differentia inter  $f(x+z)$  et polynomio

$$fx + zDfx + z^2/2! D^2fx + \dots + z^m/m! D^mfx,$$

diviso per  $z^{m+1}$ , quando varia  $z$ , in modo que  $x+z$  mane in intervallo considerato, et tende ad  $x$ , vale derivata de ordine  $m+1$  de  $fx$ , diviso per  $(m+1)!$ .

In vero, pro  $m=1$ , theorema dice que  $\lim [f(x+z)-fx]/z$  vale derivata de  $fx$ , quod es vero per definitione de derivata.

Pro  $m=2$ , nos quaere

$$\lim [f(x+z)-fx-zDfx]/z^2 | z, a-b-x, 0!,$$

ubi quantitate de que nos quaere limite, se praesenta sub forma 0/0. Ergo, pro theorema de l'Hospital, nos calcula limite de ratione de duo derivata:

$$\lim [Df(x+z)-Dfx]/(2!) | z, \dots$$

que, per definitione de derivata, vel pro casu  $m=1$ , vale  $D^2fx/2$ , conforme ad theorema.

Ita nos demonstra theorema pro  $m=3, \dots$

} Joh. BERNOULLI a.1694 t.1 p.126:

« habetur hæc series generalissima :

$$Integr. ndz = +nz - \frac{zzdn}{1.2.dz} + \frac{z^2ddn}{1.2.3.dz^2} - \frac{z^3ddd n}{1.2.3.4.dz^3} \&c. »$$

} TAYLOR a.1715 p.21 :

« Sint  $z$  et  $x$  quantitates duae variables, quarum  $z$  uniformiter augetur per data incrementa  $z$ , et sit  $nz = v$  . . . . .

p.23: . . . quo tempore  $z$  uniformiter fluendo fit  $z+v$ , fiet  $x$ ,

$$x + \dot{x} \frac{v}{1z} + \ddot{x} \frac{v^2}{1.2z^2} + \ddot{x} \frac{v^3}{1.2.3z^3} + \&c. » \quad \{$$

} MACLAURIN a.1742 p.610:

« Suppose that  $y$  is any quantity that can be expressed by a series of this form  $A + Bz + Cz^2 + Dz^3 + \&c.$  where  $A, B, C$  represent invariable coefficients . . . . . When  $z$  wanishes, let  $E$  be the value of  $y$ , and let  $\dot{E}, \ddot{E}, \ddot{E}, \&c.$  be then the respective values of  $\dot{y}, \ddot{y}, \ddot{y}, \&c.$   $z$  being supposed to flow uniformly. Then

$$y = E + \frac{\dot{E}z}{1} + \frac{\ddot{E}z^2}{1 \times 2 \cdot 2} + \frac{\ddot{E}z^3}{1 \times 2 \times 3 \cdot 2} + \&c.$$

p.611: This theorem was given by Dr. Taylor.

p.612: which theorem is not materially different from Mr. Bernouilli's. »

} ARBOGAST a.1800:

$$F(a+r) = Fa + \frac{DFa}{1}r + \frac{D^2Fa}{1.2}r^2 + \frac{D^3Fa}{1.2.3}r^3 + \text{etc.} \quad \{$$

## Nota.

Si in citatione de Bernoulli, nos pone  $n=f'(a+z)$ , et si nos effectua integratione indicato intra limites 0 et  $b-a$ , illo fit:

$$fb-fa = (b-a)f'b - (b-a)^2 f''b/2 + (b-a)^3 f'''b/3! - \dots$$

unde formula 15 per substitutione  $(x, x+a)$  in loco de  $b$  et  $a$ .

Secundo membro non es summa de uno serie; nam serie pote es divergente, re noto ad Bernoulli; vel pote habe summa differente de primo membro, ut nota Cauchy a.1823 s.2 t.4 p.230 cum exemplo  $e^{-1/x^2}$ . Vide Formul. t. 4.

Theorema praecedente occurre in P18.4, planOscul P42,...

In plure libro de Calculo infinitesimale, es vocato « formula de Taylor » theorema 17.1 sequente que spectat ad Lagrange.

$$\begin{aligned} * \quad 16.1 \quad m \in \mathbb{N}_1, u \in \text{Cls}'q, \text{Num}u = m+1, f, D^m f \in \text{qFMediou} \\ : x \in u, \bigcup_x fx = 0 : \bigcup_x 0 \in D^m f' \text{Mediou} \quad [P8 \supset P] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} * 2 \quad m \in \mathbb{N}_1, u \in \text{Cls}'q, s \in \mathbb{N}_1, fu, \Sigma(s, u) = m+1, \\ f, D^m f \in \text{qFMediou} : x \in u, r \in 0^{m+1}(s-1), \bigcup_{x,r} D^r fx = 0 \\ : \bigcup_x 0 \in D^m f' \text{Mediou} \quad [P8 \supset P] \end{aligned}$$

Si functio  $f$  es nullo pro valore  $x$ , simul cum suo derivatas de ordine 1, 2, ...  $(s-1)$ , tunc nos dice que functio  $f$  es nullo «  $s$  vice » pro valore  $x$ , vel que acquatione  $fx=0$  habe  $s$  radice coincidente in valore considerato.

Si functio  $f$  es nullo  $s_1$  vice pro valore  $x_1$ ,  $s_2$  vice pro valore  $x_2$ , ..., et si summa  $s_1+s_2+\dots$  vale  $m+1$ , tunc derivata de ordine  $m$  de  $f$  es nullo pro aliquo valore medio inter praecedentes. Seque de theorema de Rolle.

## \* 17. THEOREMA DE LAGRANGE.

$$\begin{aligned} * 1 \quad a, b \in q, a \neq b, n \in \mathbb{N}_1, f, D^n f \in \text{qF} a^{-b}, \bigcup_x \\ fb - \Sigma[(b-a)^r/r! D^r fa] | r, 0^{m+1}(n-1) \in (b-a)^n/n! D^n f' a^{-b} \\ [ \text{Hp. } k = |fb - \Sigma[(b-a)^r/r! D^r fa] | r, 0^{m+1}(n-1)| / (b-a)^n, \\ g = |fx - \Sigma[(x-a)^r/r! D^r fa] | r, 0^{m+1}(n-1)| - k(x-a)^n | | x, \bigcup_x \\ ga = Dga = D^2ga = \dots = D^{n-1}ga = 0, gb = 0, \bigcup_x \\ \exists (a^{-b}) \wedge u \exists (D^n gu = 0), \bigcup_x \exists (a^{-b}) \wedge u \exists (D^n fu - n!k) = 0, \bigcup_x \\ k \in (D^n f' a^{-b})/n! ] \end{aligned}$$

Si  $a$  et  $b$  es quantitate,  $a$  es differente de  $b$ , et si functio  $f$  habe derivatas usque ad ordine  $n$ , ubi  $n$  indica numero naturale, in toto intervallo de  $a$  ad  $b$ , tunc differentia inter  $fb$  et summa de primos  $n$  termine de serie de Taylor vale  $(b-a)^n/n!$  multiplicato per valore medio de derivata de ordine  $n$ .



In facto, si nos voca  $k$  quantitate in primo membro diviso per  $(b-a)^n$ , et si nos pone

$$gx = fx - fa - (x-a)Dfa - \dots - (x-a)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(n-1)!} D^{n-1}fa - k(x-a)^n,$$

id es, si nos voca  $g$  functione in secundo membro, ubi varia  $x$ , tunc functio  $g$  es nullo, simul cum suo derivatas de ordine 1, 2, ...  $n-1$ , pro  $x = a$ , et es nullo pro  $x = b$ . Ergo per theorema de Rolle, vel per P16.2, suo derivata de ordine  $n$ ,  $D^n fx = n!k$ , es nullo pro aliquo valore inter  $a$  et  $b$ . Unde seque theorema.

Exemplo. Si nos substitue  $a = 0$ ,  $b = x$ ,  $f = (1+x)^m/x$ , seque :

$$(1+x)^m = \sum [C(m, r) x^r | r, 0 \dots n-1] \varepsilon C(m, n) x^n (1+\theta x)^{m-n}$$

unde deriva §lim P31.6.

{ LAGRANGE a.1797. *Th. des Fonctions analytiques* p.49 :

« D'où résulte enfin ce théorème nouveau et remarquable par sa simplicité et généralité, qu'en désignant par  $u$  une quantité inconnue, mais renfermée entre les limites 0 et  $x$ , on peut développer successivement toute fonction de  $x$  et d'autres quantités quelconques suivant les puissances de  $x$ , de cette manière :

$$\begin{aligned} fx &= f. + xf'u, \\ &= f. + xf'. + \frac{x^2}{2} f'' u, \\ &= f. + xf'. + \frac{x^2}{2} f'' + \frac{x^3}{2.3} f''' u, \end{aligned}$$

les quantités  $f.$ ,  $f'$ ,  $f''$ , etc. étant les valeurs de la fonction  $fx$  et de ses dérivées  $f'x$ ,  $f''x$ , etc., lorsqu'on y fait  $x = 0$  . . .

$$\cdot 2 \quad \text{Hp.1. } p \in \mathbb{N}_1. \bigcup. fb - \sum [(b-a)^r / r! D^r fa | r, 0 \dots (n-1)] \varepsilon \{ (b-a)^p (b-x)^{n-p} / [p \times (n-1)!] D^p fx : | x' a-b$$

{ CAUCHY, *Exercices* t.1 a.1826 p.26. pro  $p=1$  :

SCHLÖMILCH a.1847 p.177 {

$$\begin{aligned} [k = \text{vide DmP.1}]. h = fb - \sum [(b-x)^r / r! D^r fx | r, 0 \dots (n-1)] - \\ k(b-x)^p (b-a)^{n-p} | x. \bigcup. ha = hb = 0. \bigcup. \exists a-b \wedge r \geq Dh.r = 0. \bigcup. \\ \exists a-b \wedge r \geq [-(b-x)^{n-1} D^n fx + k p (n-1) (b-x)^{p-1} (b-a)^{n-p} = 0] \bigcup. P \end{aligned}$$

$$\cdot 21 \quad P.2. p=n. \bigcup. P.1$$

P.2 da espressione de resto in serie de Taylor, invento per Cauchy contine P.1 ut casu particolare.

$$\begin{aligned} \cdot 3 \quad a, b \in \mathbb{Q}. a = b. n \in \mathbb{N}_1. f \in \mathbb{Q} F a^{-1} b. D^n f \in (\mathbb{Q} F a^{-1} b) (\text{cres}_0 \cup \text{decr}_0) \\ \bigcup. fb - \sum [(b-a)^r / r! D^r fa | r, 0 \dots n] \varepsilon \Theta(b-a)^n [D^n fb - D^n fa] / n! \\ \{ \text{MORERA RdM. a.1892 p.36 } \} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} * \quad 18.1 \quad a, b \in \mathbb{Q}. a = b. f, D^2 f \in \mathbb{Q} F a^{-1} b. x \in a-b. \bigcup. \\ fx - fa - (x-a)(fb - fa) / (b-a) \varepsilon (x-a)(x-b) D^2 f a^{-1} b / 2 \end{aligned}$$

$$[ h = (fz - fa - (z - a)(fb - fa)(b - a) - (z - a)(z - b)(fx - fa - (x - a)(fb - fa)(b - a)) / (x - a)(x - b) : |z \supset. ha = hb = hx = 0 \supset. \\ 0 \varepsilon Dh'a \neg x . 0 \varepsilon Dh'x \neg b \supset. 0 \varepsilon D^2h'a \neg b \supset. P ]$$

Exprime resto in interpolatione de primo gradu, vel in regula de « partes proportionale », adoptato in tabulas de log, sin, etc.

$$^2 \text{ Hp } P \cdot 1 . m, n \varepsilon Q . \supset. f[(ma + nb)/(m + n)] = (mfa + nfb)/(m + n) \\ \varepsilon - (b - a)^2 mn(m + n)^2 / 2 D^2 f'(a - b) \quad [ P \cdot 1 \supset P ]$$

$(ma + nb)/(m + n)$  es valore « medio arithmetico inter  $a$  et  $b$ , cum pondo  $m$  et  $n$  ». Si  $D^2 f$  in intervallo  $a \neg b$  es semper positivo, tunc valore de functione respondente ad medio arithmetico inter  $a$  et  $b$  es minore de medio arithmetico de valores de functione respondentes ad  $a$  et  $b$ .

Si  $m = n = 1$ , et  $f = x^p |x$ , seque Arithmetica §5 P14.2 (pag. 42).

$$^3 \text{ Hp } P \cdot 1 . D^2 f \varepsilon QF a \neg b . r \varepsilon N_1 + 1 . z \varepsilon (a \neg b F 1 \dots r) \text{ cres } . \\ m \varepsilon QF 1 \dots r . \supset. f[(\sum m z)/(\sum m)] < (\sum m f z)/(\sum m) \quad [ P \cdot 2 \supset P ]$$

Generalizatione de praecedente. Pro pondo  $m = 1$ , et  $f = x^p |x$ , seque §SP8.3 (pag. 123).

$$^4 a, b \varepsilon q . a < b . f \varepsilon qFa \neg b . x \varepsilon a \neg b . Dfx = 0 . D^2 f x > 0 . \supset .$$

$$\exists (c, d) \exists [c \varepsilon a \neg x . d \varepsilon x \neg b . fx = \min f(c \neg d)]$$

$$[ P15 \supset. \lim[(f(x+h) - fx)/h^2 |h, a \neg b - x, 0] = D^2 f x / 2 \supset .$$

$$\exists [c, d] \exists [c \varepsilon a \neg x . d \varepsilon x \neg b : h \varepsilon c \neg d - x \supset h . f(x+h) > fx \supset . \text{Ths} ]$$

Si  $a \neg b$  es intervallo, ubi es definitio functio  $f$ , et pro aliquo valore  $x$  interno ad intervallo, derivata de ordine 1 es nullo, et derivata de ordine 2 es positivo, tunc existe intervallo  $c \neg d$ , parte de  $a \neg b$ , continente in suo interno valore  $x$ , tale que  $fx$  es minimo de valores de  $f$  in intervallo  $c \neg d$ .

$$* 19 \cdot 1 \quad a, b \varepsilon q . a \leq b . f \varepsilon qFa \neg b . m \varepsilon N_1 . x \varepsilon (a \neg b F 0 \dots m) \text{sim} .$$

$$g = \sum_i f x_i II[(z - x_s)/(x_r - x_s) |s, (1 \dots m) \neg r] |r, 1 \dots m| |z .$$

$$D^m f \varepsilon qFa \neg b . y \varepsilon a \neg b . \supset .$$

$$fy - gy \varepsilon II[(y - x_r) |r, 1 \dots m] D^m f'(a \neg b) / m!$$

$$[ \text{Hp} . k = (fy - gy) / II[(y - x_r) |r, 1 \dots m] . h = (fz - g z - k II[(z - x_r) |r, 1 \dots m]) |z \\ \supset. hx_1 = 0 . hx_2 = 0 . \dots . hx_m = 0 . P16 \cdot 1 \supset .$$

$$\exists a \neg b \wedge \exists z (D^m h z = 0) \supset. \exists a \neg b \wedge \exists z (D^m f z - m!k = 0) \supset. \text{Ths} ]$$

AMPÈRE, Gergonne A. a.1826 t.16 p.329 ;

Dm. H. A. SCHWARZ, Torino A. a.1882 ;

STIELTJES, a.1882 Amsterdam Ak. s.2 t.17 p.239-254 }

Functio  $g$  in P.1 es illo functio integro de gradu  $m-1$ , que pro valores  $x_1, x_2, \dots, x_m$  coincide cum  $f$ , et es dicto « functio interpolare ».

P.1 exprime  $fy-gy$ , que vocare « resto aut errore in interpolatione ».

Newton a.1686 t.3 prop. XL lemma 5, da  $g$  sub alio forma; Waring a.1776, et Lagrange a.1795 (Œuvres t.7 p.285), sub forma hic adoptato.

\* 20.

1.  $a, h \in \mathbb{Q} . f \in \mathbb{Q} F(a + \theta h) . l' [(mod D^n f x) | (n, x) (N_1; a + \theta h)] \in \mathbb{Q} .$

$$\supset . f(a+h) = \sum h^r / r! D^r f a | r, N_0 \{$$

$$[ k = l' [(mod D^n f x) | (n, x) (N_1; a + \theta h)] . P17.1 \supset .$$

$$\text{mod}[f(a+h) - \sum (h^r / r! D^r f a | r, 0 \cdots n)] < k h^{n+1} / (n+1)! . \S \text{lim P13.1} \supset . P ]$$

Si limite supero de derivata de ordine  $n$  de  $fx$ , ubi  $n$  sume omni valore integro, et  $x$  omni valore in intervallo considerato, es finito, tunc serie de Taylor converge ad primo membro.

2.  $k \in \text{Cls}' \mathbb{Q} . k \supset \delta k . f \in \mathbb{Q} f(k; N_0) : n \in N_0 . x \in k . \supset_{k, x} . D[f(z, n) | z,$

$$k, x] \in \mathbb{Q} : \sum [l' \text{ mod } D[f(z, n) | z, k, z] | z, k] | n, N_0 \{ \in \mathbb{Q} : x \in k : \supset .$$

$$D] \sum [f(z, n) | n, N_0] | z, k, x \{ = \sum [D[f(z, n) | z, k, x] | n, N_0 \{$$

Comm(D,  $\Sigma$ )

\* 21.1  $x, a \in \mathbb{Q} . \text{mod } x, \text{mod } a \in \theta . \supset . \sqrt{1 - 2ax + a^2} =$

$$\sum a^n / (n! 2^n) D^n [(x^2 - 1)^n | x, x] | n, N_0 \{$$

Coefficiente de  $a^n$ , es dicto « polynomio de Legendre ». Plure Auctore indica illo per  $X_n x$ . Es reductibile ad casu particulare praecedente :

$$D^n (x-a)^n (x-b)^n | x .$$

\* 22.1  $n \in N_1 . a \in \mathbb{Q} F 0 \cdots n . \supset : f \in \mathbb{Q} F \mathbb{Q} . Df = [\sum (a, x^r | r, 0 \cdots n) | x,$

$$q] . = . f = \{ f 0 + \sum [a, x^{r+1} / (r+1) | r, 0 \cdots n] | x, q \{$$

$$[ D[f x - \sum [a, x^{r+1} / (r+1) | r, 0 \cdots n] | x, q] = (a 0 : q) . P10.3, \supset P ]$$

Functio que habe pro derivata polynomio de gradu  $n$  es polynomio de gradu  $n+1$ . Termine que non depende de  $x$  es  $f 0$ .

2.  $m \in \mathbb{Q} . n \in \mathbb{Q} \neq 1 . k \in \text{Intrv} . a \in k . \supset :$

$$f \in \mathbb{Q} F k . Df = [m(fx)^n | x, k] . = .$$

$$[(fx)^n Df x - m | x, k] = (a 0 : k) . = .$$

$$D[(fx)^{n+1} (-n+1) - m x | x, k] = (a 0 : k) . = .$$

$$[(fx)^{n+1} (-n+1) - m x | x, k] \in (\mathbb{Q} F k) \text{const} . = .$$

$$[(fx)^{n+1} (-n+1) - (fa)^{n+1} (-n+1) - m(x-a) | x, k] = (a 0 : k) . = .$$

$$f = \{ [(fa)^{n+1} + (-n+1)m(x-a)] | (-n+1) | x, k \} .$$

$$k \supset \mathbb{Q} F x [ (fa)^{n+1} + (-n+1)m(x-a) > 0 ]$$

Nos quaere functio  $f$  positivo definitio in aliquo intervallo  $k$ , que pro omni valore de  $x$  in  $k$ , satisfac aequatione  $Dfx = m(fx)^n$ , id es, que habe derivata proportionale ad aliquo potestate, diverso de 1, de functio. Aequatione vale  $(fx)^n Dfx - m = 0$ ; primo membro es derivata de functio

scripto in linea 4, que resulta constante, vel aequale ad suo valore pro  $x = 0$ , unde resulta valore de functio  $f$ . Intervallo  $k$  contine solo valores de  $x$ , que redde basi positivo. Nam nos habet definito potestate cum exponents  $q$ , pro basi positivo.

Casu  $n = 1$  fore tractato in P52.1.

Aequatione de typo praecedente, que contine functio et suo derivata, vocare « aequatione differentiale ».

## Cx D

\* 30.  $ue \text{Cls}'q . n \in N_1 . f \in Cx^n fu . x \in w \delta u . \supset . P1$

1.  $a, b \in q . a = b . n \in N_1 . f, Df \in Cx^n F a^{-b} . \supset .$   
 $(fb - fa)/(b - a) \in \text{Med } Df'(a - b)$

2.  $a, b \in q . a = b . m, n \in N_1 . f \in Cx^n F a^{-b} . x \in a^{-b} . D^m f x \in Cx^n . \supset . P15$

3.  $Hp . 1 . m \in N_1 . D^m f \in Cx^n F a^{-b} . h \in a^{-b} - x . \supset . f(x + h) - \sum [(h^r / r! D^r f x) | r, 0 \dots (m - 1)] \in h^m / m! \text{Med } D^m f'(x + \theta h)$

Si  $f$  es numero complexo, aut vectore, aut puncto functione de variabile reale, tunc semper nos defini derivata ut limite de ratione de incremento de functione ad incremento de variabile, quando incremento de variabile tende ad 0.

Aliquo theorema super derivatas de functione reale accipe modificatione pro numeros complexo. Ita theorema de valore medio (P9), fit P.1 :

« Ratione de incremento de functio complexo ad incremento de variabile reale es valore medio inter valores de derivata ». Illo non es semper uno ex valores de derivata.

Theorema de Taylor subsiste sine modificatione, P.2. Resto in formula de Taylor exige consideratione de valore medio.

## Dtrm D

\* 31.1  $a, b \in q . a < b . f, g, h, Df, Dg, Dh \in q F a^{-b} . \supset .$

$\exists a^{-b} \wedge x \exists \{ Dtrm[(Df.x, Dg.x, Dh.x), (fa, ga, ha), (fb, gb, hb)] = 0 \}$   
 $[k = Dtrm[(fx, gx, hx), (fa, ga, ha), (fb, gb, hb)] | x . \supset .$   
 $ka = kb = 0 . P8 . \supset . P]$

Nos considera tres functio,  $f, g, h$ , definito, cum derivatas, in aliquo intervallo  $a^{-b}$ ; tunc determinante

$$\begin{bmatrix} fx & gx & hx \\ fa & ga & ha \\ fb & gb & hb \end{bmatrix}$$

es nullo pro  $x = a$ , et pro  $x = b$ . Ergo suo derivata, que resulta, si in primo linea nos scribe derivatas, es nullo, pro aliquo valore inter  $a$  et  $b$ .

Si nos pone  $h = (a \vdash b)$ , id es nos suppose que  $h$  habe valore constante 1, in toto intervallo de  $a$  ad  $b$ , seque secundo theorema de valore medio, P9.2.

Subst  $q'$  D

\* 32. (Subst  $n$  | Cx $n$ ) P30

\* 33. ( $q'$  |  $q$ ) §D P1-5, 6.1

$$\begin{aligned} & \cdot 1 \quad u \in q' f N_0 . a \in q' . \vdash \varepsilon Lm(mod u_n a^n | n . x \in q' . mod x < mod a . \supset) \\ & \quad D\{\Sigma(u_n z^n | n, N_0) | z, q' \wedge \exists (mod z < mod a), x\} = \Sigma[n u_n x^{n-1} | n, N_1] \end{aligned}$$

vct D

\* 40. (vct | Cx) P30  
(pnt »

Puncto  $px$ , que depende de variabile reale  $x$ , es vocato « puncto mobile ». Variabile reale  $x$  es vocato « tempore », et pote coincide cum tempore physico.

Incremento de positione de puncto, vel differentia de duo positione de puncto mobile, es vectore.

Derivata  $Dpx$  de puncto es vectore, vocato « velocitate ». Derivata de ordine duo  $D^2px$  es dicto « acceleratione ». Si puncto es materiale, producto  $mD^2px$  de suo massa per acceleratione es « fortia » vel « vi ». Plure Auctore de Mechanica sume ce proprietate ut definitione de fortia.

$m(Dpx)^2$  vocare « energia » vel « vi viva ».

$$k \in Cls'q . k \supset \delta k . x \in k . u, r, Du, Dr \varepsilon vFk . \supset$$

$$\cdot 1 \quad D[u.r \times r x | x, k, x] = (u.r) \times (Dr.x) + (r.x) \times Du.x$$

$$\cdot 2 \quad D[(u.r) a (r.x) | x, k, x] = (Du.r) a r.x + (u.r) a (Dr.x)$$

Derivata de producto interno et alterno de duo vectore variabile es analogo ad derivata de producto de duo functio numerico. Nota que in producto alterno non lice commuta factores.

$$\cdot 3 \quad u.r = 0 . \supset . DUu.x = (cmp | u.r) Du.x (mod u.x)$$

$$\cdot 4 \quad \text{»} \quad Dmod u.x = Du.x \times Uu.x$$

469. **tempore**, tempus, F temps, H tiempo, I tempo, DR tempo (in musica).  $\supset$  tempor-ario A, tempor-iza A.  $\subset$  temp- + -ore (56).
470. temp-  $\supset$  temp-ore, temp-estate A, temp-eratura DR.  
 $\subset$  tepe + -n- (341) (secundo Bopp, Bréal et alios).  
 Secundo Fick, temp- de «tempore»  $\parallel$  A thing, D ding.
471. tepe  $\supset$  tep-ore A, tep-ido A.  $\parallel$  S tap, R tep-lo = L tep-ore.
472. **mobile** FI, H mobile, D mobil.  $\supset$  mobilitate A.  
 $\subset$  mo- (374) + -bile (208).
473. **velocitate**, A velocity, F vitesse (non in Mathematica), H velocidad, I velocità.  $\subset$  veloce — e + -itate (8).
474. **veloce** FI, H veloz.  $\subset$  (secunde Bréal) velo + -ce (397).  
 Van. considera primo elemento ut  $\parallel$  L vola.
475. velo (de nave), vela I, F voile.  
 $\subset$  vehe (343) + -lo (224), post contractione.
476. **acceleratione**, AF acceleration, H aceleracion, I accelerazione.  
 $\subset$  accelera + -tione (12).
477. **accelera** I, A accelerate, F accélère, H acelera.  
 $\subset$  ad (41) + celere — e + -a (4).
478. **celere** I.  $\supset$  celer-itate A.  $\subset$  cele- + -re.
479. cele-  $\supset$  cele-re, cele-bre = frequentato.  $\parallel$  L colle, prae-celle, cole, cul-mine, col-umna.  $\parallel$  G bu-col-o, pol-o.  $\parallel$  A hill, AD holm, R chohn'. = es celere, es alto.
480. -re  $\supset$  cele-re  $\wedge$  ac-re. = -ente.
481. **massa** IR, A mass, DE masse, H masa.  
 $\subset$  G maza = pasta, substantia.
482. **vi**, vis  $\supset$  vi-olento A.  $\parallel$  G i-s, S g'i.
483. **fort-ia** (non L), AF force, H fuerza, I forza.  $\subset$  forte — e + -ia (143).
484. **forte** AFL, H fuerte, DR (militere) fort.  $\subset$  fer + -te ?
485. -te  $\supset$  men-te, gen-te, par-te, supersti-te, interpre-te, equi-te.
486. **energia** G *ἐνέργεια*, A energy, D energie, F énergie, HIR energia.  
 $\subset$  en- + erg- + -ia (43).
487. en G =  $\parallel$  L in.  $\supset$  en-ergia, en-cyclopaedia DR.
488. erg- ergo, ergon, G *ἔργον*. =  $\parallel$  A work, D werk = L labore.  
 $\supset$  erg = unitate de labore in Physien.

· rectaT planN

$$k \in \text{Cls}'q . k \supset \delta k . p \in pFk . x \in k . px \rightarrow p'(k-x) . \supset .$$

$$\cdot_0 \text{ rectaTpx} = \lim[\text{recta}(px, py) | y, k, x] \quad \text{Df}$$

Si  $k$  es classe de quantitates, condensato, et  $p$  es puncto functione definito des  $k$ , et  $x$  es valore in classe  $k$ , et puncto  $px$  es differente de omni alio puncto de trajectory de  $p$ , per valores de variabile differentes de  $x$ , id es, si  $px$  non es puncto multiplo de curva, tunc recta  $Tpx$ , lege « recta tangente ad trajectory de  $p$ , respondente ad valore  $x$  de variabile », es limite de recta que transi per  $px$ , et per altero puncto  $py$ , quando  $y$  varia in classe  $k$ , et tende ad  $x$ .

Classe  $k$  es aut classe  $q$ , aut  $Q$ , aut es intervallo, etc., ut in Df de derivata. Symbolo  $\text{recta}Tpx$  vale  $(\text{recta}T_p)x$ , et non  $\text{recta}T(px)$ , id es, nos determina recta tangente ad traiectoria de  $p$ , pro valore  $x$  de variable, et non tangente ad puncto  $px$ , que non habe sensu.

$$4 \quad \text{Dpx} \in v \neq 0 \implies \text{rectaTpx} = \text{recta}(px, \text{Dpx})$$

$$[ \text{Df rectaT} \supset \text{rectaT } px = \lim \{ \text{recta}(px, py) \mid y, k, x \}$$

$$\S \text{vet } 31.4 \quad \supset \quad \cdot \quad = \quad \cdot \quad \cdot \quad (px, py - px) \cdot y, k, r]$$

$$= (py - px)/(y - x) y, k, x]$$

§lim P54.2.  $\sup$ .  $\rightarrow$  = recta  $|$   $px$ ,  $\lim$  (  $\rightarrow$  )

$$\text{Df } D \sqcup \cdot = \text{recta}(px, Dpx)$$

Si derivata de puncto mobile  $p$ , pro valore  $x$  de variabile, es vectore determinato, non nullo, tunc recta tangente in  $px$  es recta que transi per puncto  $px$ , et es parallelo ad derivata  $Dp.r.$

In fact, recta tangente es limite de recta per  $px$  et  $py$ ; vel de recta per  $px$ , et parallelo ad vectore  $py - px$ , ad que me substitue vectore parallelo  $(py - px)/(y - x)$ . Limite de ce vectore es derivata  $Dpx$ ; unde seque theorema.

$$n \in \mathbb{N}_1, D^0 p x = D^1 p x = \dots = D^n p x = 0, D^{n+1} p x \neq 0. \quad \square$$

$$\text{rectaT}pr = \text{recta}(pr, D^{n+1}pr)$$

$$[\text{Df rectaT} . \S D P15 . \supset . \text{rectaT} p x = \lim[\text{recta}(p x, p y \mid y, k, x]$$

$$= \lim_{r \rightarrow \infty} \text{recta}(px, py - px - \Sigma[(y-x)^r / r! \text{ Dr } px(r, 1 \cdots n)](y-x)^{n+1})[y, k, x]$$

$$= \text{recta}[p, r, D^{n+1} p, r(n+1)!] = \text{recta}(p, r, D^{n+1} p, r)$$

Si pro valore  $x$ , derivata de puncto es nullo, tunc recta tangente habet directione de primo inter derivatas sequente, que non es nullo.

·3  $\text{planN}px = p \wedge y \exists [\text{proj}(\text{rectaT}px)y = px]$  Df  
 $= \text{« plano normale ad trajectory de } p \text{ »}$

·4 Hp P·1  $\supset$ .  $\text{planN}px = p \wedge y \exists [(y-px) \times Dpx = 0]$   
 $= p \wedge y \exists \{D[\text{mod}(y-px)|x, k, x] = 0\}$   
 $= p \wedge y \exists [\text{real}(y-px)/Dpx = 0] = \text{plan}(px, \text{ID}px)$

Euclide I.3 Df2, dice que recta es tangente « ἐφάπτεσθαι » ad circulo (I.1 Df15) si habe uno solo puncto commune cum circulo.

Nos pote applica idem Df ad ellipsi, etc.; sed non ad omni curva.

Descartes, *La Geometrie* (Euvres, t. 6, p. 418 dice que tangente es recta que seca curva in duo puncto « ioins en vn »; id es, si æquatione que determina ce punctos de intersectione habe duo « racines entierement égales ».

Df considerato se transforma in P·0, si nos considera recta per duo puncto « juncto in uno », ut limite de recta per duo puncto distincto.

489. *tangente* DFHI, A tangent, R tangens' (in trigonometria).  
 $\subset$  tange + -nte (142).

490. *tange* HI.  $\supset$  (489), tang-ibile A.  $\subset$  tage (242) + -n- (341).

\* 42.  $\text{planO}$

Hp P41 .  $p'(k-x) \wedge \text{rectaT}px = \bigwedge \supset$ :

·0  $\text{planO}px = \lim[\text{plan}(\text{rectaT}px, py) | y, k, x]$  Dt

Si  $p$  es puncto functione definito in classe condensato  $k$ , et si recta tangente in  $px$  non habe alio puncto commune cum trajectory de  $p$ , in classe considerato, tunc  $\text{planO}px$ , lege « plano osculatore ad trajectory de  $p$  pro valore  $x$  », es limite de plano que contine recta tangente in puncto  $px$ , et puncto  $py$ , quando  $y$  varia in  $k$ , et tende ad  $x$ .

·1  $Dpx \in v-0 . D^2px \in v-qDpx \supset$ .

$\text{planO}px = \text{plan}(px, Dpx, D^2px)$

[  $\text{planO}px = \lim[\text{plan}[\text{rectaT}px, py] | y, k, x]$

P1·1  $\supset$ .  $\text{recta}(px, Dpx), py | y, k, x]$

$\text{px}, Dpx, [py-px-(y-x)Dpx] | y-x \rightarrow y, k, x]$

§D P15  $\supset$ .  $\text{planO}px = \text{plan}(px, Dpx, D^2px)$

Si, pro valore  $x$  de variabile, derivata de puncto  $p$  es vectore non nullo, et si derivata de ordine duo de  $p$  es vectore non parallelo ad derivata de ordine uno, tunc plano osculatore es plano per  $px$ , et parallelo ad derivata primo et secundo



Vel: plano osculatore ad trajectoria de puncto  $p$ , pro tempore  $x$ , es plano de puncto, de suo velocitate, et de suo acceleratione, si ce elementos determina plano.

Vel: plano osculatore contine vi, que move puncto.

In facto, per definitione de plano osculatore, et per theorema super recta tangente, plano osculatore es limite de plano per  $px$ ,  $Dpx$ , et  $py$ . Vectore  $py - px$  jace in ce plano; ergo plano osculatore es limite de plano per  $px$  et  $Dpx$ , et parallelo ad vectore  $py - px - (y - x)Dpx$ , et si diviso per  $(y - x)^2$ . Per theorema de Taylor, limite de isto vectore es  $D^2px/2$ , unde seque theorema.

$$\begin{aligned} \cdot 2 \quad m, n \in \mathbb{N}_1. \quad Dpx &= D^2px = \dots = D^{m-1}px = 0. \quad D^m px \in v=0. \\ D^{m+1}px, \dots, D^{m+n-1}px &\in qD^m px. \quad D^{m+n}px \in v=qD^m px. \quad \text{Df} \\ \text{planO}px &= \text{plan}(px, D^m px, D^{m+n} px) \end{aligned}$$

Si  $m-1$  derivata successive de punto  $p$ , pro valore  $x$  considerato, es nullo et derivata de ordine  $m$  non es nullo, et si  $n-1$  derivata de ordine post  $m$  es parallelo ad derivata de ordine  $m$ , et derivata de ordine  $m+n$  non es parallelo ad derivata de ordine  $m$ , tunc plano osculatore es plano determinato per puncto  $px$ , et per suo derivatas de ordine  $m$  et  $m+n$ .

$$\begin{aligned} \cdot 3 \quad \text{Hp} \cdot 1. \quad \text{Df} \quad Tpx &= UDpx. \quad Npx = UDTpx. \\ Bpx &= [U(Tpx)a(Npx)] \quad \text{Df} \end{aligned}$$

$Tpx$ ,  $Npx$ ,  $Bpx$  es vectores unitario parallelo ad «tangente», «normale principale», «binormale», de linea  $p$ .

$$\begin{aligned} \cdot 4 \quad \text{recta}Npx &= \text{plan}Npx \cap \text{planO}px = \text{recta}(px, Npx) \quad \text{Df} \\ &= \text{«normale principale»}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cdot 5 \quad \text{recta}Bpx &= \text{recta}(px, Bpx) \quad \text{Df} \\ &= \text{«binormale»} \quad \text{Saint Venant a.1845).} \end{aligned}$$

Notion de plano osculatore occurre in Tinseau, «Solutions de quelques problèmes relatifs à la théorie des surfaces courbes», Mém. Sav. Étrang. t. 9, a.1781.

491. **osculatore** I, A osculatory, F osculateur.  $\subset$  oscula- + -tore.

492. oscula = basia, combasia.  $\subset$  osculo = -o + -a (92).

493. osculo = basio, parvo bucca.  $\subset$  os- + -culo.

494. os, ore = bucca.  $\supset$  (493, or- + -tore....

= || S as, || (secundo Van.) L es -f, in sensu «respira».

495. -culo  $\supset$  s-culo, arti-culo, mole-cula, os-culo.

$\subset$  -co (201) = -o + -ulo (224).

\* 43. Ax Cc Rc

$$k \in \text{Cls}'q . k \supset \delta k . p \varepsilon pFk . x \varepsilon k \supset .$$

$$\cdot 0 \quad \text{Ax } px = \lim[(\text{planN } px \cap \text{planN } py) | y, k, x] \quad \text{Df}$$

Ax  $px$  vocare « axi de plano osculatore ad curva », vel « axi de curva » (Monge, *Géométrie descriptive*, a.VII, p.106). Es intersezione de duo plano normale consecutivo.

$$\cdot 1 \quad \text{Cc } px = i[\text{Ax } px \cap \text{planO } px] \quad \text{Df}$$

» = « centro de curvatura ». Es puncto de intersezione de axi cum plano osculatore.

$$\cdot 2 \quad \text{Rc } px = d(px, \text{Cc } px) \quad \text{Df}$$

= « radio de curvatura ».

$$\text{Dpx } \varepsilon v \neq 0 . D^2px \varepsilon v \neq q \text{Dpx} \supset .$$

$$\cdot 3 \quad \text{Ax } px = \text{planN } px \cap z\{ (z-px) \times (D^2px) = (Dpx)^2 \}$$

$$\begin{aligned} [\text{Hp. } f = [(z-px) \times \text{Dpy} | y, k] \supset . \text{Ax } px = \lim z\{ fx = 0 . fy = 0 \} | y, k, x; \\ = \lim z\{ fx = 0 . (fy - fx)(y-x) = 0 \} | y, k, x; \\ = z\{ fx = 0 . \lim [(fy - fx)(y-x) | y, k, x] = 0 \} = z\{ fx = 0 . Dfx = 0 \} \\ = \text{planN } px \cap z\{ -(Dpx)^2 + (z-px) \times D^2px = 0 \} ] \end{aligned}$$

$$\cdot 4 \quad \text{Cc } px = px - \text{Dpx} / \text{Imag}(D^2px \text{Dpx})$$

$$[ z = \text{Cc } px \supset . \text{real}(z-px) \text{Dpx} = 0 . D[\text{real}(z-px) \text{Dpx}] | x, k, x] = 0 \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \text{real } D[(z-px) \text{Dpx} | x, k, x] = \text{real}[-1 \cdot (z-px) \text{Dpx}] [D^2px \text{Dpx}] = \\ = -1 - \text{real}[(z-px) \text{Dpx}] \text{real}[D^2px \text{Dpx}] \\ - \text{Imag}[(z-px) \text{Dpx}] \text{Imag}[D^2px \text{Dpx}] \end{aligned} \quad (2)$$

$$1) . (2) \supset . 1 + \text{Imag}[(z-px) \text{Dpx}] \text{Imag}[D^2px \text{Dpx}] = 0 \supset .$$

$$\text{Imag}[(z-px) \text{Dpx}] = -\text{Imag}[D^2px \text{Dpx}] \quad (3)$$

$$(z-px) \text{Dpx} = \text{real}[(z-px) \text{Dpx}] + \text{Imag}[(z-px) \text{Dpx}] . (1) . (3) \supset .$$

$$(z-px) \text{Dpx} = -\text{Imag}[D^2px \text{Dpx}] \supset .$$

$$z-px = -\text{Dpx} \text{Imag}[D^2px \text{Dpx}] \supset . P ]$$

$$\cdot 5 \quad \text{Rc } px = (Dpx)^2 \text{ mod}[(\text{emp} \perp \text{Dpx}) D^2px] \quad \text{Bg}$$

$$[ \text{Df Cc} . P \cdot 3 \supset . (\text{Cc } px - px) \times D^2px = (Dpx)^2 \supset . P ]$$

Radio de curvatura vale quadrato de velocitate diviso per componente normale de acceleratione, considerato in valore absoluto. Componente normale de acceleratione vocare saepe « acceleratione normale ».

Constructio graphico de centro de curvatura, dato  $px$ ,  $\text{Dpx}$ ,  $D^2px$ :

Construe punctos  $px - \text{Dpx}$ ,  $px + \text{Dpx}$  +  $(\text{emp} \perp \text{Dpx}) D^2px$ ; per puncto  $px + \text{Dpx}$  duce normale ad recta  $[px, px + \text{Dpx} + (\text{emp} \perp \text{Dpx}) D^2px]$ , in plano osculatore, que secat normale ad curva in  $\text{Cc } px$ .

$$\cdot 6 \quad \text{Rc } px = (\text{mod } Dpx)^3 \text{ mod}(\text{Dpx} \text{ a } D^2px)$$

$$\cdot 7 \quad \text{Ax } px = \text{recta}(\text{Cc } px, \text{Bpx})$$

496. **axi**, AL axis, DF axe, I asse, H eje, F essieu.  
|| D achse, G axon, R osi, S acs'a.
497. **curvatura** HI, A curvature, F courbure.  
C curva (verbo) + -to - -o + -ura (153).
498. curva (verbo) = fac curvo. C curvo - -o + -a (4).
499. **curvo** HI, **curva** (nomen) HI. AD curve, F courbe.  
|| R crivi-ti, criva-ja (linija). C cur- + -vo (214).  
curva = curvo - -o + -a (126, linea).
500. cur- C cur-vo. || L cor-ona, cir-co, ci-n-ge,...  
G cyr-to = cur-vo, cyl-indro, cy-clo,... (Van.).

## \* 44.

## curvatura torsio

$k \in \text{Cls}'q. k \supset \delta k. p \varepsilon p F k. x \varepsilon k. D p x \varepsilon v \cdot 10. D^2 p x \varepsilon v \cdot q D p x. \supset.$

$$^1 \text{ curvatura } p x = D T p x / \text{mod } D p x = N p x / R c p x \quad D f$$

$$^2 \text{ torsio } p x = D B p x \times N p x / \text{mod } D p x \quad D f$$

$$^3 \text{ torsiop } x = -(D p x a D^2 p x a D^2 p x / \Psi) / (D p x a D^2 p x)^2$$

Nos considera «curvatura» ut vectore, et «torsione» ut quantitate cum signo. Torsio es positivo in luppolo et in cucurbita, es negativo in viti vinifera, et in viti commune de Mechanica.

$$^4 D B p x / \text{mod } D p x = (\text{torsiop } x) N p x$$

$$^5 D N p x / \text{mod } D p x = -( / R c p x) T p x - (\text{torsiop } x) B p x$$

{ FRENET, *Sur les courbes à double courbure*, Thèse  
10 juillet 1847, JdM. t.17 a.1851.

/ torsio  $p x$  = radio de torsione.

Cc  $p x - (/ \text{torsio } p x) (D R c p x) B p x =$  «centro de sphaera osculatrice»  
= «puncto de inviluppo de plan  $N p x$ ».

recta  $p x, (R c p x) T p x - (/ \text{torsio } p x) B p x =$  «generatrice de superficie  
rectificante inviluppo de plan  $p x, I N p x$ ».

$(o + T p x) x$  describe indicatrice de tangentes.

$(o + N p x) x$  » » normales principale.

$(o + B p x) x$  » » binormales.

501. **torsione** (L. a. +100), AF torsion, H tortijon, I torsione.  
C tortione (L. classico) C torto - -o + -ione.
502. torto I, ADF tort, H tuerto. C tortu-oso A, tort-ura AD.  
C \*tortico (vocabulo supposito) C torque - -ue + -to.
503. torque, HI torce, F tordre. || secundo Bréal) L trepe (raro),  
trep-ido. || G trepe, tropo, trop-ico, R trepet', S trap.

\* 45.1  $k_8 \text{ Interv. } p \varepsilon pFk . Dp \varepsilon vFk . z_1, z_2, \varepsilon k . z_1 < z_2 . \supset .$

$$pz_1 a pz_2 \varepsilon (z_2 - z_1) pz_1 a \text{Med } Dp'z_1 \neg z_2$$

$$[ \delta \varepsilon \varphi^2 . f = [ pz_1 a pz_2 a b - (z_2 - z_1) / (z_2 - z_1) pz_1 a pz_2 a b ] / \Psi [z, z_1 \neg z_2] . \supset . \\ f \varepsilon qFz_1 \neg z_2 . fz_1 = 0 . fz_2 = 0 . Df = [ [ pz_1 a Dp'z_2 a b - (z_2 - z_1) pz_1 a pz_2 a b ] / \Psi [z, z_1 \neg z_2] . \text{Theorema de Rolle} . \supset . pz_1 a pz_2 a b / \Psi \varepsilon (z_2 - z_1) pz_1 a \\ Dp'z_1 \neg z_2 a b / \Psi \quad (1)$$

$$(1) . Df \text{Med} . \supset . P ]$$

2 Hp.1 .  $Dp \varepsilon (vFk) \text{cont} . x \varepsilon k . \supset .$

$$\lim[(pz_1 a pz_2) / (z_2 - z_1) | z, (kf 1 \dots 2) \text{cres}, (x, x)] = px a Dpx$$

3 Hp.2 .  $\supset . \lim[d(pz_1, pz_2) / (z_2 - z_1) | z, \dots] = \text{mod} Dpx$

4 Hp.2 .  $Dpx = 0 . \supset .$

$$\lim[\text{recta}(pz_1, pz_2) | z, (kf 1 \dots 2) \text{cres}, (x, x)] = \text{recta}(px, Dpx)$$

Recta tangente, in uno puncto de curva, per definitione, es positione limite de recta que uni ce puncto ad alio puncto de curva, dum secundo puncto tende ad primo. Theorema dice, que, si puncto habe derivata de ordine 1 continuo et non nullo, tunc recta tangente es positione limite de recta que uni duo puncto differente de curva, dum ambo puncto varia et tende ad puncto dato.

Si hypothesi non es vero, thesi pote es in defectu. P. ex. recta tangente ad curva descripto per puncto  $px = o + x^2a + x^3b$ , ubi  $o \varepsilon p . a, b \varepsilon v . aab = 0$ , que vocare « parabola de ordine  $3/2$  », habe rectaT  $p0 = \text{recta}(0, a)$ . Positione limite de recta( $px, p-x$ ), que uni duo puncto de curva, que tende ad  $p0$  dum  $x$  tende ad 0, es recta( $0, b$ ), differente de praecedente.

\* 46.1 Hp P45.1 .  $D^2p \varepsilon vFk . z_1, z_2, z_3, \varepsilon k . z_1 < z_2 < z_3 . \supset .$

$$pz_1 a pz_2 a pz_3 \varepsilon (z_2 - z_1)(z_3 - z_1)(z_3 - z_2) pz_1 a \text{Med} Dp'z_1 \neg z_2 a \\ \text{Med} D^2p'z_1 \neg z_3 / 2$$

2 Hp.1 .  $D^2p \varepsilon (vFk) \text{cont} . \supset . \lim\{(pz_1 a pz_2 a pz_3) / [(z_2 - z_1)(z_3 - z_1)(z_3 - z_2)] | z, (kf 1 \dots 3) \text{cres}, (x, x, x)\} = px a Dpx a D^2px / 2$

3 Hp.2 .  $Dpx = 0 . \supset . \lim d[pz_1, \text{rectaT}(p, z_2)] / (z_2 - z_1)^2 | z, \dots] = \text{mod}(Dpx a D^2px) / (2 \text{mod} Dpx)$

4 Hp.2 .  $\supset . \lim[\text{ang}(Dpz_1, Dpz_2) / (z_2 - z_1) | z, \dots] = \text{mod}(Dpx a D^2px) / (\text{mod} Dpx)^2$

5  $D^2p \varepsilon (vFk) \text{cont} . Dpx a D^2px = 0 . \supset .$

$$\lim[\text{plan}(pz_1, pz_2, pz_3) | z, (kf 1 \dots 3) \text{cres}, (x, x, x)] = \text{plan}(px, Dpx, D^2px)$$

- \* 47.1 Hp P46.1 .  $D^3p \varepsilon \vee Fk$  .  $z_1, z_2, z_3, z_4 \varepsilon k$  .  $z_1 < z_2 < z_3 < z_4$  .  $\supset$   
 $pz_1 \wedge pz_2 \wedge pz_3 \wedge pz_4 \varepsilon (z_2 - z_1)(z_3 - z_1)(z_3 - z_2)(z_4 - z_1)(z_4 - z_2)$   
 $(z_4 - z_3) pz_1 \wedge \text{MedD}p^1 z_1 \neg z_2 \wedge \text{MedD}^2 pz_1 \neg z_3 \wedge \text{MedD}^3 pz_1 \neg z_4 / 12$   
 $[ f = : pz_1 \wedge pz_2 \wedge pz_3 \wedge pz_4 \Psi \neg : z - z_1, z - z_2, z - z_3 ] [(z_4 - z_1)(z_4 - z_2)(z_4 - z_3)]$   
 $pz_1 \wedge p^1 z_1 \wedge pz_2 \wedge pz_3 \wedge pz_4 \neg z_4 : \supset . f \varepsilon qFk . fz_1 = fz_2 = fz_3 = fz_4 = 0$  . Theorema de Rolle .  $\supset$  .  $pz_1 \wedge pz_2 \wedge pz_3 \wedge pz_4 \varepsilon (z_4 - z_3)(z_4 - z_2) pz_1 \wedge pz_2 \wedge pz_3 \wedge$   
 $\text{MedD}^3 p^1 z_1 \neg z_4 / 3!$  (1)  
 (1) . P45.1 . P46.1 .  $\supset$  . P ]

Hp.1 .  $D^3p \varepsilon (\vee Fk) \text{cont}$  .  $\supset$  .

- 2  $\lim \{ (pz_1 \wedge pz_2 \wedge pz_3 \wedge pz_4) / [(z_2 - z_1)(z_3 - z_1)(z_3 - z_2)(z_4 - z_1)(z_4 - z_2)(z_4 - z_3)] \mid z, (kf1 \dots 4) \text{cres}, (r, r, r, r) \} = Dpx \wedge D^2px \wedge D^3px / 12$   
 3  $Dpx \wedge D^2px = 0$  .  $\supset$  .  $\lim \{ d[pz_1, \text{planO}(p, z_1)] / (z_2 - z_1)^2 \mid z, \dots \} = \text{mod}(Dpx \wedge D^2px) / [6 \text{mod}(Dpx \wedge D^2px)]$   
 4  $Dpx = 0$  .  $\supset$  .  $\lim \{ \sin(Dpz_1, Dpz_2, Dpz_3) / [(z_2 - z_1)(z_3 - z_1)(z_3 - z_2)] \mid z, \dots \} = [(Dpx \wedge D^2px \wedge D^3px) / \psi] / [2 \text{mod}(Dpx)^3]$   
 5  $Dpx \wedge D^2px = 0$  .  $\supset$  .  
 $\lim \{ d[\text{rectaT}(p, z_1), \text{rectaT}(p, z_2)] / (z_2 - z_1)^3 \mid z, \dots \} = \text{mod}(Dpx \wedge D^2px \wedge D^3px) / [12 \text{mod}(Dpx \wedge D^2px)]$   
 6  $Dpx \wedge D^2px = 0$  .  $\supset$  .  $\lim \text{ang}[\text{rectaT}(p, z_1), \text{planO}(p, z_2)] / (z_2 - z_1)^2 = \text{mod}(Dpx \wedge D^2px \wedge D^3px) / [2 \text{mod}(Dpx \wedge D^2px)]$   
 7  $Dpx \wedge D^2px = 0$  .  $\supset$  .  
 $\lim \{ \text{ang}[\text{planO}(p, z_1), \text{planO}(p, z_2)] / (z_2 - z_1)^3 \mid z, \dots \} = \text{mod } Dpx \text{mod}(Dpx \wedge D^2px \wedge D^3px) [Dpx \wedge D^2px]^3$

Vide meo libro *Applicazioni geometriche* a.1887 p.110.

\* 49.1  $g \varepsilon v$  .  $\supset$  :

$$p \varepsilon pFq . D^3p = (tg : q) . = . p = [(\rho 0 + tDp 0 + t^2 g : 2)] t, q]$$

$$[ \dots . = . Dp = [Dp 0 + tg : t, q] . = . \dots ]$$

Si puncto mobile  $p$  habet acceleratione constante  $g$ , tunc suo lege de motu habet expressione scripto. Sui trajectory es parabola.

Puncto materiale pesante, in vacuo, prope superficie de Terra, habet acceleratione constante, dicto « gravitate ».

$$2 \quad p \varepsilon pFq . o \varepsilon p : x \varepsilon q . \supset . D^3px \varepsilon q [px - o] : \supset .$$

$$oap \wedge Dp \varepsilon (p^3fq) \text{const}$$

$$[ x \varepsilon q . \supset . o \wedge p \wedge D^2px = 0 . \supset . D[o \wedge p \wedge Dpx] [x, q, x] = 0 . \supset . P ]$$

Si  $p$  es puncto mobile, et fortia que move illo es semper directo verso puncto fixo  $o$ , tunc tripuncto  $o \wedge p \wedge Dpx$ , id es triangulo considerato in magnitudine, in plano suo, et in sensu, es constante dum varia  $x$ .

e D

\* 50.1  $x \in Q \supset D(e^x | x, x) = e^x$ 

Dem 1. [ Df D  $\supset D(e^x | x, x) = \lim[(e^{x+h} - e^x)/h | h, q, 0]$   
 $= \lim[e^x(e^h - 1)/h]$   
 $= e^x \lim(e^h - 1)/h$  ]

§e P4.7  $\supset$  "  $= e^x$  ]

Dem 2. [ D(e^x | x, x) = D[ $\Sigma(x^r/r! | r, N_0) | x, x]$   
 $= \Sigma[D(x^r | x, x)/r! | r, N_0] = \Sigma[x^{r-1}/(r-1)! | r, N_1]$   
 $= \Sigma[x^r/r! | r, N_0] = e^x$  ]

Si  $x$  es quantitate, tunc derivata de  $e^x$ , quando  $x$  varia, pro valore  $x$ , vale  $e^x$ .

Si nos pone  $x = 0$ , nos habe:  $D(e^x | x, 0) = 1$ , derivata de  $e^x$  quando  $x$  varia, pro valore 0, vale 1. Curva diagramma de functio ( $e^x | x, q$ ) es dicto « logarithmica ». Ergo « Tangente ad logarithmica  $y = (e^x | x, q)$  in puncto de abscissa 0, fac cum axi de  $x$  angulo de  $45^\circ$  ».

2  $x \in Q \supset D(\log, x) = 1/x$ 

Dem 1. [ Df D  $\supset D(\log, x) = \lim[\log(x+h) - \log x]/h | h, Q-x, 0]$

§Log.6.7  $\supset$  "  $= \lim[\log(1+h/x)]/h$  " "" 8  $\supset$  "  $= 1/x \times \lim[\log(1+h/x)]/(h/x)$  " "Comm(lim, log)  $\supset$  "  $= 1/x \times \log \lim$  " " "Df e  $\supset$  "  $= 1/x \times \log e = 1/x$  ]

Dem 2. [ §e P2.01 . §D P4.2  $\supset D(\log, Q, x) = D(e^{\log y} | y, q, \log x)$   
 $= 1/(e^{\log x}) = 1/x$  ]

3  $a \in Q \setminus 1, x \in Q \supset D(^a \text{Log } x | x, x) = (^a \text{Log } e)/x$ [ §e P2.1 . P.2  $\supset P$  ]4  $a \in Q, x \in Q \supset D(a^x | x, x) = a^x \log a$ [ Df D  $\supset D(a^x | x, q, x) = \lim[(a^{x+h} - a^x)/h | h, q, 0]$ §q 5.2  $\supset$  "  $[a^x(a^h - 1)/h]$  "Comm(lim,  $\times$ )  $\supset$  "  $= a^x \lim$  " "§e P5.2  $\supset P$  ]\* 51.1  $x \in Q \supset D[e^x(x-1) | x, x] = x e^x$  $x \in Q \supset D[e^x(x^2-2x+2) | x, x] = x^2 e^x$ 2  $x \in Q+1 \supset D(\log \log, x) = 1/(x \log x)$  $a, x \in Q, a^2 > x^2 \supset D[\log((a-x)/(a+x)) | x, x] = 2a/(x^2 - a^2)$ 3  $a \in Q, x \in Q \supset D[\log(1 + \sqrt{a+x^2}) | x, x] = 1/\sqrt{a+x^2}$

$$a \varepsilon q . x \varepsilon q \rightarrow 0 . \bigcup . D \{ \log [\sqrt{(a^2 + x^2)} - a] / x | x, x \} \\ = a / [x \sqrt{(a^2 + x^2)}]$$

$$^*4 \quad a, b, x \varepsilon q . b > a^2 . \bigcup . \\ D \{ \log [x + a + \sqrt{x^2 + 2ax + b}] | x, x \} = \sqrt{x^2 + 2ax + b}$$

$$^*5 \quad a, b, x \varepsilon q . a = b . (x + a)(x + b) > 0 . \bigcup . \\ D \{ [\log [\sqrt{(x + a)} + \sqrt{(x + b)}] / [\sqrt{(x + a)} - \sqrt{(x + b)}]] | x, x \} = \\ / \sqrt{(x + a)(x + b)}$$

$$^*6 \quad a \varepsilon Q . x \varepsilon q . n \varepsilon N_1 . \bigcup . D^n (a^x | x, x) = a^x (\log a)^n$$

$$^*7 \quad x \varepsilon Q . n \varepsilon N_1 . \bigcup . D^n (\log x, x) = (-1)^{n-1} (n-1)! x^{-n}$$

$$^*8 \quad \quad \quad D^{n+1} (x^n \log x | x, x) = n! / x$$

$$^*9 \quad x \varepsilon Q . n \varepsilon N_1 . \bigcup . \\ D^n (\log x / x | x, x) = (-1)^n n! x^{-n-1} [\log x - \sum_{i=1}^n (1/i)]$$

$$* \quad 52.1 \quad a \varepsilon q . \bigcup : f \varepsilon q Fq . Df = af . = . f x = [(f0) e^{\sqrt{ax}} | x, q]$$

$$[ \quad \quad \quad Df = af . = . [(Dfx - afx) | x, q] = (0; q)$$

$$\S D 2.5 . \bigcup : \quad \quad \quad = . D(e^{-\sqrt{ax}} | x, q) = \quad \quad \quad$$

$$\S D 10.3 . \bigcup : \quad \quad \quad = . (e^{-\sqrt{ax}} f x | x, q) \varepsilon (qFq) \text{ const}$$

$$Df \text{ const} . \bigcup : \quad \quad \quad = . x \varepsilon q . \bigcup . e^{-\sqrt{ax}} f x = [(e^{-\sqrt{ax}} f x) | x, 0] = f0 \quad |$$

$$^*2 \quad a \varepsilon q \rightarrow 0 . b \varepsilon q . \bigcup : f \varepsilon q Fq . Df = [(afx + b) | x, q] . = .$$

$$D_1 (fx + b/a) | x, q] = [a(fx + b/a) | x, q] . = .$$

$$[(fx + b/a) | x, q] = [(f0 + b/a) e^{\sqrt{ax}} | x, q] . = .$$

$$f = [(f0) e^{\sqrt{ax}} + b/a (e^{\sqrt{ax}} - 1) | x, q]$$

Calculo de  $f$ , functio reale de variabile reale, que pro omni valore de  $x$ , satisfac aequatione  $Dfx = afx + b$ , ubi  $a$  et  $b$  quantitate constante.

$$^*3 \quad a, b, m \varepsilon q . m = 1 . \bigcup : f \varepsilon q Fq . Df = [(afx + be^{mx}) | x, q] . = .$$

$$D_1 [e^{-\sqrt{ax}} f x - be^{(m-1)x} (m-a) | x, q] = (f0; q) . = .$$

$$[e^{-\sqrt{ax}} f x - be^{(m-1)x} (m-a) | x, q] \varepsilon (qFq) \text{ const} . = .$$

$$x \varepsilon q . \bigcup . e^{-\sqrt{ax}} f x - be^{(m-1)x} (m-a) = f0 - b(m-a) . = .$$

$$f = \{ [(f0) e^{\sqrt{ax}} + be^{mx} / (m-a) - be^{\sqrt{ax}} / (m-a) | x, q] \}$$

$$^*4 \quad a \varepsilon q \rightarrow 0 . \bigcup : f \varepsilon q Fq . D^2 f = a^2 f . = .$$

$$f = \{ [(f0)(e^{\sqrt{ax}} + e^{-\sqrt{ax}}) / 2 + (Df0)(e^{\sqrt{ax}} - e^{-\sqrt{ax}}) / (2a) | x, q] \}$$

$$[ \quad \quad \quad f \varepsilon q Fq . D^2 f = a^2 f . = . [e^{\sqrt{ax}} (D^2 f x - a^2 f x) | x, q] = (0; q) .$$

$$= . D[(e^{\sqrt{ax}} Dfx - a e^{\sqrt{ax}} f x) | x, q] = (0; q)$$

$$= . [(e^{\sqrt{ax}} Dfx - a e^{\sqrt{ax}} f x) | x, q] \varepsilon (qFq) \text{ const}$$

$$= . x \varepsilon q . \bigcup . e^{\sqrt{ax}} Dfx - a e^{\sqrt{ax}} f x = Df0 - a f0$$

$$= . Df = [afx + (Df0 - af0) e^{-\sqrt{ax}} | x, q]$$

$$= . \dots ]$$

# INDICE

(Numeros inter parenthesi indica pagina)

## I. LOGICA - MATHEMATICA.

(1)

$= \sup \wedge (3) \varepsilon \text{Cls} (4) ; (6) \exists (9) - \cup (10) \pi \wedge (12) \iota \gamma (13) \text{Df} (14)$   
 $\text{Dm} (15)$

## II. ARITHMETICA.

(25)

$+ N_0 0 (27) 1 2 \dots 9 X (29) \cdot \times (32) \uparrow (34) \text{Cls}' (36) N_1 > (37) \dots (38)$   
 $- (44) / (45) \text{num max} (46) \text{min} (47) \text{quot rest} (48) \text{Cfr}$   
 $\text{ord} (51) ! C (52) \text{mlt Dvr} (53) N_p (58) \text{mp} (63) \Phi (64)$

## III. ALGEBRA.

(71)

$f, I (73) \text{sim rep idem} (75) | ' ' (77) : F (79) \cap \cup (82) n (83) \text{mod}$   
 $\text{sgn} (94) R (95) r (100) E \beta \text{dt nt} (102) \eta (104) Q I' I, \infty \theta$   
 $(105) \downarrow (108) q (112) \neg \Theta (118) \text{Log} (119) \Sigma (120) \Pi (128)$   
 $\Delta (130) B (131) \text{Med} (133) \text{Num infin} (133) \Delta \lambda \rho \delta (139)$   
 $\text{Intv in ex am} (142) \text{prob} (143) \text{Cx} (144) \text{unit} (145) \text{Dtrm}$   
 $(146) \text{lin Subst Sb} (148) \text{Invar} (151) i q' \text{real imag} K (152)$   
 $\sqrt{*} (153)$

## IV. GEOMETRIA.

(163)

$\text{pnt vct} (165) \text{dist} (176) U (179) \text{recta } p, \text{plan } p, \text{cmp} || \text{cmp} \perp$   
 $\text{proj} (180) \text{Transl Sym} (181) \text{Motor} (182) \text{Homot cos sin}$   
 $(183) \text{coord} (184) A \text{quaternionio} (185) a v^2 v^3 (188) p^1 p^2 p^3$   
 $(190) \varphi (191) \omega (196) I (198) \text{posit} (200)$

## V. LIMITES.

(209)

$\text{Lm lim} (211) \text{const cres decr} (216) \text{cont} (238) e (241) \pi (254)$   
 $\log^* \sin^{-1} \cos^{-1} \text{tng}^{-1} (261) \text{ang} (264) \text{Rotat vel } \mu (268) \text{Fc}$   
 $(270)$

## VI. CALCULO DIFFERENTIALE.

(273)

$D (275) \text{rectaT planN} (296) \text{planO} (297) \text{rectaN rectaB} (298) \text{AX}$   
 $\text{Cc Rc} (299) \text{curvatura Torsio} (300).$



---

**Rivista di Matematica**, pubblicata per G. PEANO — Tomo 1, anno 1891, L. 8 - Tomo 2, anno 1892, L. 8 - Tomo 3, anno 1893, L. 8 - Tomo 4, anno 1894, L. 8 - Tomo 5, anno 1895, L. 8.


**Revue de Mathématiques**, publiée par G. PEANO. — Tomo 6, anno 1896-1899, L. 8 - Tomo 7, anno 1900-1901, L. 8 - Tomo 8, anno 1902-1905, L. 8.

**Formulaire Mathématique** — Introduction, a. 1894, L. 2 - Tome 1, a. 1895, L. 6 - Tome 2, a. 1899, L. 8 - Tome 3, a. 1901, L. 8 - Tome 4, a. 1903, L. 10.  
**Formulario Mathematico**. — Tomo 5, fascicolo 1, L. 12.

---

*Presso i* **Fratelli Bocca**, Librai-Editori, TORINO.

---



# FORMULARIO MATEMATICO

EDITO PER

**G. PEANO**

professore de Analysi infinitesimale in Universitate de Torino

---

EDITIO V

Tome V de editione completo



**TORINO**  
**FRATRES BOCCA EDITORES**

—  
1908

Fascicolo 2





VI

## CALCULO DIFFERENZIALE



## VI. CALCULO DIFFERENTIALE.

## D (derivata)

\* 1.  $u \in \text{Cls}'q, f \in qF^u \supset$ :

0  $x, y \in u \supset, A(f; x, y) = fy - fx$  Def

1  $x, y \in u, x \neq y \supset, D(f; x, y) = (fy - fx)/(y - x)$  Def

2  $x \in u \wedge \delta u \supset, D(f; x, x) = \lim[D(f; x, y) | y, u, x]$  Def

3  $\quad \quad \quad Dfx = D(f; x, x)$  Def

$u$  indica classe de quantitates;  $f$  es quantitate functione definita in campo  $u$ .

Tunc, si  $x$  et  $y$  es individua pertinente ad classe  $u$ , differentia  $fy - fx$  es dicto « incremento de functione », et indicato per  $A(f; x, y)$ .

Si  $y$  es differente de  $x$ , tunc  $D(f; x, y)$ , dicto « ratione incrementale », indica ratione de incremento de functione ad incremento  $y - x$  de variable.

$D(f; x, x)$  indica limite de ratione precedente, si  $y$  varia in campo  $u$ , et verge ad  $x$ . Per definitione de limite (pag. 230, Prop. 400),  $x$ , que pertine ad campo  $u$ , es proximo ad alios  $u$ , vel pertine ad classe derivata de  $u$ ;  $x \in u \wedge \delta u$ .

In loco de  $D(f; x, x)$ , nos scribe  $Dfx$ , que vocare « derivata de functione  $f$  pro valore  $x$  ».

Secundo membro in Prop<sup>2</sup> contine litera  $y$  que es apparen-  
te, nam seque signo de inversione  $\vdash$ . Litera  $u$  pote es eliminato, per aequalitate

$$u = \text{Variab } f$$

«  $u$  es campo de variabilitate de functione definita  $f$  ».

Ergo secundo membro contine variables reale independente  $f$  et  $x$ ; et pote es indicato per  $Dfx$ .

Scriptura  $Df_x$ , que contine tres signo  $D$ ,  $f$ ,  $x$ , sine parenthesi, debe es decomposito in

$$(Df)x$$

« derivata de functione  $f$ , pro valore  $x$  », vel in

$$D(f, x)$$

« derivata dependente de functione  $f$  et de valore  $x$  ».

$Df_x$  non pote es decomposito in  $D(fx)$ , « derivata de numero  $fx$  », expressione sine sensu; dato  $f$  et  $x$ , resulta determinato  $fx$ ; sed non viceversa. Dato numero  $fx$ , nos non pote determina  $f$  et  $x$ , unde depende derivata. Derivata non depende de solo numero  $fx$ . P. ex:

$$D \sin 0 = 1$$

significa  $(D \sin)0 = 1$ , « derivata de functione sinu, pro valore 0 vale 1 ».

Non lege  $D(\sin 0) = 1$ , vel  $D0 = 1$ , que non habe sensu.

\*  
\* \*

Derivata habe numeroso applicatione in Geometria, in Mechanica, in Physica, in Economia etc., que nos considera infra. Nunc me expone suo interpretatione in Geometria.

Nos repræsentat functione  $f$  per curva loco de punctos

$$px = o + xi + (fx)j,$$

ubi  $o$  es puncto,  $i, j$  es vectore unitario et orthogono:

$$\text{oe}p. i, j \in v. i^2 = j^2 = 1. i \times j = 0.$$

Variabile  $x$  varia in campo de variabilitate de  $f$ . Tunc curva descripto per puncto  $px$  vocare « diagramma de functione  $f$  ».

Differentia de duo puncto es vectore:

$$\Delta(p; x, y) = py - px = (y - x)i + (fy - fx)j,$$

parallelo ad vectore:

$$D(p; x, y) = (py - px)/(y - x) = i + (fy - fx)(y - x)j = i + D(f; x, y)j$$

Numero  $z$  vocare « inclinatione » de vectore  $i + zj$  in dato systema coordinato.

Ergo inclinatione de conjungente duo puncto de curva es  $(fy - fx)/(y - x)$ . Suo limite vocare « inclinatione de curva in puncto  $px$  ». Ergo:

«  $Df_x$  vale inclinatione de diagramma de functione  $f$ , in puncto de abscissa  $x$  », vel « inclinatione de recta tangente ad curva ».

Functione  $f$ , que nos deriva, es « definitio », vel es considerato simul cum suo campo de variabilitate:  $f \in q F u$ , ubi symbolo  $F$  « functione definitio » es introducto in pag. 79.

Functiones que occurre in Analysis habet campo de variabilitate non semper definito. Tunc nos adde isto campo pro obtine functiones definitas.

Exemplo 1.

$$D(x^2 x, q)0 = 0.$$

Lege: « Derivata de elevatione ad potestate 2, in campo de numeros reale, pro valore 0, vale 0 ». Vel « inclinatione de parabola diagramma de functione  $y = x^2$  ubi  $x$  sume omni valore reale, in origine 0, vale 0; vel vectore  $i$  es tangente ad parabola ». Campo de variabilitate es toto campo de numeros reale.

Exemplo 2.

$$D(1, q-0)1 = -1.$$

« Derivata de functione reciproco, in campo de valores reale differente de 0, pro valore 1, vale  $-1$  ». Vel « si nos considera hyperbola diagramma de functione  $y = 1/x$ , ubi  $x$  sume omni valore reale, valore 0 excepto, suo inclinatione in puncto de abscissa 1 vale  $-1$ ; vel tangente fac angulo  $-45^\circ$  cum axi  $oi$ .

Campo de variabilitate de functione que nos deriva pote coincide cum toto campo de numeros reale,  $u = q$ , ut in exemplo 1, vel es intervallo, vel habet forma plus complexa. P. ex., nos pote derivare functione rationale de variabile rationale rFr. Sufficit in generale que  $x$  pertinet ad classe  $u$  et ad classe derivata.

Si nos muta campo de variabilitate, derivata pote sume valores differentes. Per exemplo:

$$D(\text{mod}, Q_0)0 = 1$$

$$D(\text{mod}, -Q_0)0 = -1.$$

« Derivata de functione modulo, in campo de numeros  $\geq 0$ , pro valore 0 vale 1, et in campo de numeros  $\leq 0$  vale  $-1$  ». Vel « diagramma de functione modulo consta de duo semirecta bisectrice de angulis  $(-i, j)$  et  $(i, j)$ .

Ce linea non habet inclinatione determinatam in origine, sed inclinationes  $+1$  et  $-1$  ad dexteram et ad sinistram de origine ».

#### NOTA.

Leibniz indica derivata de  $y$  relativo ad  $x$ , per signo  $\frac{dy}{dx}$  ubi « recta aliqua pro arbitrio assumpta vocetur  $dx$  » (MathS. t.5 p.220) et « ipsas  $dx, dy$ , ut ipsarum  $x, y$  differentiis sive incrementis, vel decrementis momentaneis proportionales haberi posse » (p.169).

Quantitates  $dx$  et  $dy$  vocare « differentiale ».  $dx$  es quantitate arbitrarium, non nullo;  $dy$  vale derivata  $\times dx$ .

In aliquo casu Leibniz pone  $d\bar{x}=1$ ; et scribe (Briefwechsel t.1 p.226):

$$d\bar{x}=1, d\bar{x}^2=2x, d\bar{x}^3=3x^2 \text{ etc. } d\bar{1/x} = \frac{1}{21x} \text{ etc.}$$

Tunc  $dy = Dy$ , et differentiale es identicum ad derivata.



[Newton indica derivata per uno puncto supra functione; Lagrange per uno accentu, Arbogast per  $Df \cdot x$ . Vide Theorema de Taylor.

Cauchy (*Œuvres* s.1 t.4 p.255) indica derivatas per  $D_x$ ,  $D_y$ , ... ubi indice designa variabile.

Jacobi distingue derivatas de functione de plure variabile, per signo  $\partial$ ; ce derivatas vocare «partiale». Sed ille nota que ce notatione non suffice, et debe es completato per lingua commune. Werke, t.3 p.396 a.1841:

«quando sine graviori incommodo licet, quanquam maxime affectanda sunt signa, quibus et omnis ambiguitas tollatur, et formulae sine omni interpretatione verbali adjecta, per se clarae et intelligibiles fiant, in hoc tamen casu...».

P. ex. si nos habe functione de 3 variabile  $f \varepsilon qf(q;q;q)$ , et si  $u \varepsilon qf q$ ,  $u \varepsilon qf(q;q)$ , es necesse plure specie de  $d$  pro indica 4 derivata:

$Df(x,y,z)|x$ ,  $Df(x,ux,z)|x$ ,  $Df[x,y,w,x,y]|x$ ,  $Df[x,ux,w(x,ux)]|x$ , que es derivata de  $f(x,y,z)$  pro  $x$ , ubi:

1.  $y$  et  $z$  es constante;
2.  $y$  es functione de  $x$ ;  $z$  es constante;
3.  $z$  es functione de  $x$  et de  $y$ , et  $y$  es constante;
4.  $z$  es functione de  $x$  et de  $y$ , et  $y$  es functione de  $x$ .

**derivata.** Per etymologia, vide pag. 159, N. 280. Es nomen de symbolo  $\delta$  super classes, et de symbolo  $D$  super functiones.

**differentiale**, AD differentiale, F différentielle, H differencial, I differenziale, R differentiaal'.  $\subset$  differentia (166, pag. 70) + -le (6, pag. 19).

\* 2.  $u \varepsilon \text{Cls}'q \cdot f \varepsilon qFu \supset$ :

1.  $x,y \varepsilon u \supset \Delta(f; y, x) = -\Delta(f; x, y)$
2.  $x,y,z \varepsilon u \supset \Delta(f; x, y) + \Delta(f; y, z) + \Delta(f; z, x) = 0$
3.  $x,y \varepsilon u \supset D(f; y, x) = D(f; x, y)$
4.  $x,y \varepsilon u \cdot y = x \supset fy = fx + (y-x)D(f; x, y)$

\* 3.  $u \varepsilon \text{Cls}'q \cdot f \varepsilon qFu \supset$ :

1.  $x \varepsilon u \delta u \cdot Dfx \varepsilon q \supset \lim(f, u, x) = fx$

Dem.  $\lim(f, u, x) = \lim[fx + (y-x)D(f; x, y) | y, u, x] = fx$

Si  $Dfx$  es quantitate (determinato et finito), tunc limite de functione, si variabile, in campo de variabilitate de  $f$ , verge ad  $x$ , es valore  $fx$ .

Tunc, in definitione de derivata, Prop. 1-2, lice substitue ad  $fx$  valore dato per Prop. 3-1. Parte de hypothesis non es necessario, et definitione sume forma plus generale:

2.  $x \varepsilon \delta u \supset Dfx = \lim[fy - \lim(f, u, x)] \cdot (y-x) | y, u, x \quad Df$

\*3  $u \supset \delta u . Df \varepsilon qFu . \supset . f \varepsilon (qFu) \text{cont}$

Dem. Prop. 3.1. Def cont (pag. 238).  $\supset . P$

Si classe  $u$  pertine ad suo classe derivata, vel si campo  $u$  es condensato, secundo nomenclatura de pag. 180, et si functio  $f$  habe derivata in toto campo  $u$ , tunc isto functio es continuo. Resulta de Prop. 1, et de definitione de continuitate.

Non omni functio continuo habe derivata. Uno exemplo es functio « modulo » ante considerato.

Novo exemplo:

$$D [x \sin |x| |x, |(N_1 \pi)|] 0 = 0$$

$$D [ \quad , |(2N_1 \pi + \pi/2)|] 0 = 1$$

$$D [ \quad , |(2N_1 \pi - \pi/2)|] 0 = -1.$$

Functio  $x \sin |x|$  non es definitio pro  $x = 0$ . Si nos tribue ad illo valore 0, tunc functio es continuo, sed pro  $x = 0$  non habe derivata in campo « q » de numeros reale. Nam limite de ratione de incremento de functione ad incremento de variabile depende de campo de variabilitate.

\* 4.  $a, b, x \varepsilon q . \supset . D[(ax + b) |x, q]x = a$

Dem.  $y \varepsilon q - ax . \supset . D[(ax + b) |x; x, y] = a$

Si  $a, b, x$  es quantitate, tunc derivata de functione lineare  $ax + b$ , ubi varia  $x$ , in campo de quantitates, pro valore dato  $x$ , vale  $a$ .

Nota que in scriptura  $(ax + b)|x$ , litera  $x$  es apparente, et non es idem litera  $x$  que occurre in hypothesi; sed nullo confusione ori in isto casu, et in casu simile in calculo integrale.

In vero, ratione de incremento de functione ad incremento de variabile habe valore constante  $a$ .

\* 5.

#### DERIVATA DE SUMMA.

\*1  $u \varepsilon \text{Cls}'q . f, g \varepsilon qFu . x \varepsilon u \wedge \delta u . Df x, Dg x \varepsilon q . \supset .$

$$D[(fx + gx) |x, u]x = Dfx + Dgx \quad \text{Distrib}(D, +)$$

« Derivata de summa de duo functione vale summa de derivatas de functiones ».

$$\{ DfD . \supset . D[(fx + gx) |x, u]x = \lim [(fy + gy) - (fx + gx)] / (y - x) |y, u, x\}$$

Distrib(+, +).  $\supset .$

$$= \lim [(fy - fx) / (y - x) + (gy - gx) / (y - x)]$$

Distrib(lim, +).  $\supset . P$

\*2 Hyp 1.  $a \varepsilon q . \supset . D(a \times fx |x, u) = a \times Dfx$

« Derivata de producto de quantitate constante per functione vale quantitate constante per derivata de functione ».

\* 6. DERIVATA DE PRODUCTO.

Hyp 5.1.  $\supset$ .  $D(fx \times gx \mid x, u)x = fx \times Dgx + gx \times Dfx$

Dem.  $y \in u - tx \supset$ .  $D(fx \times gx \mid x; x, y) =$   
 $fx \times D(g; x, y) + gx \times D(f; x, y) + D(f; x, y) \times D(g; x, y) \times (y - x)$

« Derivata de producto de duo functione vale primo factore per derivata de secundo, plus secundo factore per derivata de primo ».

\* 7. DERIVATA DE QUOTIENTE.

1.  $x \in q - t0 \supset$ .  $D(/, q - t0)x = -/x^2$

Dem.  $y \in q - t0 - tx \supset$ .  $D(/; x, y) = -/(xy)$

2.  $u \in \text{Cls}'q \cdot f, g \in qF u \cdot 0 \neq f' u \cdot x \in u \wedge \delta u \cdot Dfx, Dgx \in q \supset$ .  
 $D(gx/fx \mid x, u)x = (fx \times Dgx - gx \times Dfx)/(fx)^2$

Dem.  $y \in u - tx \supset$ .  $D(gx/fx \mid x; x, y) = (gy/fy - gx/fx)/(y - x) =$   
 $(fxgy - gxfy)/(y - x)[fxfy] = [fxD(g; x, y) - gxD(f; x, y)]/(fxfy)$

« Derivata de quotiente de duo functione vale denominatore per derivata de numeratore, minus numeratore per derivata de denominatore, toto diviso per quadrato de denominatore ». Nos suppose que numeratore et denominatore es functione definito in campo  $u$ , ubi denominatore non sume valore zero, et que, per valore  $x$  in  $u$  et prope alios  $u$ , ambo functione habe derivata.

\* 8. DERIVATA DE POTESTATE.

1.  $m \in N_1 \cdot x \in q \supset$ .  $D(x^m \mid x, q)x = mx^{m-1}$

Dem. 1.  $y \in q - tx \supset$ .  $D(x^m \mid x; x, y) = \Sigma(y^{m-r}x^{r-1} \mid r, 1 \cdots m) \supset$ . P

Dem. 2.  $m=1 \supset$  P

$m \in N_1 \cdot D(x^m \mid x, q)x = mx^{m-1} \cdot P6 \supset$ .

$D(x^{m+1} \mid x, q)x = D[(x^m \times x \mid x, q)x] = mx^{m-1} \times x + x^m = (m+1)x^m$  (2)

(1) . (2) . Induct.  $\supset$ . P

Si  $m$  es numero naturale, et  $x$  es quantitate, tunc derivata de  $x^m$ , ubi varia  $x$ , in campo de numeros reale, pro valore  $x$  de variabile, vale  $mx^{m-1}$ .

Nota que in formula  $x^m \mid x$ , litera  $x$  es apparente; formula vale  $x^m \mid z$ .

et indica « potestate  $m$  » ; litera  $x$  non es idem litera  $x$ , que occurre in Hp. Si nos pone  $m = 2$ , formula fi :

$$x \in q \supset D(x^2 | x, q)x = 2x,$$

et si nos pone  $x = 1$ , formula fi :

$$D(x^2 | x, q)1 = 2.$$

« derivata de quadrato, in campo de valores reale, pro valore 1, vale 2 ».

In formula incompleto  $Dx^2 = 2x$ , que occurre in plure libro, non lice substitutione materiale de valore numerico ad  $x$ .

Demonstratione 1. In vero, ratione de incremento de functione ad incremento de variable es summa de  $m$  termine, que omni tende ad  $x^{m-1}$ .

Demonstratione 2. Potestate es casu particulare de producto, et regula deriva ex regula de derivatione de producto.

$$2 \quad n \in \mathbb{N}_1, x \in q \neq 0 \supset D(x^{-n} | x, q \neq 0)x = -nx^{-n-1}$$

$$\text{Dem. } D(x^{-n} | x, q \neq 0)x = D(1/x^n | x, q \neq 0)x = -nx^{n-1}/x^2n = -nx^{-n-1}$$

Regula de potestate mane, si exponente es negativo, pro variable non nullo.

$$3 \quad x \in Q \supset D(\sqrt{x} | Q)x = 1/(2\sqrt{x})$$

$$\text{Dem. } D\sqrt{x/y} = 1/\sqrt{x} + \sqrt{y}$$

## \* 9. DERIVATA DE FUNCTIONE DE FUNCTIONE.

$$u, x \in \text{Cls}'q, f \in qF^u, g \in uFr, x \in r \cap \delta r, g, x \in \delta u, Df(g, x), Dg, x \in q \\ \supset D(fg)x = Df(g, x) \times Dg, x$$

$$\text{Dem. } g \in r \cap \delta r, P2.4 \supset fgg - fge = Df(g, gg) \times (gg - ge) \supset$$

$$Dfg, x, y = D(fg, gg) = Dg, x, y \supset P$$

Nos suppose :  $u$  et  $h$  es classe de quantitates ;  $f$  es quantitate functione definito in campo  $u$  ;  $g$  es  $u$  functione definito in campo  $r$ . Nos sume individuo  $x$  in  $r$  et prope alios  $r$  ;  $g, x$  es prope alios  $u$ . Functione  $f$  pro valore  $g, x$ , et functione  $g$  pro valore  $x$  habe derivatas determinato et finito.

Tunc derivata de functione  $fg$ , functione  $f$  de functione  $g$ , vale derivata de  $f$  pro valore  $g, x$ , multiplicato per derivata de  $g$  pro valore  $x$ .

Vel derivata de  $fg, x$  pro  $x$  vale derivata de  $fg, x$  pro  $g, x$ , multiplicato per derivata de  $g$  pro  $x$ .

In vero, ratione incrementale de functione  $fg$ , pro valores distincto  $x$  et  $y$ , vale producto de ratione incrementale de  $f$  pro valores  $g, x$  et  $g, y$ , distincto aut non, per ratione incrementale de  $g$  pro valores  $x$  et  $y$ . Unde ad limite sequit theorema.

## \* 10.

## FUNCTIONE INVERSO.

•0  $u \in \text{Intv} . f \in (qFu) \text{ cres cont} \supset f^{-1} \in (qFf^{-1}u) \text{ cres cont}$

Si in aliquo intervallo  $u$ , functione  $f$  es crescente et continuo, tunc suo functione inverso es definito in campo de valores sumpto per  $f$ , et es ibi crescente et continuo.

•1 (decr | cres) P•0

Idem pro functione decrescente.

•2  $u \in \text{Intv} . f \in (qFu) (\text{cres} \cup \text{decr}) \text{ cont} . y \in f^{-1}u . Df(f^{-1}y) \in q^{-1}0 .$

$$\supset Df^{-1}y = /Df(f^{-1}y)$$

Dem.  $y' \in f^{-1}u \Rightarrow y' = f^{-1}y' . \supset D(f^{-1}; y, y') = (f^{-1}y' - f^{-1}y) / (y' - y) = /D(f; f^{-1}y, f^{-1}y')$

Si functione  $f$  es crescente aut decrescente, et continuo, et si  $y$  es uno ex valores de functione, tunc derivata de functione inverso de  $f$  pro valore  $y$ , es reciproco de derivata de functione directo pro valore respondente ad  $y$ . Nos suppose que derivata de functione directo existe et non es nullo.

## \* 11.

## DERIVATA DE RADICE.

•1  $m \in N_1 . x \in Q . \supset D(x^{1/m} | x, Q)x = / [m x^{1/m-1}]$

Dem.  $D(x^{1/m} | x, Q)x = /D(z^{1/m} | z, Q)x = /[(mz^{m-1} | z, Q)^{1/m}x] = /[m(x^{1/m})^{m-1}]$

•2  $m \in R . x \in Q . \supset D(x^{1/m} | x, Q)x = mx^{m-1}$

## \* 12.

## DERIVATA DE EXPONENTIALIA.

•1  $x \in q . \supset D(e^x | x, q)x = e^x$

Dem. Def D  $\supset D(e^x | x, q)x = \lim[(e^{x+h} - e^x) / h | h, q, 0]$

$$= e^x (e^h - 1) / h$$

$$= e^x \lim[(e^h - 1) / h | h, q, 0]$$

§e P5•1 (pag. 245)  $\supset \lim[(e^h - 1) / h | h, q, 0] = 1$

Derivata de functione exponentialia ( $e^x | x, q$ ) vale se ipso.

Si nos pone  $x = 0$ , nos habe:  $D(e^x | x, q)0 = 1$ , derivata de  $e^x$  quando  $x$  varia, pro valore 0, vale 1. Curva diagramma de functione ( $e^x | x, q$ ) es « logarithmica ». Ergo « Tangente ad logarithmica in puncto de abscissa 0, fac cum axi de  $x$  angulo de 45° ».

Dem.  $h \varepsilon q \rightarrow D(a^x | x; x, x+h) = (a^{x+h} - a^x) / h = a^x (a^h - 1) / h$   
 $\S 5.2 \rightarrow \lim[(a^h - 1) / h | h, q, 0] = \log a \rightarrow P$

$$\forall x \in Q. \exists D(\log, Q)x = 1/x$$

$$\begin{array}{ll}
\text{Def 1.} & \text{Df D} \quad \text{D}(\log, Q|x = \lim_{h \rightarrow 0} [\log(x+h) - \log x]/h \mid h, Q-x, 0) \\
& \S \text{Log-6-7} \quad \text{Df } \log \quad \log x = \lim_{h \rightarrow 0} [\log(1+h/x)]/h \\
& \text{8} \quad \log x = x \times \lim_{h \rightarrow 0} \log(1+h/x)/h \\
\text{Comm}(\lim, \log) & \text{Df e} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \log x = x \times \log e = x
\end{array}$$

Dem 2.    §e P2·01 . §D P12·1 .  $\supset$ .  $D(\log, Q)x = /D(e \nmid y | y, q) \log x$   
 $= / (e \nmid \log x) = / x$

2.  $a \in Q \neq 1, x \in Q \supset D({}^a\text{Log} x | x, x) = ({}^a\text{Log } e)/x$   
 Dem.  ${}^a\text{Log} x = {}^a\text{Log } e \times \log x \supset P$

3.  $m \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Q} \Rightarrow D(x^m | x, \mathbb{Q})x = mx^{m-1}$   
 Dem.  $x^m = e^{N(m \log x)}$ .

$$\begin{aligned} & \cdot 4 \quad u \in \text{Cls}'q . f \in \text{QFu} . g \in \text{qFu} . x \in u \wedge \delta u . Dfx, Dgx \varepsilon q . \supset . \\ & D(fx \upharpoonright gx \mid x, u)x = (fx \upharpoonright gx) \times \log fx \times Dgx + gx \times fx \upharpoonright (gx-1) \times Dfx \\ & \text{Dem.} \quad fx \upharpoonright gx = e^{N(gx \log fx)} \end{aligned}$$

$$x \in q^{-1}0 \quad \supset \quad D(\text{mod}, q)x = \text{sgn} x \quad .$$

$$D(\text{mod}, Q_0)0 = 1 \quad . \quad D(\text{mod}, -Q_0)0 = -1$$

Derivata de funcție « mod » depinde de câmp de variabilitate.

$$a, b, c, d \in \mathbb{Q} \quad . \quad x \in \mathbb{Q} \quad . \quad a + bx = 0 \quad . \quad \neg .$$

$$D[(c+dx)/(a+bx) \mid x, q=a/b]x = (ad-bc)/(a+bx)^2$$

$$x \in q \supset D[x/\sqrt{1+x^2} \mid x, q]x = (1+x^2)^{-3/2}$$

$$x \in q \supset D[e^x (x-1) \mid x, q]x = xe^x$$

$$x \varepsilon q \quad \supset. \quad D[e^x (x^3 - 2x + 2) \mid x, q]x = x^3 e^x$$

$$x \in q \implies D[(e^x + e^{-x})^2 \mid x, q] x = (e^x - e^{-x})^2$$

»   »   —   »   »   »   +   »

Functiones in secundo membro es « sinu » et « cosinu hyperbolico ».

$$x \in Q+1 \rightarrow D(\log \log, Q+1)x = / (x \log x)$$

$$a, x \in \mathbb{Q} \cdot a^2 > x^2 \rightarrow$$

$$D \log[(a-x)/(a+x)] \mid x, (-a)-a \mid x = 2a/(x^2-a^2)$$

$$a \in \mathbb{Q} \cdot x \in \mathbb{Q} \rightarrow D \log[x + \sqrt{(a+x^2)}] \mid x, q \mid x = / \sqrt{(a+x^2)}$$

$$a \in \mathbb{Q} \cdot x \in \mathbb{Q} \neq 0 \rightarrow D \log[\sqrt{(a^2+x^2)+a}/x] \mid x, q \neq 0 \mid x \\ = a/[x\sqrt{(a^2+x^2)}]$$

$$a, b, x \in \mathbb{Q} \cdot b > a^2 \rightarrow$$

$$D \log[x+a+\sqrt{(x^2+2ax+b)}] \mid x, q \mid x = / \sqrt{(x^2+2ax+b)}$$

$$a, b, x \in \mathbb{Q} \cdot a < b < x \rightarrow$$

$$D \log[\sqrt{(x-a)+\sqrt{(x-b)}}/\sqrt{(x-a)-\sqrt{(x-b)}}] \mid x, b+Q \mid x = \\ / \sqrt{(x-a)(x-b)}$$

### \* 15. DERIVATA DE NUMERO COMPLEXO,

DE VECTORE ET DE PUNCTO, FUNCTIONE DE VARIABLE REALE.

$$1 \quad u \in \text{Cls}'q \cdot n \in N_1 \cdot f \in Cx \cap F'' \cdot x \in \text{mod}'' \rightarrow P1, 2, 3, 5$$

$$2 \quad (\text{vct} \mid Cx) P1$$

$$(\text{pnt} \rightarrow$$

Definitione de derivata, dato in Prop. 1, et principale regulas de derivatione, subsiste pro numero complexo functione dato in campo reale.

Et si nos considera puncto et vectore in loco de complexo.

Derivata de puncto mobile, si variabile es « tempore », es vectore dicto « velocitate ».

**tempore**, vocabulo de Latino internationale.

$\supset$  = F. temps = H. tiempo = I. tempo.

F. temps  $\supset$  A. tense (in Grammatica).

I. tempo  $\supset$  A.D.R. tempo (in Musica).

$\supset$  tempor-ale A.F.H.I., tempor-ario A.F.H.I.

Vocabularios etymologico non es concorde in origine de ce vocabulo.

**velocitate**  $\supset$  = A. velocity = H. velocidad = I. velocità.

F. vélocité (non in Mathematica).

$\supset$  veloci- = F. véloce = H. veloz = I. veloce = ve + -itate (p.19)

\* 16.  $u \in \text{Cls}'q . x \in u \wedge \delta u . f, g \in vFu . Dfx, Dgx \in v . \supset :$

$$^1 D(fx \times gx \mid x, u)x = fx \times Dgx + gx \times Dfx$$

$$^2 D(fx \alpha gx \mid x, u)x = Dfx \alpha gx + fx \alpha Dgx$$

Derivata de producto interno et alterno de duo vectore variabile es analogo ad derivata de producto de duo functio numerico. Nota que in producto alterno non licet commuta factores.

$$^3 f'x = 0 . \supset . D \text{ mod } f'x = Dfx \times Ufx$$

$$^4 \quad \quad \quad D Ufx = (\text{emp} \mid f'x) Df'x'(\text{mod } f'x)$$

\* 17. FUNCTIONE IMAGINARIO DE VARIABLE IMAGINARIO.

$$^0 u \in \text{Cls}'q' . f \in q'Fu . \supset . P1, 2, \dots$$

$$^1 x \in q' . \supset . D(e^x \mid x, q')x = e^x$$

[  $(q' \mid q)$  Dem P12.1 ]

Si  $x$  es numero imaginario, tunc derivata de  $e^x$ , ubi varia  $x$ , in campo de numeros imaginario, pro valore  $x$ , vale  $e^x$ , ut pro campo reale.

$$^2 x \in q . \supset . D(e^{ix} \mid x, q)x = ie^{ix}$$

\* 18. DERIVATA DE FUNCTIONES TRIGONOMETRICO.

$$^1 x \in q . \supset . D(s, q)x = c x \quad . \quad D(c, q)x = -s x$$

[  $D(e^{i \arcsin} \mid x, q)x = i e^{i \arcsin} \mid x, q$  . Oper imag . Oper real .  $\supset . P$  ]

Derivata de sin vale cos, et derivata de cos vale  $-\sin$ . Resulta de derivata de exponentiale.

$$^2 x \in q = (n + 1/2)\pi . \supset .$$

$$D[t, q = (2n + 1)\pi/2]x = 1/(c x)^2 = 1/(t x)^2$$

[  $\quad \quad \quad = D[sx/cx \mid x]x = (c x Ds x - s x Dc x)/(c x)^2 = 1/(c x)^2$  ]

$$^3 y \in (-1)^{-1} . \supset . Ds^{-1}y = 1/\sqrt{1-y^2} \quad . \quad Dc^{-1}y = -1/\sqrt{1-y^2}$$

[  $Ds^{-1}y = Ds(s^{-1}y) = c s^{-1}y = 1/\sqrt{1-y^2}$  ]

$$^4 y \in q . \supset . Dt^{-1}y = 1/(1+y^2)$$

[  $Dt^{-1}y = Dt(t^{-1}y) = 1/(1+(t^{-1}y)^2) = 1/(1+y^2)$  ]



- \* 19.1  $x \in q-n\pi \rightarrow D/tx = -/(sx)^2$
- 2  $x \in \theta\pi/2 \rightarrow D \log sx = /tx$
- 3  $x \in \theta\pi/2 \rightarrow D \log cx = -tx$
- 4  $x \in \theta\pi \rightarrow D \log \tan(x/2) = /sinx$
- 5  $x \in -\pi/2 - \pi/2 \rightarrow$   
 $D \log \tan(\pi/4 + x/2) = /cosx$
- 6  $a \in Q . b \in q . \text{mod} b < a . x \in q \rightarrow$   
 $D c^{-1}[(b+acosx)/(a+bcosx)] = \sqrt{a^2-b^2}/(a+bcosx)$
- 7  $x \in q \rightarrow D\{[/(4\sqrt{2})]\log[(1+x\sqrt{2}+x^2)/(1-x\sqrt{2}+x^2)] +$   
 $[/(2\sqrt{2})]\tan^{-1}[x\sqrt{2}/(1-x^2)]\} = /(1+x^4)$

\* 20.1 THEOREMA DE MAXIMO ET MINIMO.

$u \in \text{Cls}'q . f \in qFu . x \in inu . fx = \max f'u . Dfx \in q \rightarrow Dfx = 0$

Dem. Hp .  $y \in u \rightarrow fy - fx \leq 0$  (1)

(1) .  $y \in u(x-Q) \rightarrow D(f; x, y) \leq 0$  (2)

(1) .  $y \in u(x+Q) \rightarrow D(f; x, y) \leq 0$  (3)

(2) . (3)  $\rightarrow Dfx \leq 0 . Dfx \leq 0 \rightarrow Dfx = 0$

$u$  es classe, ubi es definito functione  $f$ . Si ad valore  $x$ , interno ad campo considerato, responde valore  $fx$ , maximo ex valores de functione in toto campo, et si derivata de  $f$ , pro valore  $x$ , es determinato et finito, tunc ee derivata vale zero.

In vero,  $fx$  es maximo valore de functione. Ergo, si  $y$  es in campo  $u$ , seque  $fy - fx \leq 0$ . Tunc, si  $y < x$ , ratione incrementale es  $\leq 0$ . Si  $y > x$ , ratione considerato es  $\leq 0$ .  $Dfx$ , limite de ambo ratione, es  $\leq 0$  et  $\leq 0$ , ergo  $Dfx = 0$ .

2 (min | max)P.1

P.1 subsiste, si in loco de maximo valore, nos considera minimo. Plure auctore moderno voca «extremo» valore que es aut maximo aut minimo.

Exemplo. Nos vol decompone dato numero  $a$  in duo partes  $x$  et  $a-x$ , tale que producto de potestates  $m$  et  $n$  de duo parte fi maximo. Exponentes  $m, n$  es p. ex. numero naturale. Functione  $x^m(a-x)^n|x$ , es nullo pro valores 0 et  $a$  de variable, et es positivo in interno de intervallo de 0 ad  $a$ , et es continuo. Ergo ee functione fi maximo pro valore de variable interno ad intervallo considerato. Ce valore annulla derivata, vel satisfac aequatione :

$$mx^{m-1}(a-x)^n - nx^m(a-x)^{n-1} = 0;$$

si nos supprime factores  $x^{m-1}$  et  $(a-x)^{n-1}$ , que non es nullo in interno de intervallo considerato, æquatione fi

$$m(a-x) - nx = 0, \text{ vel } x/m = (a-x)/n.$$

Valore de  $x$  que satisfac æquatione es unico, et es valore quæsito. Ergo duo parte debe es proportionale ad exponentes, ut es noto per Algebra, III §12 P30, pag. 110.

*Applications de theorema præcedente ad Geometria. (Exercitio).*

1. Rectangulo inscripto in triangulo, et maximo in area, habe altitudine æquale ad altitudine de triangulo /2.

2. Cylindro in sphæra, maximo in volumen, habe altitudine  $= 2r/\sqrt{3}$ , radio basi  $= r\sqrt{2/3}$ ;  $r$  es radio de sphæra.

3. Cylindro in sphæra, maximo in superficie laterale, habe diametro de basi  $=$  altitudine  $=$  (radio sphæra)  $\times \sqrt{2}$ .

4. Idem, maximo in superficie totale, habe altitudine  $=$  (radio sphæra)  $\times \sqrt{2[1-1/\sqrt{5}]}$ .

5. Cono in sphæra, maximo in volumen, habe altitudine  $=$  (radio sphæra)  $\times 4/3$ . (Fermat a.1636).

6. Idem, maximo in superficie laterale, idem.

7. Idem, maximo in superficie totale, habe altitudine  $=$  radio  $\times (23-\sqrt{17})/16$ .

8. Cylindro inscripto in cono, et maximo in volumen, habe altitudine æquale ad altitudine de cono /3.

9. Idem, maximo in superficie laterale, habe altitudine æquale ad altitudine de cono /2.

Si functione es maximo, non in interno, sed p. ex. pro limite supero de campo, tunc derivata, si existe, es  $\leq 0$ .

Functione « mod » es minimo pro  $x=0$ , et non habe derivata.

$\uparrow 2/3$  es minimo pro  $x=0$ , et derivata es  $\infty$ .

✱ 21.

#### THEOREMA DE ROLLE.

$$a, b \in \mathbb{R}. a = b. f, Df \in \mathcal{Q}F[a, b]. fa = fb = 0. \supset. 0 \in Df[a, b]$$

Si functione reale  $f$ , habente derivata in toto intervallo de  $a$  ad  $b$ , es nullo pro valores  $a$  et  $b$ , tunc existe valore interno ad intervallo, que redde derivata nullo.

} ROLLE a.1689 p.127:

« Les racines de chaque cascade (derivata) seront prises pour les hypotheses moyennes de la cascade suivante ».

Versione: inter duo valores que annulla functione, existe valore que annulla derivata.

Dem.

Functione  $f$ , que habet derivatam, per theorema præcedente est continuus:Hp. P2.3.  $\therefore f \in qFa^{-b}$  cont (1)

Ergo existit suo maximum et suo minimum valore in toto intervallo:

Hp. (1). § cont 2.3.  $\therefore \max f' a^{-b}, \min f' a^{-b} \in q$  (2)Si functione  $f$  sumit valores positivos, tunc maximum intra illos est positivum, et respondet ad valore interno ad intervallo:Hp.  $\exists Q \wedge f' a^{-b} . x \in a^{-b} . f x = \max f' a^{-b} . \therefore x \in a^{-b}$  (3)

Ergo per theorema super maximum, derivata est nullus:

Hp. (3). P20.  $\therefore$  Ths (4)Si functione  $f$  sumit valores negativos,  $-f$  sumit valores positivos, et ex ratiocinio præcedente sequitur thesi:Hp.  $\exists (-Q \wedge f' a^{-b} . \therefore \exists Q \wedge (-f)' a^{-b} . 4. \therefore$  Ths (5)Si functione sumit valores non positivum, et non negativum, est semper nullus, et derivata  $= 0$ :Hp.  $\neg \exists Q \wedge f' a^{-b} . \neg \exists (-Q \wedge f' a^{-b} . \therefore f' \notin Fa^{-b} . \therefore$  Ths (6)

In omni casu thesi est verum:

(4) . (5) . (6)  $\therefore$  P

## \* 22.

## THEOREMA DE VALORE MEDIO.

 $a, b \in q . a = b . f, Df \in qFa^{-b} . \therefore D(f; a, b) \in Df' a^{-b}$ Dem. Hp.  $g = [fx - fa - (x - a)Df; a, b] \mid x, a^{-b} . \therefore ga = gb = 0$ .P21.  $\therefore \exists a^{-b} \wedge x \in [Dfx - Df; a, b] = 0] . \therefore$  ThsSi  $a, b$  est quantitas differente inter se, et functione reale  $f$  habet derivatam in toto intervallo de  $a$  ad  $b$ , tunc ratione de incremento de functione ad incremento de variabile est unus ex valores de derivata in interno de intervallo.In vero, si nos ponit  $hx = fa + (x - a)Df; a, b$ , sequitur  $ha = fa, hb = fb$ . Tunc functione  $gx = fx - hx$ , ubi varia  $x$ , in intervallo dato, est nullus pro  $x = a$  et  $x = b$ . Per theorema de Rolle, sua derivata est nullus pro valore interno ad intervallo, unde sequitur P.

Theorema præcedente est multo importante in calculo differentiale.

In Geometria, si nos considerat puncto  $o \mid xi \mid (fx)j$ , tunc puncto  $o \mid xi \mid (hx)j$  describit rectam que inter punctos de curva, de abscissa  $a$  et  $b$ . Theorema dicit: chorda est parallelus ad tangentem in aliquo puncto de arcu.

) CAVALIERI a.1635 LVII p.15.

« Si curva linea quæcunque data tota sit in eodem plano, cui occurrat recta in duobus punctis ..... poterimus aliam rectam lineam præfatæ aquidistantem ducere, quæ tangat portionem curvæ lineæ inter duos prædictos occursus continuatam : »

Puncto  $o + (fx)i$  describe recta  $oi$ . Theorema dice que  $D(f; a, b)$ , id es spatio descripto per puncto diviso per tempore, es uno ex valores de  $Dfx$ , numero que mete velocitate de puncto.

Sub ambo forma, de Geometria et de Mechanica, propositione es quasi evidente. Suo enunciatione, cum hypothesisi necessario et sufficiente es in:

Grassmann a.1862, Werke t.1 p.323,

Weierstrass, vide G. Cantor JfM. a.1870 t.72 p.141,

Ossian-Bonnet, vide Serret Calc. diff. a.1868 p.19.

\* 23.

1  $a, b \in \mathbb{Q} . a = b . f \in \mathbb{Q} F a - b . Df \in \mathbb{Q} F a - b . \supset . f \in \text{cres}$

2 " " "  $(-Q) \supset . f \in \text{decr}$

3 " " "  $(\neq 0) \supset . f \in \text{const}$

[ P22  $\supset$  P ]

De theorema de valore medio seque :

Functione reale, que in aliquo intervallo habe derivata semper positivo, es crescente.

Si derivata es negativo, functione es decrescente.

Si derivata es semper nullo, functione habe valore constante.

Si duo functione  $f$  et  $g$  habe derivata semper æquale,  $Df = Dg$ , tunc  $f - g$  habe derivata semper nullo. Ergo differentia de duo functione es constante.

Si functione  $h$  es derivata de  $f$ ,  $h = Df$ , tunc  $f$  vocare functione primitivo, vel « integrale » de  $h$ .

Exemplo.

$n \in \mathbb{Q} . \supset . (x^n e^{-x} | x, 0 \neg n) \in \text{cres} . (x^n e^{-x} | x, n + Q) \in \text{decr}$

Functione considerato es crescente de 0 ad  $n$ , et post decresce.

$(x^x | x, \theta/e) \in \text{decr} . (x^x | x, /e + Q) \in \text{cres}$

Nos habe:  $x \in \mathbb{Q} . \supset . 1 - \cos x \geq 0$ .

Tunc functione  $x - \sin x$ , que habe pro derivata functione  $1 - \cos x$ , es crescente; et es nullo pro  $x = 0$ ; ergo:

$x \in \mathbb{Q} . \supset . x - \sin x > 0$ ,

vel  $x \in \mathbb{Q} . \supset . x < \sin x$ .

Tunc functione  $x^3/2 - 1 + \cos x$ , que habe pro derivata functione  $x - \sin x$ , es crescente; illo es nullo pro  $x = 0$ ; ergo:

$x \in \mathbb{Q} . \supset . x^3/2 - 1 + \cos x > 0$ ,

vel

$$x \in \mathbb{Q} \supset \cos x > 1 - x^2/2.$$

Tunc functione  $x^3/3! - x + \sin x$  es crescente, et nullo pro  $x = 0$ ;  
ergo:

$$x \in \mathbb{Q} \supset \sin x > x - x^3/3!,$$

et ita porro, resulta formula 16.3 de pag. 252.

#### \* 24.

#### APPROXIMATIONES.

Quantitates que occurre in praxi es in generale determinato per approximatione; id es, es dato intervallo que contine illo. Isto intervallo pote es dato per extremos:

$$\text{Densitate de ferro} = 7700 \text{---} 7900 \text{ Kg/m}^3,$$

$$\text{, nive} = 50 \text{---} 500 \text{ Kg/m}^3.$$

Pote es dato per uno extremo, et suo amplitudo (vel longore, Long de pag. 142). Per exemplo, scriptura

$$e = 2.71828...$$

significa, apud plure Auctore, que cifras scripto es primo cifras de evolutione de numero e in fractione decimale, id es:

$$e \in 2.71828 + \theta \times 10^{-8}$$

et

$$\text{Long } (2.71828...) = 10^{-8}.$$

Aliquo Auctore da intervallo per puncto medio, et demi amplitudo: et scribe  $\text{Log} 3 = 0.4771213$  in loco de

$$\text{Log} 3 \in 0.4771213 \pm (\theta \times 10^{-7})/2.$$

In omni casu, amplitudo de intervallo es uno unitate de ultimo ordine decimale.

Si  $x$  es valore noto per approximatione, id es, si  $x$  es intervallo, et super illo nos fac operatione  $f$ , tunc  $fx$  (id es,  $f^{\circ}x$ ) es determinato solo per approximatione, id es  $fx$  es intervallo (nos suppose continuitate de  $f$ ). Si  $dx$  es differentia de duo valore de  $x$ , et  $dfx$  differentia de valores correspondente de  $fx$ , theorema de valore medio dice que

$$dfx = (Dfx)dx,$$

ubi in  $Dfx$ ,  $x$  es aliquo valore in intervallo dato.

Nos calcula  $dfx$  per excessu, et resulta:

$$x \in \text{Intv} . f, Df \in qFx \supset \text{Long} fx \leq (l' \text{mod} Dfx) \times \text{Long} x.$$

« Si  $x$  es intervallo, et  $f$  es functione reale definito, cum suo derivata, in intervallo  $x$ , tunc longore de intervallo  $fx$ , vel errore in calculo de  $fx$ , non supera longore de  $x$ , vel errore

in variabile  $x$ , multiplicato per maximo valore absoluto de derivata in intervallo ».

Ex regulas de derivatione seque:

$$x \in \theta. h \in \theta x. m \in N_1. \supset. \text{Long}(x - \theta h)^m < h$$

« Errore in calculo de potestate  $m$  de numero approximato  $x - \theta h$ , dato per limite supero  $x$ , et amplitudo de approximatione  $h$ , si  $x$  es  $< 1$ , es minore de  $m \times$  errore de numero ».

$$x \in 1 + Q. h \in Q. m \in N_1. \supset. \text{Long} \sqrt[m]{x + \theta h} < h$$

« Errore in calculo de radice  $m$  de numero majore de 1, es minore de errore in radicando ».

$$x \in 1 + Q. h \in Q. \supset. \text{Long Log}(x + \theta h) < h$$

« Errore in logarithmo decimale (aut naturale) de numero es minore que errore de numero ».

$$x \in 1 + Q. h \in Q. \supset. \text{Long sin}(x + \theta h) < h$$

« Errore in sinu (vel cosinu) es minore de errore de arcu ».

Exemplo. Nos quære  $(9.25\dots)^{10}$ . Vale  $10^{10} \times (0.925\dots)^{10}$ . Me calcula  $(0.925)^{10}$ , per exemplo cum tabulas de logarithmos,  $= 0.45858\dots$ . Numero  $0.925\dots$  habe errore  $< 10^{-2}$ ; ergo suo potestate habe errore  $< 10^{-2}$ . Me supprime cifras decimale post secundo, et scribe:  $(0.925\dots)^{10} = 0.45\dots$ ; et post multiplicatione per  $10^{10}$ :

$$(9.25\dots)^{10} = 10^9 \times 4.5\dots$$

ubi secundo cifra pote es 5 (ut es scripto) aut 6; causa accumulatione de duo errore: in suppressione de cifras post 0.45, et in determinatione de basi 9.25....

Aliquo Auctore (PERRY) voca cifras « immorale » cifras que non resulta ex hypothesi, sed ex prolongatione arbitrario de calculo trans limites legitimo. Qui scribe per exemplo:

$$(9.25\dots)^{10} = 10^9 \times 4.5858\dots$$

scribe 5 cifras, de que 3 es immorale. Ille affirma que omni numero inter 9.25 et 9.26 ad potestate 10 es comprehenso inter  $10^9 \times 4.5858$  et  $10^9 \times 4.5859$ , quod non es vero; nam illos es comprehenso solo inter  $10^9 \times 4.5$  et  $10^9 \times 4.7$ .

## \* 25.

### INTEGRALE DE POLYNOMIO.

$$n \in N_1. a \in qF0^{n-1} \supset: f \in qFq. Df = [\Sigma(a_r x^r | r, 0^{n-1})] x, q]$$

$$= f = \{f_0 + \Sigma[a_r x^{r-1} / (r+1) | r, 0^{n-1}] x, q\}$$

$$[ D(fx - \Sigma[a_r x^{r+1} / (r+1) | r, 0^{n-1}] | x, q) = (f_0 : q) . P.233. \supset P ]$$

Si  $n$  es numero naturale, et si  $a$  es successione de quantitates cum indices 0, 1, ...  $n$ , tunc functione  $f$ , que habe pro derivata polynomio :

$$Df x = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n$$

pro omni valore reale de  $x$ , vale :

$$f x = f_0 + a_0 x + a_1 x^2/2 + a_2 x^3/3 + \dots + a_n x^{n+1}/(n+1)$$

ubi varia  $x$ , in toto campo de numeros.

\* 26. ALTERO THEOREMA DE VALORE MEDIO.

$$1 \quad a, b \in \mathbb{Q} \cdot a \leq b \cdot f, g \in \mathbb{Q} F a \overline{b} \cdot m \in \mathbb{N}_0 \cdot Df = \\ [(x-a)^m g x | x, a \overline{b}] \cdot \supset \cdot f b - f a \in (b-a)^{m+1}/(m+1) \times g' a \overline{b}$$

Dem.  $k = (fb - fa)/(b-a)^{m+1}$ .  $h = [fx - fa - (x-a)^{m+1}k | x, a \overline{b}] \cdot \supset$   
 $ha = hb = 0$ . Theorema de Rolle  $\cdot \supset \cdot \exists a \overline{b} \wedge x \exists (Dh x = 0) \cdot \supset$   
 $\exists a \overline{b} \wedge x \exists [Dfx - (m+1)k(x-a)^m = 0] \cdot \supset \cdot \exists a \overline{b} \wedge x \exists [gx - (m+1)k = 0]$   
 $\cdot \supset \cdot k \in (g' a \overline{b})/(m+1)$

Si derivata de functione  $f$  habe forma  $(x-a)^m g x$ , dum  $x$  varia de  $a$  ad  $b$ , tunc incremento de functione vale integrale de primo factore  $(x-a)^m$ , per valore medio de secundo.

$$2 \quad a, b \in \mathbb{Q} \cdot a \leq b \cdot f, g \in \mathbb{Q} F a \overline{b} \cdot n \in \mathbb{N}_1 \cdot c \in \mathbb{Q} F 1 \dots n \cdot \\ Df = \{ \Sigma [c_r (x-a)^{r-1} | r, 1 \dots n] + (x-a)^n g x | x, a \overline{b} \} \cdot \supset \cdot \\ fb \in fa + \Sigma [c_r (b-a)^r / r | r, 1 \dots n] + (b-a)^{n+1}/(n+1) \times g' a \overline{b}$$

Dem. Hp  $\cdot \supset \cdot D[fx - fa - \Sigma [c_r (x-a)^r | r, 1 \dots n] | x, a \overline{b}] =$   
 $[(x-a)^n g x | x, a \overline{b}] \cdot P.1 \cdot \supset \cdot P$

Si derivata de functione es polynomio ordinato secundo potestates de  $(x-a)$ , plus termine de forma  $(x-a)^n g x$ , tunc incremento de functione vale integrale de polynomio, plus termine que nos calcula cum regula præcedente.

Exemplo.

Nos habe (Prop. 13) :  $x \in -1 + \mathbb{Q} \cdot \supset$

$$D[\log(1+x) | x, -1 + \mathbb{Q}] x = 1/(1+x)$$

Ex Algebra (pag. 121 P4) :  $x \in -1 + \mathbb{Q} \cdot n \in \mathbb{N}_1 \cdot \supset$

$$1/(1+x) = \Sigma [(-1)^r x^r | r, 0 \dots (n-1)] + (-1)^n x^n / (1+x)$$

Nos integra cum regula præcedente:  $x\varepsilon -1+Q \cdot \supset$ .

$$\log(1+x) \varepsilon \sum [(-1)^r x^{r+1} / (r+1) | r, 0 \dots (n-1)] + \\ (-1)^n x^{n+1} / (n+1) \times 1 / (1+\theta x)$$

Si  $-1 < x \leq 1$ , limite supero et infero de  $1/(1+\theta x)$  es finito;  $\lim x^{n+1}/(n+1) | n=0$ . Seque serie de MERCATOR p.246 P64.

Alio exemplo.

Nos habet:  $x\varepsilon q \cdot \supset$ . D  $\text{tang}^{-1} x = 1/(1+x^2)$   
et:  $x\varepsilon q \cdot n \in N_1 \cdot \supset$ .

$$1/(1+x^2) = \sum [(-1)^r x^{2r} | r, 0 \dots (n-1)] + (-1)^n x^{2n} / (1+x^2)$$

Nos integra et habet P7.2 de pag. 264, unde serie 7.4

$$3 \quad a, b \varepsilon q \cdot a \leq b \cdot f, Df, g, Dg \varepsilon q F a^{-b} \cdot 0 \leq Dg^i a^{-b} \cdot \supset \\ (fb-fa)/(gb-ga) \varepsilon [(Df.x)/(Dg.x)] | x^i a^{-b}$$

Dem. Hp.  $h = [fx-fa-gx-ga, fb-fa, gb-ga] | x, a^{-b} \cdot \supset$ .

$$ha = hb = 0 \cdot P21 \cdot \supset. \exists a^{-b} \wedge x \exists [Dfx-Dgx \times (fb-fa)(gb-ga) = 0] \\ \cdot \supset. P$$

$\} \text{CAUCHY Calc. diff. a.1829 p.37}$

Ratione de incrementos de duo functione es uno ex valores sumpto per ratione de derivatas.

In vero, me voca  $hx$  functione de  $x$  de forma  $fx + pgx + q$ , ubi  $p$  et  $q$  es quantitate que me determina in modo que  $ha = hb = 0$ . Functione  $h$  habet expressione scripto. Tunc per theorema de Rolle, suo derivata es nullo per uno valore inter  $a$  et  $b$ ; unde seque theorema.

$$4 \quad a, b \varepsilon q \cdot a < b \cdot f, g, h, Df, Dg, Dh \varepsilon q F a^{-b} \cdot \supset$$

$$\exists a^{-b} \wedge x \exists \{ \text{Dtrm}[(Df.x, Dg.x, Dh.x), (fa, ga, ha), (fb, gb, hb)] = 0 \} \\ [k = \text{Dtrm}[(fx, gx, hx), (fa, ga, ha), (fb, gb, hb)] | x \cdot \supset$$

$$ka = kb = 0 \cdot P21 \cdot \supset. P \}$$

Nos considera tres functione,  $f, g, h$ , definito, cum derivatas, in aliquo intervallo  $a^{-b}$ ; tunc determinante

$$\begin{vmatrix} fx & gx & hx \\ fa & ga & ha \\ fb & gb & hb \end{vmatrix}$$

es nullo pro  $x = a$ , et pro  $x = b$ . Ergo suo derivata, que resultat, si in primo linea nos scribe derivatas, es nullo, pro aliquo valore inter  $a$  et  $b$ .

Si nos pone  $h = (1/a^{-b})$ , id es nos suppose que  $h$  habet valore constante 1, in toto intervallo de  $a$  ad  $b$ , seque P.3. Si  $gx = x - a \cdot m$ , seque P.1; et pro  $m=0$ , resultat P.22.



✱ 27. THEOREMA DE DE L'HOSPITAL.

Limite de ratione de duo functione æqua ratione de limites, si numeratore et denominatore habe limite determinato et finito, et limite de denominatore non es nullo (pag. 217 Prop. 8.3 et 9.2).

Si denominatore verge ad 0, et numeratore habe limite non nullo, limite de ratione es infinito (ibi Prop. 9.3).

Si numeratore et denominatore verge ad 0, tunc es utile regula sequente:

$$\begin{aligned} \cdot 1 \quad a, b \in \mathbb{Q} \cdot a = b \cdot f, g, Df, Dg \in \mathbb{Q} F a^{-b} \cdot x \in a^{-b} \cdot fx = gx = 0 \\ \cdot 0 = \varepsilon Dg'(a^{-b} - x) \cdot \lim(Dfz / Dgz \mid z, a^{-b}, x) \in \mathbb{Q} \cup \pm\infty \\ \cdot \supset \cdot \lim(fz/gz \mid z, a^{-b}, x) = \lim(Dfz / Dgz \mid z, a^{-b}, x) \end{aligned}$$

$$\text{Dem.} \quad fz/gz = (fz - fx)/(gz - gx) \in (Dfu/Dgu) \mid u^{-b} - x \cdot \supset \cdot P$$

Es dato duo numero  $a$  et  $b$ , distincto, et duo functione  $f$  et  $g$  reale definito in intervallo de  $a$  ad  $b$ , habente derivatas. Ambo functione es nullo pro valore  $x$  de intervallo. Derivata de denominatore  $g$  non es nullo pro valores diferente de  $x$ . Ratione de duo derivata habe limite finito aut infinito. Tunc limite de ratione  $fz/gz$ , ubi varia  $z$  in intervallo dato et verge ad  $x$ , æqua limite de ratione de duo derivata.

{ DE L'HOSPITAL, *Analyse des infiniment petits* a.1696 p.145 :

« si l'on prend la différence du numérateur, et qu'on la divise par la différence du dénominateur, après avoir fait  $x=a$ , l'on aura la valeur cherchée ».

$$\begin{aligned} \cdot 2 \quad a, b \in \mathbb{Q} \cdot a = b \cdot f, g \in \mathbb{Q} F a^{-b} \cdot fa = ga = 0 \cdot Df, Dg \in \mathbb{Q} F a^{-b} \cdot \\ 0 = \varepsilon Dg'(a^{-b}) \cdot \supset \cdot \text{Lm}(fx/gx \mid x, a^{-b}, a) \supset \text{Lm}(Dfx/Dgx \mid x, a^{-b}, a) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cdot 3 \quad a \in \mathbb{Q} \cdot f, g, Df, Dg \in \mathbb{Q} F(a+Q) \cdot \lim(f, a+Q, \infty) = \\ \lim(g, a+Q, \infty) = 0 \cdot 0 = \varepsilon Dg'(a+Q) \cdot \supset \cdot \\ \text{Lm}(fx/gx \mid x, a+Q, \infty) \supset \text{Lm}(Dfx/Dgx \mid x, a+Q, \infty) \end{aligned}$$

$$[ \text{Lm}(fx/gx \mid x, a+Q, \infty) = \text{Lm}(f(a+z)/g(a+z) \mid z, Q, 0) : P.1 \cdot \supset \cdot P ]$$

$$\begin{aligned} \cdot 4 \quad a \in \mathbb{Q} \cdot f, Df \in \mathbb{Q} F(a+Q) \cdot \supset \cdot \\ \text{Lm}[(fx)/x \mid x, a+Q, \infty] \supset \text{Lm}(Df, a+Q, \infty) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cdot 5 \quad a \in \mathbb{Q} \cdot f, g, Df, Dg \in \mathbb{Q} F(a+Q) \cdot \lim(g, a+Q, \infty) = \infty \cdot \\ 0 = \varepsilon Dg'(a+Q) \cdot \supset \cdot \\ \text{Lm}(fx/gx \mid x, a+Q, \infty) \supset \text{Lm}(Dfx/Dgx \mid x, a+Q, \infty) \end{aligned}$$

\* 28.

## DERIVATA DE SERIE.

$k \in \text{Intv} \cdot f \in qf(k; N_0) : x \in k \cdot n \in N_0 \cdot \bigcup_{x, n} D[f(z, n) | z, k] x \in q :$   
 $\Sigma \{ l' \mid \text{mod } D[f(z, n) | z, k] \mid n, N_0 \} \in Q \cdot x \in k : \bigcup$   
 $D \{ \Sigma [f(z, n) | n, N_0] | z, k \} x = \Sigma \{ D[f(z, n) | z, k] x \mid n, N_0 \}$

$k$  es intervalo ;  $f$  es quantitate functione de duo variabile, uno in campo  $k$ , altero in campo de numeros  $N_0$ . [Tunc  $f(x, n)$ , si varia  $n$ , repræsentat serie, de que omni termine depende de  $x$ ]. Nos suppose que pro omni valore de  $x$  in  $k$ , et pro omni indice  $n$ , termine  $f(x, n)$  habe derivata pro  $x$ ; et que serie de limites supero de valores absoluto de derivatas de  $f(z, n)$ , pro  $z$  variante in  $k$ , es convergente. Tunc derivata de serie vale serie de derivatas.

Dem.

Per definitione, derivata vale limite de ratione incrementale :

$$D \{ \Sigma [f(z, n) | n, N_0] | z, k \} x = \lim (D \{ \Sigma [f(z, n) | n, N_0] | z; x, y \} | y, k, x) \quad (1)$$

Sed ratione incrementale de serie es serie de rationes incrementale :  
 $\S \lim P21.5 \text{ P22.1 (p.222)} \cdot \bigcup$

$$D \{ \Sigma [f(z, n) | n, N_0] | z; x, y \} = \Sigma \{ D[f(z, n) | z; x, y] \mid n, N_0 \} \quad (2)$$

Nunc ratione incrementale de omni termine verge ad suo derivata :  
 $n \in N_0 \cdot \bigcup \cdot \lim \{ D[f(z, n) | z; x, y] | y, k, x \} = D[f(z, n) | z, k] x \quad (3)$

Et per theorema de valore medio, ratione incrementale es uno ex valores de derivata :

$$n \in N_0 \cdot y \in k \cdot \bigcup \cdot D[f(z, n) | z; x, y] \in D[f(z, n) | z, k] \cdot x - y \quad (4)$$

Ergo serie de limites supero de valores absoluto de rationes incrementale de termines de serie dato converge ad limite  $\leq$  ad serie de limites supero de derivatas :

$$\Sigma \{ l' \mid \text{mod } D[f(z, n) | z; x, y] | y, k \mid n, N_0 \} \leq \Sigma \{ l' \mid \text{mod } [D[f(z, n) | z, k] \mid n, N_0 \} \quad (5)$$

Nos deduce, per theorema præcedente, que limite de serie vale serie de limites, unde seque theorema :

Comm(lim,  $\Sigma$ ) (p.233 P43.1)  $\cdot \bigcup \cdot P$

Theorema præcedente deriva de theorema de limite de serie. Ergo vale si serie de derivatas es de « convergentia uniforme simplice » (Dini).

Serie  $\Sigma [f(x, n) | n, N_0]$  es de convergentia uniforme simplice si :

$$0 \in \text{Lan} \{ l \mid \text{mod } \Sigma [f(x, n) | n, m + N_0] | x, k \} \mid m.$$

et es equiconvergente (vide pag. 234). si  $0 = \lim \dots$

Hypothesi de continuitate de derivata (que occurre in aliquo libro non es necessario.

\* 29.  $a, b \in Q . a \leq b . f \in qF a \neg b . \supset :$

1.  $x \in a \neg b . Df \in qF(a \neg b \neg x) . \lim(Df, a \neg b, x) \in q . \supset .$

$Dfx = \lim(Df, a \neg b, x)$

2.  $Df \in qF(a \neg b) . r \in a \neg b . \supset . Dfx \in \text{Lim}(Df, a \neg b, x)$

[ P22  $\supset$  P.1.2 ]

3.  $\supset . Dfa < 0 . Dfb > 0 . \supset . 0 \in Df a \neg b$

[ Hyp  $\supset . \exists a \neg b \wedge \exists (fx = \max f(a \neg b)) . \supset . P ]$

4.  $\supset . Dfa \neg Dfb \supset Df a \neg b$

[ P.3  $\supset$  P.4 ]

5.  $\supset . h \in Q . \supset . \exists (n, x) \exists \{ n \in N_1 . x \in (a \neg b f 0 \dots n) \text{ cres} .$

$x_0 = a . x_n = b : r \in 0 \dots (n-1) . \supset . \text{mod}(Dfx_r - Dfx_{r+1}) < h \}$

6.  $h \in Q . \supset . \exists (n, x) \exists \{ n \in N_1 . x \in (a \neg b f 0 \dots n) \text{ cres} .$

$x_0 = a . x_n = b : r \in 0 \dots (n-1) . \supset . \text{mod}[Dfx_r - D(f; x_r, x_{r+1})] < h \}$

Derivata de uno functione, et quando non es continuo, habe plure proprietate de functiones continuo; p. ex.:

1. Si derivata  $Df$  existe pro omni valore in intervallo differente de  $x$ , et si quando variabile verge ad  $x$ , derivata verge ad limite, tunc existe derivata de  $f$  pro valore  $x$ , æquale ad ce limite.

2. Si derivata  $Df$  existe in toto intervallo, tunc  $Dfx$  es uno ex limes de derivata  $Df$ , ubi variabile verge ad  $x$ .

3. Si pro valore  $a$  derivata habe valore negativo, et pro  $b$  valore positivo, derivata sume valore nullo inter  $a$  et  $b$  (Darboux a.1873).

4. Omni valore inter duo valore de derivata es valore de derivata.

5. Dato quantitate positivo  $h$ , nos pote divide intervallo de  $a$  ad  $b$  in partes cum valores  $x_0 = a, x_1, x_2, \dots, x_n = b$  in modo que differentia de duo valore consecutivo de derivata es in valore absoluto minore de  $h$ .

6. Et in modo que differentia inter derivata et ratione incrementale pro duo valores consecutivo fi minore de  $h$ .

Vide meo scripto Ann.N. a.1884 p. 45, 153, 252;

Goursat AM. a.1884, p. 49, 316.

\* 30.

DERIVATA DE ORDINE SUPERIORE.

$u \in \text{Cls}'q . f \in qFu . m \in N_1 . r \in \delta^m u . \supset : D^m f x = (D^m f)_r \quad Df$

$D^m f_r$  « derivata de ordine  $m$  de functione  $f$  pro valore  $r$  » debe es decomposito ut es scripto [et non in  $D^m(f_r)$ ]. Nos suppose que functione  $f$  es definito in campo  $u$ , et que  $r$  pertine ad classe derivata de ordine  $m$  de  $u$ .

## Exercitio.

$$f, D''f, g, D''g \in \mathcal{QF}u \quad \supset.$$

$$D'''[(fx+gx)|x, u]x = D'''fx + D'''gx$$

$$D'''(a \times fx | x, u)x = a \times D'''fx$$

$$D'''(fx \times gx | x, u)x = \sum [C(m, r)(D^{m-r}fx)(D^r gx) | r, 0 \dots m]$$

} LEIBNIZ *MathS.* t.5 p.380 {

$$n \in m + N_0, x \in \mathcal{Q} \quad \supset. \quad D^n(x^n | x, q)x = n! [n - 0 \dots (n-1)] \times x^{n-n}$$

$$a \in \mathcal{Q}, x \in \mathcal{Q}, n \in N_1 \quad \supset. \quad D^n(a^x | x, q)x = a^x (\log a)^n$$

$$x \in \mathcal{Q}, n \in N_1 \quad \supset. \quad D^n(\log, Q)x = (-1)^{n-1} (n-1)! \cdot x^{-n}$$

$$» \quad D^{n-1}(x^n \log x | x, Q)x = n! / x$$

$$x \in \mathcal{Q}, n \in N_1 \quad \supset.$$

$$D^n(\log x | x, Q)x = (-1)^n n! x^{-n-1} [\log x - \sum (1 \dots n)]$$

$$n \in N_1, x \in \mathcal{Q} \quad \supset. \quad D^n(e^{ix} | x, q)x = i^n e^{ix}$$

$$D^n s x = s(x + n\pi/2) \quad . \quad D^n c x = c(x + n\pi/2)$$

$$a, b \in \mathcal{Q} \quad \supset. \quad D^n [s(ax+b) | x, q]x = a^n s(ax+b+n\pi/2)$$

$$y \in \mathcal{Q}, n \in N_1 \quad \supset. \quad D^n t^{-1}y = (n-1)! [c(t^{-1}y)]^n s[n(\pi/2 + t^{-1}y)]$$

## \* 31. INTERPOLATIONE DE PRIMO GRADU.

$$1. \quad a, b \in \mathcal{Q}, a \neq b, f, D^2 f \in \mathcal{QF}a \overline{b}, x \in a \overline{b} \quad \supset.$$

$$fx - fa - (x-a)D(f; a, b) \in (x-a)(x-b)(D^2 f; a \overline{b})/2$$

$$\text{Dem.} \quad h = [fz - fa - (z-a)D(f; a, b) - (z-a)(z-b)[fx - fa - (x-a)D(f; a, b)]$$

$$[(x-a)(x-b)] | z, a \overline{b} \quad \supset. \quad ha = hb = hx = 0 \quad \supset.$$

$$0 \in Dh'a \overline{b}, 0 \in Dh'x \overline{b} \quad \supset. \quad 0 \in D^2 h'a \overline{b} \quad \supset. \quad P$$

Si  $a$  et  $b$  es quantitates differente, et  $f$  es functione definito in intervallo de  $a$  ad  $b$ , tunc functione « interpolante » de primo gradu in  $x$ :

$$fa + (x-a)D(f; a, b)$$

coincide cum  $fx$  pro  $x=a$  et  $x=b$ .

In praxi, valore de isto functione es considerato ut valore approximato de  $fx$ . Errore in ce approximatione, id es, differentia inter valore vero  $fx$  et valore de functione interpolare, es expresso per formula scripto, ubi figura derivata de ordine 2.

*Interpolatione in tabula de logarithmos*

Commune tabula de logarithmos decimale contine logarithmos de numeros integro inter  $10^n$  et  $10^{n+1}$ . Si  $x$  es numero integro inter ce limites,  $10^n \leq x < 10^{n+1}$ , tabula da  $\text{Log} x$  et  $\text{Log}(x+1)$ .

Si  $t$  es fractione proprio, regula de interpolatione dice que per approximatione es

$$\text{Log}(x+t) = \text{Log} x + t[\text{Log}(x+1) - \text{Log} x]$$

Errore, vel differentia  $d$  de duo membro resulta de theorema præcedente, ubi nos pone

$$fx = \text{Log} x, \quad Dfx = M/x, \quad D^2fx = -1/x^2.$$

$M$ , modulo de logarithmos,  $= \text{Log} e = 0.434\ldots$  (pag. 242). Tunc

$$d \in t(1-t)M/[2(x+\theta)^2]$$

Ergo  $d > 0$ ;  $t(1-t) < 1/4$ ,  $x > 10^n$ , ergo  $d < 0.054\ldots \times 10^{-2n} < 10^{-(2n+1)}$ .

Errore in interpolatione in tabula de logarithmos es minore de uno unitate decimale de ordine  $2n+1$ .

Per exemplo, in tabula de pag. 119, que da logarithmos de numeros de 10 ad 100, errore in interpolatione es minore de uno unitate de ordine 3, vel da tres cifra decimale pro logarithmo di omni numero.

In interpolatione de tabula de  $\text{Log} \sin x$ , si  $h$  es differentia de duo valore consecutivo de  $x$ , scripto in tabula, errore vale  $Mh^2/(8 \sin x^2)$ . Si  $x > 12^\circ 22'$ , et  $h=1'$ , errore resulta  $< 10^{-(7)}$ .

$$\cdot 2 \quad \text{Hp} \cdot 1. m, n \in \mathbb{Q} \cdot \supset. f[(ma+nb)/(m+n)] - (mfa+nf b)/(m+n) \\ \varepsilon - (b-a)^2 mn(m+n)^{-3} / 2 D^2 f(a-b)$$

Dem.  $[(ma+nb)/(m+n) | x] \cdot \text{P} \cdot 1 \cdot \supset. \text{P}$

$(ma+nb)/(m+n)$  es valore «medio arithmetico inter  $a$  et  $b$ , cum pondo  $m$  et  $n$ ». Formula exprime differentia inter functione de valore medio, et valore medio de functione. Resulta de Prop. præcedente.

Exemplo. Si  $fx = x^2$ , seque  $D^2fx = 2 > 0$ ; ergo:

$$[(ma+nb)/(m+n)]^2 < (ma^2+nb^2)/(m+n).$$

Si  $fx = \log x$ , seque «medio arithmetico supera medio geometrico», ut es scripto in pag. 119 § Q P26.



## 32. SERIE ASYMPTOTICO DE POTESTATES.

$$\begin{aligned} u \in \text{Intv}, x \in U, n \in \mathbb{N}_1, f \in {}_q F u, D^n f x \in q \cdot \supset. \lim[|fy - \\ \Sigma[(y-x)^r / r!(D^r f x) | x, 0 \cdots (n-1)]| / (y-x)^n | y, u, x] = (D^n f x) / n! \\ | \text{P27} \cdot 1 \cdot \supset. \lim[|fy - \Sigma[(y-x)^r / r! D^r f x | x, 0 \cdots (n-1)]| / (y-x)^n | y, u, x] \\ = \lim[Dfy - \Sigma[(y-x)^{r-1} / (r-1)! D^r f x | x, 1 \cdots (n-1)] | [n(y-x)^{n-1}] | y, u, x] \\ = \lim[(D^{n-1} fy - D^{n-1} f x) / (n! (y-x))] | y, u, x] \\ \text{Def D} \cdot \supset. = (D^n f x) / n! | \end{aligned}$$

Si functione  $f$  dato in intervallo  $u$ , habe derivata de ordine  $n$  (et præcedentes) pro valore  $x$ , tunc limite de differentia inter  $fy$  et polynomio

$fx + (y-x)Dfx + (y-x)^2/2! D^2fx + \dots + (y-x)^{n-1}/(n-1)! D^{n-1}fx$ ,  
diviso per  $(y-x)^n$ , quando varia  $y$ , in intervallo considerato, et tende ad  $x$ , vale derivata de ordine  $n$  diviso per  $n!$ .

Functione de  $y$ , que diviso  $(y-x)^n$ , verge ad limite finito, si  $y$  verge ad  $x$ , vocare «infinitesimo de ordine  $n$ ».

Ergo, theorema dice que  $fy$  contine  $fx$ , quantitate finito, plus  $(y-x)Dfx$ , infinitesimo de primo ordine, plus  $(y-x)^2/2 D^2fx$ , infinitesimo de secundo ordine, plus etc.

In vero, pro  $n=1$ , theorema dice que  $\lim(fy-fx)/(y-x)$  vale derivata de  $fx$ , quod es vero per definitione de derivata.

Pro  $n=2$ , nos quære

$$\lim |fy - fx - (y-x)Dfx| / (y-x)^2 \mid y, u, x,$$

ubi quantitate de que nos quære limite, se præsentat sub forma  $0/0$ . Ergo, pro theorema de l'Hospital, nos calcula limite de ratione de duo derivata:

$$\lim (Dfy - Dfx) / [2(y-x)] \mid y, \dots$$

que, per definitione de derivata, vel pro casu  $n=1$ , vale  $D^2fx/2$ , conforme ad theorema.

Ita nos demonstra theorema pro  $n=3, \dots$

Isto theorema es uno ex formas de «formula de Taylor». Me habe dato ce propositione, sub conditiones scripto, in notas ad Genocchi, *Calcolo differenziale* a. 1884 p. XIX; versione in Germanico pag. 321. Vide Mathesis a. 1889 p. 110, Torino A. a. 1891; Cesàro, *Calcolo infinitesimale* a. 1905 p. 94.

Expressione «série asymptotique» es de H. Poincaré Acta M. t. 8 a. 1886 p. 295, que da alio theorema interessante series de isto natura.

Plure Auctore deduce P32 de P34. Tunc occurre existentia de derivata de ordine  $n$  prope  $x$ , et suo continuitate, quod non es necessario.

Theorema præcedente occurre in P33, rectaT, planOscul ...

### \* 33. MAXIMO ET MINIMO DE FUNCTIONE.

$$*1 \quad a, b \in \mathbb{Q} \cdot a < b \cdot f \in \mathbb{Q}F[a, b] \cdot x \in [a, b] \cdot Dfx = 0 \cdot D^2fx > 0 \cdot \sup_{x \in (c, d)} f(x) = \min_{x \in [c, d]} f(x) = f(c-d)$$

Dem. P32  $\sup_{x \in (c, d)} f(x) = \lim_{y \rightarrow c-d} [(fy - fx)/(y - x)^2] \mid y, [a, b], x = D^2fx/2 > 0 \cdot \sup_{x \in (c, d)} f(x) = \min_{x \in [c, d]} f(x) = f(c-d)$  Ths

Si  $a-b$  es intervallo, ubi es definitio functione  $f$ , et pro aliquo

valore  $x$  interno ad intervallo, derivata de ordine 1 es nullo, et derivata de ordine 2 es positivo, tunc existe intervallo  $c-d$ , parte de  $a-b$ , continente in suo interno valore  $x$ , tale que  $fx$  es minimo ex valores de  $f$  in intervallo  $c-d$ .

·2 ( $<$ , max) | ( $>$ , min) P·1

Et si derivata secundo es negativo, functione es maximo.

·3  $a, b \in \mathbb{Q} \cdot a < b \cdot f \in \mathbb{Q} F a-b \cdot x \in a-b \cdot n \in 2N_1 : r \in 1 \cdots (n-1) \cdot \bigcup_r \cdot D^r f x = 0 : D^n f x > 0 : \bigcup_r \cdot \exists (c, d) \exists [c \in a-x \cdot d \in x-b \cdot f x = \min f^{c-d}]$

·4 ( $<$ , max) | ( $>$ , min) P·3

·5  $a, b \in \mathbb{Q} \cdot a < b \cdot f \in \mathbb{Q} F a-b \cdot x \in a-b \cdot n \in 2N_1 + 1 : r \in 1 \cdots (n-1) \cdot \bigcup_r \cdot D^r f x = 0 : D^n f x > 0 : \bigcup_r \cdot$

$\exists (c, d) \exists [c \in a-x \cdot d \in x-b : y \in c-d \cdot \bigcup_y \cdot D(f; x, y) > 0]$

·6 ( $<$  |  $>$ ) P·5

✱ 34.

THEOREMA DE LAGRANGE.

$a, b \in \mathbb{Q} \cdot a = b \cdot n \in N_1 \cdot f, D^n f \in \mathbb{Q} F a-b \cdot \bigcup_r \cdot$

$fb - \sum [(b-a)^r / r! \cdot D^r f a] r, 0 \cdots (n-1)] \in (b-a)^n / n! \cdot D^n f a-b$

Dato duo quantitate  $a$  et  $b$ , differentes, et functione  $f$  reale definito in intervallo de  $a$  ad  $b$ , cum derivatas usque ad ordine  $n$ , tunc differentia inter  $fb$  et summa de primos  $n$  termine de suo evolutione secundo potestates de  $b-a$  vale  $(b-a)^n / n!$  per uno ex valores de derivata de ordine  $n$ .

Dem. 1

Si  $n=1$ , Prop. coincide cum theorema de valore medio :

$n=1 \cdot P22 \cdot \bigcup_r \cdot fb - fa \in (b-a) Df a-b \quad (1)$

Applica isto theorema ad derivata :

$x \in a-b \cdot \bigcup_r \cdot Df x \in Dfa + (x-a) D^2 f a-x$

Integra cum regula P26·2 :

$fx - fa \in (x-a) Dfa + (x-a)^2 / 2 D^2 f a-x$

que es theorema pro  $n=2$ . Et ita pro. In generale, si theorema es vero pro aliquo valore  $n$ , nos demonstra illo pro  $n+1$  :

$n \in N_1 \cdot x \in a-b \cdot Df x \in \sum [(x-a)^r / r! \cdot D^r f a] r, 0 \cdots (n-1)] + (x-a)^n / n! \cdot D^n f a-b \cdot P26 \cdot \bigcup_r \cdot fb - fa \in \sum [(b-a)^{r+1} / (r+1)! \cdot D^{r+1} f a] r, 0 \cdots (n-1)] + (b-a)^{n+1} / (n+1)! \cdot D^{n+1} f a-b \quad (2)$

Unde, per inductione, seque propositione :

(1) · (2) · Induct  $\bigcup_r \cdot P$

## Dem. 2

$$\begin{aligned}
 k &= fb - \Sigma[(b-a)^r / r! \cdot D^r fa | r, 0 \dots (n-1)] / (b-a)^n . \\
 g &= (fx - \Sigma[(x-a)^r / r! \cdot D^r fa | r, 0 \dots (n-1)] - k(x-a)^n) / (x-a-b) . \supset . \\
 ga &= Dga = D^2ga = \dots = D^{n-1}ga = 0 . gb = 0 . \supset . \\
 \exists (a-b) \wedge \exists (D^n gu = 0) . \supset . \exists (a-b) \wedge \exists (D^n fu - n!k) = 0 . \supset . \\
 k \in (D^n f a - b) / n!
 \end{aligned}$$

In facto, si nos voca  $k$  quantitate in primo membro diviso per  $(b-a)^n$ , et si nos pone

$$gx = fx - fa - (x-a)Dfa - \dots - (x-a)^{n-1}/(n-1)! D^{n-1}fa - k(x-a)^n ,$$

id es, si nos voca  $g$  functione in secundo membro, ubi  $x$  varia in intervallo dato, tunc functione  $g$  es nullo, simul cum suo derivatas de ordine 1, 2, ...  $n-1$ . pro  $x=a$ , et es nullo pro  $x=b$ . Ergo per theorema de Rolle, suo derivata de ordine  $n$ ,  $D^n gx = n!k$ , es nullo pro aliquo valore inter  $a$  et  $b$ . Unde seque theorema.

Si in Dem. 1 ad P26.2 nos substitue suo Dem., resulta Dem. 2 de P34.

## Dem. 3

$$\begin{aligned}
 h &= fb - \Sigma[(b-x)^r / r! \cdot D^r fx | r, 0 \dots (n-1)] / (x-a-b) . x \in a-b . \supset . \\
 Dhx &= -(b-x)^{n-1} / (n-1)! \cdot D^n fx . P26.1 . \supset . P
 \end{aligned}$$

Dem. 3 es Dem. dato per Bernoulli, completato.

{ LAGRANGE a.1797, *Th. des Fonctions analytiques* p.49 :

« D'où résulte enfin ce théorème nouveau et remarquable par sa simplicité et généralité, qu'en désignant par  $u$  une quantité inconnue, mais renfermée entre les limites 0 et  $x$ , on peut développer successivement toute fonction de  $x$  et d'autres quantités quelconques suivant les puissances de  $x$ , de cette manière :

$$\begin{aligned}
 fx &= f. + x f'. u, \\
 &= f. + x f'. + \frac{x^2}{2} f'' u, \\
 &= f. + x f'. + \frac{x^2}{2} f'' + \frac{x^3}{2.3} f''' u,
 \end{aligned}$$

les quantités  $f.$ ,  $f'.$ ,  $f''.$ , etc. étant les valeurs de la fonction  $fx$  et de ses dérivées  $f'x$ ,  $f''x$ , etc., lorsqu'on y fait  $x=0$ .

## Exemplo.

Si nos pone  $fx = e^{ax}$ ,  $a=0$ ,  $b=x$ , resulta :

$$x \in \supset . \forall x \in 1 + x + x^2/2 + \dots + x^{n-1}/(n-1)! + x^n/n! \cdot e^{ax}$$

et, pro  $n=\infty$ . serie de pag. 243 P4.1.

Pro  $fx = \sin x$ , vel  $fx = \cos x$ , seque serie de pag. 252 P16.1.2.

Applicazione de theorema precedente ad functiones  $\log(1+x)$  pag. 246.  $(1+x)^n$  p. 226,  $\tan^{-1}x$  p. 263, es complicato.



\* 35.

## SERIE DE POTESTATES.

$u \in q'fN_0$ .  $r = \max Lm(\sqrt[n]{\text{mod } u_n}) | n. r > 0$ .

$f = [\sum (u_n x^n | n, N_0) | x, q' \wedge r \exists (\text{mod } x < r)] . x \in q' . \text{mod } x < r \supset$ :

1  $fx \in q$

2  $Dfx = \sum [nu_n x^{n-1} | n, N_1]$

3  $n \in N_0 \supset u_n = (D^n f_0)/n!$

4  $fx = \sum (x^n/n! \times D^n f_0 | n, N_0)$

5  $h \in q' . \text{mod } r + \text{mod } h < r \supset$

$f(x+h) = \sum [h^n/n! D^n fx | n, N_0]$

$u$  indica successione de quantitates, reale aut imaginario, nos voca  $r$  reciproco de maximo limes de radice de indice  $n$  de modulo de  $u_n$ , dum varia  $n$ ; et suppone illo non nullo.

Nos considera functione  $f$  que pote es repræsentato per serie de potestates de variabile:

$$fx = u_0 + u_1 x + u_2 x^2 + \dots$$

ubi varia  $x$ , in campo de quantitates imaginario minore in valore absoluto de  $r$ ; nos sume quantitate  $x$  in ce campo. Tunc

1 Serie  $fx$  es convergente.

2 Suo derivata vale:  $Dfx = u_1 + 2u_2 x + \dots$

3 Coefficiente de potestate  $n$  de  $x$  vale derivata de ordine  $n$ , pro 0, diviso per  $n!$ . Ergo:

4  $fx = f_0 + x Df_0 + x^2/2! D^2 f_0 + x^3/3! D^3 f_0 + \dots$

5 Pro valores de  $h$  de modulo  $< r - \text{mod } x$ ,  $f(x+h)$  es evolubile secundo potestates de  $h$ .

Dem.

Ex definitione de  $r$ , seque:

$$\max Lm \sqrt[n]{\text{mod } u_n r^n} | n = 1 \quad (1)$$

Ergo maximo limes de radice de indice  $n$  ex modulo de termine de loco  $n$  in serie dato es minore de 1:

$$(1) \supset \max Lm \sqrt[n]{\text{mod } (u_n x^n)} | n = (\text{mod } x)/r < 1 \quad (2)$$

Unde, per theorema de Cauchy, serie de modulos de termines de serie dato es convergente:

$$(2) . \S \text{lim P24.5 (pag. 224)} \supset \sum [\text{mod } (u_n x^n) | n, N_0] \in Q \quad (3)$$

Et serie dato es convergente, ut Prop. 1 affirma:

$$(3) . \S \text{lim P52.1 (pag. 235)} \supset P.1$$

Si  $\text{mod } x > r$ , maximo limes de termine generale  $= \infty$ .

Pro  $x=0$  :  $f0 = u_0$ . De  $fx = u_0 + x(u_1 + u_2x + \dots)$ , seque :

$$\lim(f, \text{Variab}f, 0) = u_0 \quad (4)$$

De  $(fx - f0)/x = u_1 + u_2x + \dots$ , ad limite, per Prop. (4), resulta :

$$Df0 = u_1 \quad (5)$$

Nunc nos evolve omni termine de serie  $f(x+h)$  cum formula de binomio:

$$f(x+h) = \Sigma \{C(n,p) u_n x^{n-ph} \mid p, N_0 \mid n, N_0\} \quad (6)$$

que es serie de serie, vel serie duplo. Nos commuta summa pro  $p$  et summa pro  $n$ . Hoc lice, si serie duplo de modulus de termines de serie duplo dato es convergente. Vide P36 infra. Serie duplo de modulus converge :

$$(3) \cdot \supset \cdot \Sigma \{C(n,p) (\text{mod} u_n) (\text{mod} x)^{n-p} (\text{mod} h)^p \mid p, N_0 \mid n, N_0\} = \Sigma \{(\text{mod} u_n) (\text{mod} x + \text{mod} h)^n \mid n, N_0\} \in \mathbb{Q} \quad (7)$$

$$(6) \cdot (7) \cdot P.6 \cdot \supset \cdot f(x+h) = \Sigma; h^p \Sigma \{C(n,p) u_n x^{n-p} \mid n, N_0\} \mid p, N_0 \quad (8)$$

Per (5), coefficiente de  $h$  in isto evolutione es derivata  $Df(x+h)$ , pro  $h=0$ , id es,  $Dfx$  secundo P.2 :

$$(8) \cdot (5) \cdot \supset \cdot P.2$$

Nos deriva  $p$  vice :

$$P.2 \cdot p \in N_1 \cdot \supset \cdot D^p fx = p! \Sigma \{C(n,p) u_n x^{n-p} \mid n, N_0\} \quad (9)$$

$$(8) \cdot (9) \cdot \supset \cdot P.5$$

### SERIE DE TAYLOR ET DE MACLAURIN.

Plure libro voca serie de P.4.5 « serie de MacLaurin et de Taylor ».

Theorema præcedente *præsuppone* que functione es evolubile in serie de potestates.

Serie de MacLaurin, pro functiones  $e^x$ ,  $\sin x$ ,  $\cos x$ , vale pro omni  $x$ . Vide pag. 243 P.4.1, pag. 252 P.16.1.2.

Functiones  $(1+x)^m$ ,  $\log(1+x)$ ,  $\text{tang}^{-1}x$  es representato per serie de potestates, si  $\text{mod} x < 1$ . Vide pag. 222, 246, 263.

Serie de Stirling, et serie de potestates per logarithmo integrale es divergente pro omni  $x$ . Alio exemplo in D'Arcais a.1899 p.326.

Functione  $e^{-x^2}$  habe omni derivata nullo pro  $x=0$ ; serie de MacLaurin es convergente, et habe summa differente de valore de functione, ut nota Cauchy a.1823 s.2 t.4 p.230.

Reproductione sequente ex operas de Auctores expone historia de serie.

Joh. BERNOULLI a.1694 t.1 p.126:

« habetur hæc series generalissima :

$$\text{Integr. nulz} = +nz - \frac{zzdn}{1.2.dz} + \frac{z^2ddn}{1.2.3.dz^2} - \frac{z^3ddd n}{1.2.3.4.dz^3} \text{ \&c. } »$$

Si in citatione præcedente nos pone  $n = Dfz$ , et si nos effectua integratione indicato intra limites  $b$  et  $x$ , formula fit:

$$fx - fb = (x-b) Dfx - (x-b)^2/2 D^2fx + (x-b)^3/3! D^3fx - \dots \quad (1)$$

unde serie (5), si nos pone  $b = x+h$ .

Demonstratione de Bernoulli es: « differentia de duo membro de (1) habe derivata semper nullo ». In realitate, differentia inter primo membro et summa de primos  $n$  termine de secundo habe derivata scripto in P.34, Dem. 3 de theorema de Lagrange.

TAYLOR a.1715 p.21 :

« Sint  $z$  et  $x$  quantitates duae variables, quarum  $z$  uniformiter augetur per data incrementa  $z$ , et sit  $nz = v$  . . . . .

p.23: . . . quo tempore  $z$  uniformiter fluendo fit  $z+v$ , fiet  $x$ .

$$x + \dot{x} \frac{v}{1z} + \ddot{x} \frac{v^2}{1.2z^2} + \ddot{\ddot{x}} \frac{v^3}{1.2.3z^3} + \&c. »$$

Taylor deduce isto theorema ex propositione de Mercator pro differentias. Vide supra pag. 131 P4.1, et infra P38.1. Ipse in pag. 38 expone processu identico ad illo de Bernoulli. Unde Bernoulli reclama prioritate, et dice: « Quam eandem seriem postea Taylorus, interjecto plus quam viginti annorum intervallo, in librum, quem edidit A. 1715, *de Methodo incrementorum* transferre dignatus est, sub alio tantum characterum habitu. Vide ejus lib. p. 38 ».

Prof. A. Pringsheim, *Zur Geschichte des Taylorschen Lehrsatzes*, BM. a.1900 s.3 t.1 p.433, expone plure interessante notitia super historia de isto formula, sed frustra, me puta, tenta rehabilitatione de Taylor.

MACLAURIN a.1742 p.610 :

« Suppose that  $y$  is any quantity that can be expressed by a series of this form  $A + Bz + Cz^2 + Dz^3 + \&c.$  where  $A, B, C$  represent invariable coefficients . . . When  $z$  wanishes, let  $E$  be the value of  $y$ , and let  $\dot{E}, \ddot{E}, \ddot{\ddot{E}}, \&c.$  be then the respective values of  $\dot{y}, \ddot{y}, \ddot{\ddot{y}}, \&c.$   $z$  being supposed to flow uniformly. Then

$$y = E + \frac{\dot{E}z}{1} + \frac{\ddot{E}z^2}{1 \times 2z^2} + \frac{\ddot{\ddot{E}}z^3}{1 \times 2 \times 3z^3} + \&c. »$$

Isto theorema æquivalere ad theorema de Taylor, ut Auctore declara :

p.611: « This theorem was given by Dr. Taylor. »

p.612: « which theorem is not materially different from Mr. Bernouilli's. »

Notatione simile ad hodierno es in :

ARBOGAST a.1800:

$$F(a+x) = Fa + \frac{DFa}{1}x + \frac{D^2Fa}{1.2}x^2 + \frac{D^3Fa}{1.2.3}x^3 + \text{etc.} »$$

In conclusione, Bernoulli a. 1694, et Taylor a. 1715 habere scripto serie, sine hypothesis præciso.

Lagrange habere calculato resto sub forma de Prop. 34. Ce theorema in plure libro de Calculo infinitesimali, es vocato « Theorema de Taylor ».

Pro alio expressione de resto, vide Calculo integrale.

Prop. 35 que præcedere, es de Cauchy, *Résumés analytiques*. Turin a. 1833 pag. 47 et 113, Œuvres s.1 t.5 p.360.

Plus recente es interpretatione ut serie asymptotico, Prop. 32, que ducere ad aliquo resultatu interessante.

## \* 36.

## SERIE DUPLO.

$$u \in q'f(N_0, N_0) \cdot \Sigma \{ \Sigma [\text{mod } u(r, s) | r, N_0] | s, N_0 \} \in Q \cdot \supset$$

$$\Sigma \{ \Sigma [u(r, s) | r, N_0] | s, N_0 \} = \Sigma \{ \Sigma [u(r, s) | s, N_0] | r, N_0 \}$$

Dem.

$$\S \lim P21.0 \text{ (p.220)} \cdot \supset \quad \cdot = \lim \Sigma \{ \Sigma [u(r, s) | r, N_0] | s, 0 \cdots n \} / n$$

$$\S \lim P21.5 \text{ (p.222)} \cdot \supset \quad \cdot = \lim \Sigma \{ \Sigma [u(r, s) | s, 0 \cdots n] | r, N_0 \} / n$$

$$\S \lim P43.1 \text{ (p.233)} \cdot \supset \quad \cdot = \Sigma \{ \lim \Sigma [u(r, s) | s, 0 \cdots n] | n \} / r, N_0$$

$$\S \lim P21.0 \text{ (p.220)} \cdot \supset \quad \cdot = \Sigma \{ \Sigma [u(r, s) | s, N_0] | r, N_0 \}$$

Si  $u$  es quantitate, reale aut imaginario, functione de duo variable, et si serie de serie de modulus de  $u(r, s)$  ubi varia in primo loco  $r$ , et in secundo loco  $s$ , es convergente, tunc serie de serie de  $u$ , ubi varia in primo loco  $r$  et in secundo loco  $s$ , æqua idem serie, si varia in primo loco  $s$ , et in secundo  $r$ . Occurrit in dem. de Prop. 35.

## \* 37.

## RATIONES INCREMENTALE SUCCESSIVO.

$$u \in \text{Cls}'q \cdot f \in qFu \cdot n \in N_1 \cdot \supset:$$

$$1 \quad x_0, x_1, x_2 \in u \cdot \supset \cdot D^2(f; x_0, x_1, x_2) = D[D(f; x_0, y) | y; x_1, x_2] \quad \text{Df}$$

$$2 \quad x \in u f 0 \cdots (n+1) \cdot \supset$$

$$D^{n+1}\{f; [x, 0 \cdots (n+1)]\} = D^n\{D(f; x_0, y) | y; [x, 1 \cdots (n+1)]\} \quad \text{Df}$$

Ratione incrementale  $D(f; x_0, y)$  es definitio in Prop. 1.1.2, pagina 275. Suo ratione incrementale, dum varia  $y$ , et sume valores  $x_1, x_2$ , es « ratione incrementale de ordine duo », et nos indica illo per  $D^2(f; x_0, x_1, x_2)$ . Ita pro rationes incrementale de ordine successivo.

Valores  $x_0, x_1, x_2, \dots$  pote es distincto aut plure coincidente.

$$3 \quad x \in (u f 0 \cdots n) \text{sim} \cdot \supset \cdot D^n[f; (x, 0 \cdots n)] =$$

$$\Sigma \{ (fx_r) / \Pi [(x_r - x_s) | s, (0 \cdots n) - r] | r, 0 \cdots n \}$$

$$4 \quad x \in (u f 0 \cdots n) \text{sim} \cdot \supset \cdot D^n[f; (x, 0 \cdots n)] =$$

$$\text{Dtrm} \{ [(x_r^n | s, 0 \cdots (n-1)), fx_r] | r, 0 \cdots n \} / \text{Dtrm} \{ [(x_r^n | s, 0 \cdots n) | r, 0 \cdots n] \}$$

Si  $x_0, x_1, \dots$  es quantitates differente in campo  $u$ , tunc ratione incrementale de ordine  $n$  de functione  $f$  pro valores  $x$  vale determinante, que habe pro linea de loco  $r$

$$1, x_r, x_r^2, \dots, x_r^{n-1}, fx_r$$

ubi  $r$  sume valores  $0 \cdots n$ , diviso per determinante de potestates successivo des  $x$ .

\*5  $x \in u \text{ f } 0^{...n} . y \in (0^{...n} \text{ f } 0^{...n})_{\text{rec}} \supset$   
 $D^n[f; (xy, 0^{...n})] = D^n[f; (x, 0^{...n})]$

Si  $x$  es successione de elementos de classe  $u$ , cum indices  $0, 1, \dots, n$ , et  $y$  es correspondentia reciproco inter ce indices, vel es permutatione de indices, tunc ratione incrementale de ordine  $n$  de  $f$ , respondente ad indices permutato, æqua ratione respondente ad indices primitivo.

Functione de plure variabile, que non varia, si nos permuta variables, vocare « functione symmetrico ». Ergo ratione incrementale es functione symmetrico de variables  $x_0, x_1, \dots, x_n$ .

\*6  $x \in (q=0) \text{ f } 0^{...n} \supset D^n[/math>;  $(x, 0^{...n})] = (-1)^n / \Pi(x, 0^{...n})$$

\*7  $f \in \text{qFN}_0 . x \in \text{N}_0 \supset \Delta^n f x = n! D^n(f; x + 0^{...n})$

Relatione inter ratione incrementale, et differentia finito  $\Delta$ , introducto in pag. 130.

\* 38.  $u \in \text{Cls}'q . f \in \text{qFu} . n \in \text{N}_1 . x \in u \text{ f } 0^{...n} \supset$ :

\*0  $\text{Interp}[f; (x, 0^{...n})] =$   
 $f x_0 + \sum \Pi[(y-x_r) | r, 0^{...}(s-1)] D^s[f; (x, 0^{...s}) | r, 1^{...n}] | y, q] \quad \text{Df}$

$\text{Interp}[f; (x, 0^{...n})]$ , lege « functione interpolante de  $f$ , respondente ad  $n+1$  valores  $x_0, x_1, \dots, x_n$  », indica polynomio

$$f x_0 + (y-x_0) D(f; x_0, x_1) + (y-x_0)(y-x_1) D^2(f; x_0, x_1, x_2) + \dots \\ + (y-x_0) \dots (y-x_{n-1}) D^n(f; x_0, x_1, \dots, x_n)$$

ubi varia  $y$ , in campo de numeros reale.

**interpolatione:** A.D.F. interpolation, H. interpolacion, I. interpolazione, R. interpolátsiá.  $\subset$  interpola + -tione.

**interpola:** A. interpola-te, D. interpol-ieren, F. interpol-er, H. interpola-r, I. interpola-re, R. interpol-irovatj.

$\subset$  L. inter (vide pag. 159 N. 268) + -pola (elemento de origine non concorde apud linguistas).

« Functione interpolare » de Ampère, Gergonne A. a. 1826 t. 16 p. 329 vale « ratione incrementale »  $D^n(f; x_0 x_1 \dots)$  id es coefficiente in functione interpolante.

\*1  $D^n[f; (x, 0^{...n})] \text{ eq } . y \in u \text{ f } 0^{...n} \supset$ .

$f y = \text{Interp}[f; (x, 0^{...n})] y + \Pi[(y-x_r) | r, 0^{...n}] D^{n+1}[f; (x, 0^{...n}), y]$

} NEWTON a. 1686, t. 3 prop. XL lemma 5 }

Si ratione incrementale de ordine  $n$  pro valores  $x$  existe, et si  $y$  es  $u$  differente de omni  $x$ , tunc  $fy$  vale functione interpolante de  $f$  in valores  $x$ , pro  $y$ , plus termine complementare  $(y-x_0)(y-x_1)\dots(y-x_n)D^{n+1}(f; x_0, x_1, x_2, \dots, x_n, y)$

Si valores  $x$  es æquidifferente, resulta Prop. 4.1 de pag. 131.

Si valores  $x$  es coincidente, resulta evolutione asymptotico de  $fy$  secundo potestates de  $y-x$ , plus generale de P32.

$$\cdot 3 \quad x \in (u \text{ f } 0 \dots n) \text{ sim } \cdot \supset. \text{Interp}[f; (x, 0 \dots n)] = [\sum \{fx, \Pi[(y-x_i)/(x_r-x_i) | s, (0 \dots n) - r] | r, 0 \dots n\} | y, q]$$

Si valores de  $x$  es differente, functione interpolante pote sume forma

$fx_0 \times [(y-x_1)\dots(y-x_n)] / [(x_0-x_1)\dots(x_0-x_n)] + \text{alios termine dato per WARING a. 1776, et LAGRANGE a. 1795 (Oeuvres t. 7, pagina 285).}$

$$\cdot 4 \quad y \in q \cdot x \cdot 0 \dots n \cdot \supset. \text{Interp}[f; (x, 0 \dots n)]y = \Pi[(y-x_i) | r, 0 \dots n] D^n[f x / (y-x) | x, (x, 0 \dots n)]$$

\* 39.  $u \in \text{Intv} \cdot n \in N_1 \cdot f \in qFu \cdot \supset:$

$$\cdot 1 \quad D^n f \in qFu \cdot x \in u \text{ f } 0 \dots n \cdot \supset. D^n[f; (x, 0 \dots n)] \in (D^n f' u) / n!$$

Dem.  $h = f - \text{Interp}[f; (x, 0 \dots n)] \cdot \supset. hx_0 = hx_1 = hx_2 = \dots = hx_n = 0$ .

$$P21 \cdot \supset. 0 \in D^n h' u \cdot \supset. 0 \in D^n f' u - n! D^n[f; (x, 0 \dots n)]$$

Si campo  $u$  de variabilitate es intervallo, et functione  $f$  habe derivatas usque ad ordine  $n$  in isto intervallo, tunc ratione incrementale de ordine  $n$  de  $f$  respondente ad valores  $x_0, x_1, \dots, x_n$  es uno ex valores de derivata de ordine  $n$ , diviso per factoriale.

Dem. In vero, differentia  $h$  inter functione  $f$  et suo interpolante in  $x_0, x_1, \dots, x_n$ , es nullo pro ce  $n+1$  valores; ergo, per theorema de Rolle, suo derivata de ordine 1 es nullo pro  $n$  valores intermedio; derivata de ordine 2 es nullo pro  $n-1$  valores, ... et derivata de ordine  $n$  es nullo pro uno valore medio inter præcedentes. Ce derivata de ordine  $n$  de  $h$  vale derivata de  $f$ , minus derivata de functione interpolante, que es  $n! \times$  coefficiente de termine de gradu maximo.

Si plure valoro  $x$  coincide, modificatione es evidente.

{ CAUCHY, Œuvres t.5 pag. 409. Demonstratione hic scripto es de H. A. SCHWARZ, Torino A. a.1882; et de STIELTJES, a.1882 Amsterdam Ak. s.2 t.17 p.239-254 }

·2  $D^{n+1}f \in \text{qFu} . x \in u \text{f} 0 \cdots n . y \in u . \supset .$   
 $fy - \text{Interp}[f; (x, 0 \cdots n)]y \in \Pi[(y-x)_r | r, 0 \cdots n] (D^{n+1}f'u) / (n+1)!$

Dem. P38·1 . P39·1  $\supset$  . P

Si in intervallo  $u$ , functione  $f$  habe derivata de ordine  $n+1$ , tunc differentia inter valore  $fy$  de functione dato et valore de functione interpolante de  $f$ , in  $n+1$  valores  $x_0, x_1, \dots, x_n$ , respondente ad valore  $y$ , vale

$$(y-x_0)(y-x_1)\dots(y-x_n)(D^{n+1}fz)/(n+1)!$$

ubi  $z$  es aliquo valore in campo  $u$ .

Vale theorema præcedente. Si valores  $x_0, x_1, \dots, x_n$  es æquale, resulta theorema de Lagrange P 34; pro  $n=1$ , resulta P 31.

·3  $x \in u . D^{n+1}[Df; (ux, 1 \cdots n)] \in \text{q} . y \in u - ux . \supset .$   
 $D^{n+1}[f; (ux, 0 \cdots n), y] \in D^n[Df; (ux, 1 \cdots n), z] / (n+1) \mid z'x - y$   
 Dem. P38·1  $\supset$  .  $fy = \text{Interp}[Df; (ux; 1 \cdots n)] + (y-x)^n D^n[Df; (ux; 1 \cdots n), y]$   
 P26·1  $\supset$  .

$fy \in \text{Interp}[f; (ux; 0 \cdots n)] + (y-x)^{n+1} / (n+1) D^n[Df; (ux; 1 \cdots n), z] \mid z'x - y.$   
 P38·1  $\supset$  P

·4  $x \in u . D^n[Df; (ux, 0 \cdots n)] \in \text{q} . \supset .$   
 $D^{n+1}[f; (ux, 0 \cdots (n+1))] = D^n[Df; (ux; 0 \cdots n)] / (n+1)$   
 Dem. P·3  $\supset$  P·4

·5  $x \in u . D^nfx \in \text{q} . \supset . D^n[f; (ux; 0 \cdots n)] = (D^nfx) / n!$   
 Dem. P·4  $\supset$  P·5

Si pro valore  $x$  in  $u$ , derivata de ordine  $n$  de  $f$  existe, tunc ratione incrementale de ordine  $n$  de functione  $f$ , respondente ad  $n+1$  valores de variabile coincidente in  $x$ , vale derivata de ordine  $n$ , diviso per factoriale de  $n$ . Equivale ad P32 præcedente.

\* 40. integro (functione integro)

·1  $(\text{qFq})\text{integro} =$   
 $(\text{qFq}) \wedge f_3 [\exists (\text{qfN}_0) \wedge a_3 \mid f = [\Sigma(a, x^n \mid r, N_0) \mid x, q] \mid] \quad \text{Df}$

Nos voca functione reale de variabile reale « integro » omni functione expresso, pro omni valore reale de  $x$ , per serie de potentias de  $x$ .

·2  $f \in (qFq)\text{intero} \supset$   
 $\text{gradu } f = \min N_0 n \exists [D^{n+1} f = (0!q)] \quad \text{Df}$

Gradu de functione integro  $f$ , es minimo inter valores de  $n$ , que redde derivata de ordine  $n+1$  de  $f$  semper nullo. Ce gradu pote non es finito.

**gradu**: A. grade degree, D. grad, F. grade degré, H.I. grado, R. gradus.  
 = passu.  $\supset$  A.D.F.H.I. gradu-ale gradu-atione.  
 $\sqsubset$  grad- = i.  $\supset$  A.D.F.H.I.R. con-gres-su pro-gres-su pro-gres-sione.  
 $\sqsubset$  E. gredh-, S. gredhjati, R. gresti.

·3  $n \in N_1, f \in (qFq)\text{intero} \cdot \text{gradu } f \leq n \cdot a \in (qF0 \cdots n)\text{sim} \cdot$   
 $x \in q = a'0 \cdots n \cdot c = fa_r / \Pi[(a_r - a_s) | s, 0 \cdots n - r] | r \supset$   
 $(fx) / \Pi[(x - a_r) | r, 0 \cdots n] = \Sigma[c_r / (x - a_r) | r, 0 \cdots n]$

Dem. Hyp  $\supset f = \text{Interp}[f; (0 \cdots n)] \cdot \text{P38} \cdot 3 \supset P$

Nos considera functione rationale, quotiente de duo functione integro in  $x$ . Denominatore es producto de factores

$$(x - a_0)(x - a_1) \dots (x - a_n)$$

ubi  $a_0, a_1, \dots, a_n$  es  $n+1$  quantitates distincto. Numeratore es de gradu inferiore ad denominatore. Valore  $x$  es differente de valores  $a$ . Tunc illo functione rationale vale summa

$$c_0/(x - a_0) + c_1/(x - a_1) + \dots + c_n/(x - a_n),$$

cum numeratores  $c_0, c_1, \dots$  constante.

·4  $n \in N_1, f \in (qFq)\text{intero} \cdot \text{gradu } f = n \supset \text{Radices } f =$   
 $(q'F1 \cdots n) \wedge a \exists [f = \{(D^n f_0)/n! \Pi[(x - a_r) | r, 1 \cdots n] | x, q\}] \quad \text{Df}$

Si  $n$  es numero naturale, et  $f$  es functione integro de gradu  $n$ , tunc « Radices  $f$  » indica successione de  $n$  numeros imaginario a tale que, pro omni  $x$ ,  $fx$  vale coefficiente de termine de gradu maximo, multiplicato per factores  $(x - a_1)(x - a_2) \dots (x - a_n)$ .

Nos limita ad casu que  $f$  es functione reale; sed radices de  $f$  debe es sumpto in campo imaginario. Valores  $a_1, a_2, \dots, a_n$  pote es distincto aut non.

Ergo, si  $f$  es functione arbitrario, et  $g$  es functione integro de gradu  $n$ , habe sensu  $\text{Interp}[f; \text{Radices } g]$ , que exprime polynomio de gradu  $n-1$ . Si  $f$  es integro, isto polynomio vocare « resto de divisione de  $f$  per  $g$  ».



$\cdot 5 \quad f, g, h \varepsilon (qFq) \text{ integro} . \text{gradu} f < \text{gradu} g + \text{gradu} h .$   
 $\text{Radices} g \wedge \text{Radices} h = \wedge . p = \text{Interp}(fx/hx \mid x; \text{Radices} g) .$   
 $q = \text{Interp}(fx/gx \mid x; \text{Radices} h) . x \varepsilon q . gx \times hx \Leftarrow 0 . \supset .$   
 $(fx)/(gx \times hx) = (px)/(gx) + (qx)/(hx)$

Nos considera fractione  $(fx)/[(gx) \times (hx)]$  ubi  $f, g, h$  es functione integro, et gradu de numeratore  $fx$  es minore de gradu de denominatore. Functiones  $g$  et  $h$  habe nullo radice commune. Tunc nos calcula duo functione integro  $px$  et  $qx$ , tale que, pro omni  $x$ , que non redde nullo denominatore, fractione dato es decomposito in duo fractiones  $px/gx + qx/hx$ . Gradu de  $p$  es minore de gradu de  $g$ , et gradu de  $q$  minore de gradu de  $h$ .

$\ast \quad 41.4 \quad x, a \varepsilon q . \text{mod} x, \text{moda} \varepsilon \theta . \supset . \sqrt[n]{1 - 2ax + a^2} =$   
 $\sum \{ a^n / (n! 2^n) D^n [(x^2 - 1)^n \mid x, x] \mid n, N_0 \}$

Coefficiente de  $a^n$ , es dicto « polynomio de Legendre ». Plure Auctore indica illo per  $X_n x$ .

$\cdot 2 \quad n \varepsilon N_1 . \supset . B_n = (-1)^{n-1} D^{n-1} [x/(e^x - 1) \mid x, q = 0] 0$

Expressione de numero de Bernoulli (pag. 131) per derivata. Nos applica definitione de derivata dato per P3.2 (pag. 278). Pag. 260 P11.4  $\supset P$ .

$\ast \quad 42. \quad \text{SERIE DE LAGRANGE.}$

$\cdot 1 \quad u \varepsilon \text{Cls}' q' . f, Df \varepsilon q' Fu . x \varepsilon u . a \varepsilon q' . \text{moda} < 1, \text{mod}[(z-x)/fz \mid z'u] . \supset . \text{Num } u \wedge z(z = x + afz) = 1$

$\cdot 2 \quad \text{Hp}' 1 . z \varepsilon u . z = x + afz . g, Dg \varepsilon q' Fu . \supset .$   
 $gz = gx + \sum \{ (a^n / n!) D^n [(fx)^n (Dgx) \mid x, u, x] \mid n, N_1 \}$

$\{ \text{LAGRANGE a.1768; oeuvres t. 3, p. 25} \}$

Rouché, a.1861 JP. t. 39 p.193 determina hypothesis in serie de Lagrange.

$\cdot 3 \quad e \varepsilon Q . e < 0.6627434 . x \varepsilon q . \supset .$   
 $1 \wedge q \wedge z(z = x + e \sin z) = x + \sum \{ (e^n / n!) D^n [( \sin a )^n \mid x, x] \mid n, N_1 \}$

Equatione in primo membro, es « equatione de Keplero », que occurre in theoria de motu de planetas.

Lagrange id. p.113 da serie. Laplace a.1823, oeuvres t.5 p.473, pone hypothesis  $e < 0.662$ .

Vide Levi-Civita LinceiR. a.1904 p.260.

## \* 43.

## FUNCTIONE COMPLEXO.

Derivata de numero complexo, de vectore et de puncto functione de variabile reale, es definitio in pag. 284 P 15.

Si puncto mobile  $p$  es functione de « tempore »  $x$ , tunc :

$Dpx =$  « velocitate de puncto ».

$D^2px =$  « acceleratione ».

Si puncto es materiale, et  $m$  es suo massa :

$mD^2px =$  « vi » vel « fortia » agente super puncto.

$m(Dpx)^2/2 =$  « energia ».

Si  $o$  es puncto fixo, motu de  $o + Dpx$  es dicto « hodographo ».

**acceleratione**, A. acceleration, F accélération, H. aceleracion, I. accelerazione.  $\subset$  ad (p.21) + celer(e) (= I.) + -a (p.18) + -tione (p.19).

**massa** : A. mass, D.F. masse, H. masa, I.R. massa.

$\subset$  G. maza = pasta, substantia.

**vi** (L. classico).  $\supset$  A.F.H.I. : vi-olatione, vi-olento.

**fortia** (L. tardio) : A.F. force, H. fuerza, I forza.

$\subset$  fort(e) (F. fort, H. fuerte, I forte) + -ia (p.68).

**energia** G. *ἐνέργεια* : A. energy, D. energie, F. énergie, H.I. energia, R. energiá.  $\subset$  en + erg- + -ia.

en G.  $\supset$  A.D.F.H.I.B. : en-demico en-thusiasmo en-tomologia en-tropia el-lipsi em-blema em-pirico.  $\subset$  E. eni, L.A.D. in.

ergo G. = labore.  $\supset$  A.D.F.H.I.R. : chir-urgo, dramat-urgo, metall-urgia.

Argon (Chemia, = a-ergon), erg (unitate de labore in Physica).

$\subset$  G.ant. vergo  $\subset$  E. vergo  $\supset$  A. work, D. werk = labore.

**hodographo**, motu considerato per Möbius a.1843 t.4 p.47. Nomen introducto per Hamilton a.1846 DublinT. t.3.

$\subset$  hodo + graph(e) + -o

hodo G. = via.  $\supset$  A.D.F.H.I.R. : met-hodo, peri-odo, an-odo, cat-hodo...

$\subset$  E sodo  $\supset$  R. chod' = via. R. ischod' =|| G.A.F.H.I. ex-odo.

graphie G. = scribe.

$\supset$  A.D.F.H.I.R. : calli-graph-o, epi-graph-ê, litho-graph-o, ortho-graph-ia, panto-graph-o, tele-graph-o, typo-graph-ia, gram-ma (vide pag. 207), ...

$\subset$  E. gerbhe, A. carve, D. kerbe = sculpe.

-o Indica nomen de agente. Vide tabula de suffixos.

hodo-graph-o = que describe via.

\* 44. VALORE MEDIO PRO FUNCTIONE COMPLEXO.

1.  $a, b \in \mathbb{C} \cdot a \neq b \cdot n \in \mathbb{N}_1 \cdot f, Df \in C^n \cdot F(a, b) \supset$   
 $(fb - fa)/(b - a) \in \text{Medio } Df'(a, b)$

2. (vct | Cx) P.1  
 (pnt | Cx) P.1

Si  $f$  es numero complexo de ordine  $n$ , aut puncto, aut vectore, functione definito de variabile reale in intervallo de  $a$  ad  $b$ , tunc ratione de incremento de functione ad incremento de variabile es « medio » inter valores de derivata. Non es semper uno ex valores de derivata, ut pro functione reale.

Classe « Medio » es definito pro numeros reale, in pag. 133, et pro numeros complexo, pag. 145 Prop. 5.0.

Per exemplo, si  $x$  es tempore, et  $fx$  es puncto mobile, nos sume puncto  $o$ , et imagina puncto  $o + Df/x$ , que habe motu hodographo. Theorema dice que

$$o + D(f; a, b) \in \text{Med}(o + Df'a - b).$$

$o + Df'a - b$  es « arcu de curva descripto per motu hodographo », suo classe medio es minimo figura convexo que contine figura dato. In ce figura convexo jace puncto  $o + D(f; a, b)$ .

In casu particulare  $fa = fb$ , quando positione finale coincide cum initiale, nos deduce que origine  $o$  pertine ad minimo figura convexo continente arcu de motu hodographo (sed non es puncto hodographo).

Dem.

$p \in C^n \cdot h = \sum [p_r \times (fx)_r | r, 1 \dots n] | x, a - b; \cdot P22 \supset D(h; a, b) \in Dh'a - b$   
 $\supset \sum [p_r \times D(f_r; a, b) | r, 1 \dots n] \in \sum [p_r \times (Df_r'a - b) | r, 1 \dots n]. \text{Def Med.} \supset P$

Me expone demonstratione scripto in symbolos, pro casu de vectore functione de variabile reale. Sume vectore  $p$  ad arbitrio. Tunc producto  $hx = p \times (fx)$  es quantitate reale functione de variabile reale  $x$ . Ad illo es applicabile theorema de valore medio, et seque

$$D(p \times fx | x; a, b) \in p \times Df'a - b \text{ vel } p \times D(f; a, b) \in p \times Df'a - b.$$

Nunc, si  $u$  es vectore,  $v$  es classe de vectores, et pro omni vectore  $p$  resulta  $p \times u \in p \times v$ , seque (non que  $u \in v$ ), sed, per definitione de classe Medio, que  $u \in \text{Med } v$ .

3. Hyp.1.  $m \in \mathbb{N}_1 \cdot D^m f \in C^n \cdot F(a, b) \cdot x \in a - b \cdot h \in a - b - x \supset$   
 $f(x + h) - \sum [(h^r / r! D^r f x) | r, 0 \dots (m - 1)] \in h^m / m! \text{ Medio } D^m f'(x + \theta h)$

$$4 \text{ Hyp'1. } m \in N_1. D^m f \in C_{Xn} F a-b. x \in a-b f 0 \dots m. \supset. \\ D^m[f; (x, 0 \dots m)] \in \text{Medio}(D^m f' a-b)/m!$$

Espressione de resto, per Lagrange, de evolutione in serie de potestates (pag. 300), et expressione de ratione incrementale successivo (pag. 307 P39) subsiste pro functione complexo, introducto valore medio de derivata.

$$* 45. \quad \text{rectaT} = \text{RECTA TANGENTE.}$$

$$k \in \text{Cls}'q. p \in pFk. x \in k \wedge \delta k. \supset.$$

$$0 \text{ rectaTpx} = \lim[\text{recta}(px, py) | y, k \wedge \exists (py \neq px), x] \text{ Df}$$

Si  $k$  es classe de quantitates, et  $p$  es puncto functione definito in classe  $k$ , tunc « rectaTpx », lege « recta tangente ad trajectoria de  $p$ , pro valore  $x$  », es limite de recta per  $px$ , et per altero puncto  $py$ , dum  $y$  varia, in classe  $k$ , ubi sume valores que redde  $py$  differente de  $px$ , et tende ad  $x$ .

Classe  $k$  es aut classe  $q$ , aut  $Q$ , aut es intervallo, etc., ut in Df de derivata. Symbolo rectaTpx vale (rectaTp)x, et non rectaT(px), id es, nos determina recta tangente ad trajectoria de  $p$ , pro valore  $x$  de variabile, et non tangente ad puncto  $px$ , que non habe sensu.

**tangente** D.F.H.I., A tangent, R tangens'.  $\subset$  tange + -nte (142).

**tange** H.I., D. tang-ieren.  $\subset$  tage (242) + -n- (341).

Euclidē 13 Df2, dice que recta es tangente « ἐφάπτομαι » ad circulo (1.1 Df15) si habe uno solo puncto commune cum circulo.

Nos pote applica ideum Df. ad ellipsi, etc.; sed non ad omni curva.

Descartes, *La Geometrie*. a.1637 Œuvres, t.6, p.418 dice que tangente es recta que seca curva in duo puncto « ioins en vn »; id es, si æquatione que determina ce punctos de interseccionē habe duo « racines entièrement égales ».

Df considerato se transforma in P.0, si nos considera recta per duo puncto « juncto in uno », ut limite de recta per duo puncto distincto.

$$4 \text{ Dpx} \in v \neq 0. \supset. \text{rectaTpx} = \text{recta}(px, Dpx)$$

Si derivata de puncto mobile  $p$ , pro valore  $x$  de variabile, es vectore determinato, non nullo, tunc recta tangente in  $px$  es recta per puncto  $px$ , et parallelo ad derivata  $Dpx$ .

Dem. Df rectaT  $\supset$ . rectaT  $px = \lim [ \text{recta}(px, py) | y, k, x ]$   
 p.180 P1.4  $\supset$ . " " " "  $(px, py - px) | y, k, x ]$   
 " 11  $\supset$ . " " " "  $(py - px) / (y - x) | y, k, x ]$   
 p.237 §lim P71.2  $\supset$ . " = recta  $[ px, \lim ( \quad )$   
 Df D  $\supset$ . " = recta  $( px, Dpx )$

In facto, recta tangente es limite de recta per  $px$  et  $py$ ; vel de recta per  $px$ , et parallelo ad vectore  $py - px$ , ad que me substitue vectore parallelo  $(py - px) / (y - x)$ . Limite de ce vectore es derivata  $Dpx$ ; unde seque theorema.

$$\cdot 2 \quad n \in \mathbb{N}_1 . Dpx = D^2px = \dots = D^n px = 0 . D^{n+1} px \in v \neq 0 . \supset . \\ \text{rectaT } px = \text{recta}(px, D^{n+1} px)$$

Dem. Df rectaT . §D P32  $\supset$ . rectaT  $px = \lim [ \text{recta}(px, py) | y, k, x ;$   
 $= \lim \text{recta}(px, py - px - \Sigma [(y-x)^r / r! D^r px | r, 1 \dots n] / (y-x)^{n+1} | y, k, x ]$   
 $= \text{recta}[px, D^{n+1} px / (n+1)!] = \text{recta}(px, D^{n+1} px)$

Si pro valore  $x$ , derivata de puncto es nullo, tunc recta tangente habe directione de primo inter derivatas sequente, que non es nullo.

In facto non evolve  $py - px$  in serie asymptotico secundo potestates de  $y - x$ , usque ad ordine  $n+1$ ; mane solo ultimo termine; ergo tangente habe directione de primo termine non nullo.

✱ 46. planN = PLANO NORMALE.

Hyp P45  $\supset$ . planN  $px = p \wedge y \exists [ \text{proj}(\text{rectaT } px) y = px ]$  Df  
 $= \text{« plano normale ad trajectory de } p \text{ »}$

« planN  $px$  », lege « plano normale ad curva  $p$ , pro valore  $x$  », es plano perpendicularare ad tangente in  $px$ ; vel, expresso per ideas præcedente, es loco de punctos  $y$  tale que projectione super recta tangente ad  $px$ , de  $y$ , coincide cum  $px$ .

$$\cdot 1 \quad Dpx \in v \neq 0 . \supset . \text{planN } px = p \wedge y \exists [ (y - px) \times Dpx = 0 ] \\ = p \wedge y \exists [ D(\text{mod}(y - px) | z, k) x = 0 ] \\ = p \wedge y \exists [ \text{real}(y - px) / Dpx = 0 ] = \text{plan}(px, IDpx)$$

Plano normale in  $px$  es loco de punctos  $y$  que satisfac æquatione  $(y - px) \times Dpx = 0$ ; vel que redde derivata de distantia de  $y$  ad  $px$  nullo pro  $z = x$ ; vel que redde nullo parte reale de quaternionione  $(y - px) / Dpx$ ; vel es plano de puncto  $px$ , et de bivectore indice de  $Dpx$ .

\* 47.  $\text{planO} = \text{PLANO OSCULATORE.}$

Hp P45  $\supset$ :  $\text{planO} px =$

$\lim[\text{plan}(\text{rectaT} px, py) | y, k \wedge y \exists (py - \varepsilon \text{ rectaT} px), x] \quad \text{Dt}$

«  $\text{planO} px$  » lege « plano osculatore ad linea  $p$ , pro valore  $x$  » es limite de plano per recta tangente in  $px$ , et per  $py$ , dum  $y$  varia, in campo  $k$ , et sume valores que redde plano de recta et de puncto determinato, vel in modo que  $py$  non es super recta tangente in  $px$ , et verge ad  $x$ .

Notione de plano osculatore occurre in Tinseau, « Solutions de quelques problèmes relatifs à la théorie des surfaces courbes », Mém. Sav. Etrang. t. 9, a. 1781.

**osculatore** I, A osculatory, F osculateur.  $\subset$  oscula- + -tore.

oscula- = basia, combasia.  $\supset$  = A. oscula-te, D. -lieren, F. -ler.

$\subset$  oscul(o) + -a (92).

osculo H. = basio, parvo bucca.  $\subset$  os + -culo.

os, ore = bucca.  $\supset$  A.D.F.H.I.R. or-atore or-atorio or-aculo.

$\subset$  E. ôs, S as, || (secundo Van.) L es (1), in sensu « respira ».

-culo  $\supset$  se-culo, arti-culo, mole-cul-a, os-culo.  $\subset$  -c(o) (201) + -ulo (224).

\*1  $Dpx \varepsilon v \neq 0$ .  $D^2px \varepsilon v = qDpx$   $\supset$ .

$\text{planO} px = \text{plan}(px, Dpx, D^2px)$

[  $\text{planO} px = \lim[\text{plan}[\text{rectaT} px, py] | y, k, x$  ]

P45.1  $\supset$ .

•  $[\text{recta}(px, Dpx), py] | y, k, x$

•  $px, Dpx, [py - px - (y - x)Dpx] / (y - x)^2 | y, k, x$

§D P32  $\supset$ . » =  $\text{plan}(px, Dpx, D^2px)$  ]

Si, pro valore  $x$  de variabile, derivata de puncto  $p$  es vectore non nullo, et si derivata de ordine duo de  $p$  es vectore non parallelo ad derivata de ordine uno, tunc plano osculatore es plano per  $px$ , et parallelo ad derivata primo et secundo.

Vel: plano osculatore ad trajectory de puncto  $p$ , pro tempore  $x$ , es plano de puncto, de suo velocitate, et de suo acceleratione, si ce elementos determina plano.

Vel: plano osculatore contine fortia que move puncto.

In facto, per definitione de plano osculatore, et per theorema super recta tangente, plano osculatore es limite de plano per  $px$ ,  $Dpx$ , et  $py$ . Vectore  $py - px$  jace in ce plano; ergo plano osculatore es limite de plano per  $px$  et  $Dpx$ , et parallelo ad vectore  $py - px - (y - x)Dpx$ , et si diviso per  $(y - x)^2$ . Per theorema de Taylor, limite de isto vectore es  $D^2px/2$ , unde sequē theorema.

$$\begin{aligned} \cdot 2 \quad m, n \in \mathbb{N}_1. \quad D^m p x = D^n p x = \dots = D^{m+n} p x = 0. \quad D^m p x \in v=0. \\ D^{m+1} p x, \dots, D^{m+n-1} p x \in q D^m p x. \quad D^{m+n} p x \in v=q D^m p x. \quad \supset. \\ \text{planO} p x = \text{plan}(p x, D^m p x, D^{m+n} p x) \end{aligned}$$

Si  $m-1$  derivata successivo de puncto  $p$ , pro valore  $x$  considerato, es nullus et derivata de ordine  $m$  non es nullus, et si  $n-1$  derivata de ordine post  $m$  es parallelo ad derivata de ordine  $m$ , et derivata de ordine  $m+n$  non es parallelo ad derivata de ordine  $m$ , tunc plano osculatore es plano determinato per puncto  $p x$ , et per suas derivatas de ordine  $m$  et  $m+n$ .

$$\begin{aligned} \cdot 3 \quad \text{Hp} \cdot 1. \quad \supset. \quad T p x = U D p x \quad . \quad N p x = U D T p x \quad . \\ B p x = [I(T p x) a(N p x)] \quad \text{Df} \end{aligned}$$

$T p x$ ,  $N p x$ ,  $B p x$  es vectores unitario parallelo ad « tangente », « normale principale », « binormale », de linea  $p$ .

$$\begin{aligned} \cdot 4 \quad \text{recta} N p x = \text{plan} N p x \cap \text{plan} O p x = \text{recta}(p x, N p x) \quad \text{Df} \\ = \text{« normale principale »}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cdot 5 \quad \text{recta} B p x = \text{recta}(p x, B p x) \quad \text{Df} \\ = \text{« binormale »} \quad (\text{Saint Venant a.1845}). \end{aligned}$$

\* 48.

Ax Cc Rc

$k \in \text{Cls}'q. \quad p \in p F k. \quad x \in k \delta k. \quad \supset.$

$$\cdot 0 \quad \text{Ax } p x = \lim[(\text{plan} N p x \cap \text{plan} N p y) | y, k, x] \quad \text{Df}$$

$\text{Ax } p x$  vocare « axi de plano osculatore ad curva », vel « axi de curva » (Monge, *Géométrie descriptive*, a.VII, p.106). Es interseccione de duo plano normale consecutivo.

**axi**, A.L. axis, D.F. axe, I. asse, H. eje, F. essieu.

$\subset$  E. acsi  $\supset$  D. achse, G. axon axon-o-metria, R. osi, S. acs'a.

$$\begin{aligned} \cdot 1 \quad \text{Cc } p x = i[\text{Ax } p x \cap \text{planO } p x] \quad \text{Df} \\ = \text{« centro de curvatura »}. \quad \text{Es puncto de interseccione de} \\ \text{axi cum plano osculatore.} \end{aligned}$$

**curvatura** H.I., A. curvature, F. courbure.

$\subset$  curva (verbo) + -t(o) + -ura (153).

curva (verbo) = fac. curvo,  $\subset$  curv(o) + -a (4).

**curva** (nomen) H.I., A. curve, D. kurve, F. courbe.

$\subset$  curv(o) + -a (126, linea).

**curvo** H.I.  $\subset$  E. gervo  $\supset$  R. crivi-ti, criva-a linia = linea curva.

$\subset$  cur-  $\supset$  cor-ona, cir-co, ci-n-ge,... + -vo (214).

$$\begin{aligned} \cdot 2 \quad \text{Rc } p x = d(p x, \text{Cc } p x) \quad \text{Df} \\ = \text{« radio de curvatura »}. \end{aligned}$$

$Dpx \in v=0 . D^2px \in v=qDpx \quad \neg$ .

$$\cdot 3 \quad Axpx = \text{plan} Npx \wedge \exists z[(z-px) \times (D^2px) = (Dpx)^2]$$

[Hp.  $f = [(z-px) \times Dpy \mid y, k] \quad \neg$ .  $Axpx = \lim \{ p \wedge \exists [fx = 0 . fy = 0] \mid y, k, x \}$   
 $= \lim \{ p \wedge \exists [fx = 0 . (fy - fx)/(y - x) = 0] \mid y, k, x \}$   
 $= p \wedge \exists [fx = 0 . \lim \{ (fy - fx)/(y - x) \mid y, k, x \} = 0] = p \wedge \exists [fx = 0 . Dfx = 0]$   
 $= \text{plan} Npx \wedge \exists [-(Dpx)^2 + (z-px) \times D^2px = 0] \quad ]$

Axi de curva  $p$  pro  $x$ , es intersectione de plano normale in  $px$ , vel loco de punctos  $z$  que redde

$$(z-px) \times Dpx = 0,$$

cum plano loco de punctos  $z$  que satisfac æquatione:

$$(z-px) \times D^2px = (Dpx)^2,$$

que resulta ex præcedente, post derivatione pro  $x$ .

In vero, me pone  $fy = (z-px) \times Dpy$ , ubi  $z$  es puncto. Tunc  $fy = 0$  es æquatione in  $z$ , satisfacto per punctos de plano normale pro valore  $y$ . Tunc axi es limite de intersectione de planos de æquatione  $fx = 0$ ,  $fy = 0$ . Isto systema vale  $fx = 0$  et  $D(f; x, y) = 0$ , et ad limite,  $fx = 0$  et  $Dfx = 0$ .

$$\cdot 4 \quad Ccpx = px - Dpx / \text{Imag}(D^2px/Dpx)$$

[  $z = Ccpx \quad \neg$ .  $\text{real}(z-px)/Dpx = 0$ .  $D[\text{real}(z-px)/Dpx] \mid x, k, x = 0$  (1)  
 $\text{real} D[(z-px)/Dpx \mid x, k, x] = \text{real}[-1 - [(z-px)/Dpx][D^2px/Dpx]] =$

$$= -1 - \text{real}[(z-px)/Dpx] \text{real}[D^2px/Dpx] - \text{Imag}[(z-px)/Dpx] \text{Imag}(D^2px/Dpx) \quad (2)$$

(1) . (2)  $\neg$ .  $1 + \text{Imag}[(z-px)/Dpx] \text{Imag}(D^2px/Dpx) = 0 \quad \neg$ .

$$\text{Imag}[(z-px)/Dpx] = -\text{Imag}(D^2px/Dpx) \quad (3)$$

$(z-px)/Dpx = \text{real}[(z-px)/Dpx] + \text{Imag}[(z-px)/Dpx] \cdot (1) \cdot (3) \quad \neg$ .

$$(z-px)/Dpx = -\text{Imag}(D^2px/Dpx) \quad \neg$$

$$z-px = -Dpx / \text{Imag}(D^2px/Dpx) \quad \neg. P ]$$

Centro de curvatura de curva  $p$ , pro valore  $x$ , vale  $px$  minus derivata de  $px$  diviso per imaginario de ratione de derivata de ordine duo ad derivata ordine uno.

Ratione de duo vectore es quaternione (pag. 185). Si vectores considerato in calculo es in plano fixo, tunc quaterniones es repræsentato per numeros imaginario (pag. 268).

$$\cdot 5 \quad Rcpx = (Dpx)^2 / \text{mod}[(\text{cmp} \perp Dpx) D^2px]$$

$$[ DfCc . P \cdot 3 \quad \neg. (Ccpx-px) \times (D^2px) = (Dpx)^2 \quad \neg. P ]$$

Radio de curvatura vale quadrato de velocitate diviso per componente normale de acceleratione, considerato in valore absoluto. Componente normale de acceleratione vocare sæpe «acceleratione normale».



Constructione graphico de centro de curvatura, dato  $px$ ,  $Dpx$ ,  $D^2px$ :

Construe punctos  $px + Dpx$ ,  $px + Dpx + (\text{cmp } \perp Dpx) D^2px$ ; per puncto  $px + Dpx$  duce, in plano osculatore, normale ad recta  $[px, px + Dpx + (\text{cmp } \perp Dpx) D^2px]$ , que seca normale ad curva in  $Ccpx$ .

$$\cdot 6 \quad Rcpx = (\text{mod } Dpx)^2 / \text{mod}(Dpx \text{ a } D^2px)$$

$$\cdot 7 \quad Axx = \text{recta}(Ccpx, Bpx)$$

$$\cdot 8 \quad D^2px = (D \text{ mod } Dpx) Tpx + (Dpx)^2 / (Rc \text{ } px) Npx$$

$$\text{Dem.} \quad Dpx = (\text{mod } Dpx) Tpx \cdot \text{Oper } D \cdot \perp. P$$

Derivata de ordine 2, vel acceleratione de puncto es summa de vectore derivata de modulo de velocitate, directo secundo tangente ad trajectory, plus quadrato de velocitate diviso per radio de curvatura, directo secundo normale principale ad curva.

$$\cdot 9 \quad Ccpx = px + (Dpx)^2 [(D^2px)(Dpx)^2 - (Dpx)(Dpx \times D^2px)] / [(Dpx)^2 (D^2px)^2 - (Dpx \times D^2px)^2]$$

Expressione de centro de curvatura ope solo producto interno de duo vectore.

\* 49. curvatura

$$\text{Hyp P48 } \perp. \text{ curvatura } px = D Tpx / \text{mod } Dpx \quad \text{Df} \\ = Npx / Rc \text{ } px$$

«Curvatura» es vectore directo secundo normale principale, et reciproco de radio de curvatura.

\* 50. torsio

$$k \in \text{Cls}'q \cdot p \in pFk \cdot x \in k \delta k \cdot \perp.$$

$$\cdot 1 \quad \text{torsio } px = D B \text{ } px \times Npx / \text{mod } D \text{ } px \quad \text{Df}$$

«Torsione» es quantitate cum signo. Torsione es positivo in luppulo et in cucurbita, es negativo in viti vinifera, et in viti commune de Mechanica constructo in Europa. Viti constructo in Sina et in Nippon, habe torsione positivo.

$$\cdot 2 \quad \text{torsio } px = -(Dpx \text{ a } D^2px \text{ a } D^3px / \psi) / (Dpx \text{ a } D^2px)^2$$

Torsione vale minus producto alterno de derivatas de ordine 1, 2, 3, diviso per trivectore unitate (pag. 198), diviso per quadrato de producto alterno de derivatas de ordine 1 et 2.

$$\cdot 3 \quad D B p x / \text{mod } D p x = (\text{torsio } p x) N p x$$

$$\cdot 4 \quad D N p x / \text{mod } D p x = - ( / R c p x ) T p x - (\text{torsio } p x) B p x$$

Derivata de vectores unitario T (Prop. 49), N, B, definito in Prop. 47.

{ FRENET, *Sur les courbes à double courbure*, Thèse  
10 juillet 1847, JdM. t.17 a.1851.

/ torsio  $p x$  = radio de torsione.

Cc  $p x - ( / \text{torsio } p x ) ( D R c p x ) B p x =$  « centro de sphæra osculatrice »  
= « puncto de inviluppo de plan  $N p x$  ».

recta  $p x$ ,  $( R c p x ) T p x - ( / \text{torsio } p x ) B p x =$  « generatrice de superficie  
rectificante inviluppo de plan  $( p x, I N p x )$  ».

$( o + T p x ) / x$  describe indicatrice de tangentes.

$( o + N p x ) / x$  » » normales principale.

$( o + B p x ) / x$  » » binormales.

**torsione** (L. a. +100), A.D.F. torsion, H. tortijon, I. torsione.

⊂ tortione (L. classico) ⊂ tort(o) + -ione.

torto I., A.D.F. tort, H. tuerto. ⊂ torqu(e) + -to.

torque, H.I. torce, F. tordre.

\* 51.1  $k \in \text{Cls}' q . p \varepsilon p F k . z_1, z_2, \varepsilon k \quad \bigcup$ .

$$p z_1 a p z_2 = (z_2 - z_1) p z_1 a D(p; z_1, z_2)$$

Expressione de producto alterno de duo puncto de curva.

$$\cdot 2 \quad H p \cdot 1 . D p \varepsilon (v F k) \text{cont} . x \varepsilon k \quad \bigcup$$

$$\lim[(p z_1 a p z_2) / (z_2 - z_1) | z, (k f 1 \cdots 2) \text{sim}, (x, x)] = p x a D p x$$

$$\cdot 3 \quad H p \cdot 2 \quad \bigcup . \lim[d(p z_1, p z_2) / (z_2 - z_1) | z, \dots] = \text{mod } D p x$$

$$\cdot 4 \quad H p \cdot 2 . D p x = 0 \quad \bigcup$$

$$\lim[\text{recta}(p z_1, p z_2) | z, (k f 1 \cdots 2) \text{sim}, (x, x)] = \text{recta}(p x, D$$

Recta tangente, in uno puncto de curva, per definitione, es limite de recta que uni ce puncto ad alio puncto de curva, dr puncto tende ad primo. Theorema dice que, si puncto habe ordine 1 continuo et non nullo, tunc recta tangente es posit recta que uni duo puncto diferente de curva, dum ambo r tende ad puncto dato.

Si hypothesi non es vero, thesi pote es in defectu. P. e ad curva descripto per puncto  $p x = o + x^2 a + x^3 b$ , ubi  $o$  que vocare « parabola de ordine  $3/2$  », habe recta T Positione limite de recta  $(p x, p - x)$ , que uni duo p tende ad  $p 0$  dum  $x$  tende ad 0, es recta  $(0, b)$ , differe

\* 52.1 Hp P51 .  $z_1, z_2, z_3 \varepsilon k \rightarrow$ .

$$pz_1 \wedge pz_2 \wedge pz_3 = (z_1 - z_2)(z_2 - z_3)(z_3 - z_1) pz_1 \wedge D(p; z_1, z_2) \wedge D^2(p; z_1, z_2, z_3)$$

Producto alterno de tres punto de curva, expresso per rationes incrementale de puncto.

$$\cdot 2 \quad \text{Hp} \cdot 1 \cdot D^2 p \varepsilon (vFk) \text{cont} \rightarrow \lim \{ (pz_1 \wedge pz_2 \wedge pz_3) / [(z_1 - z_2)(z_2 - z_3)(z_3 - z_1)] | z, (kf 1 \cdots 3) \text{sim}, (x, x, x) \} = px \wedge Dpx \wedge D^2 px / 2$$

Limite de triangulo (producto alterno) de tres puncto de curva, diviso per producto de differentias de variable, si tres puncto verge ad idem puncto  $px$ .

$$\cdot 3 \quad \text{Hp} \cdot 2 \cdot Dpx \rightarrow 0 \rightarrow \lim d[pz_1, \text{rectaT}(p, z_2)] / (z_1 - z_2)^2 | z, \dots] = \text{mod}(Dpx \wedge D^2 px) / (2 \text{mod} Dpx)$$

Distantia de uno puncto de curva ab tangente in puncto successivo.

$$\cdot 4 \quad \text{Hp} \cdot 2 \rightarrow \lim [\text{ang}(Dpz_1, Dpz_2) / (z_1 - z_2) | z, \dots] = \text{mod}(Dpx \wedge D^2 px) / (\text{mod} Dpx)^2$$

Angulo de duo tangente successivo.

$$\cdot 5 \quad D^2 p \varepsilon (vFk) \text{cont} \cdot Dpx \wedge D^2 px \rightarrow 0 \rightarrow \lim [\text{plan}(pz_1, pz_2, pz_3) | z, (kf 1 \cdots 3) \text{sim}, (x, x, x)] = \text{plan}(px, Dpx, D^2 px)$$

Si puncto habe derivatas de ordine 1 et 2 continuo et non paralelo, tunc limite de plano per tres puncto de curva vergente ad idem puncto, es plano de duo derivata, vel coincide cum plano osculatore.

Si hypothesi non es satisfacto, thesi pote es in defectu.

\* 53.1 Hp P51 .  $z_1, z_2, z_3, z_4 \varepsilon k \rightarrow$ .

$$pz_1 \wedge pz_2 \wedge pz_3 \wedge pz_4 = (z_1 - z_2)(z_2 - z_3)(z_3 - z_4)(z_4 - z_1)(z_1 - z_3)(z_2 - z_4) pz_1 \wedge D(p; z_1, z_2) \wedge D^2(p; z_1, z_2, z_3) \wedge D^3(p; z_1, z_2, z_3, z_4)$$

Producto alterno, vel tetrahedro cum signo, de quatuor puncto consecutivo de curva.

Hp.1 .  $D^3 p \varepsilon (vFk) \text{cont} \rightarrow$ .

$$\cdot 2 \quad \lim \{ (pz_1 \wedge pz_2 \wedge pz_3 \wedge pz_4) / [(z_1 - z_2)(z_2 - z_3)(z_3 - z_4)(z_4 - z_1)(z_1 - z_3)(z_2 - z_4)] | z, (kf 1 \cdots 4) \text{sim}, (x, x, x, x) \} = px \wedge Dpx \wedge D^2 px \wedge D^3 px / 12$$

$$\cdot 3 \quad Dpx \wedge D^2 px \rightarrow 0 \rightarrow \lim \{ d[pz_1, \text{planO}(p, z_2)] / (z_1 - z_2)^3 | z, \dots \} = \text{mod}(Dpx \wedge D^2 px \wedge D^3 px) / (6 \text{mod}(Dpx \wedge D^2 px))$$

Distantia de uno puncto de curva ab plano osculatore in puncto successivo.

$$\cdot 4 \quad Dpx = 0 \quad \supset \quad \lim \{ \sin(Dpz_1, Dpz_2, Dpz_3) / [(z_1 - z_2)(z_2 - z_3)(z_3 - z_1)] \mid z, \dots \} = [(Dpx \wedge D^2px \wedge D^3px) / \psi] / [2(\bmod Dpx)^3]$$

Sinu de trihedro de tres tangente successivo. Sinu de trihedro es definito in pag. 199 Prop. 22·2.

$$\cdot 5 \quad Dpx \wedge D^3px = 0 \quad \supset \quad \lim \{ d[\text{recta}T(p, z_1), \text{recta}T(p, z_2)] / (z_1 - z_2)^3 \mid z, \dots \} = \bmod(Dpx \wedge D^2px \wedge D^3px) / [12 \bmod(Dpx \wedge D^2px)]$$

Distanzia de duo recta tangente successivo.

$$\cdot 6 \quad Dpx \wedge D^2px = 0 \quad \supset \quad \lim \text{ang}[\text{recta}T(p, z_1), \text{plan}O(p, z_2)] / (z_1 - z_2)^2 = \bmod(Dpx \wedge D^2px \wedge D^3px) / [2 \bmod(Dpx \wedge D^2px)]$$

$$\cdot 7 \quad Dpx \wedge D^2px = 0 \quad \supset \quad \lim \{ \text{ang}[\text{plan}O(p, z_1), \text{plan}O(p, z_2)] / (z_1 - z_2) \mid z, \dots \} = \bmod Dpx \bmod(Dpx \wedge D^2px \wedge D^3px) / [Dpx \wedge D^2px]^2$$

Angulo de duo plano osculatore successivo.

Vide meo libro *Applicazioni geometriche* a.1887 p.110.

## \* 54. COORDINATAS

$$o \in p . a, b \in v . a^2 = b^2 = 1 . a \times b = 0 . i = b/a . k \in \text{Cls}'q . f \in qFk . \\ p = (o + xa + fx b) \mid x, k . x \in k \delta k . y = fx . y' = Dfx . y'' = D^2fx \quad \supset : \\ \cdot 0 \quad Dpx = a + y'b \quad . \quad D^2px = y''b$$

Nos considera puncto  $o$ , et duo vectores unitario et orthogonale  $a$  et  $b$ . Nos voca  $i$  unitate imaginario que fer  $a$  in  $b$ .

Tunc  $o + xa + yb$  es puncto de coordinatas chartesiano  $x$  et  $y$ . Nos suppone  $y$  dato per  $x$ ; puncto describe curva, de que nos determina plure elemento.

$$\cdot 1 \quad \text{recta}Tpx = [o + (x + z)a + (y + zy')b] \mid z'q \\ \text{Dem.} \quad [ \text{recta}Tpx = \text{recta}(px, Dpx) = \text{recta}(o + xa + yb, a + y'b) = \dots ]$$

$$\cdot 2 \quad y' \in q \neq 0 \quad \supset \quad o + (x - y/y')a \in \text{recta}Tpx \\ \text{Dem.} \quad [ P \cdot 1 . z = -y/y' \quad \supset \quad P ]$$

Intersectione de recta tangente cum axi  $oa$ .

Vectore  $-y/y'a$  vocare « subtangente » de linea descripto per  $p$  de coordinatas cartesiano  $x$  et  $y$  in  $\text{plan}(o, a, b)$ .

$$\cdot 3 \quad o + (y - xy')b \in \text{recta}Tpx$$

Intersectione de recta tangente cum axi  $ob$ .



4  $Dpt \varepsilon v=0 . X, Y, Z \varepsilon q . \supset: o + \lambda$   
 $(X - xt)(Dxt) + (Y - yt)(Dyt) + (Z - zt)$

Æquatione de plano normale ad curva.

5  $D^2pt = (D^2xt)a + (D^2yt)b + (D^2zt)$

6  $Dpt \varepsilon v=0 . D^2pt \varepsilon v=qDpt . X$   
 $\varepsilon \text{ planOp}x . = . \text{Determ}[X - xt, Y - y$   
 $Dxt, Dyt,$

$D^2xt, D^2yt,$

Æquatione de plano osculatore.

## \* 57. ÆQUATIONE DIFFERENTI

$a \varepsilon q . \supset: f \varepsilon q Fq . Df = af . = . f =$   
 Dem.  $Df = af . = . \{ (Dfx - afx)$   
 $= . D(e^{-ax} fx | x,$   
 $= . (e^{-ax} fx | x, q$   
 $= : x \varepsilon q . \supset x . e^{-a}$

Si  $a$  es quantitate dato, tunc func  
 reale, que pro omni valore de  $x$  sai

$$Dfx = a(fx$$

es expresso per

$$fx = (f0)e^a$$

ubi varia  $x$  in campo de numeros re

In vero, æquatione dato vale, pro omni  $a$   
 de  $e^{-ax}fx$  es  $e^{-ax}(Dfx - afx)$ ; ergo æquation  
 isto functione es semper nullo. Tunc isto f  
 æquale ad suo valore pro  $x=0$ . Ergo, pro  
 $fx = (f0)e^{-ax}$ .

\*  
 \* \*

Æquatione inter functione  $f$  et alic  
 « æquatione differentiale ». Suo ordin  
 derivatas que occurre in æquatione.

Æquatione differentiale es dicto «  
 gradu in functione et suo derivatas. I  
 tegra » æquatione differentiale, si ne  
 que satisfac illo, pro omni valore de

Æquatione supra considerato es « diff  
 lineare ». Coefficiente de  $f$  es constan  
 independente de  $f$  et  $Df$ . Formula da

$$\begin{aligned} * \quad 58.1 \quad a \in q=0 . b \in q . \supset: f \in q F q . Df &= \{(afx+b)|x, q\} . = . \\ D[(fx+b/a) | x, q] &= [a(fx+b/a) | x, q] . = . \\ [(fx+b/a) | x, q] &= [(f0+b/a)e^{ax} | x, q] . = . \\ f &= [(f0)e^{ax} + b/a(e^{ax}-1)|x, q] \end{aligned}$$

Calcolo de  $f$ , functione reale de variabile reale, que pro omni valore de  $x$ , satisfac æquatione  $Dfx = afx + b$ , ubi  $a$  et  $b$  es quantitate constante.

$$\begin{aligned} * \quad 2 \quad a, b, m \in q . m \neq a . \supset: f \in q F q . Df &= [(afx+be^{mx})|x, q] . = . \\ D[e^{-ax}fx - be^{(m-a)x}/(m-a) | x, q] &= (0: q) . = . \\ [e^{-ax}fx - be^{(m-a)x}/(m-a) | x, q] \in (q F q) \text{ const} . &= : \\ x \in q . \supset: e^{-ax}fx - be^{(m-a)x}/(m-a) &= f0 - b/(m-a) . = . \\ f &= \{[(f0)e^{ax} + be^{mx}/(m-a) - be^{ax}/(m-a)]|x, q\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} * \quad 59. \quad m \in q . n \in q=1 . k \in \text{Intrv} . a \in k . \supset: \\ f \in QFk . Df &= [m(fx)^n | x, k] . = . \\ [(fx)^{-n} Dfx - m'x, k] &= (0: k) . = . \\ D[(fx)^{-n+1}/(-n+1) - mx | x, k] &= (0: k) . = . \\ [(fx)^{-n+1}/(-n+1) - mx | x, k] \in (q F k) \text{ const} . &= . \\ [(fx)^{-n+1}/(-n+1) - (fa)^{-n+1}/(-n+1) - m(x-a) | x, k] &= (0: k) . = . \\ f &= \{[(fa)^{-n+1} + (-n+1)m(x-a)]^{1/(-n+1)} | x, k\} . \\ k \supset q \wedge x \exists [(fa)^{-n+1} + (-n+1)m(x-a) > 0] \end{aligned}$$

Nos quære functione  $f$  positivo definito in aliquo intervallo  $k$ , que pro omni valore de  $x$  in  $k$ , satisfac æquatione  $Dfx = m(fx)^n$ , id es, que habe derivata proportionale ad aliquo potestate, diverso de 1, de functione. Æquatione vale  $(fx)^{-n} Dfx - m = 0$ ; primo membro es derivata de functione scripto in linea 4, que resulta constante, vel æquale ad suo valore pro  $x = 0$ , unde resulta valore de functione  $f$ . Intervallo  $k$  contine solo valores de  $x$ , que redde basi positivo. Nam nos habe definito potestate cum exponents  $q$ , pro basi positivo.

Casu  $n = 1$  es tractato in P57.

## \* 60. MOTU DE PUNCTO GRAVE.

$$\begin{aligned} g \in v . \supset: p \in p F q . D^2 p &= (g: q) . = . p = [(p0 + t Dp0 + t^2 g/2) | t, q] \\ [ \dots . = . Dp &= [(Dp0 + tg) | t, q] . = . \dots ] \end{aligned}$$

Si  $g$  es vectore dato, tunc puncto mobile  $p$ , que pro omni valore de tempore  $t$  habe acceleratione constante  $g$ :

$$D^2 p t = g$$

es dato per

$$p t = p0 + t(Dp0) + t^2 g/2 .$$

et describe « parabola ».

Puncto materiale grave, in vacuo, prope superficie de Terra, habe acceleratione constante, dicto « gravitate ».

Dem. Equatione:  $D^2pt = g$ , pro omni  $t$ , post integratione (Prop. 24 pagina 289), fit:  $Dpt = Dp0 - gt$ ; que post novo integratione sume forma scripto.

GALILEI, *Dialoghi*, a.1638; Opere t. 13 p. 222:

« Projectum, dum fertur motu composito ex horizontali æquabili, et ex naturaliter accelerato deorsum, lineam semiparabolicam describit in sua latione. »

\* 61. MOTU CENTRALE.

$p \in pFq . o \in p . \supset .$

$x \in q . \supset . D^2px \in q(px - o) := o a p a Dp \in (p^2fq) \text{const}$

Dem.  $x \in q . \supset . D[(o a p x a Dpx)|x, q]|x = o a p x a D^2px$

$p$  es puncto functione de variabile reale, id es,  $p$  es puncto mobile; et  $o$  es puncto fixo. Si pro omni valore de tempore  $x$ , semper es acceleratione de puncto parallelo ad vectore  $px - o$ , vel fortia que move puncto es semper directo. verso centro  $o$ , tunc tripuncto  $o a p x a Dpx$ , id es triangulo de vertices  $o$ ,  $p$ ,  $x$ ,  $px + Dpx$ , considerato in magnitudine, plano suo, et in sensu, habe valore constante, dum varia tempore  $x$ . Et viceversa.

NEWTON, Principia l. 1 P 1:

« Areas, quas corpora in gyros acta radiis ad immobile centrum virium ductis describunt, et in planis immobilibus consistere et esse temporibus proportionales ».

\* 62. PUNCTO GRAVE IN MEDIO RESISTENTE.

$a \in Q . g \in v . \supset . p \in pFq . D^2p = g - aDp :=$

$Dp = [(Dp0)e^{-ax} - g(e^{-ax} - 1)/a]|x, q| :=$

$Dp = D[-(Dp0)e^{-ax}/a + ge^{-ax}/a^2 + gx/a]|x, q| :=$

$p = \{[p0 - Dp0e^{-ax}/a + ge^{-ax}/a^2 + gx/a + Dp0/a - g/a^2]|x, q|\}$

$:= p = \{[p0 + (Dp0)(1 - e^{-ax})/a + g(e^{-ax} - 1 + ax)/a^2]|x, q|\}$

$:= p = \{[(p0 + Dp0/a - g/a^2) + (g/a)x + (g/a^2 - Dp0/a)e^{-ax}]]|x, q|\}$

Nos suppose que  $p$  es puncto functione de quantitate, que nos voca tempore, id es,  $p$  es puncto mobile. Nos suppose que suo acceleratione  $D^2p$  habe forma  $g - aDp$ , ubi  $g$  es vectore dato, et  $a$  es quantitate positivo. Si puncto  $p$  es grave, et  $g$  es acceleratione gravitate, et si puncto move se in medio resistente, ubi resistantia es opposito et proportionale ad velocitate  $Dp$ , tunc  $D^2p$  habe forma scripto. Pro calcula  $p$ , nos nota que



æquatione es in  $Dp$  lineare et de primo ordine (58.1) unde nos deduce  $Dp$  in functione de tempore; nos calcula functione que habe pro derivata functione præcedente, et que pro  $x=0$  habe valore  $p0$ . Ita nos habe  $p$ .

Trajectoria de puncto  $p$  es « linea exponentialia » vel « logarithmica ».

Si nos pone  $qx = p0 + Dp0/a - g/a^2 + gx/a$ ,  
seque  $\lim[(px - qx)|x, q, \infty] = 0$ ;  $qx$  describe recta, que es asymptoto de logarithmica.

{ NEWTON, a.1687 libro 2, Prop. 4. }

\* 63. ÆQUATIONE LINEARE DE ORDINE DUO.

$$a \varepsilon q' \neq 0 \quad \supset: f \varepsilon q' Fq' \quad D^2 f = a^2 f \quad \text{.}.$$

$$f = \{[(f0)(e^{ax} + e^{-ax})/2 + (Df0)(e^{ax} - e^{-ax})/(2a)] \mid x, q'\}$$

$$\begin{aligned} \text{Dem.} \quad [f \varepsilon q' Fq' \quad D^2 f = a^2 f \quad \text{.} \quad & [e^{ax}(D^2 f x - a^2 f x) \mid x, q'] = (f0' : q') \\ & \text{.} \quad D[(e^{ax} Df x - a e^{ax} f x) \mid x, q'] = (f0' : q') \\ & \text{.} \quad [(e^{ax} Df x - a e^{ax} f x) \mid x, q'] \varepsilon (q' Fq') \text{const} \\ & \text{.} \quad \text{.} \quad x \varepsilon q' \quad \supset_x \quad e^{ax} Df x - a e^{ax} f x = Df0 - a f0 \\ & \text{.} \quad Df = [a f x + (Df0 - a f0) e^{-ax} \mid x, q'] \\ & \text{.} \quad \text{.} \quad \dots \end{aligned}$$

Si  $a$  es quantitate dato, tunc omni functione de variabile, reale aut imaginario, que pro omni valore de  $x$  satisfac æquatione

$$D^2 f x = a^2 f x,$$

id es, que habe derivata secundo proportionale ad functione, habe forma scripto.

\* 64. MOTU HARMONICO.

$$a \varepsilon Q \quad . \quad o \varepsilon p \quad \supset: p \varepsilon p Fq \quad D^2 p = -a^2(p - o) \quad \text{.}.$$

$$p = \{[o + (p0 - o) \cos ax + (Dp0) \sin(ax)/a] \mid x, q\}$$

$$\text{Dem.} \quad (p - o, ia) \mid (f, a) \text{ P63 } \supset. \text{ P}$$

Si  $p$  es puncto functione de quantitate reale, que me voca tempore, id es, si  $p$  es puncto mobile, et suo acceleratione  $D^2 p$  habe forma  $-a^2(p - o)$ , ubi  $a$  es quantitate positivo, et  $o$  es puncto fixo, id es, si  $D^2 p$  es directo verso puncto  $o$ , et proportionale ad vectore  $p - o$ , tunc  $p$  habe expressione scripto.

Puncto describe ellipsi de centro  $o$ , et de hemi-diametros conjugato vectores  $p0-o$  et  $(Dp0)/a$ . Motu habe periodo  $2\pi/a$ , vel  $px = p(x+2\pi/a)$ . Periodo non depende de  $p0$  et  $Dp0$ : motu es isochrono.

Puncto  $p$  pertinente ad systema elastico, posito ex suo positione de æquilibrium  $o$ , tende ad  $o$  cum fortia proportionale (pro parvo deformatione) ad vectore  $p-o$ .

NEWTON a.1687; Principia l. 1, Prop. X:

« si vis sit ut distantia, movebitur corpus in ellipsi centrum habente in centro virium ».

## \* 65. SYSTEMA DE ÆQUATIONES DIFFERENTIALE LINEARE.

$n \in \mathbb{N}_1$ ,  $a \in \text{Subst } n$   $\supset$ :

$$x \in \mathbb{C}^n \text{ F } q \cdot Dx = ax \quad . = . \quad x = [(x0)e^{\lambda(at)} | t, q] \\ [(\text{Subst } | q) \text{ Dem } 57]$$

Si  $n$  es numero, et  $a$  es substitutione de ordine  $n$ , tunc complexo  $x$  de ordine  $n$ , functione de numero reale, que satisfac æquatione differentiale  $Dx = ax$ , habe forma

$$x(t) = (x0)e^{\lambda(at)},$$

ubi  $t$  es variabile in campo de numeros reale.

Formula et demonstratione es identico ad theorema præcedente P57.

Æquatione  $Dx = ax$  repræsenta systema de  $n$  æquatione differentiale lineare homogeneo ad coefficientes constante:

$$\begin{aligned} Dx_1 &= a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \\ Dx_2 &= a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \\ &\vdots \\ Dx_n &= a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n. \end{aligned}$$

Exponentiale de substitutione es definito in V § e P11.0 pag. 249:

$$e^a = 1 + a + a^2/2! + a^3/3! + \dots$$

Potestate  $n$ , et successivos, de  $a$ , pote es expresso per præcedentes, ope æquatione characteristico (pag. 151 Prop.5.4. Ergo  $e^{\lambda a}$  es polynomio de gradu  $n-1$  in  $a$ :

$$e^a = \text{Interpolante}[e^{\lambda a}] \cdot \text{Radices}[\text{Determinante}(a-h)(h,q)](a)$$

$e^{\lambda a}$  es functione interpolante (p.306) de exponentiale, calculato super radices de functione characteristico  $\text{Dtrm}(a-h)$ , ubi  $h$  es reale, pro  $a$ .

\* 66.

## DERIVATAS PARTIALE.

$u, v \in \text{Intv} \cdot f \in \text{qF}(u; v) \cdot a \in u \cdot b \in v \cdot \supset$

$$\cdot 0 \quad D_1 f(a, b) = D[f(x, b) | x, u] a \cdot D_2 f(a, b) = D[f(a, y) | y, v] b \quad Df$$

Si  $u$  et  $v$  es intervallo, et  $f$  es quantitate functione de duo variabile, primo in  $u$ , secundo in  $v$ , et si nos sume  $a$  in  $u$  et  $b$  in  $v$ , tunc  $D_1 f(a, b)$  indica derivata de  $f(x, b)$ , ubi varia  $x$  in campo  $u$ , pro valore  $a$ . Ita  $D_2 f$  indica derivata pro secundo variabile.

Plure auctore indica ce derivatas, dicto « derivatas partiale », per notationes :

$$D_1 f(x, y) = D_x f(x, y) = f'_x(x, y) = \frac{df(x, y)}{dx} = \frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$$

$$D_2 f(x, y) = D_y f(x, y) = f'_y(x, y) = \frac{df(x, y)}{dy} = \frac{\partial f(x, y)}{\partial y}$$

In primo notatione, que nos seque, lice, in loco de  $x$  et  $y$ , pone duo valore determinato, p. ex. 0 et 0; nos habe derivatas

$$D_1 f(0, 0) \quad D_2 f(0, 0).$$

Cetero notationes es incompleto, et debe es completato per lingua comune. Per ex. quod in primo notatione es indicato per  $D_1 f(0, 0)$ , in secundo notatione debe es indicato per  $D_x f(0, 0)$  aut per  $D_0 f(0, 0)$ ? Et quod in primo notatione es indicato per  $D_1 f(y, x)$ , in secundo notatione debe es indicato per  $D_x f(y, x)$  aut per  $D_y f(y, x)$ ? Vide in pag. 278 citatione de Jacobi.

$$\cdot 1 \quad D_1 f, D_2 f \in \text{qF}(u; v) \cdot x \in u \cdot y \in v \cdot \supset \cdot f(x, y) - f(a, b) \in (x-a)D_1 f(a^-x; b^-y) + (y-b)D_2 f(a^-x; b^-y)$$

$$\text{Dem.} \quad f(x, y) - f(a, b) = [f(x, y) - f(a, y)] + [f(a, y) - f(a, b)] \quad (1)$$

$$f(x, y) - f(a, y) \in (x-a)D_1 f(a^-x; y) \quad (2)$$

$$f(a, y) - f(a, b) \in (y-b)D_2 f(a; b^-y) \quad (3)$$

$$(1) (2) (3) \supset P$$

Si functione  $f$  habe ambo derivatas partiale in intervallos dato, et si nos sume alios valore  $x$  in  $u$ , et  $y$  in  $v$ , tunc differentia de duo valores de functione  $f$  vale incremento de  $x$ , per derivata de  $f$  pro primo variabile, plus incremento de  $y$ , per derivata de  $f$  pro secundo variabile, ubi derivatas es calculato per valores medio inter considerato.

2.  $D_1 f, D_2 f \in (q F(u; v) \text{ cont. } w \in \text{Intv. } x \in u F w . y \in v F w . t \in w . D_1 x t, D_2 y t \in q) . \supset . D[f(xt, yt) | t, w] t = D_1 f(xt, yt) D_1 x t + D_2 f(xt, yt) D_2 y t$   
 Dem.  $P \cdot 1 . t_1 \in w . \supset . f(xt_1, yt_1) - f(xt, yt) \in (xt_1 - xt) D_1 f(xt, yt) + (yt_1 - yt) D_2 f(xt, yt)$   
 $\supset . D[f(xt, yt) | t, t_1] = D_1 f(\dots) D(x; t, t_1) + D_2 f(\dots) D(y; t, t_1) . \supset . P$

Si derivatas partiale de  $f$  es continuo, et si  $w$  es intervallo, et  $x$  es functione definitio in campo  $w$ , que sume valores in  $u$ , et  $y$  es functione definitio in campo  $w$ , que sume valores in  $v$ , et si  $t$  es valore in  $w$ , et existe derivatas de  $x$  et de  $y$  pro  $t$ , tunc derivata de  $f(xt, yt)$ , ubi varia  $t$  (litera  $t$  es apparente), pro  $t$ , vale derivata de  $f$ , pro primo variabile, multiplicato per derivata de  $x$  pro  $t$ , plus derivata de  $f$ , pro secundo variabile, multiplicato per derivata de  $y$  pro  $t$ .

Functione  $f(xt, yt)$  vocare « functione composito » de  $t$ .

*Exemplo.* Derivata de productio  $(xt)(yt)$  pro  $t$ , vale derivata pro primo factore  $xt$ , vel  $yt$ , per derivata de primo  $D_1 x t$ , plus derivata pro secundo factore  $yt$ , vel  $xt$ , per derivata  $D_2 y t$ , id es

$$(yt)(D_1 x t) + (xt)(D_2 y t),$$

secundo regula P6 de pag. 280.

Derivata de  $(xt)N(yt)$  vale derivata de potestate, pro basi variabile, vel  $(yt) \times (xt)N(yt-1)$ , multiplicato per derivata de basi  $D_1 x t$ , plus derivata de potestate pro exponents variabile, vel  $(xt)N(yt) \times \log(xt)$  per derivata de exponents  $D_2 y t$ . Sequit formula P13.4 de pag. 283.

3.  $D_1 f, D_2 f, D_3 D_1 f \in q F(u; v) . x \in u . y \in v . \supset .$

$$f(x, y) - f(a, y) - f(x, b) + f(a, b) \in (x-a)(y-b) D_3 D_1 f(a^-x : b^-y)$$

$$\begin{aligned} \text{Dem. } f(x, y) - f(x, b) - f(a, y) + f(a, b) &= \Delta[\Delta f(h, k) | k; b, y] | h; a, x \\ &\in (x-a) \Delta[D_1 f(h, k) | k; b, y] | h^+ a^- x \\ &\in (x-a)(y-b) D_3 D_1 f(h, k) | k^+ b^- y | h^+ a^- x \end{aligned}$$

4.  $D_1 f, D_2 f, D_3 D_1 f \in q F(u; v) \text{ cont. } \supset . D_1 D_2 f = D_2 D_1 f$

$$\begin{aligned} \text{Dem. } D_1 D_2 f(a, b) &= \lim [D_2 f(x, b) - D_2 f(a, b)] (x-a)^- | x, u, a \\ &= \lim \lim [f(x, y) - f(a, y) - f(x, b) + f(a, b)] / [(x-a)(y-b)^-] | y, v, b^- x, u, a \\ &= \lim \lim D_2 D_1 f(a^-x, b^-y) | y, v, b^- x, u, a = D_2 D_1 f(a, b) \end{aligned}$$

Si functione  $f$  de duo variabile habe derivatas  $D_1 f, D_2 f$ , et  $D_3 D_1 f$  continuo, tunc lice invertit ordine de derivationes, id es, lice commutit operationes  $D_1$  et  $D_2$ .

Ex demonstratione resulta que nos debe suppone existentia et continuitate de  $D_3 D_1 f$ . Tunc es necessario existentia de  $D_1 f$ , que es continuo pro secundo variabile (pag. 279, P3.3), sed non es necesse suo continuitate pro

primo variabile. Nos suppose existentia de  $D_2 f(a, y)$ , pro aliquo valore  $a$  de primo variabile, et pro omni valore de secundo variabile  $y$ ; tunc seque existentia de  $D_2 f(x, y)$ , et de  $D_2 D_1 f(x, y)$  pro omni valore de  $x$  et de  $y$ .

$$\cdot 5 \quad h, k \in \mathbb{Q} \quad \bigcup. (hD_1 + kD_2)f(a, b) = hD_1 f(a, b) + kD_2 f(a, b) \quad \text{Df}$$

$$\cdot 6 \quad n \in \mathbb{N}_1 : r, s \in \mathbb{N}_0 : r + s \leq n \quad \bigcup_{r, s} D_1^r D_2^s f \in \mathcal{QF}(u; r) \text{ cont. } h \in u - a \\ \cdot k \in v - b \quad \bigcup. f(a + h, b + k) = \sum [(hD_1 + kD_2)^r f(a, b) / r! \cdot |r, 0 \dots (n-1)|] + \\ (hD_1 + kD_2)^n f(a + zh, b + zk) / n! \cdot |z, \theta$$

Si  $n$  es numero naturale, et pro omni dyade de numeros  $r$  et  $s$ , de summa non superiore ad  $n$ , semper existe derivata de ordine  $r$  pro primo variabile de derivata de ordine  $s$  pro secundo variabile, et es continuo, et si nos sume duo quantitate  $h$  et  $k$ , in modo que  $a + h$  es  $u$ , et  $b + k$  es  $v$ , tunc  $f(a + h, b + k)$  es evolubile secundo potestates de  $h$  et de  $k$ , plus termine complementare. Operatione  $(hD_1 + kD_2)^r$  resulta definito per Prop.  $\cdot 5$ , et pote es evoluto ut potestate de binomio.

#### \* 67. DERIVATA DE FUNCTIONE DE NUMERO COMPLEXO.

$$m, n \in \mathbb{N}_1 : u \in \text{Cls}' \text{Cxn} : f \in \text{Cxm F } u : x \in u \wedge \delta u \quad \bigcup. Df x = \\ \wedge (\text{Cxm f Cxn}) \text{lin} \wedge g \beta [\lim] [fy - fx - g(y - x)] / \text{mod}(y - x) | y, u, x \{ = 0 \} \\ \text{Df}$$

Derivata de functione reale de variabile reale (pag. 275), et de numero complexo, vectore, puncto, functione de variabile reale, es, per definitione, limite de ratione de incremento de functione ad incremento de variabile:

$$Df x = \lim (fy - fx) / (y - x).$$

Si nos habe functione reale aut complexo de variabile complexo, non habe sensu ratione de duo numero complexo, et definitione præcedente non es applicabile. Sed pro numeros reale, derivata satisfac conditione:

$$\lim [fy - fx - (y - x) \times Df x] / \text{mod}(y - x) = 0,$$

que nos sume per definitione de derivata, si variabile independente es complexo.

Derivata de  $f$ , numero complexo de ordine  $m$ , functione de complexo de ordine  $n$ , in campo  $u$ , pro valore  $x$  prope  $u$ , es illo transformatio lineare  $g$ , tale que incremento de functio  $fy - fx$  minus  $g$  de incremento de variabile  $y - x$  diviso per  $\text{mod}(y - x)$ , tende ad 0, quando  $y$ , in  $u$ , tende ad  $x$ .

Derivata es trasformatione que habe ut elementos derivatas partiale de coordinatas de functione pro coordinatas de variabile.

Derivata de functione de numero complexo es considerato per:

Jacobi a.1841, opera t.3 p.421. Grassmann a.1862, t. 2, p.295.

Vide in Geometria, derivata de potentiale P71.

## \* 68. Tang (FIGURA TANGENTE).

$$u \in \text{Cls}'p . x \in p \supset.$$

$$\begin{aligned} \cdot 0 \quad \text{Tang}(u, x) &= \text{Lm}\{[x + h(u-x)] \mid h, Q, \infty\} \\ &= \text{Lm}[\text{Homot}(x, h)u \mid h, Q, \infty] \quad \text{Df} \end{aligned}$$

Si  $u$  es figura, et  $x$  puncto, tunc  $\text{Tang}(u, x)$ , lege « figura tangente ad  $u$  in puncto  $x$  », indica limite de figura homothetico de  $u$  cum centro de homothetia in  $x$ , quando ratione de homothetia  $h$  cresce ad infinito.

$$\cdot 1 \quad x \in \text{ex}u \supset. \text{Tang}(u, x) = \Lambda$$

Si  $x$  es puncto externo ad  $u$ , tunc figura tangente ad  $u$  in puncto es classe nullo.

$$\cdot 2 \quad x \in u - \delta u \supset. \text{Tang}(u, x) = \iota x$$

Si  $x$  es puncto isolato de  $u$ , figura tangente contine solo puncto  $x$ .

$$\cdot 3 \quad x \in \delta u \supset. \exists \text{Tang}(u, x)$$

Si  $x$  es puncto prope alios  $u$ , tunc semper existe punctos de figura tangente ad  $u$  in puncto  $x$ .

$$\cdot 4 \quad x \in \text{in}u \supset. \text{Tang}(u, x) = p$$

Si  $x$  es interno ad  $u$ , figura tangente es toto spatio.

$$\cdot 5 \quad y \in \text{Tang}(u, x) = \iota x \supset. x + Q(y-x) \supset \text{Tang}(u, x)$$

Si in figura tangente ad  $u$ , in puncto  $x$ , nos sume aliquo puncto  $y$ , differente de  $x$ , toto radio de origine  $x$ , et que i trans  $y$ , pertine ad figura tangente.

$$\cdot 6 \quad v \in \text{Cls}'p . v \supset u \supset. \text{Tang}(v, x) \supset \text{Tang}(u, x)$$

Si figura  $v$  continere in  $u$ , et figura tangente ad  $v$  in puncto  $x$  continere in figura tangente ad  $u$ .

$$\cdot 7 \quad r \in \text{Cls}'p \supset. \text{Tang}(u \cup v, x) = \text{Tang}(u, x) \cup \text{Tang}(v, x)$$

Operatione « Tang » es distributivo ad «  $\cup$  ».

$$\cdot 8 \quad \text{Tang}[\text{Tang}(u, x), x] = \text{Tang}(u, x)$$

\* 69.  $a, p \in p . r \in Q . d(p, a) = r \supset.$ 

$$\cdot 1 \quad \text{Tang}\{p \wedge x \exists [d(x, a) = r], p\} = \text{plan}[p, I(p-a)]$$

Nos considera loco de punctos que dista ab puncto dato  $a$  per quantitate dato  $r$ , id es superficie de sphæra de centro  $a$  et de radio  $r$ . Tunc figura tangente ad superficie dicto, in suo puncto  $p$ , es plano per puncto  $p$ , et normale ad vectore  $p-a$ .

$$\cdot 2 \quad \text{Tang}\{p \wedge x\exists[d(x,a) \leq r], p\} = \text{plan}[p, I(p-a)] + Q_0(a-p)$$

Figura tangente ad solido sphærico in puncto de superficie es semi-spatio limitato per plano præcedente.

$$\cdot 3 \quad a, x \in p . m, n \in q . mU(x-a) + nU(x-b) = 0' . \supset$$

$$\text{Tang}\{p \wedge y\exists[md(y,a) + nd(y,b) = md(x,a) + nd(x,b)]\} =$$

$$p \wedge z\exists\{z-x\} \times [mU(x-a) + nU(x-b)] = 0'$$

Tangente ad ovals de Descartes.

Descartes, *La Geometrie*, Leyde a. 1637, (Œuvres t. 6, p. 429.

$$\cdot 4 \quad u \in \text{Intv} . p \in (pF'u) \text{cont} . x \in \text{in } u . px = p'(u-x) . Dpx \in v=0$$

$$\supset . \text{Tang}(p'u, px) = \text{recta}T(p, x)$$

Puncto mobile  $p$  es functio definita et continuo in intervallo  $u$ ,  $x$  es interno ad isto intervallo: puncto  $px$  non es multiplo de curva  $p'u$ , et habet derivatam non nullo; tunc figura tangente (Tang) ad curva  $p'u$  es recta tangente (rectaT), ante considerato.

### \* 70. PLANO TANGENTE AD SUPERFICIE.

$$\cdot 1 \quad u, r \in \text{Intv} . p \in pF(u'r) . x \in \text{in } u . y \in \text{in } r . p(x,y) = p'(u'r) = p(x,y) .$$

$$D_1p, D_2p \in [vF(u'r)] \text{cont} . D_1p(x,y) = 0 . D_2p(x,y) = q D_1p(x,y)$$

$$\supset . \text{Tang}[p'(u'r), p(x,y)] = \text{plan}[p(x,y), D_1p(x,y), D_2p(x,y)]$$

Dem. Hp.  $u', r' \in \text{Intv} . u' \supset u . r' \supset r . x \in u' . y \in r' . \supset$

$$a \in \text{Tang}[p'(u'r'), p(x,y)] . = a \in \text{Tang}[p'(u'r'), p(x,y)]$$

$$= \lim \text{dist}[a, p(x,y) + h[p(u',r') - p(x,y)]/h, Q, 0] = 0$$

$$= \lim \text{dist}[a, p(x,y) + h(u'-x) D_1p(u',r') + h(r'-y) D_2p(u',r')] = 0$$

$$= \lim \text{dist}[a, \text{plan}[p(x,y), D_1p(x,y), D_2p(x,y)]] = 0$$

$$= \text{dist}[a, \text{plan}[p(x,y), D_1p(x,y), D_2p(x,y)]] = 0$$

$$= a \in \text{plan}[p(x,y), D_1p(x,y), D_2p(x,y)]$$

Es dato duo intervallo  $u$  et  $r$ , et puncto mobile  $p$ , functione de duo variable, in dicto intervallos. Tunc puncto  $p$  describe « superficie », et duo variable es dicto « coordinatas curvilineo de puncto in superficie ».

Nos sume valore  $x$  interno ad  $u$ , et  $y$  interno ad  $r$ , et suppone que  $p(x,y)$  es puncto simplice de superficie descripto per puncto  $p$ ; tunc si puncto habet derivatas pro ambo variable, continuo, non nullo et non parallelo, figura tangente ad superficie loco de punctos  $p$ , in puncto considerato, es plano per puncto et que contine derivatas de puncto pro ambo variable. Ce plano vocare « plano tangente ».

Si in superficie es descripto curva que habe tangente in suo puncto  $p$ , tunc tangente ad curva jace in plano tangente ad superficie. Seque de Prop. 68-6.

Plure Auctore sume ce proprietate ut definitione. « Plano tangente ad superficie in suo puncto  $p$  » es definitio ut « plano que contine recta tangente in  $p$  ad omni curva, descripto in superficie, et que i trans  $p$  ».

Tunc, si per puncto  $p$ , in superficie dato, nos duce linea sine tangente (ut spira mirabile in suo polo, loxodromia in suos polo, etc.), plano tangente contine tangente ad linea, que non habe tangente; quod es contradictorio.

Aliquo Auctore corrige definitione præcedente, et voca plano tangente « plano que contine tangente ad dicto curvas, que habe tangente ». Tunc omni plano es tangente ad superficie, que contine nullo linea cum tangente. Es tale superficie genito per rotatione de curva  $y = x \sin 1/x$ , circa  $oy$ , in puncto  $o$ .

Vide alio Df de plano tangente in Formul. t.4 p.295.

$$\begin{aligned} & 2 \quad k \in \text{Intv} . a \in pFk . u \in (v=0)Fk . x \in k . y \in q . Dax, Dur \in v . \\ Dax + yDur &= \varepsilon q ux \cdot \supset . \text{Tang}[\bigcup \text{recta}(ax, ux) | x'k, ax + yux] \\ &= \text{plan}(ax, ux, Dax + yDur) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Dem.} \quad & \text{plan}[\bigcup \text{recta}(ax, ux) | x'k, ax + yux] \\ &= \text{plan}[(ax + yux) | (x, y)'(k, q), ax + yux] \\ &= \text{plan}[ax + yux, D_1[(ax + yux)(x, y) | x, y], D_2[(ax + yux)(x, y) | (x, y)]] \\ &= \text{plan}(ax + yux, Dax + yDur, ux) \\ &= \text{plan}(ax, ux, Dax + yDur) \end{aligned}$$

Nos considera puncto  $a$  et vectore non nullo  $u$ , ambo functione dato in intervallo  $k$ .

Es dato  $x$  in intervallo  $k$ , et quantitate reale  $y$ . Nos suppose existentia de derivatas de  $a$  et de  $u$ , et que vectore  $Dax + yDur$  non es parallelo ad  $ux$ . Superficie loco de rectas per  $ax$  et parallelo ad  $ux$ , ubi  $x$  varia in intervallo  $k$ , es expresso per  $\bigcup \text{recta}(ax, ux) | x'k$ .

Theorema dice que figura tangente ad ce superficie in suo puncto  $ax + yux$  es plano per  $ax$ , et parallelo ad vectores  $ux$  et  $Dax + yDur$ .

Superficie loco de recta mobile = F. surface réglée = D. Regelfläche  
= I. superficie rigata.

F. règle = || D. Regel  $\subset$  I. regula.

I. riga  $\subset$  Germanico: riga  $\supset$  D. Reihe, A. row.

Ce superficie habe in Germania nomen Latino, et in Italia nomen Germanico.



## \* 71.

## DERIVATA DE POTENTIALE.

$$u \in \mathcal{F}p . x \in \mathcal{D} . Dux = \\ \lim_{v \rightarrow x} \{ [uy - ux - v \times (y - x)] / \text{mod}(y - x) \mid y, p, x \} = 0 \quad \text{Df}$$

Quantitate reale functione de positione de puncto in spatio vocare « potentiale », nam uno suo interpretatione es « potentiale » de Mechanica.

Si  $u$  es potentiale, et  $x$  es puncto, tunc  $Dux$ , lege « derivata de functione  $u$  in puncto  $x$  », indica illo vectore  $v$  tale que differentia  $uy - ux$  de duo valore de functione, minus producto interno de vectore  $v$  per vectore  $y - x$  differentia de duo positione de puncto, diviso per  $\text{mod}(y - x)$ , tende ad 0, quando puncto  $y$ , in spatio, verge ad  $x$ .

Ce definitione es analogo ad definitione de derivata de functione de numero complexo, dato in P67·0. Derivata  $g$  de P67·0 responde ad  $v \times$  de præsente definitione.

Lamé (JdM. a.1840 t.5 p.316) voca « parametro differentiale de primo ordine de functio  $u$  in puncto  $x$  » valore absoluto de  $Dux$ .

Hamilton considera illo ut vectore, quem indica per  $p$ , et voca Nabla. Vide IrishT. t. 3, Quaternions t. 2, p. 432.

**Nabla**, ג רבליא  $\subset$  Hebraico; instrumento musico, in forma de  $p$ .

Idem vectore in plure libro (Gans) vocare « gradiente ».

$Du$  es « vi respondente ad Functio de vi  $u$  (Hamilton), vel ad potentiale  $-u$  », et « fluxu de calore pro temperatura  $-u$  ».

« Potentiale » es considerato per Laplace. Green a.1828 introduce vocabulo.

$$1 \quad u, x \in \mathcal{F}p . i \in \mathcal{V} . \mathcal{D} . D[i \times (x - a) \mid x, p]x = i \\ \text{Dem.} \quad y \in \mathcal{F}p . \mathcal{D} . i \times (y - a) - i \times (x - a) = i \times (y - x) . \mathcal{D} . P$$

$$2 \quad u, x \in \mathcal{F}p . \mathcal{D} . D[(x - a)^2 \mid x, p]x = 2(x - a) \\ \text{Dem.} \quad (y - a)^2 - (x - a)^2 = (y - x)^2 + 2(x - a) \times (y - x) . \mathcal{D} . \\ [(y - a)^2 - (x - a)^2 - 2(x - a) \times (y - x)] / \text{mod}(y - x) = (y - x) \times U(y - x) . \mathcal{D} \\ \lim [(y - a)^2 - (x - a)^2 - 2(x - a) \times (y - x)] / \text{mod}(y - x) \mid y, p, x = 0$$

$$3 \quad a \in \mathcal{F}p . x \in \mathcal{F}p - a . \mathcal{D} . D[d(x, a) \mid x, p]x = U(x - a) \\ \text{Dem.} \quad D[d(x, a) \mid x, p]x = D[\text{mod}(x - a) \mid x, p]x = D[\sqrt{(x - a)^2} \mid x, p]x = \\ 2(x - a) / [2\sqrt{(x - a)^2}] = (x - a) / \text{mod}(x - a) = U(x - a) ]$$

Derivata de distantia de puncto mobile  $x$  ad puncto  $a$ , si  $x$  es differente de  $a$ , vale vectore unitario de  $a$  ad  $x$ .

$$\cdot 4 \quad a \in p \cup p' . x \in p = a . \supset . D[d(x, a) | x, p]x = U[x - (\text{proj } a)x]$$

Si  $a$  indica recta vel plano, et  $x$  es puncto ex  $a$ , tunc derivata de distantia de  $x$  ad figura  $a$  es vectore unitario secundo projectione super  $a$  de  $x$  ad  $x$ .

$$\cdot 5 \quad k \in \text{Cls}'p . k = \lambda k' . x \in p = k . a \in k . d(x, a) = d(x, k) : y \in k = a . \supset y . d(x, a) < d(x, y) : \supset . D[d(x, k) | x, p]x = U(x - a)$$

Derivata de distantia de puncto  $x$  ab figura  $k$  es vectore unitario in directione de distantia, in hypothesis scripto.

$$\cdot 6 \quad a \in p . i \in v = 0 . x \in p = (a + qi) . \supset . D[\text{ang}(x - a, i) | x, p]x = U\{\text{cmp } \perp (x - a) | i\} / d(x, a)$$

## \* 72.

$$\cdot 1 \quad u \in \text{qFp} . x \in p . ux = \max u'p . Dux \in v . \supset . Dux = 0$$

$$\cdot 11 \quad (\min | \max) P \cdot 1$$

Si potentiale  $u$  es maximo pro aliquo puncto  $x$ , pro quo existe derivata de  $u$ , tunc ce vectore derivata vale 0.

Idem pro minimo.

$$\cdot 2 \quad u \in \text{qFp} . k \in \text{Cls}'p . x \in k . ux = \min u'k . Dux \in v . y \in \text{Tang}(k, x) . \supset . (Dux) \times (y - x) \geq 0$$

Si nos considera solo punctos de aliquo figura  $k$ , et si potentiale sume pro puncto  $x$ , valore minimo inter valores respondente ad punctos de figura  $k$ , et derivata de  $u$  in  $x$  es vectore determinato, tunc producto de ce vectore per omni variatione  $y - x$  de puncto in figura tangente ad  $k$  in  $x$ , es positivo aut nullo.

$$\cdot 3 \quad u \in \text{qFp} . k \in \text{Cls}'p . x \in k . ux = \max u'k . Dux \in v . y \in \text{Tang}(k, x) . \supset . (Dux) \times (y - x) \leq 0$$

Regula simile subsiste pro maximo.

$$\cdot 4 \quad u \in \text{qFp} . x \in p . Dux \in v = 0 . \supset . \text{Tang}[p \cap y \mathcal{E}(uy = ux), x] = \text{plan}(x, IDux)$$

Figura loco de punctos  $y$ , que satisfac conditione  $uy = ux$ , vocare «superficie æquipotentiale» que i trans  $x$ .

Si nos considera solo punctos in plano dato, in loco de superficie, occurre « linea æquipotentiale ».

Si derivata de potentiale  $u$ , in puncto  $x$ , es vectore non nullo, tunc figura tangente ad superficie æquipotentiale que transi per  $x$ , es plano per  $x$ , et normale ad vectore  $Du.x$ . Id es,  $Du.x$  es vectore « normale » ad superficie æquipotentiale.

*Applications.*

1. Normale ad loco de punctos  $x$  que redde constante  $d(x,a)+d(x,b)$ , ubi  $a$  et  $b$  es puncto dato (ellipsi de foco  $a$  et  $b$ ), es directo secundo  $U(x-a)+U(x-b)$ , vel secundo bisectrice de radios focale. (Apollonio).

2. Si es constante summa de distantias de  $x$  ad plure puncto fixo  $a_1, \dots$  normale es directo secundo vectore  $U(x-a_1)+\dots$

(Leibniz, Math.S a.1693 t.6 p.233).

3. Si es constante functione  $f(r_1, r_2)$ , ubi  $r_1 = d(x, a_1)$ ,  $r_2 = d(x, a_2)$ , vectore  $D_1 f(r_1, r_2) U(x-a_1) + D_2 f(r_1, r_2) U(x-a_2)$  es normale ad loco.

(Poincot a.1806, p.206).

4. Puncto que redde minimo summa de distantias ab plure puncto dato es in æquilibrio sub actione de fortias æquale inter se, et directo ad punctos dato. (Steiner t. 2, p.95).

Vide demonstratione et alio applicationes de propositiones præcedente in meo libro a. 1887, p.131-151.

Vide etiam Hurwitz MA. t. 22, p.231, Wetzig JfM. t. 62, p. 346, Baker AmerJ. t. 4 p.327, Sturm JfM. t. 96 p.36, t. 97 p.49.

\* 73. RELATIONE INTER POTENTIALE ET ENERGIA.


$u \in qFp . p \in pFq . D^2 p = -Dup \supset \{[(Dpt)^2/2 + up] | t, q\} \in \text{const}$   
Dem.  $D[(Dp)^2/2 + up] = Dp \times D^2 p + Dup \times Dp = Dp \times (D^2 p + Dup) = 0$

Si  $u$  es quantitate functione de positione de puncto, vel potentiale, et si  $p$  es puncto mobile, vel puncto materiale cum massa 1, et si acceleratione de puncto vale vi respondente ad potentiale  $u$ , tunc summa de energia cum potentiale, dum varia tempore, es constante.

\*1  $u \in qFp . p \in pFq . (D^2 p + Dup) \times Dp = (u;q) \supset$  Ths

Idem fi, si puncto  $p$  move se, in modo que suo velocitate es semper normale ad  $D^2 p + Dup$ , id es si vi  $D^2 p$  que move illo es summa de  $-Du$ , vi de potentiale  $u$ , plus vi normale ad trajectory de puncto. Ce casu se præsentat, si puncto es mobile super linea dato, aut super superficie dato, sine attrito.

VII  
CALCULO INTEGRALE



## VII. CALCULO INTEGRALE.

Primo idea de integrale se præsenta ad mathematicos in mensura de area et de volumen.

Si nos nosce area de polygonos, et si nos habe, in dato plano, figura (non polygonale), tunc nos voca « polygono circumscripto » polygono que contine in suo interno figura dato; et « polygono inscripto », polygono interno ad figura dato. Ce vocabulos habe valore etymologico, et non ut in Geometria elementare.

Limite infero de areas de polygonos circumscripto vocare « area supero de figura ». Limite supero de polygonos inscripto vocare « area infero ». Si area supero æqua infero, valore commune de duo area vocare « area de figura dato ».

Nos exprime per symbolos de Analysi ideas præcedente, et nos habe definitione de integrale.

\* 1.  $s' = \text{POLYGONO CIRCUMSCRIPTO.}$

$u \in \text{Intv. } f \in \text{qf}u. l'f'u, l'f'u \in \text{q. } \supset:$

Nos suppose:  $u$  es intervallo;  $f$  indica quantitate functione in intervallo  $u$ ; limite supero et limite infero de valores de  $f$  in  $u$  es quantitate finito.

$$s'(f, u) = (\text{Long}u) (l'f'u)$$

Df  $s'$

$s'(f, u)$ , que nos lege « rectangulo circumscripto ad figura diagramma de functione  $f$ , super basi  $u$  », indica producto de amplitudo de intervallo  $u$  per limite supero de valores de  $f$  in  $u$ .

\*1  $h \in \text{Cls}'u . l'u, l'u \varepsilon h . \text{Num}h \in N_1 . \supset$

$$s'(f, u, h) = \sum \{ s' \{ f, (\min_r h) \neg (\min_{r+1} h) \} \mid r, 1 \cdots (\text{Num}h - 1) \} \quad \text{Df}$$

Si  $h$  es classe de numeros in intervallo  $u$ , continente  $l'u$   $l'u$  extremos de  $u$ , et in numero finito, tunc  $s'(f, u, h)$ , lege « polygono circumscripto ad figura  $f$ , super basi  $u$  diviso in partes per valores  $h$  », indica summa de rectangulos  $s'(f, x \neg y)$ , ubi  $x$  es uno ex numeros  $h$ , et  $y$  es numero successivo.

$\min_r h$  « minimo de loco  $r$  de  $h$  » indica elemento que habe loco  $r$  in classe  $h$  de numeros, disposito in ordine crescente, et es definitio in pag. 120.

\*2  $h \in \text{Cls}'u . \text{Num}h \in N_0 . \supset . s'(f, u, h) = s'(f, u, h \cup l'u \cup l'u) \quad \text{Df}$

Si  $h$  non contine extremos de intervallo  $u$ , adde illos.

\* 2.  $s_i = \text{POLYGONO INSCRIPTO.}$

$u \in \text{Intv} . f \varepsilon \text{qf}u . l'f'u, l'f'u \varepsilon q . \supset$

$$(s, l) \mid (s', l') \text{ P1.0.1.2}$$

$s(f, u, h)$ , lege « polygono inscripto in figura  $f$ , super basi  $u$ , diviso per  $h$  », es definitio ut  $s'$ , mutato limite supero in infero

\*1  $h \in \text{Cls}'u . \text{Num}h \in N_0 . \supset$

$$s'(f, u) \leq s'(f, u, h) \leq s(f, u, h) \leq s(f, u)$$

Rectangulo circumscripto super basi  $u$  supera polygono circumscripto super basi diviso per  $h$ , que supera polygono inscripto, que supera rectangulo inscripto; æqualitate es incluso  
Dem.  $x, y \varepsilon h . \supset . l'f'u \leq l'f'x \neg y \leq l, f'x \neg y \leq l, f'u$

\*2  $h, k \in \text{Cls}'u . \text{Num}h, \text{Num}k \in N_0 . \supset$

$$s'(f, u, h) \leq s'(f, u, h \cup k) \leq s(f, u, h \cup k) \leq s(f, u, k)$$

[ P.1  $\supset$  P ]

Si  $h$  et  $k$  es duo divisione de intervallo  $u$ , in numero finito, tunc polygono circumscripto pro divisione  $h$  supera aut æqua polygono circumscripto pro divisione  $h \cup k$ , que es subdivisione de divisione  $h$ . Ita polygono inscripto pro subdivisione  $h \cup k$  de divisione  $k$  supera polygono inscripto pro divisione  $k$ .

\* 3.  $S' = \text{INTEGRALE SUPERO.}$   
 $S_1 = \text{INTEGRALE INFERO.}$

$u \in \text{Intv} . f \in \text{qfu} . l'f'u, l_f'u \in \text{q} . \supset:$

·0  $S'(f, u) = l_1[s'(f, u, h) | h \in \text{Cls}'u \wedge h \in (\text{Num}h \in N_0)]$

Df  $S'$

·1  $S_1(f, u) = l_1[s_1, \text{-----}]$

Df  $S_1$

Si  $u$  et  $f$  habe sensu ut in P1, tunc  $S'(f, u)$ , lege « integrale supero de functione  $f$ , in intervallo  $u$  », indica limite infero de valores que sume  $s'(f, u, h)$ , polygono circumscripto, ubi  $h$  indica omni divisione de  $u$ , in numero finito de partes.

$S_1(f, u)$ , « integrale infero », es limite supero de polygonos inscripto.

·2  $S'(f, u), S_1(f, u) \in \text{q} . S'(f, u) \leq S_1(f, u)$

Dem. Df  $S', S_1$  . p.116 §§ P10-1 .  $\supset$ . P

Integrale supero et integrale infero habe valore determinato et finito; integrale supero es majore aut æquale ad integrale infero.

\* 4.  $S = \text{INTEGRALE.}$

$u \in \text{Intv} . f \in \text{qfu} . l'f'u, l_f'u \in \text{q} . \supset:$

·0  $S(f, u) = l_1[lS'(f, u) \wedge lS_1(f, u)]$

Df  $S$

Si functione  $f$ , dato in intervallo  $u$ , habe limite supero et infero de suo valores finito, tunc  $S(f, u)$ , lege « integrale de  $f$ , in intervallo  $u$  », indica valore commune de integrale supero et de integrale infero.

Ergo  $S(f, u)$  habe sensu, si integrale supero et infero coincide secundo Df de 1, pag. 13. Propositione  $S(f, u) \in \text{q}$  « integrale es quantitate » vel « existe in campo de quantitates », es sæpe indicato per « integrale existe », vel « functione es integrabile in intervallo  $u$  ». Vocabulo « existe » in tale expressione, et in similes, ut « limite existe », « derivata existe », habe valore de symbolo  $\varepsilon$ , diverso de  $\eta$ , que præcede semper nomen de classe.



$$\cdot 1 \quad S(f, u) \varepsilon q \quad . = . \quad S'(f, u) = S(f, u)$$

$$\cdot 2 \quad \text{-----} \cdot \supset . \text{-----} = S(f, u)$$

Ut functione  $f$  es integrabile in intervallo  $u$ , es necesse et suffice que integrale supero æqua integrale infero.

Valore commune de illos es valore de integrale.

$$\cdot 3 \quad S(f, u) \varepsilon q \quad . = : m \varepsilon Q . \supset_m . \mathcal{U} h \exists [h \varepsilon \text{Cls}'u . \text{Num} h \varepsilon N_0 . \\ s'(f, u, h) - s(f, u, h) < m]$$

Dem. P.1 . Def S' S,  $\supset$  P

Ut integrale de functione  $f$  in campo  $u$  existe, es necesse et suffice que, pro omni quantitate positivo (parvo ad arbitrio)  $m$ , responde divisione  $h$  de intervallo  $u$ , in numero finito, ita ut differentia inter polygono circumscripto et polygono inscripto es minore de  $m$ .

Æquivalere ad conditione præcedente, post substitutione de integrales supero et infero per definitiones.

$$\cdot 4 \quad S(f, u) = \eta \exists \{ h \varepsilon \text{Cls}'u . \text{Num} h \varepsilon N_1 . \downarrow u, l'u \varepsilon h . \supset h . y \varepsilon \\ \Sigma [(\min_{r+1} h - \min_r h) \text{Med} f'(\min_r h \text{---} \min_{r+1} h) | r, 1 \cdots (\text{Num} h - 1)] \} \quad \text{Dfp}$$

Definitione possibile de integrale, independente de  $S'$  et  $S$ .

Si nos divide intervallo in partes, et multiplica amplitudo de intervallos partiale per valores medio de functione in illos, et summa ce productos, nos habere classe de quantitates, que contine integrale; et integrale es solo numero que habere ce proprietate, pro omni divisione de intervallo.

#### Historia.

Integrale, sub nomen de area et de volumen, occurre in Enclide et in Archimede. Vide Prop. 16.

Kepler a.1605, Cavalieri a.1639, Wallis a.1655 considera integrale ut «summa valores de functione».

Leibniz (A. Erud. a.1686) in loco de «summa» introduce  $f$ , suo initiale sub forma typographico de illo tempore.

Jac. Bernoulli, A.Erud. a.1690. voca illo «integrale» nomen hodie commune inter nationes:

**integrale**, A.D.H. integral, F. intégrale, I. integrale, R. integral'.

$\subset$  integra + -le (p. 19 N. 6).

**integra** = fac integrale. A. integra-te, D. integr-ieren, F. intégre-r,

I. integra-re, H. -r, R. integr-ir-ovatı.  $\supset$  A.D.F. integra-tion.

$\subset$  integro (p. 157 N. 240) - -o + -a (p.18 N.4).

Cauchy a.1823, Œuvres s.2 t.4 p.122, defini integrale ut limite, per P5.2.

Darboux a. 1875 (vide Prop. 5, et in idem anno Ascoli et Thomæ) considera  $S'$   $S$ , ut limite de summas  $s'$   $s$ .

Substitutione de limite supero de classe (1') ad limite de functione (lim) reduce definitiones ad forma præcedente simplicissimo, sed paucio noto. Vide meo scripto *Sulla definizione di integrale*, Annali di Matem. a.1895.

« Integrale de functione  $f$  in in intervallo de  $a$  ad  $b$  » es indicato in generale per  $\int_a^b f(x)dx$ .

Parenthesi circa  $x$  in  $f(x)$  es inutile, ut es dicto in pag. 74, et produce confusione cum usu de parenthesi commune in Arithmetica et in Algebra.

Ergo integrale pote es scripto  $\int_a^b f x dx$ .

Signo  $dx$  indica que variable de integratione es  $x$ . Ergo signo «  $d$  » habe in integrales, valore de signo de variabilitate «  $|$  » (pag. 77), que jam occurre in  $\Sigma$  (pag. 120),  $\Pi$ ,  $D$ ,... Tunc integrale sume forma  $\int_a^b f x | x$ .

Nunc  $f x x = f$ , ut resulta de definitione, pag. 77. Ergo integrale sume forma  $\int_a^b f$ ; et si nos scribe literas variable super uno linea,  $\int(f, a, b)$ .

Integrale, ut es definitio, depende de functione  $f$ , et de campo de integratione  $u$ . Si campo es intervallo de  $a$  ad  $b$ , tunc es functione symmetrico de extremos:  $a^-b = b^-a$  (vide pag. 118). Sed campo  $u$  pote es campo arbitrario.

Ergo, si nos scribe elementos que occurre in integrale, resulta notatione  $S(f, u)$ , que nos adopta.

Signo «  $d$  » in commune notatione habe officio de signo «  $'$  »; illo vocare « differentiale », et in suo definitione Auctores non es concorde. Secundo Leibniz (vide pag. 277),  $dx$  es quantitate arbitrario, et lice pone  $dx = 1$ . Plure Auctore dice que  $dx$  es « infinitesimo », id es « quantitate variable que verge ad 0 ». Sed omni quantitate indicato per litera  $x$  es constante in idem formula, et variable cum formula; distinctione de quantitates in constante et variable care sensu. Alio Auctore dice que  $dx$  es « infinitesimo constante »; et discussione cum methodo de Metaphysica super infinitesimo produce multo obscuritate. Vide discussiones in Mem. Bologna a. 1895 p. 303, in Bulletin de l'Académie de Belgique a. 1901 p. 549-589, et plure alio. Substitutione de signo  $d$  per «  $|$  » elimina omni ambiguitate.

Vide *Encyclopædie* t. 2 p. 69.

✿ 5.1  $u \in \text{Intv} . f \in \text{qfu} . l'f'u, l f'u \in \text{q} . m \in \text{Q} . \supset$

$\exists \text{Q} n \exists [h \in \text{Cls}'u . \text{Num} h \in \mathbb{N}_0 . l'u, l u \in h : r \in 1 \cdots (\text{Num} h - 1) . \supset$

$\min_{r+1} h - \min_r h < n : \supset h . s'(f, u, h) - S'(f, u) < n]$

} DARBOUX a.1875 p.66 }

$S(f, u)$ , que nos defini ut limite infero de valores de  $s'(f, u, h)$ , es etiam limite de  $s'(f, u, h)$ , quando varia lege de divisione  $h$ , in modo que maximo amplitudo de intervallos partiale verge ad 0. Ce limite non es «lim» de successione, definitio in p.214; et non es limite de uno vel plure variabile continuo, considerato in p.230 et sequentes. Nam lege de divisione  $h$  depende de punctos de divisione, et  $\text{Num}h$  cresce sine limite, quando amplitudo de omni intervallo verge ad 0. Ergo vocabulo «limite» habe novo valore. Nos elimina suo definitione, cum enuntiatio sequente de theorema de Darboux:

«Si  $f$  es functione reale dato in intervallo  $u$ , limitato supra et infra, tunc, si nos fixa quantitate positivo  $m$  (parvo ad arbitrio), semper existe alio quantitate positivo  $n$ , ita ut, pro omni divisione  $h$  de intervallo  $u$ , in numero finito de partes, si amplitudo de omni parte es minore de  $n$ , tunc differentia inter  $s'$  respondente ad divisione  $h$ , et integrale supero, semper es minore de  $m$ ».

Idea «limite» pote etiam reducto ad limite de successione, per §lim P42.7 (p.233). Ut casu particulare, si nos divide intervallo in  $n$  partes aequale, tunc:

$$\cdot 2 \quad \text{Hp } 1 . a = l'u . b = l'u . \supset . S'(f, a \text{---} b) = \lim s'[f, a \text{---} b, a + (0 \cdots n)(b-a)/n] | n \quad \text{Dfp}$$

$$\cdot 3 \quad \text{Hp } 2 . S(f, a \text{---} b) \varepsilon q . \supset . S(f, a \text{---} b) = (b-a) \lim \Sigma |f[a + r(b-a)/n] | r, 0 \cdots (n-1) \{ / n \} | n$$

Integrale, si existe, diviso per longore de intervallo, es limite de valore medio arithmetico inter  $n$  valore de functione, respondentes ad valores de variabile in progressionem arithmetico. Plure auctore voca isto limite «valore medio de functione».

## \* 6. DECOMPOSITIONE DE INTERVALLO BASI.

$$a, b \varepsilon q . a < b . f \varepsilon q f a \text{---} b . l'f a \text{---} b, l'f a \text{---} b \varepsilon q . c \varepsilon a \text{---} b . \supset :$$

$$\cdot 0 \quad S'(f, a \text{---} b) = S'(f, a \text{---} c) + S'(f, c \text{---} b)$$

$a$  et  $b$  es quantitate,  $a$  es minore de  $b$ ;  $f$  es quantitate functione dato in intervallo ab  $a$  ad  $b$ , et habe limite supero et infero de suo valores, ambo finito; et  $c$  es valore interno ad intervallo ab  $a$  ad  $b$ . Tunc integrale supero de  $f$ , ab  $a$  ad  $b$ , vale integrale supero de  $f$  ab  $a$  ad  $c$ , plus integrale supero de  $f$  ab  $c$  ad  $b$ .

Dem.  $h \in \text{Cls}' a \neg b$ .  $\text{Num} h \in N_0$ .  $ch \supset$ .

$$s'(f, a \neg b, h) = s'(f, a \neg c, hca \neg c) + s'(f, c \neg b, hca \neg b).$$

Oper 1,  $\supset$ . P

In vero, nos sume divisione  $h$  de intervallo totale, in numero finito, que contine puncto  $c$ . Tunc polygono circumscripto, super basi ab  $a$  ad  $b$ , diviso per  $h$ , vale polygono super basi  $a \neg c$ , plus polygono super basi  $c \neg b$ , diviso per punctos de  $h$  pertinente ad duo intervallo partiale.

Nos opera per limite infero, et seque theorema.

$$\cdot 1 \quad (S_i | S') \text{ P} \cdot 0$$

Ita pro integrale infero.

$$\cdot 2 \quad S(f, a \neg b) \text{ eq } \supset S(f, a \neg c), S(f, c \neg b) \text{ eq}$$

$$\cdot 3 \quad S(f, a \neg b) \text{ eq } \supset S(f, a \neg b) = S(f, a \neg c) + S(f, c \neg b) \quad [ \text{P} \cdot 0 \cdot 1 \supset \text{P} ]$$

Si functione  $f$  es integrabile in intervallo ab  $a$  ad  $b$ , tunc es integrabile in ambo intervallo ab  $a$  ad  $c$  et ab  $c$  ad  $b$ ; et vice-versa. Et integrale ab  $a$  ad  $b$  vale integrale ab  $a$  ad  $c$ , plus integrale ab  $c$  ad  $b$ .

## \* 7. INTEGRALE DE SUMMA.

$u \in \text{Intv}$ .  $f, g \in \text{qfu}$ .  $l'f'u, l'f'u, l'g'u, l'g'u \text{ eq } \supset$ :

$$\cdot 0 \quad S'[(fx+gx)|x, u] \leq S'(f, u) + S'(g, u) \quad .$$

$$S_i \text{-----} \leq S_i \text{-----} S_i \text{-----}$$

Si in intervallo  $u$  es dato duo functione  $f$  et  $g$ , ambo limitato supra et infra, tunc integrale supero de summa  $fx + gx$ , ubi varia  $x$  in  $u$ , es minore aut æquale ad summa de integrales.

Dem.  $a, b \in u \supset (fx+gx)|x'a \neg b \supset f'a \neg b + g'a \neg b \supset$ .

$$l'(fx+gx)|x'a \neg b \leq l'f'a \neg b + l'g'a \neg b \supset \text{P}$$

$$\cdot 1 \quad S(f, u), S(g, u) \text{ eq } \supset S[(fx+gx)|x, u] = S(f, u) + S(g, u) \quad [ \text{P} \cdot 0 \supset \text{P} ]$$

Si ambo functione es integrabile, tunc integrale de summa vale summa de integrales.

Si uno solo termine es integrabile, tunc:

$$\cdot 2 \quad S(f, u) \text{ eq } \supset S'[(fx+gx)|x, u] = S(f, u) + S'(g, u) \quad .$$

$$S_i \text{-----} = S(f, u) + S_i(g, u)$$

$$\cdot 3 \quad m \in \mathbb{Q} \supset S'(mf, u) = mS'(f, u) \quad . \quad S_1(mf, u) = mS_1(f, u)$$

Lice commuta integrale supero et infero cum factore positivo.

$$\cdot 4 \quad S'(-f, u) = -S'(f, u)$$

Si nos muta signo ad functione, integrale supero fit infero.

$$\cdot 5 \quad S(f, u) \in \mathbb{Q} \cdot m \in \mathbb{Q} \supset S(mf, u) = mS(f, u)$$

Lice transporta factore constante ex signo integrale.

$$\cdot 6 \quad S(f, a \overline{b}) = (b-a) S[f \mid a+(b-a)z] \mid z, \Theta$$

$$\cdot 7 \quad S(f, a \overline{b}) = S[f(-x) \mid x, -b \overline{-a}]$$

\* 8. cres S

$$\cdot 1 \quad u \in \text{Intv} \cdot f \in (qfu)_{\text{cres}_0} \supset S(f, u) \in \mathbb{Q}$$

Omni functione reale, crescente dum varia, es integrabile.

Dem.  $a=1, u \cdot b=1'u \cdot n \in \mathbb{N}_1 \supset$

$$s, [f, a \overline{b}, a+(b-a)(0 \cdots n)/n] = (b-a) \Sigma; f[a+r(b-a)/n] \cdot r, 0 \cdots (n-1)/n$$

$$s' [ \quad \quad \quad ] = (b-a) \Sigma; \quad \quad \quad , 1 \cdots n/n$$

$$s' ( \quad \quad \quad ) = (b-a) (fb-fa)/n \quad (1)$$

$$(1) \supset 1, [(b-a)(fb-fa)/n] \cdot n \cdot \mathbb{N}_1 = 0 \quad (2)$$

$$(2) \supset S'(f, a \overline{b}) = S_1(f, a \overline{b}) \supset P$$

Si functione es crescente ( $\text{cres}_0$ ), rectangulo inscripto  $s(f, u)$ , ubi  $u$  es intervallo dato, vel suo parte, habe altore aequale ad primo valore de functione; et rectangulo circumscripto  $s'(f, u)$  habe altore aequale ad ultimo.

Nos divide intervallo dato  $a \overline{b}$  in  $n$  partes aequale, cum valore  $a+(b-a) \times (0 \cdots n)/n$ . Tunc polygono circumscripto minus polygono inscripto vale differentia de valores extremo de functione multiplicato per long-ore de intervallo partiale  $(b-a)/n$ .

Limite infero de differentia  $s'-s$ , ubi varia  $n$ , es zero.

Ergo integrale supero aequa integrale infero, et functione es integrabile.

$$\cdot 2 \quad u \in \text{Intv} \cdot f \in (qfu)_{\text{decr}_0} \supset S(f, u) \in \mathbb{Q}$$

Idem pro functione decrescente. Ergo si functione es tale que intervallo de integration pote es diviso in partes in numero finito, ita ut in omni parte functione es monotono, id es vel crescente vel decrescente, tunc functione es integrabile.

\* 9.

cont S

$$\begin{aligned}
 & u \in \text{Intv} . f \in (\text{qfu})\text{cont} \supset S(f, u) \in \text{q} \\
 \text{Dem.} \quad & \S \text{cont P1.3 (pag. 239)} . h \in \text{Q} \supset \exists N_1 \wedge n \geq [r \in 0 \cdots (n-1)] \supset_r \\
 & |f'[a+(r+\theta)(b-a)/n] - f'[a+(r+\theta)(b-a)/n]| < h \supset \\
 & \exists N_1 \wedge n \geq |s'[f, a \bar{b}, a+(0 \cdots n)(b-a)/n] - s, [\dots]| < (b-a)h : \\
 (1) \supset & S'(f, a \bar{b}) - S(f, a \bar{b}) = 0 \supset P
 \end{aligned}
 \tag{1}$$

Omni functione continuo es integrabile.

In vero, pro theorema de continuitate æquabile, dato numero positivo  $h$  (parvo ad arbitrio), nos pote divide intervallo  $a \bar{b}$  in numero satis magno  $n$  de partes æquale, ut differentia inter limite supero et limite infero de valores de functione (vel suo oscillatione) in omni intervallo partiale, es minore que  $h$ . Tunc differentia inter polygonos circumscripto et inscripto  $s'$  et  $s$ , es minore de  $(b-a)h$ , quantitate parvo ad arbitrio. Seque æqualitate de integrales supero et infero.

\* 10.

THEOREMA DE VALORE MEDIO.

$$\begin{aligned}
 & u \in \text{Intv} . f \in \text{qfu} . l'f'u, lf'u \in \text{q} \supset \\
 & 0 \leq S(f, u) \in \text{q} \supset S(f, u) \in (\text{Long}u) \times \text{Med}f'u
 \end{aligned}$$

Integrale vale longore de intervallo multiplicato per valore medio inter valores de functione.

$$\begin{aligned}
 & 1 \quad g \in \text{Qfu} . l'g'u \in \text{q} . S(g, u) \in \text{Q} \supset \\
 & l'f'u \times S(g, u) \leq S'(fx \times gx | x, u) \leq S(fx \times gx | x, u) \leq lf'u \times S(g, u) \\
 \text{Dem.} \quad & x \in u \supset l'f'u \leq fx \leq lf'u . (l'f'u)gx \leq fx \times gx \leq (lf'u) \times gx
 \end{aligned}$$

Si in intervallo  $u$  es dato alio functione  $g$  positivo limitato et integrabile, tunc integrale supero, et integrale infero de producto  $fx \times gx$ , ubi varia  $x$ , in  $u$ , vale integrale de  $g$  per valore medio inter valores de  $f$ .

Es vocato « theorema de valore medio de integrale ».

Cauchy, a.1823 s.2 t.4 p.138, et Dirichlet, a.1837 t.1 p.138, enuntia illo pro functio continuo.

Vide MA. a.1874 t.7 p.605, JdM. a.1874 s.2 t.3 p.293, et Pringsheim MünchenA. a.1900 p.209.



Ergo omni functione continuo es derivata de alio functione, id es de suo integrale ab limite fixo ad limite variabile.

Plure Auctore voca « integrale indefinito » integrale de functione ab limite fixo ad limite variabile.

2.  $u \in \text{Intv} . f, Df \in (\text{qfu})\text{cont} . a, b \in u . \supset . S(Df; a, b) = A(f; a, b)$

Dem.  $x \in u . P.1 . \supset . D[S(Df; a, x); z, u]x = Dfx . \supset . S(Df; a, x) = fx - fa$

Si in intervallo  $u$  es dato functione  $f$  cum derivata continuo, et duo valore  $a$  et  $b$ , tunc integrale de derivata de  $f$  ab  $a$  ad  $b$  vale incremento de functione.

Ce theorema da importante regula sequente, pro calculo de  $S(f; a, b)$ . Quære functione  $g$ , tale que  $Dg = f$ . Tunc integrale vale  $gb - ga$ . Determinatione de functione  $g$  pote es facile, aut minus secundo natura de functione  $f$ .

\* 13.1  $a, b \in q . a < b . f, Df \in \text{qFa} \neg b . !Df^+ a \neg b, !Df^- a \neg b \in q . \supset . S(Df, a \neg b) \leq fb - fa \leq S'(Df, a \neg b)$

Si functione  $f$  habe derivata in intervallo de  $a$  ad  $b$ , et systema de valores de derivata es finito, tunc incremento de functione es inter integrale infero et integrale supero de derivata.

Dem.

$x, y \in a \neg b . \S D P.22 . \supset . (y - x) !Df^+ x \neg y \leq fy - fx \leq (y - x) !Df^- x \neg y$   
 $h \in \text{Cls}' a \neg b . \text{Num} h \in N_0 . \supset . s_1(Df, a \neg b, h) \leq fb - fa \leq s_1'(Df, a \neg b, h)$

2. Hp.1 .  $S(Df, a \neg b) \in q . \supset . S(Df, a \neg b) = fb - fa$   
 $[P.1 \supset P]$

Si derivata de  $f$  es integrabile, tunc integrale de derivata vale incremento de functione.

#### \* 14. INTEGRATIONE PER PARTES.

$a, b \in q . f, g, Df, Dg \in (\text{q F a} \neg b)\text{cont} . \supset .$

$S(f \times Dg; a, b) = (fb)(gb) - (fa)(ga) - S(g \times Df; a, b)$

Dem.  $x \in a \neg b . \supset . D(fx \times gx | x, a \neg b)x = fx \times Dgx + gx \times Dfx . \supset .$

$A(fx \times gx | x; a, b) = S(fx \times Dgx | x; a, b) + S(gx \times Dfx | x; a, b) . \supset . P$

Decompone functione integrando in producto de functione  $f$  per derivata de functione  $g$ . Tunc integrale consta ex duo



parte : incremento de producto  $fx-gx$ , ubi  $x$  varia inter limites de integrale, minus integrale de producto de  $g$  per derivata de  $f$ . Resulta ex derivata de producto.

$$\cdot 1 \quad f, g \varepsilon \text{ qf } \Theta. \text{ l' } f' \Theta, \text{ l' } f' \Theta, \text{ l' } g' \Theta, \text{ l' } g' \Theta \varepsilon \text{q} . S(f, \Theta), S(g, \Theta) \varepsilon \text{q} . \supset . \\ S[g.r S(f, \Theta x) | x, \Theta] + S[f.x S(g, \Theta x) | x, \Theta] = S(f, \Theta) \times S(g, \Theta)$$

! J. THOMAE a.1875 Zm. t.20 p.475 !

Integratione per partes sine signo D.

\* 15. SUBSTITUTIONE IN INTEGRALE.

$$a, b \varepsilon \text{q} . g, Dg \varepsilon \text{ (qF } a \neg b \text{) cont} . f \varepsilon \text{ [qF } (g' a \neg b) \text{] cont} . \supset .$$

$$S(f; ga, gb) = S(fgx \times Dgx | x; a, b)$$

$$\text{Dem. } x \varepsilon a \neg b . \S D 9 . \supset . D[S(f; ga, gx) | x, a \neg b] x \\ = D[S(f; ga, y) | y, g' a \neg b] gx \times Dgx = fgx \times Dgx$$

Dato duo quantitate  $a$  et  $b$ , et  $g$ , functione reale definito in intervallo ab  $a$  ad  $b$ , cum derivata continuo, et functione  $f$  definito in campo de valores sumpto per  $g$  in intervallo  $a \neg b$ , et continuo, tunc integrale de functione  $f$ , ab  $ga$  ad  $gb$  vale integrale de producto  $fgx \times Dgx$ , ubi varia  $x$  ab  $a$  ad  $b$ .

Id es, in calculo de  $S(fy | y; ga, gb)$ , substitue  $y = gx$ , multiplica  $fgx$  per  $Dgx$ , et integra, pro  $x$ , inter limites  $a$  et  $b$ , respondentes in relatione  $y = gx$  ad limites de antiquo integrale.

Resulta de derivata de functione de functione, pag. 281.

$$\cdot 1 \quad f \varepsilon \text{ (Qf } \Theta \text{) cont} . g \varepsilon \text{ qf } [\Theta S(f, \Theta)] \text{ cont} . \supset .$$

$$S[g, \Theta S(f, \Theta)] = S[f.x \times g[S(f, \Theta x)] | x, \Theta]$$

Integratione « per substitutione », scripto sine signo D.

\* 16. INTEGRALE DE POTESSTATE.

$$m \varepsilon \mathbb{Q}_0 . \supset . S(x^m | x, \Theta) = / (m+1)$$

Si  $m$  es numero positivo aut nullo, integrale de  $x^m$ , ubi varia  $x$ , de 0 ad 1 vale  $1/(m+1)$ .

Primo integrale importante, que occurre in Mathematica.

Dem. 1  $S(x^m|x, \theta) = S[Dx^{m+1}/(m+1)|x, \theta]$   
 $= \Delta[x^{m+1}/(m+1)|x, \theta] = 1/(m+1)$

In vero, integrale de  $x^m$  vale integrale de derivata de  $x^{m+1}/(m+1)$ , ergo vale incremento de isto functione.

Dem. 2

$n \in \mathbb{N}_1$ . §2 P7.1.  $\sup s'_i[x^m|x, \theta, (0 \cdots n)/n] = \Sigma(1 \cdots n)^m/(n+1) > 1/(m+1)$ .  
 $s_i[x^m|x, \theta, (0 \cdots n)/n] < 1/(m+1)$ .  $s'_1 \cdots - s'_n \cdots = 1/n$ .  $\sup P$

Divide intervallo  $\theta$  in  $n$  partes æquale.

Summa  $s'$  de rectangulos circumscripto ad figura vale summa de potestates  $m$  de numeros naturale de 1 ad  $n$ , diviso per  $n$  ad  $m+1$ , que supera  $1/(m+1)$ , per theorema de Algebra (pag. 123).

Summa  $s$ , de rectangulos inscripto in figura vale summa de potestates  $m$  de numeros de 0 ad  $n-1$ , diviso per  $n$  ad  $m+1$ , que es minore de  $1/(m+1)$ .

Differentia de polygono circumscripto et inscripto vale  $1/n$ , quantitate parvo ad arbitrio.

Ergo integrale, minore de primo summa, et majore de secundo, vale  $1/(m+1)$ .

### Historia.

Pro  $m=1$ ,  $S(x|x, \theta) = 1/2$  dice que area de triangulo vale producto de basi per altitudine, diviso per 2. Euclide, I.1 P34, pro demonstra isto regula, divide parallelogrammo in duo triangulo æquale per diagonale.

Nos pote traduce in symbolos analytico ce Dm ut seque:

P7.6.7.  $\sup S(x|x, \theta) = S[(1-x)|x, \theta]$  (1)

P7.1.  $\sup S(x|x, \theta) + S[(1-x)|x, \theta] = 1$  (2)

(1). (2).  $\sup S(x|x, \theta) = 1/2$

Lege: « Area de triangulo (0,0), (1,0), (1,1), vale area de triangulo (0,0), (0,1), (1,1), ut resulta de superpositione, vel de regula de Calculo integrale. Summa de duo area vale 1. Ergo integrale dato vale  $1/2$  ».

Pro  $m=2$ ,  $S(x^2|x, \theta) = 1/3$  dice que volumen de pyramide vale producto de basi per altitudine, diviso per 3. Euclide, I.12 P7, pro demonstra regula decompone prisma in tres pyramide.

$S(x^2|x, \theta) = S[(1-x)^2|x, \theta] = 2S[x(1-x)|x, \theta]$  (1)

Summa de tres pyramide vale prisma totale:

$S(x^2|x, \theta) + S[(1-x)^2|x, \theta] + 2S[x(1-x)|x, \theta] = 1$  (2)

(1). (2).  $\sup S(x^2|x, \theta) = 1/3$

Archimede stude idem integrale in calculo de area de suo spirale, de barycentro de triangulo, et de area de parabola. Suo ratiocinio es circa ut seque (*περί ἑλικῶν* P10-24):

[  $S(x^2|x, \theta) = \lim \Sigma[(r/n)^2|r, 1 \cdots n]/n = \lim \Sigma(1 \cdots n)^2/n^3/n$   
 $= \lim n(n+1)(2n+1)/6n^3/n = \lim (1+1/n)[1/(2n)]/3/n = 1/3$  ]

{ B. CAVALIERI a.1639 p.524: « se in un parallelogrammo, descritto il diametro, intenderemo tirate parallele ad un lato di esso quante se ne possono tirare, indefinitamente di qua e di là prolungate, la parte di esse che resta nel parallelogrammo, cioè (per parlare nella lingua usata in essa geometria) tutte le linee del parallelogrammo saranno doppie di tutte le linee comprese in uno dei fatti triangoli. Tutti i quadrati del parallelogrammo saranno tripli di tutti i quadrati dello stesso triangolo. Tutti i cubi saranno quadrupli di tutti i cubi. Tutti i biquadrati saranno quintupli di tutti i biquadrati (intendo sempre quelli del parallelogrammo di quelli del detto triangolo). Donde argomento probabilmente che tutti li quadricubi saranno sestupli di tutti i quadricubi. Tutti i cubicubi saranno settupli di tutti i cubicubi, e così in infinito secondo i numeri continuamente susseguenti. » }

{ FERMAT t.1 p.195; edito per Mersenne a.1644 }

Fermat da ce theorema cum hypothesis  $m \in \mathbb{R}$ , in calculo de area de parabola  $y_n = x^m$ . Area de parallelogrammo circumscripto es ad parabola « ut summa exponentium ambarum potestatum ad exponentem potestatis applicatarum... [  $S(x \wedge m; n) | x, \Theta = n! (m+n)$  ] ».

\* 17. INTEGRALE DE FUNCTIONE INTEGRO.

\*3  $n \in \mathbb{N}_1, a \in \mathbb{Q}^{0 \cdots n}, x \in \mathbb{Q} \supset$

$$S\{\Sigma(a, x^{n-r} | r, 0 \cdots n) | x, \Theta\} = \Sigma[a, x^{n-r+1}, (n-r+1) | r, 0 \cdots n]$$

Integrale de functione integro de gradu  $n$  es functione integro de gradu  $n+1$ .

\* 18.

\*1  $u \in \text{Intv} \cdot f \in \mathbb{Q}^u \cdot l' \bmod f^u \in \mathbb{Q} \supset \bmod S'(f, u) \leq S'(\bmod f, u)$

\*2 " " " " "  $\bmod S(f, u) \leq$  "

\*3  $a, b \in \mathbb{Q} \cdot a < b \supset S(\text{sgn}, a \neg b) = \bmod b - \bmod a$

\*4  $a \in \mathbb{Q} \supset S(E, \Theta a) = [\beta a + (Ea - 1)/2] Ea$

\*5  $a \in \mathbb{Q} \supset S(\beta, \Theta a) = [(\beta a)^2 + Ea] 2$

\*6  $S'[(\lim \text{sgn } \beta n! x | n) | x, \Theta] = 1$

$S' \text{ " " " " " } = 0$

Functione que, per  $x$  rationale vale 0, et per  $x$  irrationale vale 1, habet integrales supero et infero differente, et non es integrabile. (Dirichlet t. 1 p.132). Pro expressione analytico de functione, vide §lim 16·2·21 p.219.

## \* 19. INTEGRALE DE FUNCTIONE RATIONALE.

$$\cdot 0 \quad x \in \mathbb{Q} \quad \supset \quad S(/; 1, x) = \log x$$

$$\text{Dem.} \quad S(/; 1, x) = S(D \log; 1, x) = A(\log; 1, x) = \log x$$

Si  $x$  es quantitate positivo, integrale de functione reciproco, vel  $1/x$ , ubi varia  $x$ , ab 1 ad  $x$ , vale logarithmo naturale de  $x$ . Pote es sumpto ut definitione de logarithmo.

Gregorius a S. Vincentio in *Opus Geometricum*, Antverpiae a.1647 p.594 vide proprietate characteristico de area de hyperbola  $[S(/, 1^{-a})]$ , que seque:

$$a, m \in \mathbb{Q} \quad \supset \quad S(/, 1^{-am}) = mS(/, 1^{-a}).$$

Alfonso de Sarasa in opusculo: *Solutio problematis a R. P. Marino Mersennio minimo propositi*, Antverpiae a.1649 p.7, gno que areas de hyperbola responde ad logarithmos.

$$\cdot 1 \quad a, b \in \mathbb{Q} \quad a \neq 0 \quad b/a > 0 \quad \supset \quad S(/; a, b) = \log(b/a)$$

Integrale de functione « reciproco » in intervallo que non contine valore 0, ubi functione non es finito.

$$\cdot 2 \quad a, b, x, y \in \mathbb{Q} \quad a \neq b \quad (x-a)(y-a)(x-b)(y-b) > 0 \quad \supset$$

$$S\{/(x-a)(x-b)\} / \{r; x, y\} = \\ / (b-a) \log\{[(y-a)/(y-b)] / [(x-a)/(x-b)]\}$$

Quantitate sub signo log vocare « biratione » de quatuor numero  $x, y, a, b$ .

$$\text{Dem.} \quad 1/[(x-a)(x-b)] = [1/(x-b) - 1/(x-a)]/(b-a)$$

In vero, nos decompone fractione integrando in summa de duo fractione, ut es exposito in pag. 309.

$$\cdot 3 \quad x \in \mathbb{Q} \quad \supset \quad S[1/(1+x^2)]x; 0, x] = \tan^{-1}x$$

$$\text{Dem. 1} \quad \S \text{DP18-4 (pag. 285)} \supset P$$

$$\text{Dem. 2} \quad S[1/(1+x^2)]x; 0, x] = S[1/[(x-i)(x+i)]]x; 0, x] = \\ [1/(2i)] \log\{(1+xi)/(1-xi)\} = \tan^{-1}x.$$

$$\cdot 4 \quad n \in \mathbb{N}_1 + 1 \quad a, x \in \mathbb{Q} \quad a \neq 0 \quad x/a > 0 \quad \supset$$

$$S(1/x^n | x; a, x) = (1/a^{n-1} - 1/x^{n-1})/(n-1)$$

Dato functione rationale, vel quotiente de duo functione integro, si nos nosce radices de denominatore, fractione es decompomibile in fractiones de forma  $c/(x-a)^m$ . Vide pag. 309. Si  $m > 1$ , suo integrale es dato per Prop.  $\cdot 4$  et es rationale. Si  $m = 1$ , suo integrale, dato per Prop.  $\cdot 1$  es logarithmo. Ergo omni functione rationale habe functione primitivo, que pote es expresso per functiones rationale et per logarithmos.

## \* 20.

## INTEGRALES IMPROPRIO.

Si intervallo de integratione es infinito, aut si functione  $f$  infinito in intervallo de integratione, definitione de integrale dato in Prop. 1-4 non vale; nam uno termino de summa  $s'$ , vel  $s$ , es infinito.

In isto casu, Auctores pone definitiones sequente:

$$\cdot 1 \quad a \varepsilon q . f \varepsilon q f(a+Q_0) . \supset .$$

$$S(f, a+Q_0) = \lim[S(f, a+Q) | b, a+Q, \infty] \quad \text{Df}$$

Si  $f$  es functione reale de valores de  $a$  ad  $\infty$ , integrale de  $f$ , extenso de  $a$  ad  $\infty$  es limite de integrale de  $a$  ad  $b$ , ubi varia  $b$ , sume valores supra  $a$ , et verge ad  $\infty$ .

$$\cdot 2 \quad b \varepsilon q . f \varepsilon q f(b-Q_0) . \supset .$$

$$S(f, b-Q_0) = \lim[S(f, a+Q) | a, b-Q, -\infty] \quad \text{Df}$$

$$\cdot 3 \quad f \varepsilon q f q . \supset . S(f, q) = \lim[S(f, a+Q) | a, q, -\infty] \quad \text{Df}$$

$$\cdot 4 \quad a \varepsilon q . f \varepsilon Q f(a+Q_0) . S(f, a+Q_0) \varepsilon Q . \supset . 0 \varepsilon \text{Lm}(f, a+Q, \infty)$$

$$\cdot 5 \quad \text{Hp P.4} . \supset . 0 \varepsilon \text{Lm}(xf|x, a+Q, \infty)$$

$$\cdot 51 \quad a \varepsilon Q . S(f, q) \varepsilon q . \supset . S[f(a.r)|x, q] = S(f, q) / a$$

$$\cdot 52 \quad a \varepsilon q . S(f, q) \varepsilon q . \supset . S[f(a+r)|x, q] = S(f, q)$$

$$\cdot 6 \quad a, b \varepsilon q . a < b . u \varepsilon q f(a+Q) . l' \text{ mod } u'(a+Q) = \infty : c \varepsilon a+Q . \supset . l' \text{ mod } u'(c+Q) \varepsilon Q : \supset . S(u, a+Q) = \lim[S(u, c+Q) | c, a+Q, a] \quad \text{Df}$$

$$\cdot 7 \quad \text{-----} \quad l' \text{ mod } u'(a+Q) \varepsilon Q \quad \text{-----} \quad a+Q \quad \text{-----} \quad b] \quad \text{Df}$$

$$\cdot 8 \quad \text{-----} \quad c, d \varepsilon a+Q . \supset . l' \text{ mod } u'(c+Q) \varepsilon Q : \supset . \text{Ths P.6} \quad \text{Df}$$

Integrales definito per P.1.2.3.6.7.8 vocare « integrales singulare (Cauchy a. 1823), aut improprio », et indicare per:

$$\int_a^{\infty} f(x) dx \quad \int_{-\infty}^b f(x) dx \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$$

Non semper isto integrales existe; si illo existe, et habe valore finito, es dicto convergente.

Quando Df.3-6 ne es applicabile, Cauchy (Œuvres s.1 t.1 p.477) considera « valore principale de integrale », que, secundo Riemann p.241, ne habe grande utilitate.

\* 21.4  $S(/, 1+Q) = \infty$

·2  $n \in 1+Q \cdot \supset S(x^{-n}|x, 1+Q) = /(n-1)$   
 } TORRICELLI a.1644, pro  $n=2$ ; FERMAT t.2 p.338; WALLIS  
 a.1655 t.1 p.409 {

\* 22.  $\pi$  S

- 0  $S[/(1+x^2)|x, \theta] = \pi/4$   
 $S[/(1+x^2)|x, Q] = \pi/2$  .  $S[/(1+x^2)|x, q] = \pi$
- 1  $a \in Q \cdot \supset S[/(a^2+x^2)|x, q] = \pi/a$   
 $[/(a^2+x^2)|x, q] = D[a \cdot t^{-1}(x/a)|x, q]$
- 2  $a \in Q \cdot b, c \in q \cdot ac - b^2 > 0 \cdot \supset$   
 $S[/(ax^2+2bx+c)|x, q] = \pi/\sqrt{ac-b^2}$   
 $[x \in q \cdot \supset /(ax^2+2bx+c) = a'[(ax+b)^2+ac-b^2]$   
 $= D[\sqrt{ac-b^2} \cdot t^{-1}[(ax+b)/\sqrt{ac-b^2}]|x, q, x']]$
- 3  $S[/(1+x^2)|x, Q] = S[x/(1+x^2)|x, Q] = 2\pi/(3\sqrt{3})$
- 4  $S[/(1+x^4)|x, q] = S[x^2/(1+x^4)|x, q] = \pi\sqrt{2}/2$
- 5  $a, b \in Q \cdot \supset S[/math>  $/[(a^2+x^2)(b^2+x^2)]|x, q] = \pi/[ab(a+b)]$   
 $[/[(a^2+x^2)(b^2+x^2)] = [/[(a^2+x^2) - /(b^2+x^2)]/(b^2-a^2)]$$
- 6  $a, b \in Q \cdot \supset S[x^2/[(a^2+x^2)(b^2+x^2)]|x, q] = \pi/(a+b)$   
 $[x^2/[(a^2+x^2)(b^2+x^2)] = [b^2/(b^2+x^2) - a^2/(a^2+x^2)]/(b^2-a^2)]$
- 7  $a, b, c \in Q \cdot \supset S[/(a+bx^2+cx^4)|x, q] = S[x^2/(ax^4+bx^2+c)|x, q]$   
 $= \pi/\sqrt{ab+2a\sqrt{ac}}$  } PLANA TurinM. a.1820 {
- 8  $S[/(1+x^6)|x, Q] = 2S[x^2/(1+x^6)|x, Q] = S[x^4/(1+x^6)|x, Q]$   
 $= \pi/3$   
 } ·2·5 EULER *Calc. Int.* a.1768 t.1 §353 t.4 s.4 §105 {
- 9  $a \in Q \cdot m \in N_1 \cdot \supset S[/(a^2+x^2)^{m+1}|x, Q] =$   
 $\Pi_1(2r-1)/(2r) \cdot |r, 1 \dots m| \pi (2a^{2m+1})$

\* 23.0  ${}^2f \in (QfQ_0)\text{decr} \cdot \supset \Sigma(f, N_0) \varepsilon Q \cdot = S(f, Q_0) \varepsilon Q$   
 } MACLAURIN a.1742 p.289 {

[ Hp.  $n \in N_0 \cdot \supset \Sigma(f, 0 \dots n) > S[f, 0 \dots (n+1)] > \Sigma[f, 0 \dots (n+1)] - f_0 \cdot \supset$  Ths ]

Si  $f$  es functione positivo et decrescente de variabile inter 0 et  $+\infty$ , tunc conditione necessario et sufficiente pro convergentia de serie  $f_0 + f_1 + f_2 + \dots$ , es convergentia de integrale de  $f$  de 0 ad  $+\infty$ .

In vero, summa  $f_0 + f_1 + \dots + f_n$  supera integrale de 0 ad  $n+1$ , que supera summa  $f_1 + f_2 + \dots + f(n+1)$ . Ergo, si summa de serie es finito, tunc integrale, que es minore de summa de serie, es finito. Et si integrale es finito, serie  $f_1 + f_2 + \dots$  habet valore finito, minore de integrale; et addito  $f_0$ , seque convergentia de serie dato.

Plure tractato de Calculo tribue isto theorema ad Cauchy, a. 1821.

Exemplo. Si in loco de  $f$  nos pone  $f(1+x) \cdot x$ , de  $S(, 1+Q) = \infty$ , Prop 21.1, seque  $\Sigma(, N_1) = \infty$  (§lim P23.1, pag. 223), et viceversa.

Si  $f = f(1+x)^n \cdot x$ , ubi  $n \in 1+Q$ , de P21.2 seque  $\Sigma N_1^{-n} \in Q$  (§lim P23.3 p.223).

## \* 24.

## FUNCTIONES IRRATIONALE.

$$\cdot 1 \quad a, x \in Q \quad \supset \quad S[\sqrt{a^2+x^2}|x; 0, x] = \log\{[x + \sqrt{a^2+x^2}]/a\} \\ [ \quad \S D \text{ P14 (p.284)} \supset P ]$$

$$\cdot 2 \quad a, x \in Q \quad \supset \quad S[\sqrt{a^2+x^2}|x; 0, x] = \\ x\sqrt{a^2+x^2}/2 + a^2 \log\{[x + \sqrt{a^2+x^2}]/a\}/2 \\ [ \quad D[x\sqrt{a^2+x^2}|x, q]x = \sqrt{a^2+x^2} + x^2/\sqrt{a^2+x^2} = \\ \sqrt{a^2+x^2} + (a^2+x^2)/\sqrt{a^2+x^2} - a^2/\sqrt{a^2+x^2} = 2\sqrt{a^2+x^2} - a^2/\sqrt{a^2+x^2} \\ \supset \quad 2S[\sqrt{a^2+x^2}|x; 0, x] = x\sqrt{a^2+x^2} + a^2 S[\sqrt{a^2+x^2}|x; 0, x] \quad P.1 \quad \supset \quad P ]$$

$$\cdot 3 \quad a \in Q \quad y \in \Theta a \quad \supset \quad S[\sqrt{a^2-y^2}|y, \Theta y] = s^{-1}(y/a)$$

$$\cdot 4 \quad a \in Q \quad y \in \Theta a \quad \supset \quad S[\sqrt{a^2-y^2}|y, \Theta y] = \\ [y\sqrt{a^2-y^2} + a^2 s^{-1}(y/a)]/2$$

$$\cdot 5 \quad S[\sqrt{1-x^2}|x, \Theta] = \pi/4 \quad \{ \text{WALLIS a.1655 p.417 :}$$

« Circulus ad Quadratum Diametri, (vel etiam Ellipsis quælibet ad Parallelogrammum sibi circumscriptum), eam habet rationem, quam habent Radices Quadraticæ universales Residuorum seriei infinitæ Æqualium serie Secundanorum mulctatæ, ad seriem illam Æqualium. »!

Versione: Ratione de circulo ad quadrato de diametro, vel  $\pi/4$ , æqua summa universale (integrale) de radice quadratico de 1 minus potestate secundo de variabile, vel de  $\sqrt{1-x^2}$ .

$$\cdot 6 \quad a \in Q \quad y \in \Theta a \quad \supset \quad S[\sqrt{(a-y)/y}|y, \Theta y] = \\ \sqrt{[y(a-y)] + a/2} \cdot c^{-1}[(a-2y)/a]$$

\* 25.

## INTEGRALE EULERIANO.

$$m, n \in \mathbb{Q} - 1 \quad \supset \quad S[x^m(1-x)^n | x, \Theta] \in \mathbb{Q}$$

Si  $m$  et  $n$  es quantitate superiore ad  $-1$ , integrale considerato habet valore positivo determinatum et finitum.

Euler stude ea integrale in Torino M. t. 3 a. 1762, Petr. NC. a. 1772, Petr. NA. a. 1779.

Legendre, Exerc. t. 1 p. 221, t. 2 p. 3, voca illo « integrale Euleriano de primo speciei »; quem Binet, a. 1839 JP. c. 27, indica per  $B(m+1, n+1)$ .

$$\begin{aligned} 1 \quad S[x^m(1-x)^n | x, \Theta] &= S[x^n(1-x)^m | x, \Theta] \\ &[ (1-x)x \supset P ] \end{aligned}$$

Integrale non varia si nos permuta  $m$  et  $n$ . Resulta de substitutione  $1-x$  in loco de  $x$ .

$$\begin{aligned} 2 \quad S[x^{m+1}(1-x)^n | x, \Theta] &= (m+1)/(m+n+2) S[x^m(1-x)^n | x, \Theta] \\ [ D[x^{m+1}(1-x)^{n+1} | x, \Theta] x &= (m+1)x^m(1-x)^{n+1} - (n+1)x^{m+1}(1-x)^n \\ &= (m+1)x^m(1-x)^n - (m+n+2)x^{m+1}(1-x)^n \quad (1) \\ (1) \supset (m+1)S[x^m(1-x)^n | x, \Theta] &- (m+n+2)S[x^{m+1}(1-x)^n | x, \Theta] \\ &= A[x^{m+1}(1-x)^{n+1} | x; 0, 1] = 0 \supset P ] \end{aligned}$$

Formula de reductione. Exprime integrale, ubi exponentes es  $m+1$  et  $n$ , per idem integrale, respondente ad exponentes  $m$  et  $n$ .

$$3 \quad n \in \mathbb{N}_0 \supset S[x^m(1-x)^n | x, \Theta] = n! / \Pi(m+1+0 \cdots n)$$

$$\begin{aligned} \text{Dem. } 1 \quad S[x^m(1-x)^n | x, \Theta] &= S[\Sigma[(-1)^r C(n+r) x^{m+r} | r, 0 \cdots n] | x, \Theta] \\ &= \Sigma[(-1)^r C(n, r) / (m+r+1) | r, 0 \cdots n] \end{aligned}$$

$$\text{III § II P6.2 (p. 130) } \supset P$$

$$\text{Dem. } 2 \quad \text{P.2. P20.1 } \supset P$$

Si uno de exponentes, p. ex.  $n$  es integro, integrale habet valore rationale. Hoc resulta ex Algebra, vel ex regula de reductione præcedente; nam post subtractione de 1 unitate, plure vice, nos redde illo  $= 0$ , et nos habet integrale de potentia.

$$\begin{aligned} 4 \quad m, n \in \mathbb{N}_0 \supset S[x^m(1-x)^n | x, \Theta] &= m! n! / (m+n+1)! \\ &= 1 / [(m+n+1) C(m+n, m)] \end{aligned}$$

{ WALLIS a. 1655 p. 428-433; STIRLING a. 1730 p. 125 }

Si ambo exponente es integro, formula habet expressionem scriptam in P. 4.

Si nos trahit  $C(m+n, m)$  de P. 4, nos exprime numero de combinationes per integrale Euleriano, que habet sensum et pro  $m$  et  $n$  non integro.

$$\begin{aligned} 5 \quad S[x^m(1-x)^n | x, \Theta] &= S[x^m/(1+x)^{m+n+1} | x, Q] \\ [ x/(1+x) \supset P ] \end{aligned}$$



$$\cdot 6 \quad m, n \in \mathbb{N}_1, m < n \quad \supset \quad S[x^{m-1}/(1+x^n)|x, Q] = \pi/[n \, s(m\pi/n)] \\ \{ \text{EULER BerolMisc. a.1743 t.7 p.151} \}$$

$$\cdot 7 \quad a \varepsilon \theta \quad \supset \quad S[x^{a-1}(1-x)^{-a}|x, \theta] = \pi/s(a\pi)$$

$$\cdot 8 \quad a \varepsilon \theta, m, n \in \mathbb{Q}_0 \quad \supset \quad S[x^{m+a}(1-x)^{n-a}|x, \theta] = \\ \Pi(1 \cdots m + a) \Pi(1 \cdots n - a) / (m+n+1)! (\pi a) / \sin(\pi a) \\ \{ \text{EULER BerolMisc. a.1743 t.7 p.181} \}$$

Integrale præcedente pote es expresso per  $\pi$ , pro  $m+n$  integro.

\* 26.

e S

$$\cdot 1 \quad x \varepsilon q \quad \supset \quad S(e^x|x, 0, x) = e^x - 1 \quad [D(e^x|x, q)x = e^x \quad \supset \quad P]$$

$$\cdot 2 \quad a \varepsilon \mathbb{Q} - 1, x \varepsilon q \quad \supset \quad S(a^x|x, 0, x) = (a^x - 1)/\log a$$

$$\text{Dem. 1} \quad D(a^x/\log a|x, q)x = a^x \quad \supset \quad P$$

$$\text{Dem. 2} \quad S(a^x|x, 0, x) = x \lim \Sigma [a^{(rx/n)}|r, 0 \cdots (n-1)]/n \\ = \lim (a^x - 1)/[a^{(x/n)} - 1] : n \\ = (a^x - 1)/\lim [a^{(x/n)} - 1]/(n/x) : n = \dots$$

$$\cdot 3 \quad S(e^{-x}|x, Q) = 1$$

$$[S(e^{-x}|x, Q) = \lim [S(e^{-x}|x, \theta x)|x, Q, \infty] \\ = \lim (1 - e^{-x}) = 1]$$

$$\cdot 4 \quad a \varepsilon \mathbb{Q} \quad \supset \quad S(e^{-ax}|x, Q) = 1/a$$

$$\cdot 5 \quad n \varepsilon \mathbb{Q} \quad \supset \quad S(e^{-x} x^n|x, Q) = n S(e^{-x} x^{n-1}|x, Q)$$

$$[x \varepsilon \mathbb{Q} \quad \supset \quad D(e^{-x} x^n|x, Q)x = n e^{-x} x^{n-1} - e^{-x} x^n \quad (1)]$$

$$* \quad (1) \quad \supset \quad e^{-x} x^n = n S(e^{-x} x^{n-1}|x, \theta x) - S(e^{-x} x^n|x, \theta x) \quad (2)$$

$$(2). \text{ Oper lim } \supset \quad P]$$

$$\cdot 6 \quad n \in \mathbb{N}_0 \quad \supset \quad S(e^{-x} x^n|x, Q) = n! \quad [P.3.5 \quad \supset \quad P]$$

« Integrale euleriano de secundo specie », quem Legendre *Exer. t.2*, p.4 indica per  $\Gamma(n+1)$ ; illo exprime functio de  $n$ , que pro  $n$  integro coincide cum functione  $n!$ .

$$\cdot 7 \quad n \in \mathbb{N}_0, a \varepsilon \mathbb{Q} \quad \supset \quad S(e^{-ax} x^n|x, Q) = n!/a^{n+1} \quad [ax \varepsilon P.6 \quad \supset \quad P]$$

$$\cdot 8 \quad n \in \mathbb{N}_0, x \varepsilon \mathbb{Q}_0 \quad \supset \quad e^{-x} S(e^{-x} x^n|x, x+Q) = n! \Sigma(x^r/r!|r, 0 \cdots n)$$

$$\cdot 9 \quad m, n \varepsilon \mathbb{Q} - 1 \quad \supset \quad S[x^m(1-x)^n|x, \theta] = \\ S(e^{-x} x^m|x, Q) \times S(e^{-x} x^n|x, Q) / S(e^{-x} x^{m+n+1}|x, Q)$$

Expressione de integrale Euleriano de primo specie per integrale Euleriano de secundo specie.

\* 27.  $n \in \mathbb{N}_0, x \in \mathbb{Q}_0, \supset$ .

$$1 \quad x e^x S(e^{-x}/z | z, x+Q) = \sum [(-1)^r r! x^{-r} | r, 0 \dots (n-1)] \\ + (-1)^n x e^x S(e^{-x}/z^{n+1} | z, x+Q)$$

$$2 \quad x e^x S(e^{-x}/z | z, x+Q) = \sum [(-1)^r r! x^{-r} | r, 0 \dots (n-1)] \varepsilon \\ \theta (-1)^n n! x^{-n}$$

} LAGUERRE BsF. a.1879 t.7 p.72; Oeuvres t.1 p.4283 {

« Logarithmo-integrale »; (Soldner a. 1809), « hyperlogarithmo » (Mascheroni), « Logologarithmo (Caluso) ». Indicare per « lie- $\infty$  ».

Terminos de serie  $1 - 1/x + 2!/x^2 - 3!/x^3 + \dots$  es reciproco de terminos de serie exponential  $e^{-x} = 1 - x/1 + x^2/2! - \dots$  Ergo serie considerato es divergente pro omni valore positivo de  $x$ . Sed differentia inter summa de suo primos  $n$  termine et logarithmo-integrale, habe expressione simplicem, et que pote es utile in calculo numerico.

Resto minue, dum  $n < x$ ; postea cresce sine limite. Serie de typo praecedente vocare « semi-convergente ».

Exemplo: pro  $x = 100$ :

$$100 e^{100} S(e^{-x}/z | z, 100+Q) = 1 - 0.01 + 0.0002 - 0.000006 + 0.00000024 \\ = 0.99019424$$

cum errore negativo, minore de  $10^{-8}$ .

\* 28.  $\sin \cos S$

$$0 \quad S(s, \theta\pi/2) = S(c, \theta\pi/2) = 1$$

$$1 \quad a \in \mathbb{Q}, \supset. S(s; 0, a) = 1 - ca \quad \text{ } \{ \text{KEPLER a.1605, t.3 p.105; a.1609 t.3 p.391: «... pro summis rectorum utimur simplicibus sinibus versis» }$$

Versione: integrale de sinu (recto) vale sinu verso, vel  $1 - \cosinu$ .

Vide id. a.1618, t.6 p.407.

$$\text{Dem. 1} \quad S(s; 0, a) = S(D-c; 0, a) = -ca + c0 = 1 - ca$$

$$\text{Dem. 2} \quad S(s; 0, a) = \lim (a/n) \sum [s(ra/n) | r, 1 \dots n] | n \\ = s(a/2) \lim (a/n) s[(n+1)a/(2n)] / s[a/(2n)] | n \\ = 2s(a/2) \lim s[(a/2)(1+1/n)] a/(2n) / s[a/(2n)] | n \\ = 2[s(a/2)]^2 = 1 - ca \quad ]$$

$$2 \quad m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, \supset. S[e^{miz} | x, 2\theta\pi] = 0 \\ [ S[\dots] = \Delta[e^{(miz)}] (mi, x; 0, 2\pi) = 0 ]$$

$$3 \quad m, n \in \mathbb{N}, m^2 = n^2, \supset.$$

$$S[s(mx) s(nx) | x, \theta\pi] = S[c(mx) c(nx) | x, \theta\pi] = 0$$

$$34 \quad m, n \in \mathbb{N}, \supset. S[s(mx) c(nx) | x, \theta\pi] = 0$$

$$[ P.2. Df \sin. Df \cos. \supset. P.3.31 ]$$

$$^4 \quad m \in N_1 \quad \supset. \quad S[(mx)^s | x, \theta\pi] = S[(sx)^s | x, \theta\pi] = \pi/2$$

$$^5 \quad m \in Q \quad \supset. \quad S[(sx)^m | x, \theta\pi/2] = S[(cx)^m | x, \theta\pi/2]$$

$$^{51} \quad S[(sx)^s | x, \theta\pi/2] = S[(cx)^s | x, \theta\pi/2] = \pi/4$$

$$^6 \quad n \in 2 + Q_0 \quad \supset. \quad S[(cx)^n | x, \theta\pi/2] = (n-1)/n \quad S[(cx)^{n-1} | x, \theta\pi/2]$$

$$* \quad 29^1 \quad m, n \in Q_0 \quad \supset.$$

$$S[x^m(1-x)^n | x, \theta] = 2S[(sx)^{2m+1}(cx)^{2n+1} | x, \theta\pi/2]$$

$$^2 \quad n \in N_1 \quad \supset. \quad S[(sx)^{2n} | x, \theta\pi/2] = S[(cx)^{2n} | x, \theta\pi/2] = \\ \Pi[2(1 \cdots n) - 1] / \Pi[2(1 \cdots n)] \times \pi/2 = C(2n, n) / 2^{2n} \times \pi/2$$

$$^3 \quad n \in N_0 \quad \supset. \quad S[(sx)^{2n+1} | x, \theta\pi/2] = S[(cx)^{2n+1} | x, \theta\pi/2] = \\ \Pi[2(1 \cdots n)] / \Pi[2(1 \cdots n) + 1] = 2^{2n} / [(2n+1) C(2n, n)]$$

$$[ \text{P}28^5 \cdot 6 \quad \supset. \quad \text{P} \cdot 2 \cdot 3 ]$$

$$x \in q \quad \supset:$$

$$^4 \quad n \in N_1 \quad \supset. \quad S[(sx)^{2n} | x; 0, x] = \\ \sum \{ (-1)^{n-r} C(2n, r) \sin[(2n-2r)x] / (2n-2r) | x, 0 \cdots (n-1) \} / 2^{2n-1} \\ + x C(2n, n) / 2^{2n}$$

$$^5 \quad n \in N_1 \quad \supset. \quad S[(cx)^{2n} | x; 0, x] = \\ \sum \{ C(2n, r) \sin[(2n-2r)x] / (2n-2r) | r, 0 \cdots (n-1) \} / 2^{2n-1} + \\ x C(2n, n) / 2^{2n}$$

$$[ \text{§e P}15 \cdot 3 \quad \supset. \quad \text{P} \cdot 4 \cdot 5 ]$$

$$^6 \quad n \in N_0 \quad \supset. \quad S[(sx)^{2n+1} | x; 0, x] = \sum \{ (-1)^{n-r+1} C(2n+1, r) \times \\ [\cos[(2n-2r+1)x] - 1] / (2n-2r+1) | r, 0 \cdots n \} / 2^{2n}$$

$$^7 \quad n \in N_0 \quad \supset. \quad S[(cx)^{2n+1} | x; 0, x] = \\ \sum \{ C(2n+1, r) \sin[(2n-2r+1)x] / (2n-2r+1) | r, 0 \cdots n \} / 2^{2n}$$

$$[ \text{§e P}15 \cdot 4 \quad \supset. \quad \text{P} \cdot 6 \cdot 7 ]$$

$$^8 \quad n \in N_0 \quad \supset. \quad S[(sx)^{2n+1} | x, \theta\pi/2] = S[(cx)^{2n+1} | x, \theta\pi/2] = \\ \sum \{ (-1)^{n-r} C(2n+1, r) (2n-2r+1) | r, 0 \cdots n \} / 2^{2n}$$

$$[ \text{P} \cdot 6 \cdot 7 \quad \supset. \quad \text{P} ]$$

$$* \quad 30^1 \quad a \in \theta\pi/2 \quad \supset. \quad S\{(tx)^s | x, \theta a\} = ta - a$$

$$^2 \quad a \in \theta\pi/2 \quad \supset. \quad S(t, \theta a) = -\log ca$$

$$^3 \quad a \in \theta\pi/2 \quad \supset. \quad S(/c, \theta a) = \log\{ta + (ca)^{-1}\} = \log t(\pi/4 + a/2) \\ \{ \cdot 1 \cdot 3 \text{ COTES a.1722 p.78-81 } \}$$

- 4  $a \varepsilon \theta \pi / 2 \rightarrow S[(sxcx)|x, \theta a] = \log ta$
- 5  $a \varepsilon \theta \pi \rightarrow S(/sx|x, \theta a) = \log t(a/2)$
- 6  $a \varepsilon \theta \pi / 2 \rightarrow S(/tx|x, \theta a) = \log ca$
- \* 31·1  $a, b \varepsilon Q \rightarrow S\{/(a \cdot sx)^2 + (b \cdot cx)^2 |x, \theta \pi / 2\} = \pi / (2ab)$
- 2  $a \varepsilon Q \cdot b \varepsilon q \cdot a^2 > b^2 \rightarrow S\{/(a + b \cdot cx) |x, \theta \pi\} = \pi / \sqrt{(a^2 - b^2)}$
- 21  $z \varepsilon \theta \pi \rightarrow S\{/(1 + cz \cdot cx) |x, \theta \pi\} = \pi / sz$   
 $[ (1, cz) | (a, b) P \cdot 2 \rightarrow P ]$
- 3  $a \varepsilon Q \cdot b, c \varepsilon q \cdot a^2 > b^2 + c^2 \rightarrow$   
 $S\{/(a + b \cdot cx + c \cdot sx) |x, 2\pi \theta\} = 2\pi / \sqrt{(a^2 - b^2 - c^2)}$
- 4  $z \varepsilon \theta \pi \rightarrow S\{/(1 - 2x \cdot cz + x^2) |x, \theta\} = (\pi - z) / (2sz)$   
 $\{ \text{EULER Calc. Integr. a.1794 t.4 p.288 (PetrNC a.1774 t.19) \}$
- \* 32·1  $S\{(sx/x)/x |x, Q\} = \pi / 2$   
 $\{ \text{EULER (a.1781) Calc. Integr. a.1794 t.4 p.345 \}$
- 2  $S\{(sx/x)^2 |x, Q\} = \pi / 2$  { EULER ib. {  
 $[ D[(\sin x)^2/x |x, x] = 2 \sin x \cos x /x - (\sin x)^2/x^2 \quad (1)$   
 $(1) \rightarrow (\sin b)^2/b - (\sin a)^2/a = S\{(\sin 2x)/x |x, a \overline{b}\} - S(\sin x \cdot x)^2 |x, a \overline{b}\}$   
 $S\{(\sin x/x)^2 |x, a \overline{b}\} = -(\sin b)^2/b + (\sin a)^2/a + S(\sin 2x/x |x, a \overline{b})$   
 $\text{Oper lim}(|a, Q, 0) \rightarrow$   
 $S\{(\sin x \cdot x)^2 |x, 0 \overline{b}\} = -(\sin b)^2/b + S(\sin 2x |x, 0 \overline{b})$   
 $\quad \quad \quad = \quad \quad \quad + S(\sin z \cdot z |z, 0 \overline{2b})$   
 $\text{Oper} (\lim |b, \infty) \rightarrow S\{(\sin x/x)^2 |x, Q\} = \pi/2 ]$
- \* 33·1  $y \varepsilon Q \rightarrow S(s^{-1}y|y, \theta y) = ys^{-1}y + \sqrt{(1-y^2)} - 1$
- 2  $y \varepsilon Q \rightarrow S(t^{-1}, \theta y) = yt^{-1}y - [\log(1+y^2)]/2$
- \* 34.  $a \varepsilon q \rightarrow$
- 1  $\text{sgna} = 2/\pi S\{s(ax)/x |x, Q\}$
- 2  $\text{moda} = 2/\pi S\{s(ax)^2/x^2 |x, Q\}$
- 3  $a, b \varepsilon q \rightarrow 2S[s(ax) s(bx)/x^2 |x, Q] = \pi \min(\alpha \cup \beta)$
- \* 35·1  $S[x/(e^x - 1) |x, Q] = \pi^2/6$
- 8  $n \varepsilon N_1 \rightarrow S[x^{2n-1}/(e^{2\pi x} - 1) |x, Q] = B_n/(4n)$   
 $\{ \text{EULER PetrNC. a.1769 t.14 I p.151 \}$

\* 36.1  $a\epsilon Q \cdot b\epsilon q \cdot \supset. S[e^{-ac}c(bx)|x, Q] = a/(a^2+b^2)$   
 $\cdot S[e^{-as}s(bx)|x, Q] = b/(a^2+b^2)$   
 $[S(e^{-a+ib}x|x, Q) = (a-ib)/(a^2+b^2) \cdot \text{Oper real} \cdot \text{Oper imag} \cdot \supset. P]$

\* 2  $p, q\epsilon Q \cdot \supset. S[e^{-px}[c(qx)-1]|x, Q] = \log[p/\sqrt{p^2+q^2}] \cdot$   
 $S[e^{-px}s(qx)|x, Q] = t^{-1}(q/p)$

{ EULER, a.1781 *Calc. Integr.*, a.1794 t.4 p.345 }

[  $S(e^{-p+qi}x|x, \Theta x) = [1-e^{-p+qi}x]/(p-qi) \cdot \supset. S[S[e^{-p+qi}x|x, \Theta x]|q, \Theta q]$   
 $= S[(p-qi)/q, \Theta q] - e^{-px}S[e^{qix}/(p-qi)/q, \Theta q] \cdot \supset.$

$S[e^{-px}(e^{qix}-1)/x|x, \Theta x] = \log[p/(p-qi)] - ie^{-px}S[e^{qix}/(p-qi)/q, \Theta q] \cdot$

$\text{Oper}(\lim|x, \infty) \cdot \supset. S[e^{-px}(e^{qix}-1)/x|x, Q] = \log[p/(p-qi)] =$

$\log[p(p+qi)/(p^2+q^2)] \cdot \S eP13.5 \cdot \S s^{-1}P4.5 \cdot \supset. S[e^{-px}[c(qx)-1]|x|x, Q]$

$+iS[e^{-px}s(qx)|x|x, Q] = \log[p/\sqrt{p^2+q^2}] + it^{-1}(q/p) \cdot \S q' P1.6 \cdot \supset. P ]$

\* 3  $n\epsilon N_1 \cdot a\epsilon q \cdot \supset.$

$S[e^{-ax}(sx)^{2n+1}|x, 2\Theta\pi] = (2n+1)!(1-e^{-2\pi a})/II[a^2+(2r+1)^2]|r, 0\cdots n\}$

$S[e^{-ax}(sx)^{2n}|x, 2\Theta\pi] = (2n)!(1-e^{-2\pi a})/aIII[(a^2+4r^2)|r, 0\cdots n\}$

{ CAUCHY ParisCR. a.1854 t.39 p.129; Œuvres s.1 t.12 p.175 }

\* 4  $S[(cx+x\ s.r.)/(1+x^2)|x, Q] = \pi/c$

{ LAPLACE (ParisM. a.1782, publ. a.1785) Oeuvres t.10 p.264 }

\* 5  $a\epsilon Q \cdot b\epsilon q' \cdot \text{real } b \epsilon Q \cdot \supset. S[c(ax)/(b^2+x^2)|x, q] = \pi \cdot b \cdot e^{-ab}$

{ LAPLACE, DIRICHLET t.1 p.112 }

\* 6  $a\epsilon Q \cdot b\epsilon q' \cdot \text{real } b \epsilon Q \cdot \supset. S[e^{-ax}/(b^2+x^2)|x, q] = \pi \cdot b \cdot e^{-ab}$

{ DIRICHLET t.1 p.113 }

\* 37.1  $S(\log s, \Theta\pi/2) = S(\log c, \Theta\pi/2) = -(\pi \log 2)/2$

{ EULER PetriA. a.1777 t.1, p.7 }

[  $S(\log \sin x|x, \Theta\pi/2) = S[\log \sin x/x|x, \Theta\pi/2] + S(\log x|x, \Theta\pi/2)$  (1)

(1)  $\supset. S(\log \sin x|x, \Theta\pi/2) \in q$  (2)

(1)  $\supset. S[\log \sin, \Theta\pi/2] = S[\log 2 + \log \sin(x/2) + \log \cos(x/2)|x, \Theta\pi/2]$

$= \pi/2 \log 2 + S[\log \sin(x/2)|x, \Theta\pi/2] + S[\log \sin(x/2)|x, \pi/2-\pi] =$

$\pi/2 \log 2 + S[\log \sin(x/2)|x, \Theta\pi] = \pi/2 \log 2 + 2S(\log \sin x|x, \Theta\pi/2)$  (3)

(2), (3)  $\supset. P]$

[  $S(\log \sin, \Theta\pi/2) = \lim_{n \rightarrow \infty} 2[x/(2n)] \log \sin[x\pi/(2n)]|r, 1 \cdots n/n$

$= \pi/2 \lim_{n \rightarrow \infty} \log H[\sin[x\pi/(2n)]|r, 1 \cdots n/n/n]$  (1)

(1)  $\cdot \S x P6.1 \cdot \supset. S[\log \sin, \Theta\pi/2] = \pi/2 \lim_{n \rightarrow \infty} \log(\sqrt{n}2^{n-1}/n|n$

$= \pi/2 \lim_{n \rightarrow \infty} (\log n/(2n) - \log 2/(n-1)/n|n) = -(\pi \log 2)/2 ]$

\* 2  $S(x \log \sin x|x, \Theta\pi) = -(\pi^2 \log 2)/2$

\* 3  $S[x \sin x / |1+(\cos x)^2| |x, \Theta\pi] = \pi^2/4$

$$\begin{aligned} & \cdot 4 \quad r \in \mathbb{Q} \cdot \text{mod } r > 1 \quad \cdot \cdot \cdot \quad S[\log(1-2r \cdot c x + r^2) | x, \theta \pi] = \pi \log r^2 \\ & [ \quad \text{Hp} \quad \cdot \cdot \cdot \quad S[\log(1-2r \cdot c x + r^2) | x, \theta \pi] = \\ & \lim[(\pi/n) \Sigma; \log[1-2r \cdot c(m\pi/n) + r^2] | m, 1 \cdots n]; | n = \\ & \lim[(\pi/n) \log I; [1-2r \cdot c(m\pi/n) + r^2] | m, 1 \cdots (n-1)]; | n \quad (1) \\ & \text{Hp} \cdot \S \text{P} 6 \cdot 2 \quad \cdot \cdot \cdot \quad r^{2n} - 1 = (r^2 - 1) I; [1-2r \cdot c(m\pi/n) + r^2] | m, 1 \cdots (n-1); \quad (2) \\ & (1) \cdot (2) \quad \cdot \cdot \cdot \quad S[\log(1-2r \cdot c x + r^2) | x, \theta \pi] = \\ & \lim; (\pi/n) \log[(r^{2n} - 1)/(r^2 - 1)]; | n = \lim[(\pi/n) \log(r^{2n} - 1)]; | n = \\ & \pi \log[\lim(r^{2n} - 1)/n | n] \quad \cdot \cdot \cdot \quad \text{P} \quad ] \end{aligned}$$

\*3 S:[log(1+x)]/(1+x^4) |x, \Theta'=(\pi/8) log2  
 } BERTRAND JdM. t.8 a.1843 p.112 {  
 [ S:[log(1+y)]/(1+y^2) |y, \Theta'=  
 S:[log(1+y)]Dt^{-1}y |y, \Theta'=S[log(1+tx) |x, \Theta\pi/4] .  
 P9\*4 .\r\n. S[log(1+u(x/4-x)) |x, \Theta\pi/4]=  
 S:[log(2/(1+tx)) |x, \Theta\pi/4]=(\pi/4)log2 -S[log(1+tx) |x, \Theta\pi/4] .\r\n.  
 S[log(1+tx) |x, \Theta\pi/4]=(\pi/8)log2 ]

\* 6 S{(t<sup>-1</sup>y)/(1+y) |y, θ} = (π/8) log2  
 [ P31:3 ⊃. S{(t<sup>-1</sup>y)/(1+y) |y, θ}=S{(t<sup>-1</sup>y)Dlog(1+y) |y, θ}= (π/4)log2-S{log(1+y) Dt<sup>-1</sup>y |y, θ} . P-5 ⊃. P ]

$$\cdot 7 \quad S(x \text{ sr} / [1 + (\text{sr})^2] | r, \Theta \pi) = \pi [\log(\sqrt{2} + 1)] / \sqrt{2}$$

\* 38.1  $S(e^{-x^2}|x, q) = \sqrt{\pi}$   
 $[S(e^{-x^2}|x, q) = S(\lim_{m \rightarrow \infty} [(1+x^2/m)^m] | x, q) = \lim_{m \rightarrow \infty} S[(1+x^2/m)^m | x, q] | m =$   
 $2 \lim_{m \rightarrow \infty} S[1 + (\text{taugy})^2 | m-1 | m' y, \theta \pi/2 | m =$   
 $2 \lim_{m \rightarrow \infty} \sqrt{m} S[(\cos y)^{2m-2} | y, \theta \pi/2 | m =$   
 $2 \lim_{m \rightarrow \infty} \sqrt{m} \Pi[1 - (2r)|x, 1 \dots (m-1)] \times \pi/2 | m =$   
 $\pi \lim_{m \rightarrow \infty} \sqrt{1.3.3 \dots (2m-3) | 2m-3 | m} [2.2.4.4 \dots (2m-2) | 2m-2] | m =$   
 $\pi \lim_{m \rightarrow \infty} \sqrt{\Pi[2E(n/2)+1] / [2E(n+1)/2] | n, N_1} \times \lim_{m \rightarrow \infty} \sqrt{m/2(m-1)} | m \quad (1)$   
 (1). § $\pi$  P10.1  $\square$ . P ]  
 } EULER PetrC. a.1730 (edito a.1738) t.5 p.44 }

$$x \in Q. \cup. S(e^{-x^2}|x, \theta x) = \sum \{(-1)^n x^{2n+1} / [(2n+1)n!] | n, N_0\} = x e^{-x^2} [1 + \sum (2x^2)^{n+1} / \Pi[2 \times \dots (n-2) + 1] | n, N_0\}$$

Ce integrale se prezenta in «Calculo de probabilitate». Laplace inveni illo in theoria de refractione in astronomia, a. 1805 (Traité de Mécanique Céleste) Oeuvres, t. 4, pag.254.

Existe plure tabula de valores de  $S(e^{-x^2}|x, \theta x)$ :  
 Bertrand, Calcul des probabilités, Paris, 1889, p.329;  
 Kämpfe Bruno, Tafel des Integrals  $\Phi$ , Leipzig 1893.

TABULA DE  $\Phi x = (2/\sqrt{\pi})S(e^{-x^2}|x, \Theta x)$ 

	·0	·1	·2	·3	·4	·5	·6	·7	·8	·9
0	·000	·112	·222	·328	·428	·520	·603	·677	·742	·796
1	·842	·880	·910	·934	·952	·966	·976	·983	·989	·992
2	·995	·997	·998	·998	·999	.....				

Exemplo: Pro calcula  $\Phi(1.85)$ :

Lege in horizontale 1, in verticale ·8

Interpola

$$\Phi(1.8) = 0.989$$

$$0.05 \times [\Phi(1.9) - \Phi(1.8)] / 0.1 = 0.001$$

$$\text{Summa } \Phi(1.85) = 0.990$$

que differ de valore dato per tabula plus amplo, per 1 unitate de ultimo ordine.

\* 39.1  $a \in \mathbb{Q}^+ \text{ real } a > 0 \Rightarrow S(e^{-ax^2}|x, q) = \sqrt{\pi/a}$

·2  $a \in \mathbb{Q} \Rightarrow S[e^{-(x^2+a^2/x^2)}|x, Q] = \sqrt{\pi} e^{-a^2/2}$   
 } LAPLACE (ParisM. a.1810, edito a.1811) Oeuvres t.12 p.368 {

·3  $S[e^{i(x^2)}|x, q] = (1+i)\sqrt{\pi/2}$

·4  $S[s(x^2)|x, Q] = S[c(x^2)|x, Q] = \sqrt{\pi/2}/2 \quad [= P.3]$   
 } EULER a.1781, *Calc. Integr.* a.1794 t.4 p.339 {

Euler inveni ce integrales in theoria de curva elastico, a.1744 p.276; et in 1781 determina valore de illos.

Fresnel, a.1818 t.1 p.178, inveni illos in theoria de diffractione de luce.

Vide et: Cauchy, *Oeuvres* s.1 t.7 p.151.

Dirichlet, *Oeuvres* t.1 p.245, 264 da novo demonstratione.

Fresnel calcula tabula de ce integrale inter limites variabile.

·5  $a, b, c \in \mathbb{Q}^+ \text{ real } a > 0 \Rightarrow$

$$S[e^{-(ax^2+bx+c)}|x, q] = \sqrt{\pi/a} e^{[-c+b^2/(4a)]}$$

} CAUCHY a.1827 s.2 t.7 p.280 {

\* 40. INTEGRATIONE PER SERIE.

·1  $u \in \text{Intv} \cdot f \in \text{qf}(u; N_0) \cdot \Sigma \{f \bmod [f(x, r)|x, u]|r, N_0\} \in \mathbb{Q}:$   
 $r \in N_0 \Rightarrow S[f(x, r)|x, u] \in \mathbb{Q} \Rightarrow$

$$S\{\Sigma[f(x, r)|r, N_0]|x, u\} = \Sigma\{S[f(x, r)|x, u]|r, N_0\} \quad \text{Comm}(S, \Sigma)$$

$f$  indica quantitate functione de duo variabile, uno in intervallo  $u$ , et altero sumente valores 0, 1, 2, ...

Id es,  $f(x, 0) + f(x, 1) + f(x, 2) + \dots$  es serie; et omni suo termine es functione de variabile  $x$  in intervallo  $u$ .

Si serie formato per limites supero de valores absoluto de termines de serie dato, ubi  $x$  varia in intervallo  $u$ , es convergente; et si omni termine de serie dato es integrabile in intervallo  $u$ ; tunc integrale de serie vale serie de integrales.

$$\begin{aligned}
 & [x\epsilon u . n\epsilon N_1 . R_n = \Sigma \{l' \text{ mod } [f(x,r), x'u]^r, n+N_1\} \supset \\
 & \quad \Sigma[f(x,r)|r, N_0] = \Sigma f(x,r)|r, 0 \cdots n + \Sigma[f(x,r)|r, n+N_1] . \\
 & \quad \text{mod } \Sigma[f(x,r)|r, n+N_1] \leq R_n \tag{1} \\
 & n\epsilon N_1 . (1) . P9-11 \supset . \\
 & S'_i | \Sigma[f(x,r)|r, N_0]|x,u| = \Sigma[S[f(x,r)|x, u]^r, 0 \cdots n + S'_i | \Sigma[f(x,r)|r, n+N_1]|x, u| , \\
 & S_i | \text{mod } \Sigma[f(x,r)|r, n+N_1]|x,u| \leq Longu \times R_n + S_i | \text{mod } \Sigma[f(x,r)|r, n+N_1]|x,u| . \\
 & \text{mod } S_i | \text{mod } \Sigma[f(x,r)|r, n+N_1]|x,u| \leq \dots \tag{2} \\
 & Hp \supset . \lim_{n \rightarrow \infty} R_n = 0 \tag{3} \\
 & (2) . (3) \supset . S'_i | \Sigma[f(x,r)|r, N_0]|x,u| = \Sigma[S[f(x,r)|x,u]^r, 0 \cdots n + S_i | \text{mod } \Sigma[f(x,r)|r, n+N_1]|x,u| . \\
 & \quad S_i | \text{mod } \Sigma[f(x,r)|r, n+N_1]|x,u| = \dots \supset . P ]
 \end{aligned}$$

In vero summa de serie vale summa de termines de 0 ad  $n$ , plus resto, que es, in valore absoluto, minore de resto in serie de limites supero, quem me voca  $R_n$ . Tunc integrale supero de summa de serie vale summa de integrales de primos termine, plus integrale supero de resto, que es minore de longitudo de intervallo de integrale, per  $R_n$ . Idem pro integrale infero. Si nunc  $n$  verge ad  $\infty$ ,  $R_n$  verge ad 0: tunc integrale supero de serie, et suo integrale infero, es expresso per serie de integrales.

Nos substitue ad conditione de convergentia uniforme que occurre in plure tractato, alio plus simplo. Vide pag. 233, 295.

✱ 41.1  $S(x^x|x, \Theta) = 1 - 2^{-1} + 3^{-1} - \dots = .7834305\dots$   
 { Joh. BERNOULLI, a.1694 t.1 p.185 }

2.  $n \in \mathbb{Q}$ .  $\sum S(x^{-nx} | x, \theta) = \sum [n''(r+1) - (r+1)] r, N_0]$   
 { EULER a.1768 t.1 p.144: « Quæ ob concinnitatem terminorum omnino est notatu digna. » }

\* 42.  $n, p \text{ eq. mod } n < 1 \Rightarrow S[(1+2n \text{cx} + n^2)^n | x, \theta \pi] = \pi \sum_j [C(p, r) n^j] | r, N_0 \}$

$$\begin{aligned}
& [x, n, \text{peq}, \text{modn} < 1 \rightarrow (1 + 2n\text{cx} + n^2)p = (1 + n\text{e}^{ix})^p (1 + n\text{e}^{-ix})^p = \\
& [1 + p n \text{e}^{ix} + p(p-1)/2 n^2 \text{e}^{2ix} + \dots][1 + p n \text{e}^{-ix} + p(p-1)/2 n^2 \text{e}^{-2ix} + \dots] = \\
& \Sigma[C(p, r) n^r \text{e}^{ir} | r, N_0] + \\
& \Sigma[C(p, r) C(p, s) n^{r+s} \text{e}^{i(r+s)x} | (r, s), (N_0; N_0) \wedge (r, s) \wedge (r=s)] \\
(1) \quad & \text{OperS} . \text{P } 28.2 \rightarrow \text{P} ]
\end{aligned}$$



- \* 43.  $a, b \in \mathbb{Q} . n \in \mathbb{N}_1 . f, D^{n+1}f \in (qFa \overline{b})\text{cont} . \supset$   
 $fb - \sum [(b-a)^r / r! D^r f a | r, 0 \dots n] = /n! S[(b-x)^n D^{n+1}f x | x, a, b]$   
 $= (b-a)^{n+1} / n! S[(1-t)^n D^{n+1}f[a+t(b-a)] | t, \Theta]$   
 $[ \text{Hp} . g = fb - \sum [(b-x)^r / r! D^r f x | r, 0 \dots n] | x, a \overline{b} : \supset . gb = 0 \quad (1)$   
 $Dg = \sum [(b-x)^{r-1} (r-1)! D^r f x | r, 1 \dots n]$   
 $= \sum [(b-x)^r / r! D^{r+1}f x | r, 0 \dots n] | x, a \overline{b}$   
 $= [-(b-x)^n / n! D^{n+1}f x | x, a \overline{b}] \quad (2)$   
 $gb - ga = S(Dg, a \overline{b}) \quad (3)$   
 $(1) . (2) . (3) . \supset . P ]$   
 $\} \text{LAGRANGE a.1797 ; (Euvres t.9 p.73 \}$

Expressione, sub forma de integrale, de differentia inter valore  $fb$  et summa de primos  $n+1$  termine in formula de Taylor.

\* 44. FORMULAS DE QUADRATURA.

- 1  $f \in (qFq)\text{integ} . \text{grad} f = 1 . a, b \in \mathbb{Q} . a < b . \supset$   
 $S(f, a \overline{b}) = (b-a)(fa+fb)/2$   
 $[ p, q \in \mathbb{Q} . f = [(p+qx) | x, q] . \supset . fa = p+qa . fb = p+qb .$   
 $S(f, a \overline{b}) = p(b-a) + q(b^2-a^2)/2 = (b-a)[p+q(a+b)/2] . \supset . P ]$

Integrale de functione integro de gradu uno, extenso ad aliquo intervallo, vale amplitudo de intervallo per valore medio arithmetico inter primo et ultimo valore de functione.

Integrale considerato mensura area de trapezio.

- 2  $a, b \in \mathbb{Q} . a < b . f, D^2f \in (qFa \overline{b}) . \supset$   
 $S(f, a \overline{b}) = (b-a)(fa+fb)/2 \in -(b-a)^2(D^2f a \overline{b})/12$   
 $[ g = [fa+(x-a)(fb-fa)] | x . x \in a \overline{b} . \S D \text{ P18.1 } \supset$   
 $fx - gx \in -(x-a)(b-x)(D^2f a \overline{b})/2 . S(g, a \overline{b}) = (b-a)(fa+fb)/2 .$   
 $S[(x-a)(b-x) | x, a \overline{b}] = (b-a)^3/6 . \supset . P ]$

Si in intervallo de  $a$  ad  $b$ , functio  $f$  habe derivata de ordine 2, tunc differentia inter integrale de  $f$ ; de  $a$  ad  $b$ , et area de trapezio constructo super ordinatas  $fa$  et  $fb$ , vel errore que resulta si ad integrale nos substitue trapezio, es expresso per formula scripto.

In vero, si nos voca  $gx$  functio de gradu 1, que pro  $x=a$  et  $x=b$  coincide cum  $fx$ , tunc  $fx-gx$  es exprimibile ope derivata de  $f$ , de ordine 2; integrale de  $g$  vale trapezio; ...

Exemplo. Si nos pone  $f \cdot x = 1/x$ , vel  $f = (1/x)|x = 1$ ,  $a=1$ ,  $b=2$ , seque  $Df \cdot x = -1/x^2$ ,  $D^2 f \cdot x = 2/x^3$ . Ergo  $S(1, 1^{-2})$ , ( $= \log 2$ , vide P19) vale  $(1+1/2)/2$ , cum errore de forma  $-1/(6x^3)$ , ubi  $x$  es valore incognito) inter 1 et 2. Ce errore es negativo, et minore in valore absoluto de  $1/6$ ; und  $0.75 > \log 2 > 0.75 - 1.6 = 0.59$ .

$$\begin{aligned} \cdot 3 \quad & \text{Hp}^2 \cdot n \in N_1 + 1 \cdot \supset \cdot S(f, a^{-b}) = \\ & (b-a)[fa + fb + 2\sum_{i=1}^n f(a + r(b-a)/n)]/r, 1 \cdots (n-1)] \cdot (2n) \varepsilon \\ & -(b-a)^2(D^2 f \cdot a^{-b})/(12n^3) \\ & [ \text{P}^2 \cdot \supset \cdot S(f, a^{-b}) = \\ & 2[1/f(a + r(b-a)/n) + f(a + (r+1)(b-a)/n)] \cdot (b-a)/n \cdot |r, 0 \cdots (n-1)| \\ & \varepsilon -(b-a)^2/(12n^3) \sum_{i=1}^n D^2 f[a + (r+1)(b-a)/n] \cdot |r, 0 \cdots (n-1)| \\ & \varepsilon -(b-a)^2/(12n^3) \times n D^2 f \cdot a^{-b} \cdot \supset \cdot \text{P} ] \end{aligned}$$

Si functio  $f$  habe derivata de ordine 2 in toto intervallo de  $a$  ad  $b$ , tunc nos divide intervallo de integratione in  $n$  parte aequale, et nos substitue ad omni integrale partiale, trapezio correspondente. Summa de trapezios es valore approximato de integrale; et differentia vale errore praecedente (P<sup>2</sup>) diviso per quadrato de numero de partes.

In vero, errore totale es summa de errores partiale, dato per formula  $\cdot 2$ . Ce summa contine factore commune  $-(b-a)^2/(12n^3)$ , multiplicato per summa de  $n$  valores de  $D^2 f$ , que vale  $n$  multiplicato per valore medio inter valores de  $D^2 f$ .

Exemplo. Nos considera integrale praecedente  
 $\log 2 = S(1, 1^{-2})$ .

Nos divide intervallo de 1 ad 2 in 10 parte, cum valores 1, 1.1, 1.2, ... 1.9, 2; valore approximato de integrale es

$$(1/1 + 2/1.1 + 2/1.2 + \dots + 2/1.9 + 1/2)/20;$$

errore vale praecedente diviso per 100; ergo es negativo, et minore in valore absoluto de  $1/600$ .

$$\cdot 4 \quad \text{Hp}^1 \cdot \supset \cdot S(f, a^{-b}) = (b-a)f[(a+b)/2]$$

$$\begin{aligned} \cdot 5 \quad & \text{Hp}^2 \cdot \supset \cdot S(f, a^{-b}) - (b-a)f[(a+b)/2] \varepsilon (b-a)^2(D^2 f \cdot a^{-b})/24 \\ & [g = 1/f[(a+b)/2] + [x - (a+b)/2] Df[(a+b)/2] \cdot |x \cdot xsa^{-b} \cdot \supset \cdot \\ & f \cdot x - g \cdot x \varepsilon [x - (a+b)/2]^2 (D^2 f \cdot a^{-b})/2 \cdot \\ & S(g, a^{-b}) = (b-a)f[(a+b)/2] \cdot \\ & S_1[x - (a+b)/2]^2 |x, a^{-b}| = (b-a)^2/12 \cdot \supset \cdot \text{P} ] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cdot 6 \quad & \text{Hp}^2 \cdot \supset \cdot S(f, a^{-b}) = (b-a)(fa + fb)/2 \\ & - S[(x-a)(b-x) D^2 f \cdot x | x, a^{-b}]/2 \end{aligned}$$

$$[D[(2x-a-b)fx - (x-a)(x-b)Dfx]x = [2fx - (x-a)(x-b)D^2fx]x \quad (1)$$

$$\text{Incrém}; [(2x-a-b)fx - (x-a)(x-b)Dfx]x, a^{-1}b = (b-a)(fb+fa) \quad (2)$$

$$(1) \cdot (2) \cdot \text{Oper S} \cdot \text{D} \cdot \text{P}$$

Exprime differentia inter valore exacto de integrale, et valore approximato dato per formula de trapezio, sub forma de integrale.

✱ 45.

$$1 \quad f \varepsilon (qFq) \text{integ} \cdot \text{grad} f \leq 3 \cdot a, b \varepsilon q \cdot a < b \cdot \text{D}$$

$$S(f, a^{-1}b) = (b-a)\{fa+fb+4f[(a+b)/2]\}/6$$

$$[g = f[(a+b)/2 + z(b-a)/2] \mid z, q] \cdot \text{D} \cdot g \varepsilon (qFq) \text{integ} \cdot \text{grad} g = \text{grad} f \cdot$$

$$g(-1) = fa \cdot g0 = f[(a+b)/2] \cdot g1 = fb \cdot$$

$$S(f, a^{-1}b) = (b-a)/2 \times S[g, (-1)^{-1}] \quad (1)$$

$$p, q, r, s \varepsilon q \cdot g = [(p+qz+rz^2+sz^3) \mid z, q] \cdot$$

$$g(-1) = p - q + r - s \cdot g0 = p \cdot g1 = p + q + r + s \cdot$$

$$S[g, (-1)^{-1}] = 2p + 2r/3 = [g(-1) + 4g0 + g1]/3 \quad (2)$$

$$(1) \cdot (2) \cdot \text{D} \cdot \text{P}$$

Si  $f$  es functio integro, de gradu non superiore ad tres, tunc integrale de  $f$ , extenso ad intervallo de  $a$  ad  $b$ , vale amplitudo  $b-a$  de intervallo, multiplicato per valore medio arithmetico inter  $fa$ ,  $fb$  et  $f[(a+b)/2]$  cum pondo 1,1,4.

Cavalieri a.1639 p.446:

« Per havere la capacità della botte... moltiplicaremo la terza parte della lunghezza della botte..., in due cerchi maggiori ed uno dei minori... ».

Gregory, a.1668; Cotes, *opuscula* a.1722 p.33.

Simpson, a.1743 p.109. Plure Auctore voca formula praecedente « formula de Simpson ».

$$2 \quad a, b \varepsilon q \cdot a < b \cdot f, D^4 f \varepsilon qFa^{-1}b \cdot \text{D} \cdot S(f, a^{-1}b) -$$

$$(b-a)\{fa+fb+4f[(a+b)/2]\}/6 \varepsilon -(b-a)^4(D^4 f \cdot a^{-1}b)/(4! \cdot 5!)$$

$$[g = f[(a+b)/2 + x(b-a)/2] \mid x, -1^{-1}] \cdot \text{D} \cdot$$

$$S(f, a^{-1}b) = (b-a)/2 \times S(g, -1^{-1}) \quad (1)$$

$$\text{Hp}(1) \cdot h = [(1-x^2)g0 + x(1-x^2)Dg0 + x^2(1+x)/2 g1 + x^3(1-x)/2 g(-1)]x \cdot \text{D} \cdot$$

$$h \varepsilon (qfq) \text{integ} \cdot \text{grad} h \leq 3 \cdot h(-1) = g(-1) = fa \cdot h0 = g0 = f[(a+b)/2] \cdot$$

$$Dh0 = Dg0 \cdot h1 = g1 = fb \quad (2)$$

$$\text{Hp}(2) \cdot x \varepsilon -1^{-1} \cdot \text{D} \cdot gx - hx \varepsilon x^2(x^2-1)D^4 g'(-1^{-1})/4! \cdot$$

$$D^4 gx = (b-a)^4/16 D^4 f[(a+b)/2 + x(b-a)/2] \quad (3)$$

$$\text{Hp}(2) \cdot (3) \cdot \text{D} \cdot S(g, -1^{-1}) - S(h, -1^{-1})$$

$$\varepsilon D^4 g'(-1^{-1})/4! S[x^2(x^2-1) \mid x, -1^{-1}] \quad (4)$$

$$\text{Hp}(2) \cdot \text{P} \cdot 1 \cdot \text{D} \cdot S(h, -1^{-1}) = [h(-1) + 4h0 + h1]/3$$

$$= [fa + 4f[(a+b)/2] + fb]/3 \quad (5)$$

$$S[x^2(x^2-1) \mid x, -1^{-1}] = -4/15 \quad (6)$$

$$(1) \cdot (4) \cdot (5) \cdot (6) \cdot \text{D} \cdot \text{P}$$

Formula de P.1, exacto pro functiones de gradu 2 aut 3, es approximato pro functione arbitrario. Errore in isto approximatione vale minus amplitudo de intervallo de integratione, ad potestate 5, multiplicato pro uno ex valores de derivata de ordine 4, de functione  $f$  in intervallo, toto diviso per  $4! \cdot 5!$ .

Si nos applica ee regula ad exemplo de P.44.2,  $S(, 1^{-2}) = \log 2$ , nos habe valore approximato

$$(1/1 + 4/1 \cdot 5 + 1/2)/6 = 0.694 \dots$$

cum errore de forma  $-1/(120x^5)$ , ubi  $x \approx 1^{-2}$ ; ergo  $0.68 < \log 2 < 0.694 \dots$

$$\begin{aligned} \cdot 3 \quad \text{Hp}^2 \cdot n \in \mathbb{N}_1 \cdot \bigcup \cdot S(f, a^{-b}) \\ \varepsilon(b-a) \{ f a + f b + 2 \sum \{ f[a + 2r(b-a)/n] \}^r, 1 \dots (n-1) \} + \\ 4 \sum \{ f[a + (2r+1)(b-a)/(2n)] \}^r, 0 \dots (n-1) \} \cdot (6n) - \\ (b-a)^5 (D^4 f(a^{-b})) / (4! \cdot 5! \cdot n^4) \end{aligned}$$

Si nos divide intervallo de  $a$  ad  $b$  in  $n$  partes, et nos applica ad omni parte formula praecedente, nos obtine valore magis approximato de integrale. Differentia decresce ut numero de partes ad potestate 4.

Si, in exemplo praecedente, nos pone  $n=5$ , resulta :

Valore approximato

$$\begin{aligned} &= [1 \cdot 1 + 1/2 + \\ &+ 2(1/1 \cdot 2 + 1/1 \cdot 4 + 1/1 \cdot 6 + 1/1 \cdot 8) \\ &+ 4(1/1 \cdot 1 + 1/1 \cdot 3 + 1/1 \cdot 5 + 1/1 \cdot 7 + 1/1 \cdot 9)]/30 \\ &= (1 \cdot 5 + 2 \times 2 \cdot 72818 + 4 \times 3 \cdot 45955 \dots)/30 \\ &= 20 \cdot 79456 \cdot 30 = 0.693152 \end{aligned}$$

Errore vale errore in calculo praecedente, diviso per  $5^4 = 625$ ; ergo errore es negativo, et minore in valore absoluto de  $1/75000$ . Sequit:

$$0.69314 < \log 2 < 0.693152.$$

Calculo numerico cum formula  $\cdot 3$  es paucio plus complexo que calculo cum formula P.44.3, et approximatione fit 100 vice majore.

Me da expressiones de restos P.2.3 in « *Applicazioni geometriche* a.1887, p.206 ».

F. Rimondini, *Sul calcolo approssimato degli integrali doppi*, Torino A. a.1904-05, extendit formula P.2 ad integrale duplo.

$$\cdot 4 \quad \text{Hp}^1 \cdot \bigcup \cdot$$

$$\begin{aligned} S(f, a^{-b}) &= (b-a) \{ f a + 3f[(2a+b)/3] + 3f[(a+2b)/3] + f b \} \\ &\quad \cdot \text{NEWTON, a.1711, Opuscula t.1 p.281} \end{aligned}$$

Vide formulas successivo in Formul. t.4, p.187.

\* 46.

Arcu

 $u \in \text{Intv} \cdot p \in p f u \cdot \supset:$ 
 $\cdot 0 \quad \text{Chorda}(p, u) = \text{mod}(p' u - p l_1 u) \quad \text{Def}$ 
 $\cdot 1 \quad h \in \text{Cls}' u \cdot \text{Num} h \in N_1 \cdot l_1 u, l' u \in h \cdot \supset. \text{polyg}(p, u, h) = \sum [\text{Chorda}(p, \min_{r+1} h \neg \min_{r+1} h) | r, 1 \dots (\text{Num} h - 1)] \quad \text{Def}$ 
 $\cdot 2 \quad \text{Arcu}(p, u) = l' [\text{polyg}(p, u, h) | h' \text{Cls}' u \wedge h \exists (\text{Num} h \in N_1 \cdot l_1 u, l' u \in h) \quad \text{Def}$ 

Si  $u$  es intervallo, et  $p$  es puncto mobile functione de variabile (tempore) in intervallo  $u$ , tunc  $\text{Chorda}(p, u)$  vale distantia de positiones extremo de puncto.

Et, si  $h$  es classe de valores in  $u$  in numero finito, continente extremos de  $u$ , vel si  $h$  es divisione de intervallo  $u$  in partes (vide pag. 340), tunc  $\text{polyg}(p, u, h)$ , lege « longitudo de linea polygonale inscripto in trajectory de  $p$  in intervallo  $u$  diviso per valores  $h$  » indica summa de chordas.

$\text{Arcu}(p, u)$  « arcu descripto per puncto  $p$ , quando variabile varia in  $u$  » es limite supero de lineas polygonale inscripto, respondente ad omni divisione  $h$  de intervallo  $u$  in partes.

Vide pag. 117.

**arcu** : A.F. arc, H.I. arco, D. (raro) arcus.

F. arche, A. arch, R. arca arcada (in Architectura).

 $\cdot 3 \quad Dp \in (vFu) \text{cont} \cdot \supset. \text{Arc}(p, u) = S(\text{mod } Dp, u)$ 

Si puncto mobile  $p$  habe derivata continuo in toto intervallo  $u$ , tunc arcu vale integrale de valore absoluto de derivata (velocitate) de  $p$ .

Dem.

 $x, y \in u \cdot x < y \cdot \S D \text{ P44} \cdot \supset. py - px \in (y - x) \text{ Mod } Dp' x \neg y \quad \cdot 1$ 

Sume duo valore  $x$  et  $y$  in  $u$ . Theorema de valore medio (pag. 312) dice que vectore differentia de duo puncto vale incremento de variabile multiplicato per valore medio de derivata in intervallo.

 $\text{Hyp. 1)} \cdot \supset. \text{Chorda}(p, x \neg y) \leq (y - x) l' \text{mod } Dp' x \neg y \quad (2)$ 

Ergo chorda que uni punctos  $px$  et  $py$  es minore de incremento de tempore multiplicato per limite supero de valores absoluto de velocitate in idem intervallo.

$h \in \text{Cls}'u . \text{Num} h \in N_1 . 1, u, 1'u \in h . (2) \supset$

$$\text{poly}g(p, u, h) \leq s'(\text{mod}Dp, u, h) \quad (3)$$

Et si  $h$  es divisione de intervallo  $u$  in partes, ex definitione de numero  $s'$  (pag. 346) resulta que linea polygonale inscripto in trajectoria de  $p$ , in intervallo  $u$ , diviso per valores  $h$ , es minore de summa  $s'$  respondente ad functione  $\text{mod}Dp$ , in intervallo  $u$ , diviso per valores  $h$ .

$$(3) . \text{Df Arcu} \supset \text{Arcu}(p, u) \leq S'(\text{mod}Dp, u) \quad (4)$$

Unde, ex definitione de arcu, resulta que arcu es minore de integrale supero de valore absoluto de velocitate.

$$\text{Hyp}(1) \supset \text{Arc}(p, x \neg y) \leq \text{Chorda}(p, x \neg y) \quad (5)$$

$$\supset \text{Arc}(p, x \neg y) \cdot (y - x) \leq \text{mod}[(py - px)(y - x)] \quad (6)$$

Si  $x$  et  $y$  es duo valore, ut in Prop. (1), nos habe que arcu supera chorda; unde arcu diviso per intervallo de tempore supera chorda diviso per idem intervallo.

$$x \in u . (4) . (6) \supset D[\text{Arcu}(p, 1, u \neg x) x, u] x = \text{mod}Dp x \quad (7)$$

$$(7) \supset P$$

Ergo, si  $x$  es valore in intervallo dato, derivata de arcu descripto per  $p$ , ab extremo infero de intervallo, ad  $x$ , facto pro  $x$ , vale valore absoluto de velocitate. Integratione duce ad formula.

$$4 \quad Dp \in (vFu)\text{cont} . x \in u . Dp x = 0 \supset$$

$$\lim[\text{Arcu}(p, x \neg y) / \text{Chorda}(p, x \neg y) | y, u, x] = 1$$

$$[P.3 \supset \lim[\text{Arc}(p, x \neg y) / \text{mod}(y - x) | y, u, x] = \text{mod}Dp x \quad (1)$$

$$\text{Df } D \supset \lim[d(p, x, y) / \text{mod}(y - x) | y, u, x] =$$

$$\lim[\text{mod}[(py - px)(y - x)] | y, u, x] = \text{mod}Dp x \quad (2)$$

$$(1) . (2) \supset P]$$

Si puncto  $p$  habe derivata continuo, et pro valore  $x$ , differente de 0, tunc limite de arcu descripto in intervallo ab  $x$  ad  $y$ , diviso per chorda respondente, ubi  $y$  verge ad  $x$ , vale 1.

$$5 \quad Dp \in vF'' . 1' \text{ mod } Dp' u \in Q \supset$$

$$S(\text{mod}Dp, u) \leq \text{Arc}(p, u) \leq S'(\text{mod}Dp, u)$$

Casu de derivata non continuo, sed limitato.

#### \* 47. (Cx|p) P 46.

Nos extendit definitione de arcu ad numero complexu de ordine arbitrario, in locu de puncto.

Interessante es casu de functione reale de variabile reale.

$u \in \text{Intv} . f \in qfa \supset \text{Arcu}(f, u) = \text{variatione de functione } f \text{ in intervallo } u$  secundo Jordan a. 1893. Vide Scheffer, ActaM. t. 5. H. Lebesgue a. 1904 p. 62.

\* 48.

Long

"ε Cls'q .⊃.

$$\text{Long}_i u = 1' \{ h \times \text{Num } n \wedge p \exists [(p + \theta)h \supset u] \} | h' Q \{ \quad \text{Df}$$

$$\text{Long}' u = 1, \{ h \times \text{Num } n \wedge p \exists [\exists (p + \theta)h \wedge u] \} | h' Q \{ \quad \text{Df}$$

$$\text{Long } u = \iota (\text{Long}_i u \wedge \iota \text{Long}' u) \quad \text{Df}$$

Si  $u$  es classe de quantitates reale, tunc nos sume aliquo quantitate positivo  $h$ , et considera segmentos inter duo valores successivo de

$$\dots -2h, -h, 0, h, 2h, \dots$$

vel de  $ph$ , ubi  $p$  es n. Numero de segmentos parte de figura  $u$ , multiplicato per  $h$ , longore commune de illos, si varia  $h$ , habe limite supero. quem nos indica per  $\text{Long}_i u$ , lege « longore infero de classe  $u$  ».

Numero de segmentos que habe aliquo puncto commune cum  $u$ , multiplicato per  $h$ , quando  $h$  sume omni valore positivo, habe limite infero. indicato per  $\text{Long}' u$ , lege « longore supero de  $u$  ».

$\text{Long} u$ , lege « longore de  $u$  », es valore commune de longore supero et de longore infero; habe sensu, si ce duo longore coincide.

Definitiones præcedente es analogo ad Df de  $S'$ ,  $S$ ,  $S$ .

Stolz, MA. a.1884 t.23 p.152 et Cantor AM. a.1884 t.4 p.388 considera  $\text{Long}'$ .  $\text{Long}$ , et  $\text{Long}$  occurre in meo libro a. 1887 p. 155, et in Jordan a. 1893 p. 28.

L. **longo**: F. long, H. luengo, I. lungo, Port. longo.

⊃ long-i-metria A.D.F.H.I.R.

⊂ E. longho: A. long, D. lang.

L. **longitudo**, longitudine; A.F. longitude, H. longitud, I. longitudine (in Geographia).

⊃ A.D.F.H. longitudin-al.

= **longore** (non L.), F. long-ueur.

= long-itia (non L.), I. lunghezza.

= H. long-ura.

= A. length (|| long-itia), D. Länge (|| long-io-ne)

·1 "ε Intv .⊃.  $\text{Long}' u = \text{Long}_i u = \text{Long} u$

Si classe  $u$  es intervallo, suo longitudo supero et infero et proprio vale differentia de extremos, ut es definitio in pag. 142.

·2  $r \in \text{Cls}' \text{Intv} . \text{Num } v \in N_0 . \supset .$

$$\text{Long}' \bigcup r = \text{Long}_i \bigcup v = \text{Long} \bigcup r$$

Si  $v$  es systema de plure-intervallo in numero finito, tunc figura  $\bigcup r$ , reunione de intervallos  $v$ , summa, in sensu logico, de intervallos  $v$ , habe longore supero æquale ad infero.

Differentia inter longores supero et infero de  $u$  vale longore supero de campo  $amu$  (p.142).

Campo  $\eta$  (p. 104) de numeros rationale minore de 1, habe 1 pro longore supero, et 0 pro longore infero.

$$\text{Long}'u = \text{Long}_i u = \text{Long}u = 0$$

Si campo  $u$  es limitado, es si habe numero finito de elementos (tunc grupo derivato  $= \Lambda$ ), vel numero infinito, sed grupo derivato habe numero finito de elementos, vel numero infinito sed numerabile, tunc longore supero (et infero et proprio) de  $u$  es nullo.

Classe de numeros, que es expresso in fractione, analogo ad decimale sed in base 3, pro solo cifras 0 et 2, es perfectio, et habet longore supero nullo.

Classe perfecto habe potestate de continuo, ut es scripto in pag.141, Prop.5'3. Ergo existe classe perfecto, de longore nullo.

Et existe classe perfecto, condensato in nullo intervallo, id es  $\delta u$  continue nullo intervallo, et longore supere de classe non es nullo.

$$\begin{aligned} \text{Long}_i u = & \text{! } x \exists [\text{! } (o, i, h) \exists \{ o \text{ exp} \cdot i \text{ ev} \cdot i^2 = 1 \cdot u \supset \text{recta}(o, i) \cdot \\ & h \in Q \cdot x = h \times \text{Num } p \exists [p \in \mathbb{N} \cdot o + (p + \Theta) h i \supset u] ] \quad \text{Df} \end{aligned}$$

$$x = h \times \text{Num } p_3[p_{\text{en}} . \exists[o+(p+\Theta)hi] \wedge u_i] \quad \text{Dr}$$

$$\cdot 3 \quad \text{Long} u = \iota(\iota \text{Long}' u \cap \iota \text{Long} u) \quad \text{Df}$$

$u$  es classe de punctos, vel figura, et existe recta  $a$  que contine  $u$ ; id es  $u$  es classe de punctos super recta. Tunc sume puncto  $o$  et vectore unitario  $i$ , in modo que  $u$  jace super recta  $(o, i)$ ; sume quantitate positivo  $h$ . Divide recta in segmentos de longore  $h$ , cum punctos

$$\dots, o-2hi, o-hi, o, o+hi, o+2hi, \dots$$

Segmento inter duo puncto consecutivo habet expressionem  $o + (p + \theta)hi$ , ubi  $p$  est numero integer positivus aut negativus aut nullus.



Numera segmentos que cōtinere in  $u$ :

$$\text{Nump}\exists [p\in n . o+(p+\Theta)hi \supset u];$$

et multiplica illo per longore commune de segmentos  $h$ ; resulta quantitate  $x$  que depende de  $o, i, h$ . Sume limite supero de valores de  $x$ , pro omni triade  $o, i, h$ , compatibile cum conditiones scripto. Ce limite vocare « longore infero de  $u$  », et indicare per  $\text{Long}_u$ .

Si nos numera segmentos que habe aliquo puncto commune cum  $u$ , et multiplica per  $h$ , et sume limite infero, resulta « longore supero de  $u$  », indicato per  $\text{Long}'u$ .

Si longore infero æqua supero, valore commune vocare « longore proprio de  $u$  », et indicare per  $\text{Long } u$ .

$$\cdot 4 \quad a, b \in p . \supset . \text{Long}(a-b) = d(a, b)$$

Longore de segmento vale distantia de suo extremos.

$$* \quad 50.0 \quad u \in \text{Cls}'q . l' \text{mod } u \in Q . f \in qFu . \supset .$$

$$Sf = S \vee (qFq) \wedge g\exists(x \in u . \supset_x . gx = fx : x \in q-u . \supset_x . gx = 0)$$

Df

$$\cdot 01 \quad (S'|S)P \cdot 0$$

$$\cdot 02 \quad (S|S)P \cdot 0$$

Df

Si  $u$  es classe de numeros reale finito; et  $f$  es functione reale definita in campo  $u$ , id es, considerato simul cum campo de variabilitate, tunc  $Sf$  « integrale de  $f$  » es integrale de illo functione definita per omni valore reale de variabile, que pro omni  $x$  in campo  $u$ , redde  $gx = fx$ , et pro omni valore non in  $u$ , vale 0. Idem pro integrale supero et infero.

$$\cdot 1 \quad u \in \text{Cls}'q . l' \text{mod } u \in Q . \supset .$$

$$\text{Long}'u = S'(\iota 1 : u) . \text{Long}_u = S(\iota 1 : u)$$

Si  $u$  es classe limitata, tunc longitudo supero de  $u$  vale integrale supero de functione que habe valore constante 1 in campo  $u$  (et 0 ex campo  $u$ ). Longitudo infero vale integrale infero.

Vide Poussin, *Cours d'Analyse*, a. 1903 t. 1 p. 221.

## \* 51. NOVO CONDITIONE DE INTEGRABILITATE.

$$u \in \text{Cls}'q . f \in qFu . x \in \delta u . \supset . l'fx = \max Lm(f, u, x)$$

Def

$$lfx = \min Lm(f, u, x)$$

—

$$Ofx = l'fx - lfx$$

—

Si  $u$  es classe de quantitates, et  $f$  es quantitate functione definita in campo  $u$ , et  $x$  es elemento de classe derivata de  $u$ , tunc  $l'fx$ , lege « limite supero de functione  $f$  in  $x$  », vel « extremo oscillatorio supero de

functione  $f$  in  $x$  » indica maximo valore de classe « limes » (pag. 230) de functione  $f$ , ubi variabile sume valores in campo de variabilitate de  $f$ , et verge ad  $x$ .

Symbolo  $l'fx$  vale  $(l'f)x$ , vel  $l'(f,x)$ ; non habe sensu  $l'(fx)$ . Nam ente definito depende de  $f$  et de  $x$ , et non de numero  $fx$ . Vide observatione analogo pro derivata, in pag. 276.

Idem pro  $l'fx$  « limite infero, vel extremo oscillatorio infero de functione  $f$  in  $x$  ».

$O'fx$  vocare « oscillatione de functione  $f$  in puncto  $x$  ».

$$\cdot 1 \quad u \in \text{Intv} . f \in \text{qFu} . l'f'u, l'f'u \in \text{q} . \supset . \\ S'(f,u) = S'(l'f, u) . S_l(f, u) = S_l(l'f, u) . S'(f,u) - S_l(f, u) = S'(O'f, u)$$

Integrales supero et infero de functione  $f$  in intervallo  $u$  æqua integrales de extremos oscillatorio de  $f$ .

Differentia de integrales de  $f$  vale integrale supero de oscillatione de  $f$  in intervallo dato. Vide Poussin, *Cours d'Analyse* a. 1903 p. 221; Lebesgue a. 1904 p. 35.

Ex definitione de integrale, seque (pag. 342): « ut integrale existe, es necesse et suffice que integrale supero æqua infero ».

Ergo « ut functione  $f$  es integrabile in  $u$ , es necesse et suffice que integrale supero de oscillatione de functione in  $u$  es nullo ».

Ante consideratione de integrales supero et infero (a. 1875, vide pag. 343), Riemann (a. 1854; publicato a. 1867; Werke pag. 226) exprime conditione de integrabilitate sub forma, que Du Bois Reymond a. 1882 p. 189, habe reducto ad:

$$\cdot 2 \quad S(f,u) \in \text{q} . =: h \in \text{q} . \supset . \text{Long}' u \wedge x \exists (O'fx > h) = 0$$

Ut functione  $f$  es integrabile, es necesse et suffice que, si  $h$  es quantitate positivo, parvo ad arbitrio, gruppo de  $u$ , ubi oscillatione de functione supera  $h$ , habe longore supero nullo.

Ce conditione sume novo forma, post introductione de novo idea de longore, indicato per « long » et definito ut seque.

$$\ast \quad 52. \quad u \in \text{Cls}'\text{q} . \supset .$$

$$\text{long} u = l'x \exists [\exists \text{Cls}'\text{Intv} \wedge v \exists (u \supset \bigcup v . x = \text{Long}, \bigcup v)] \quad \text{Df}$$

Dato  $u$ , classe de quantitates, sume classe  $v$  de intervallos (in numero infinito), tale que omni  $u$  pertine ad aliquo  $v$ , vel classe  $u$  continere in summa, in sensu logico, de  $v$ . De ce systema de intervallos  $\bigcup v$  sume longore infero  $x$ ; id es, inscribere in  $\bigcup v$  classe de intervallos in numero finito, et sume longore supero de longore proprio de ce classe de intervallos. Limite infero de  $x$ , ubi varia classe  $v$  de intervallos, es indicato per « long  $u$  », quo me voca « longore medio de  $u$  ».

Ergo «longore medio» es limite infero de classe de quantitates, que es limite supero de alio quantitates.

$$\cdot 1 \quad \text{Long}'u \supseteq \text{long}u \supseteq \text{Long}_i u$$

$$\cdot 2 \quad \text{Num}u = \text{Num}N_0 \cdot \supset \cdot \text{long}u = 0$$

$$\begin{aligned} [x \in (u \text{FN}_0) \text{rep} \cdot h \in \mathbb{Q} \cdot v = (x_n \pm \theta h/2^n) | n \cdot N_0 \cdot \supset \\ v \in \text{Cls}'\text{Intv} \cdot u \supset \cup v \cdot \text{Long}_i v = 4h \cdot \supset \cdot \text{long}u < 4h \cdot \supset \cdot \text{long}u = 0] \end{aligned}$$

Si  $u$  es classe numerabile de punctos,  $\text{long}u$  vale 0.

In vero nos pote pone numeros  $u$  in correspondentia reciproco cum numeros naturale  $x_0 x_1 \dots$  Nunc si nos comprehende omni elemento  $x_n$  de  $u$  in intervallo de centro  $x_n$ , et de radio  $h/2^n$ , longore interno de ce intervallos, vel limite supero de longores de numero finito de intervallos in illos, vale  $4h$ , quantitate parvo ad arbitrio.

$$\cdot 3 \quad \text{long}\eta = 0$$

$$[\S \text{Num P10} \cdot 7 \text{ (pag. 137)} \cdot \supset \cdot \text{Num}\eta = \text{Num}N_0 \cdot \text{P} \cdot 2 \cdot \supset \cdot \text{P}]$$

$$\cdot 4 \quad u \in \text{Intv} \cdot f \in \text{qf}u \cdot l'f'u, l'f'u \text{eq} \cdot \supset :$$

$$S'(f, u) = S(f, u) \cdot = \cdot \text{long}'u \wedge x \exists [\lim(f, u, x) = f(x)] \cdot = 0$$

Si  $f$  es functio reale definita in intervallo  $u$ , limitata supra et infra, tunc conditione necessario et sufficiente pro integrabilitate de functione, es que longore medio de classe de punctos in  $u$ , ubi functione  $f$  non es continuo, es nullo.

Mirabile transformatione de criterio de integrabilitate.

Conditione de integrabilitate es expresso per conditione de classe de punctos ubi functione es discontinuo.

Ce theorema es invento in idem tempore, per Lebesgue et Vitali, in plure publicatione, et in modo explicito:

Lebesgue. *Leçons sur l'intégration*, Paris a.1904, p.29. Vitali, *Sulla integrabilità delle funzioni*, Rendiconti Ist. Lomb. a.1904, p.73.

$$\cdot 5 \quad \text{Hp} \cdot 4 \cdot r \in \text{Cls}'u \cdot \text{Num}r \in N_0 \cup \text{Num}N_0 \cdot f \in [\text{qf}(u-r)] \text{cont} \cdot \supset \cdot S(f, u) \text{eq} \quad [ \text{P} \cdot 1 \cdot 3 \supset \text{P} ]$$

Si functione  $f$  es continuo, excepto punctos in numero finito, aut infinito numerabile, tunc functione es integrabile. Seque de Prop. præcedente.

$$\cdot 6 \quad u \in \text{Intv} \cdot f, g \in \text{qf}u \cdot S(f, u), S(g, u) \text{eq} \cdot h \in \text{qf}(f'u : g'u) \text{cont} \cdot \supset \cdot S[h(fx, gx) | x, u] \text{eq}$$

Functione  $h$  continuo de plure functione  $f, g$  integrabile, es integrabile.

## \* 53.

## Area

$u \in \text{Cls}'p . \exists p, u \exists (u \supset a) . \supset$

1  $\text{Area}'u = l'x \exists [\exists (o, i, j, h) \exists \{ o \in p . i, j \in v . i^2 = j^2 = 1 . i \times j = 0 .$

$u \supset \text{plan}(o, i, j) . h \in Q . x = h^2 \times \text{Num}(p, q) \exists [p, q \in n .$

$o + (p + \theta)hi + (q + \theta)hj \supset u] \}$  Df

2  $\text{Area}'u = l'x \exists [\exists (o + (p + \theta)hi + (q + \theta)hj) \wedge u] \}$  Df

3  $\text{Area}u = l(\iota \text{Area}'u \wedge \iota \text{Area}_p u)$  Df

Si  $u$  es classe de punctos, vel figura, in aliquo plano  $a$ , tunc sume puncto  $o$  et duo vectore  $i, j$  unitario et orthogonale, in plano de  $u$ , et numero positivo  $h$ . Divide toto plano in quadratos, de vertices  $o + phi + qhj$ , ubi  $p$  et  $q$  es numero integro, positivo aut negativo. Numero de quadratos interno ad figura  $u$ , multiplicato per  $h^2$ , area de uno quadrato, da area de figura ex quadratos in  $u$ . Numero de quadrato que habe aliquo puncto commune cum  $u$ , da area de figura ex quadratos que contine  $u$ . Limite supero de area de figuras interno ad  $u$ , vocare  $\text{Area}'u$  « area infero de  $u$  », et limite infero de area de figuras continente  $u$  vocare  $\text{Area}'u$  « area supero de  $u$  ».

Si duo area es æquale, nos voca « area proprio », et indica per  $\text{Area}u$ , valore commune de illos.

L. **area**: A.D.H.I. area, F. aire.

$\supset$  F. are: A. are, D. ar, I. ara, R. ar' = 100 m<sup>2</sup>.

\* 54.  $o \in p . i, j \in v . i^2 = j^2 = 1 . i \times j = 0 .$ 

$u \in \text{Cls}'\text{plan}(o, i, j) . l' \text{mod}(u - u) \in Q . \supset$

1  $x \in q . \supset_x . \text{Long}'\{\lambda u \wedge \lambda [\text{plan}(o, i, j) - u] \wedge (o + ix + jq)\} = 0 : \supset$

$\text{Area}u = S\{\text{Long}[u \wedge (o + ix + jq)]\} . x, q\}$

Si  $o$  es puncto, et  $i, j$  es vectore unitario et orthogono, et si  $u$  es classe de elementos (puncto) in plano  $o, i, j$ , et limite supero de distantia de duo puncto de figura es finito, tunc per puncto  $o + xi$ , de abscissa  $x$ , duce recta paralelo ad  $j$ :  $o + ix + jq$ . Me voca, in modo provisorio, fine (perimetro) de figura  $u$  punctos pertinente ad classe limite de  $u$ , et ad classe limite

de punctos de plano que non es  $u$ ; id es « fine  $u$  » =  $\lambda u \wedge \lambda[\text{plan}(o, i, j) = u]$ . Si recta  $o + ix + jq$  seca campo fine de  $u$  secundo figura rectilineo que habe longore supero nullo pro omni valore de  $x$ , tunc area de figura  $u$  vale integrale de longore de sectione de recta  $o + ix + jq$  cum figura  $u$ , ubi  $x$  varia et sume omni valore reale. In hypotesi scripto, ce figura rectilineo habe longore proprio, functione continuo de  $x$ , ergo integrabile, et figura  $u$  habe area proprio.

Demonstratione es simile ad Dem. de P 57.1, infra.

$$\cdot 2 \quad \text{Area}' u \leq S_i \{ \text{Long}' [\lambda u \wedge (o + ix + jq)] | x, q \}$$

$$\cdot 3 \quad \text{Area}, u \leq S'_i \{ \text{Long}, [u - \lambda[\text{plan}(o, i, j) = u] \wedge (o + ix + jq)] | x, q \}$$

In omni casu, nos habe limitationes pro area supero et infero.

$$\cdot 4 \quad k \in \text{Intv} \cdot f \in \text{Qfk} \text{ l}' f' k, \text{ l} f' k \in \text{eq} \cdot \supset. \\ \text{Area}' \bigcup [o + xi + (\Theta f x)j | x, k] = S'(f, u) \\ \text{Area}, \text{-----} S_i \text{-----}$$

Si in intervallo  $k$  es dato functione  $f$  positivo, limitato supra et infra, tunc  $o + xi + (\Theta f x)j =$  « segmento rectilineo inter punctos  $o + xi$  et  $o + xi - (fx)j$  ». Si varia  $x$  et sume valores in classe  $k$ , resulta classe de segmentos. Summa, in sensu logico, de ce segmentos, id es figura descripto per ce segmento variabile, habe area supero et infero æquale ad integrale supero et infero de  $f$  in  $k$ . Es interpretatione de integrale, in pag.339 et sequentes.

$$\ast \quad 55.1 \quad o \in p \cdot u, r \in v \cdot \supset. \text{Area}(o + \theta u + \theta v) = \text{mod}(uav) \\ \text{Area de parallelogrammo.}$$

$$\cdot 2 \quad a, b, c \in p \cdot a = b \cdot \supset. \text{Area}(a - b - c) = d(a, b) \times d[c, \text{recta}(a, b)] \cdot 2 \\ = \text{mod}[(b - a)a(c - a)] \cdot 2 \\ = \sqrt{[d(a, b) + d(b, c) + d(c, a)][d(a, b) + d(b, c) - d(c, a)][d(a, b) - d(b, c) + d(c, a)][-d(a, b) + d(b, c) + d(c, a)]} / 4$$

Area de triangulo. Suo expressione per lateres es de Herone. Vide pag.265 Prop.2.6.

$$\cdot 3 \quad o \in p \cdot a, b \in v \cdot a^2 = b^2 = 1 \cdot a \times b = 0 \cdot i = b' a \cdot k \in \text{Intv} \cdot \\ r \in (\text{qfk}) \text{cont} \cdot \supset. \text{Area}[o + z(r)t e^{it} a] | (z, t)'(\Theta, k) = S[(r)t^2 | t, k] \cdot 2$$

Puncto de coordinatas polare  $z(r)t$  et  $t$ , si  $z$  varia inter 0 e 1, et  $t$  in intervallo  $k$ , describe area expresso per integrale.



de distantia de duo puncto de figura es finito, sume puncto  $o$  et vectore unitario  $i$ . Si pro omni abscissa  $x$ , plano per puncto  $o+xi$ , et normale ad  $i$  [plano de tripuncto  $(o+xi)ai$ , vide pag. 198, 199] seca campo fine de  $u$  secundo figura de area supero nullo, tunc volumen de  $u$  vale integrale de area de sectione de  $u$  cum plano per puncto  $o+xi$ , et normale ad  $i$ , ubi varia  $x$ , et sume omni valore reale.

Dem.

$$j,kev. j^2=k^2=1. i \times j=j \times k=k \times i=0.$$

Sume alio duo vectore  $j$  et  $k$ , unitario, et orthogonale inter se et cum  $i$ .

$$xeq. g.x = \text{Volum}, u \cap [o+(x-Q)i+qj+qk].$$

$$g'.x = \text{Volum}' \quad " \quad " \quad " \quad "$$

Sume quantitate  $x$ , voca  $g.x$  et  $g'.x$  volumen infero et supero de parte de figura  $u$  que es in semispatio de punctos cum abscissa minore de  $x$ .

$$heQ. a = (n:n) \cap (p,q) \cap [o+xi+(p+\theta)hj+(q+\theta)hk] \supset \text{in } u].$$

$$b = \quad " \quad " \quad " \quad " \quad " \quad \cap \text{am } u = \Lambda].$$

$$c = \quad " \quad " \quad " \quad " \quad " \quad \supset \text{ex } u].$$

Sume quantitate positivo  $h$ ; divide toto plano  $o+xi+qj+qk$  in quadratos de latere  $h$ ; et voca  $a$  dyades de numeros integro  $p$  et  $q$ , tale que quadrato correspondente  $o+xi+(p+\theta)hj+(q+\theta)hk$  es toto interno ad  $u$ .

Voca  $b$  dyades de quadratos que habe aliquo puncto commune cum fine de  $u$ .

Voca  $c$  dyades de quadratos externo ad  $u$ .

$$l = \text{dist}:[o+xi+(p+\theta)hj+(q+\theta)hk] | (p,q)'(a \cap c), \text{ am } u: \supset. l \in Q$$

Voca  $l$  distantia de figura composito de quadratos  $a$  et  $c$ , ab campo fine de  $u$ . Distantia de duo figura (pag.176 Prop.22'3) es limite infero de distantias de punctos de uno figura ab punctos de altero. Si ambo figura es clauso, vale distantia minimo. In nostro casu, figuras es clauso, et habe nullo puncto commune; ergo  $l$  es quantitate positivo non nullo.

$$ye x+\theta l. \supset. [o+x'yi+(p+\theta)hj+(q+\theta)hk] | (p,q)'a \supset u \cap (o+xi+qj+qk) \\ \supset \quad " \quad " \quad " \quad " \quad " \quad (a \cap b)$$

Si  $y$  es abscissa inter  $x$  et  $x+l$ , tunc figura composito de parallelepipedo, de basi quadratos  $a$ , et de altitudine vectore  $(y-x)i$ , es parte de strato de figura  $u$ , inter planos normale ad  $i$ , per punctos  $o+xi$  et  $o+yj$ ; ce strato es parte de parallelepipedos de basi quadratos  $a$  et  $b$ , et de idem altitudine.

$$\text{Volumen de figura inscripto} = (y-x) \times h^2(\text{Num}a);$$

$$\text{Volumen infero de strato} = g.y - g'.x;$$

$$\text{Volumen supero} = g'.y - g'.x;$$

$$\text{Volumen de figura circumscripto} = (y-x) \times h^2(\text{Num}a + \text{Num}b).$$

Divide per  $y-x$ :

$$ye x+\theta l. \supset. h^2(\text{Num}a) \leq D(g';x,y) \leq D(g';x,y) \leq h^2(\text{Num}a + \text{Num}b)$$

nam formula subsiste et pro  $y < x$ .

Nunc si  $y$  verge ad  $x$ , et derivata de  $g$ , et  $g'$  non es supposito:

$$\text{Lm}[Dg,;x,y)y,q,x] \supset h^2(\text{Num}a + \theta \text{Num}b)$$

"  $g'$  " " " "

Varia  $h$  in omni modo, et sume limites supero et inféro de secundo membro:

$$\text{Lm}[D(g,;x,y)|y,q,x] \supset \text{Area}[\text{in } u \cap (o+xi+qj+qk)] + \theta \text{Area}'[\text{am } u \cap (o+xi+qj+qk)]$$

Classe limes de ratione incrementale de  $g$ , continere in area inféro de sectione de campo interno ad  $u$  cum plano  $(o+xi, Ii)$ , plus fractione de area sectione cum campo fine.

Per hypothesi, ultimo area es nullo; ergo area de sectione cum campo in  $u$ ,  $\lambda u$  et  $u$  es æquale. Classe Lm consta ex uno solo individuo:

$$Dg, x = Dg', x = \text{Area}[u \cap \text{plan}(o+xi, Ii)]$$

Integra ab  $-\infty$  ad  $x$ ;  $g, x$  et  $g', x$  es nullo pro valore de  $x$  minore de abscissa de omni puncto de figura. Ergo:

$$g, x = g', x = S[\text{Area } u \cap \text{plan}(o+xi, Ii) \mid x, x-Q]$$

Et si  $x$  verge ad  $+\infty$ , vel nos tribue ad  $x$  valore superiore ad abscissa de omni puncto, seque theorema.

Regula pro calculo de area (Prop.54) et de volumen (Prop.56) occurre in Kepler et in Cavalieri a.1635 libro 2 Prop.3:

« Figurae planae habent inter se eandem rationem, quam eorum omnes lineae iuxta quamvis regulam assumptae; Et figurae solidae, quam eorum omnia plana iuxta quamvis regulam assumpta ».

Enunciatione de hypothesi es recente.

Vide meo libro: *Applicazioni geometriche* a.1887 p. 178 221.

$$2 \quad \text{Volum}'u \leq S_1[\text{Area}'[\lambda u \cap \text{plan}(o+xi, Ii)] \mid x, q\}$$

$$3 \quad \text{Volum}u \geq S'_1[\text{Area}[\text{in } u \cap \text{plan}(o+xi, Ii)] \mid x, q\}$$

\* 58.

$$5 \quad o \in p \cdot u, v, w \in v \cdot \supset \cdot \text{Volum}(o+\theta u+\theta v+\theta w) = \text{mod}(uavaw, \psi)$$

Volumen de parallelepipedo super vectores  $u, v, w$  æqua valore absoluto de ratione de trivectore  $uavaw$  ad trivectore unitario  $\psi$ . Vide p.188, 198, 199 P 22.4.

$$6 \quad a \in p \cdot b \in p \cdot u \cdot c \in p \cdot \text{recta}(a, b) \cdot d \in p \cdot \text{plan}(a, b, c) \cdot \supset \cdot$$

$$\text{Volum}(a-b-c-d) = \text{Area}(a-b-c) \times d[d, \text{plan}(a, b, c)] \cdot 3$$

Tetrahedro.



\* 59. VOLUMEN DE CYLINDRO ET DE CONO

$a \varepsilon p, . u \varepsilon \text{Cls}'a . \text{Area} u \varepsilon Q . \supset$ :

$$1 \quad i \varepsilon v \neq 0 . \supset . \text{Volum}(u + \theta i) = \text{Area} u \times \text{mod} i \times \sin(i, a)$$

Si  $a$  es plano, et  $u$  es figura in plano  $a$ , cum area determinato, tunc, si  $i$  es vectore non nullo, volumen de cylindro aut prisma que resulta si ad omni puncto de  $u$  nos adde fractione de vectore  $i$ , vale area de basi  $u$ , per modulo de  $i$ , per sinu de angulo de  $i$  cum plano  $a$ .

$$2 \quad o \varepsilon p . \supset . \text{Volum}(o^- u) = \text{Area} u \times d(o, a) / 3$$

Et volumen de cono aut pyramide, que resulta si nos junge puncto  $o$  cum omni puncto de  $u$  vale area de basi  $u$  per distantia de  $o$  ab plano  $a$ , divisio 3.

$$[ \text{Hp} . i \varepsilon v . i^2 = 1 . p \varepsilon a . a = \text{plan}(p, Ii) . h = d(o, a) . \supset .$$

$$\text{Volum}(o^- u) = S[\text{Area}(o^- u) \wedge \text{plan}(o + xi, Ii | x, \theta h)] \\ = S[\text{Area} u \times (x/h)^2 | x, \theta h] = \text{Area} u \times h/3 ]$$

In vero, sume vectore  $i$  unitario, et normale ad plano  $a$ . Voca  $h$  distantia de  $o$  ab  $a$ . Volumen quaesito vale integrale de area de sectione in cono de plano per puncto  $o + xi$ , et normale ad  $i$ , ubi varia  $x$  ab 0 ad  $h$ . Cono partiale de altitudine  $x$  es homothetico ad cono dato; ergo areas es ut quadratos de altitudines. Ergo area sectione in puncto  $o + xi$  vale area  $u \times (x/h)^2$ . Post integratione cum regula de potestates, pag.350, seque formula.

Propositione occurre in Euclide L. XII Prop.7, pro pyramide, Prop.10 pro cono de revolutione, et in Cavalieri a.1635 l.7 Prop.8 pro cono generale:

« Quilibet cylindricus triplus est conici in eadem basi, & altitudine cum eo existentis ».

\* 60. VOLUMEN DE SPHERA.

$$o \varepsilon p . r \varepsilon Q . \supset . \text{Volum} \{ p \wedge x \exists [d(x, o) < r] \} = 4\pi r^3 / 3$$

Si  $o$  es puncto, et  $r$  es quantitate positivo, tunc volumen de solido formato per punctos que dista de  $o$  minus que  $r$ , id es, volumen de sphaera de centro  $o$  et de radio  $r$  vale  $4\pi r^3 / 3$ .

$$[ \text{Hp} . i \varepsilon v . i^2 = 1 . \supset . \text{Volum} \{ p \wedge x \exists [d(x, o) < r] \} = \\ S[\text{Area} \text{plan}(o + zi, Ii) \wedge x \exists [d(x, o + zi) < \sqrt{r^2 - z^2}] | z, (-r)^- r ] = \\ S[\pi (r^2 - z^2) | z, (-r)^- r ] = 2\pi r^3 S[(1 - t^2) | t, \theta] = 4\pi r^3 / 3 ]$$

Invero, nos sume vectore unitario ad arbitrio  $i$ . Tunc volumen quæsitum vale integrale de area de sectione in sphaera cum plano passante per puncto  $o+zi$ , et normale ad  $i$ , que es circulo de centro  $o+zi$ , et de radio  $\sqrt{r^2-z^2}$ , ubi integrale es extenso de  $-r$  ad  $+r$ . Ce area vale  $\pi(r^2-z^2)$ , et post integratione, nos habet valore scripto.

{ ARCHIMEDE t.1 p.40: Πᾶσα σφαῖρα τετραπλασία ἐστὶ κώνου τοῦ βάσιν μὲν ἔχοντος ἴσην τῷ μεγίστῳ κύκλῳ τῶν ἐν τῇ σφαίρᾳ, ὕψος δὲ τὴν ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σφαίρας. }

\* 61.  $a, b \in p. (\text{Sym}) b = b. r \in Q. \supset$

$$\text{Volum } p \wedge x \exists [d(x, a) < r. d(x, b) < r] = 2r^3/3$$

Parte commune ad cylindros, que habet pro axi duo recta  $a$  et  $b$ , que se secant ad angulo recto, et radios æquales.

\* 62. VOLUMEN IN COORDINATAS CURVILINEO.

$x_0, x_1 \in q. y_0, y_1 \in (qF x_0 \neg x_1) \text{cont. } z_0, z_1 \in [qF (x, y) \exists (x \in x_0 \neg x_1. y \in y_0 \neg y_1) \text{cont. } c = (x, y, z) \exists [x \in x_0 \neg x_1. y \in y_0 \neg y_1. z \in z_0(x, y) \neg z_1(x, y)] . p \in (pFc) \text{sim. } D_1 p \wedge D_2 p \wedge D_3 p / \psi \in (QFc) \text{cont. } \supset$   
 $\text{Volum } p \wedge c = S[S]S[D_1 p(x, y, z) \wedge D_2 p(x, y, z) \wedge D_3 p(x, y, z) / \psi$   
 $[z, z_0(x, y) \neg z_1(x, y)] [y, y_0 \neg y_1] [x, x_0 \neg x_1]$

Es dato duo quantitate  $x_0$  et  $x_1$ , et duo functione  $y_0, y_1$  definito in intervallo  $x_0 \neg x_1$ , et continuo, et duo functione  $z_0$  et  $z_1$  definito de dyades  $(x, y)$  tale que  $x$  es in  $x_0 \neg x_1$ , et  $y$  es in  $y_0 \neg y_1$ . Nos voca  $c$  campo de triade  $(x, y, z)$  tale que  $x$  es in  $x_0 \neg x_1$ ,  $y$  in  $y_0 \neg y_1$ ,  $z$  in  $z_0(x, y) \neg z_1(x, y)$ ;  $p$  es puncto functione de triades de systema  $c$ , et ad valores differente de  $x, y, z$  responde punctos differente, et ratione de trivectore super tres derivata de  $p(x, y, z)$  pro  $x, y, z$  ad trivectore unitario  $\psi$  es functione positivo et continuo in campo  $c$ . Tunc volumen loco de puncto  $p$ , pro triades de campo  $c$ , resulta ut seque:

In  $D_1 p(x, z, z) \wedge D_2 p(x, y, z) \wedge D_3 p(x, y, z) / \psi$  varia  $z$  inter  $z_0(x, y)$  et  $z_1(x, y)$  et integra. Postea varia  $y$  inter  $y_0$  et  $y_1$ , et integra. In fine varia  $x$  inter  $x_0$  et  $x_1$ , et integra. Integrale triplo meto volumen quæsitum.

Regula præcedente es sæpe exposito ut seque.

Parallelepipedo descripto per puncto  $p(x, y, z)$  si  $x, y, z$  varia in intervallos infinitesimo de amplitudine  $dx, dy, dz$ , vale

$$D_1 p(x, y, z) \wedge D_2 p(x, y, z) \wedge D_3 p(x, y, z) / \psi \, dx \, dy \, dz,$$

vel  $m dx dy dz$ , ei nos voca  $m$  coefficiente de  $dx dy dz$ .

Varia  $z$  inter  $z_0$  et  $z_1$ , et summa parallelepipedos:

$$(f m dz) dx dy$$

mete volumen de « filo » infinitesimo, descripto per puncto  $p(x, y, z)$ , ubi  $x$  et  $y$  varia in intervallos infinitesimo  $dx$  et  $dy$ , et  $z$  in intervallo finito  $z_0(x, y) \text{---} z_1(x, y)$ .

Varia  $y$  inter  $y_0 x$  et  $y_1 x$ , et summa filis:

$$[f(m dz) dy] dx$$

mete « strato » descripto per puncto, ubi  $x$  varia in intervallo infinitesimo  $dx$ , et  $y$  et  $z$  intervallos finito.

Varia  $x$  inter  $x_0$  et  $x_1$  et summa stratos:

$$f[f(m dz) dy] dx$$

mete volumen.

Variabiles  $x, y, z$  unde depende puncto  $p$  vocare suo « coordinatas curvilineo ».

Propositione es considerato in plure libro ut evidente. Non existe demonstratione elementare. Vide infra, integrales multiplo.

### \* 63. AREA DE SUPERFICIE NON IN PLANO.

«  $\mathcal{C}$ ls'p . Volum  $u = 0$  .  $\supset$  .

$$\text{area } u = \lim \{ \text{Volum} \{ p \in x \exists [d(x, u) < h] \} / (2h) \mid h, Q, 0 \} \quad \text{Df}$$

Si  $u$  es figura, et suo volumen es nullo, vel  $u$  es superficie curvo, considera solido formato de punctos que dista de  $u$  minus que  $h$ , quantitate positivo dato; divide volumen de isto strato per  $2h$ , suo spissore. Limite de ratione, si  $h$  verge ad 0, vocare « area de figura  $u$  ».

Si figura  $u$  es in plano, « area  $u$  » nunc definito = Area'  $u$ . de Prop. 53.

Ce definitione de area es dato per Borchardt a.1854, JfM. t.19 p.369; et per Minkowski a.1901.

Super differentes definitione dato per area de superficie curvo, vide Formulario, t. 4, p.300-301,

Lebesgue, Intégrale, Longueur, Aire; Ann. di Mat. a.1902.

Fréquet, Sur une généralisation des notions d'aire, NouvAdM. t.4 a.1904.

Sibirani, Periodico di Matematica a.1905.



\* 66.  $u \in \text{Cls}'p . \text{area } u = 0 . \supset$

$\text{arc } u = \lim \{ \text{Volum}[p \wedge x3[1, \text{mod}(x-u) < h]/(\pi h^3)] \mid h, Q, 0 \} \quad \text{Df}$

Si  $u$  es classe de punctos, que habe extensione superficiale nullo, tunc « arc  $u$  » indica limite de volumen de filo formato de punctos que dista de  $u$  minus que  $h$ , diviso per area de sectione  $\pi h^2$ , ubi  $h$  verge ad 0.

Si  $p$  es puncto mobile, functione de variabile (tempore) in intervallo  $k$ , si  $p$  es functione continuo, et si nullo arcu es descripto duo vice, Arcu( $p, k$ ), arcu descripto per  $p$  in intervallo  $k$ , ut es definitio in pag. 370, = arc( $p'k$ ), id es mensura lineare de figura loco de punctos  $p$  in intervallo  $k$ .

·1  $o \varepsilon p . i \varepsilon v-t0 . r \varepsilon Q . \supset$

$\text{Long}\{p \wedge x3[d(x, o) = r . (x-o) \times i = 0]\} = 2\pi r$

·2  $o \varepsilon p . r \varepsilon Q . u \varepsilon \text{Cls}'p \wedge x3[d(x, o) = r] . \text{area } u \varepsilon Q . \supset$

$\text{Volum}(o^-u) = r \times \text{area } u / 3$

Volumen de sectore de sphæra, de radio  $r$ , et de basi figura  $u$  in superficie de sphæra, vale radio per area basi, diviso per 3.

·3  $o \varepsilon p . r \varepsilon Q . u \varepsilon \text{Cls}'p \wedge x3[d(x, o) = r] . \text{arc } u \varepsilon Q . \supset$

$\text{area}(o^-u) = r \times (\text{arc } u) / 2$

·4  $i \varepsilon v-t0 . o \varepsilon p . u \varepsilon \text{Cls}'\text{plan}(o, Ii) . \text{arc } u \varepsilon Q . \supset$

$\text{area}(u + \theta i) = \text{arc } u \times \text{mod } i$

Area de cylindro.

·5  $o \varepsilon p . i \varepsilon v-t0 . a \varepsilon \theta \pi / 2 . \supset$

$\text{area}\{p \wedge x3[\text{ang}(x-o, i) = a . (x-o) \times i \varepsilon \theta i^2]\} = \pi i^2 \text{sina} / (\cos a)^2$   
Cono de revolutione; angulo ad vertice  $2a$ , altitudo  $\text{mod } i$ .

·6  $o \varepsilon p . i \varepsilon v-t0 . a \varepsilon \theta \pi / 2 . u \varepsilon \text{Cls}'p \wedge x3[\text{ang}(x-o, i) = a] .$

$\text{area } u \varepsilon Q . \supset . \text{area}[\text{proj plan}(o, Ii)]'u = (\text{area } u) \cos a$

·7  $a \varepsilon p . o \varepsilon a . r \varepsilon Q . h \varepsilon \theta . \supset$

$\text{Volum } p \wedge x3[d[x, a \wedge y3[d(y, o) = r]] < h \} = 2\pi^2 r^3 h .$

$\text{area } p \wedge x3[d[x, a \wedge y3[d(y, o) = r]] = h \} = 4\pi^2 r h$

} KEPLER a.1615 t.4 p.582:

« Omnis annulus sectionis circularis... est aequalis cylindro, cujus altitudo aequat longitudinem circumferentiae, quam centrum figurae circumductae descripsit, basis vero eadem est cum sectione annuli ». !

VIII

APPLICATIONES AD GEOMETRIA  
ET COMPLEMENTO



## VIII. APPLICATIONES AD GEOMETRIA ET COMPLEMENTO

§ 1-27 es reproductione de *Theoria de Curvas* per Dr. G. PAGLIERO assistente de *Analysi infinitesimale* in *Universitate de Torino*, publicato in anno 1905-06.

### §1 Parabola

$o \in p . a, b \in v . a^2 = b^2 = 1 . a \times b = 0 . i = b/a . \supset \therefore$

$p = [(o + 2xia + x^2a) | x, q] . f = o + a . d = \text{recta}(o - a, ia) . x \in q . \supset$

Si  $o$  es puncto,  $a$  et  $b$  es vectore unitario et orthogonale, et si  $i$  indica rotatione que porta  $a$  in  $b$ , et si  $p$  habe expressione scripto, tunc puncto  $px$ , si  $x$  varia, et sume omni valore reale, genera curva dicto « parabola ».  $o$  es « vertice »,  $f$  es « foco ».  $d$  es « directrice »,  $\text{recta}(o, a)$  es « axi ».

\* 1.1  $px = f + (x + i)^2 a$

2  $d(px, f) = d(px, d) = x^2 + 1$  } PAPPO I.VII p.1012 {

Omni puncto de parabola æquidista ab foco et ab directrice.

[  $d(px, o + a) = \text{mod}[(x + i)^2 a] = \text{mod}[(x + i)^2] = [\text{mod}(x + i)]^2 = x^2 + 1$   
 $= d(o + 2xia + x^2 a, o + 2xia - a) = d[px, \text{recta}(o - a, ia)]$  ]

3 [Sym  $\text{recta}(o, a)$ ]  $px = p(-x)$

Symmetrico pro  $\text{recta}(o, a)$  de puncto  $px$  es puncto  $p(-x)$ . Ergo  $\text{recta}(o, a)$  es « axi de symmetria » de parabola.

4  $X, Y \in q . \supset : o + Xa + Yia \in p'q . = . Y^2 = 4X$

Conditione necessario et sufficiente ut punto de coordinatas numeros reale  $X, Y$  es super parabola, es æquatione scripto, que vocare « æquatione de parabola ».

\* 2.0  $Dpx = 2(x + i)a . D^2px = 2a$

1  $\text{recta}Tpx = [o + (2x + z)ia + (x^2 + zx)a] | z'q$

[  $\text{recta}Tpx = \text{recta}(px, Dpx) = \text{recta}(o + 2xia + x^2 a, ia + xa) = \dots$

2  $o + iax, o - ax^2 \in \text{recta}Tpx$

Intersectione de tangente cum axi  $(o, a), (o, ia)$ .





## §2 Ellipsi

Hp §1 .  $m, n \in \mathbb{Q} . m > n . p = [(o + m \cos x + n \sin x) | x, q] .$

$$f = o + a \sqrt{m^2 - n^2} . d = \text{recta}[o + m^2 a \sqrt{m^2 - n^2}, ia] .$$

$$f' = o - \quad \quad \quad . d' = \quad \quad \quad . x \in \mathbb{Q} . \supset :$$

$x$  = anomalía de eccentro (Kepler, *Astronomia nova*, a.1609, Opera t.3 p.408). Punctos  $f, f'$  es vocato « focos » (Kepler), rectas  $d, d'$  es « directrices » (De l'Hospital).

$$* \quad 1.0 \quad X, Y \in \mathbb{Q} . \supset : o + Xa + Yia \varepsilon p'q . = . X^2/m^2 + Y^2/n^2 = 1$$

$$.01 \quad r, u \in \mathbb{Q} . \supset : f + r e^{iu} a \varepsilon p'q . = .$$

$$r = \sqrt{m^2 - n^2} / [1 + (1/m) \sqrt{m^2 - n^2} \cos u]$$

$$.1 \quad px = o + [(m+n)e^{ix} + (m-n)e^{-ix}]a/2$$

[ § e P13.4 .  $\supset$  . P ]

Alí expressione de puncto de ellipsi ; resulta de relatione inter functiones trigonometrico et exponentiale p.251.

$$.2 \quad [\text{Sym recta}(o, a)]px = p(-x) .$$

$$[\text{Sym recta}(o, ia)]px = p(\pi - x) . (\text{Sym } o)px = p(\pi + x)$$

Ellipsi habet pro axi de symmetria recta  $(o, a)$  et recta  $(o, ia)$ , et pro centro  $o$ .

$$.3 \quad d(px, f) + d(px, f') = 2m \quad \quad \quad \} \text{APOLLONIO l. 3 § 52 et 51}$$

$$.4 \quad d(px, f) = m - \sqrt{m^2 - n^2} \cos x = \sqrt{m^2 - n^2} / m \quad d(px, d)$$

$$.5 \quad d(px, f') = m + \quad \quad \quad = \quad \quad \quad d(px, d')$$

} PAPPO VII P 235 et 238

$$* \quad 2.1 \quad Dpx = (-msx + inc.x)a = [(m+n)e^{ix} - (m-n)e^{-ix}]ia/2 \\ = p(x + \pi/2) - o$$

Vectores  $px - o, p(x + \pi/2) - o$  es « hemi-diametros coniugato ».

$$.2 \quad (px - o)^2 + [p(x + \pi/2) - o]^2 = m^2 + n^2$$

$$.3 \quad d \{ \text{proj}(\text{rectaT } px) f, o \} = m$$

Projectione de uno foco super tangente in uno puncto de ellipsi dista ab centro de quantitate constante  $m$ . Vel, podaria de ellipsi, relativo ad foco, es circulo de centro puncto  $o$ , et de radio  $m$ .

$$.4 \quad x = \varepsilon n\pi . \supset . \text{rectaT } px = \text{recta}[px, U(px - f) - U(px - f')]$$

$$.5 \quad \text{rectaN } px = \text{recta}[px, U(px - f) + U(px - f')]$$

$$.6 \quad o + (m+n)e^{ix}a \varepsilon \text{rectaN } px$$

$$\cdot 7 \quad d(f, \text{rectaT } px) \times d(f', \text{rectaT } px) = n^2$$

} KEILL LondonT. a. 1709!

$$\cdot 8 \quad d(px, f) \times d(px, f') = (Dpx)^2$$

$$\cdot 9 \quad d[f, (\text{Sym rectaT } px)f'] = 2m$$

$$\cdot 91 \quad (px-o) a [p(x+\pi/2)-o] = mn(ab)$$

$$\ast \quad 3 \cdot 0 \quad D^2 px = -(px-o)$$

$$\cdot 1 \quad Cc \, px = o + [n(\cos x)^2 - m(\sin x)^2] a(m^2 - n^2) / (mn)$$

$$\cdot 2 \quad Rc \, px = (Dpx)^2 / d(o, \text{rectaT } px) = (\text{mod } Dpx)^2 / (mn)$$

$$\ast \quad 4 \cdot 1 \quad \text{Area } o^- p^2 2\theta\pi = \pi mn$$

} ARCHIMEDE *Περί κωνοειδέων* P5 {

$$\cdot 1 \quad x \in 2\theta\pi \supset \text{Area}(o^- p^2 6x) = mn.r/2$$

$$\begin{aligned} \cdot 2 \quad \text{Arc}(p, 2\theta\pi) &= 4S \{ \sqrt{(m \sin x)^2 + (n \cos x)^2} \mid x, \theta\pi/2 \} \\ &= 2\pi m \{ 1 - \sum [I_1[1 - (2r)^2]^2 \mid r, 1 \dots s] (1 - n^2/m^2)^s / (2s-1) \mid s, N_1 \} \\ &= \pi(m+n) \sum [C(2, r)^2 [(m-n)/(m+n)]^{2r} \mid r, N_0 \} \\ &= \pi(m+n) \{ 1 + [(m-n)/(m+n)]^2 / 4 + [(m-n)/(m+n)]^4 / 64 + \dots \} \end{aligned}$$

$$\cdot 3 \quad \text{Arc}(p, 2\theta\pi) > \pi(m+n)$$

} KEPLERO a.1609 t.3 p.401 :

« Tota elliptica circumferentia est proxime medium arithmeticum inter circulum diametri longioris et circulum diametri brevioris » . :

$$\cdot 4 \quad \text{Arc}(p, 2\theta\pi) < \pi(m+n) + \pi(\sqrt{m} - \sqrt{n})^2 / 2$$

ParisCR. a.1889 p.360.

$$\cdot 5 \quad \text{Arc}(p, 2\theta\pi) < \pi \{ m+n + \sqrt{2(m^2+n^2)} \} / 2$$

} HARTMANN HoffmannZ. t.30 p.256 {

**Ellipsi.** A. ellipsis, D.F. ellipse, H. elipsi, I. ellissi, R. elipsis'

⊂ G. *ἐλλειψι-ς*. = (in origine) defectu.

⊂ en (p.311) + lip(e) (|| L. linque) + -si.

### §3 Hyperbola

$$\text{Hp } §1 \quad m, n \in \mathbb{Q} \quad p = [o + (m+in)ax + (m-in)a\bar{x}] \cdot r, \quad q \neq 0;$$

$$f = o + 2a\sqrt{m^2+n^2} \quad d = \text{recta}[o + 2m^2/\sqrt{m^2+n^2}] a, \quad id \quad .$$

$$f' = o - \quad \quad \quad d' = \quad \quad \quad - \quad \quad \quad .$$

$$x \in q \neq 0 \supset .$$

\* 1.0  $x, y \in q \supset o + xa + yia \varepsilon p'q \implies x^2/m^2 - y^2/n^2 = 4$

•1  $[\text{Sym recta}(o, a)] px = p(x)$

•2  $[\text{Sym recta}(o, ia)] px = p(-x) \quad (\text{Sm } o)px = p(-x)$   
 $o$  es « centro »;  $\text{recta}(o, a)$  et  $\text{recta}(o, ia)$  es « axi »;  $o \pm 2ma$  es « vertice ».  
 Puntos  $f, f'$  es « focos », rectas  $d, d'$  es « directrices ».

\* 2.0  $x D_p x = (m + in)ax - (m - in)a \cdot x$   
 $qx = o + 2(m + in)ax \quad rx = o + 2(m - in)a \cdot x \supset$

•1  $qx, rx \varepsilon \text{ rectaT } px \quad px = (qx + rx) \cdot 2$

•2  $oa(rx)a(qx) = 4mn(aab)$   
 $\text{recta}[o, (m \pm in)a]$  es « asymptotos »;  $px - o, px - rx$  es « hemi-diametros coniugato ».

\* 3.1  $\text{mod}[d(px, f) - d(px, f')] = 4m$

•2  $d(px, f) = \text{mod}[(x + \sqrt{x})(m^2 + n^2) - 2m] =$   
 $\sqrt{(m^2 + n^2)/m} \times d(px, d) = d(px, d \wedge \text{recta}[px, (m \pm in)a])$

•3  $d[\text{proj}(\text{rectaT } px) f, o] = 2m$

•4  $d[\text{Sym rectaT } px) f, f'] = 4m$

•5  $d(f, \text{rectaT } px) \times d(f', \text{rectaT } px) = 4n^2$

\* 4.1  $x = \pm 1 \supset \text{rectaT } px =$   
 $\text{recta}[px, U(px - f) + U(px - f')]$

•2  $\text{rectaN } px = \text{recta}[px, U(px - f) - U(px - f')]$

\* 5.1  $Cc px = o + [n(x + \sqrt{x})^2 - m(x - \sqrt{x})^2]a (m^2 + n^2) (4mn)$   
 $x \varepsilon 1 + Q \supset$

•2  $\text{Arca } o - p' 1 - x = 2mn \log x$   
 } •2 GREGORIUS a S. Vinc. a.1647 p.594 {

•3  $\text{Arc}(p, 1 - x) =$   
 $\sqrt{(m^2 + n^2)S} \sqrt{[1 + 2(n^2 - m^2)[(n^2 + m^2)x^2 + x^4]]x, 1 - x}$

**Hyperbola** A., D. hyperbel, F. hyperbole, H. hiperbola, I. iperbola  
 R. giperbola.  $\subset$  G. ὑπερβολή.  $\subset$  hyper (|| L. super) + bola (v. para bola)  
**Asymptoto**, ADF asymptote, R asimptota.

$\subset$  G. ἀσύμπτωτος (Eutocio) = non coincidente.

$\subset$  a- ( $\supset$  A.D.F.H.I.R. a-chromatico a-mnestia a-tomo ... || L. in- D. un-) + syn- (p.20) + pto- ( $\supset$  A.-R. sym-ptoma || L. pete) + -to.

## §4. Parabola de vario ordine.

Hp §1 .  $m, n \in \mathbb{Q} \neq 0$  .  $k = q^n x^3 (x^n, x^m \in \mathbb{Q})$  .

$$p = [(o + x^n a + x^m i a) | x, k] . x \in k . \supset .$$

$$\cdot 0 \quad x, y \in \mathbb{Q} . \supset : o + x a + y i a \in p^k . = . x^m = y^n$$

$$\cdot 1 \quad o + (m - n) x^n a / m \in \text{recta} T \quad p x$$

$$\cdot 2 \quad m + n - 2 = 0 . \supset . \text{Cc } p x = \\ p x + (n^3 x^{3n-3} + m^3 x^{3m-3}) \text{D} p x [mn(m+n-2)x^{m+n-3}]$$

$$\cdot 3 \quad m + n \in \mathbb{Q} . \supset . \text{Area} \bigcup [(o + x^n a)^{-p x} | x, \Theta x] = n x^{m+n} / (m+n)$$

$$\cdot 4 \quad y, z \in \mathbb{Q} . y < z . \supset . \text{Arc}(p, y^{-z}) = \\ S[\sqrt[n^3 x^{3n-3} + m^3 x^{3m-3}] | x, y^{-z}]$$

Parabola de ordine  $m, n$ . Pro  $m, n = -1$  curva es hyperbola.

## §5 Linea exponentiale

\* 1. Hp §1.  $p = \{[o + (x + i e^x) a] | x, q\} . x \in \mathbb{Q} . \supset .$

$$\cdot 1 \quad o + (x - 1) a \in \text{recta} T \quad p x$$

$$\cdot 2 \quad \lim \{ d [ p x, \text{recta} (o, a) ] | x, q, -\infty \} = 0$$

$$\cdot 3 \quad \text{Cc } p x = o + [(x - 1 - e^{2x}) + i(2e^x + e^{-x})] a \\ = p x + (e^x + e^{-x})(i - e^x) a$$

$$\cdot 4 \quad \text{Rc} p x = e^{-x}(1 + e^{2x}) \sqrt{3/2}$$

$$\cdot 5 \quad \text{Rc} p(-\log 2/2) = 3\sqrt{3/2} = \min(\text{Rc} p, q)$$

$$y, z \in \mathbb{Q} . y < z . \supset .$$

$$\cdot 6 \quad \text{Arc}(p, y^{-z}) = S[\sqrt{1 + e^{2x}} | x, y^{-z}] = \\ 1/\sqrt{1 + e^{2x}} + \log[\sqrt{1 + e^{2x}} - 1] - x | x; y, z \}$$

$$\cdot 7 \quad \text{Area} \bigcup [p x - (o + x a) | x, y^{-z}] = S(e^x | x, y^{-z}) = e^x - e^y \\ \{ \cdot 1 \cdot 7 \text{ TORRICELLI a.1644 } \}$$

$$\cdot 8 \quad \text{Volum} \bigcup [\mu(2\pi o a a)[(o + x a)^{-p x}] | x, y^{-z}] \\ = \pi S(e^{2x} | x, y^{-z}) = \pi(e^{2x} - e^{2y})/2$$

$$\cdot 9 \quad \text{area} \bigcup [\mu(2\pi o a a) p x | x, y^{-z}] = 2\pi S[e^x \sqrt{1 + e^{2x}} | x, y^{-z}] \\ = \pi X 1 [e^x \sqrt{1 + e^{2x}} + \log\{e^x + \sqrt{1 + e^{2x}}\} | x; y, z \}$$

Linea vocare et « curva logarithmica ».

Recta  $(o, a)$ , de que in P.2, es « asymptoto ».

\* 2. Hp§1.  $m \varepsilon Q_{-1} . p = \{[o + (x + im^x)a] | x, q\} . x \varepsilon q . \supset .$

·1  $o + (x - / \log m)a \varepsilon \text{recta} T p x$

·2  $\lim \{ d [p x, \text{recta}(o, a)] | x, q, -\infty \} = 0$

·3  $C c p x = o + \{ (x - / \log m - m^{2x} \log m) + i [2m^x + m^{-x} / (\log m)^2] \} a$   
 $= p x + \{ m^x + m^{-x} / (\log m)^2 \} (i - m^x \log m) a$

$y, z \varepsilon q . \supset .$

·4  $\text{Arc}(p, y^{-z}) = S \{ \sqrt{1 + (m^x \log m)^2} | x, y^{-z} \} = (/ \log m) \times$   
 $A \{ \sqrt{1 + (m^x \log m)^2} + \log \{ \sqrt{1 + (m^x \log m)^2} - 1 \} \}$   
 $- x \log m | x, y, z \}$

·5  $\text{area} \bigcup [p x - (o + x a) | x', y^{-z}] = S(m^x | x, y^{-z}) =$   
 $(m^z - m^y) / \log m$

### §6 Catenaria, Tractória.

\* 1. Hp§1.  $p = \{[o + a x + i a (e^x + e^{-x}) / 2] | x, q\} . x \varepsilon q . \supset .$

·1  $|\text{Sym recta}(o, i a) | p x = p(-x)$

·2  $D p x = a + i a (e^x - e^{-x}) / 2$

·3  $\text{mod } D p x = (e^x + e^{-x}) / 2$

·4  $d(o + a x, \text{recta} T p x) = 1$

$r x = o + a x + a (e^{2x} - e^{-2x}) / 4 . \supset .$

·5  $r x \varepsilon \text{recta} N p x$

·6  $C c p x = o + a x + (e^x + e^{-x}) i a - (e^{2x} - e^{-2x}) a / 4 = (\text{Sm } p x) r x$

·7  $\text{Rc} p x = d(p x, r x) = (e^x + e^{-x})^2 / 4$

·8  $x \varepsilon Q . \supset . \text{Arc}(p, \Theta x) = \text{Area} \bigcup [(o + x a) - p x | x', \Theta x] =$   
 $S[(e^x + e^{-x}) / 2 | x, \Theta x] = (e^x - e^{-x}) / 2$

·9  $x \varepsilon Q . \supset . \text{Volum} \bigcup \{ \mu(2\pi o a a) [(o + x a) - p x] | x', \Theta x \} =$   
 $(2) \text{area} \bigcup \{ \mu(2\pi o a a) p x | x', \Theta x \} = (e^{2x} - e^{-2x} + 4x) \pi / 8$

Catenaria es positione de æquilibrio de catena grave homogeneo.

{ LEIBNIZ a.1691 t.5 p.246 }

P.7. Radio de curvatura vale normale usque ad axi  $(o, a)$ .

\* 2. HpP1.  $q = \{ [px - \text{Arc}(p, \Theta x) \text{UD} px] \mid x, Q_0 \} . x \varepsilon Q_0 . \supset$ .

$$\cdot 0 \quad qx = o + [x - (e^x - e^{-x} - 2i)(e^x + e^{-x})]a$$

$$\cdot 01 \quad \lim \{ d[px, \text{recta}(o, a)] \mid x, Q_0, \infty \} = 0$$

$$\cdot 1 \quad Dqx = (e^x - e^{-x} - 2i)(e^x - e^{-x})(e^x + e^{-x})^2 a$$

$$\cdot 2 \quad \text{mod } Dqx = (e^x - e^{-x})^2 (e^x + e^{-x})$$

$$\cdot 3 \quad \text{recta} Nqx = \text{recta}(px, qx)$$

$$\cdot 4 \quad o + xa \varepsilon \text{recta} Tqx \quad \cdot 5 \quad d(qx, o + xa) = 1$$

$$\cdot 6 \quad Ccqx = px$$

$$\cdot 7 \quad Rcqx = d(px, qx) = (e^x - e^{-x})/2$$

$$\cdot 8 \quad \text{Arc}(q, \Theta x) = S[(e^x - e^{-x})(e^x + e^{-x}) \mid x, \Theta x] = \log[(e^x + e^{-x})/2]$$

$$\cdot 9 \quad \text{area} \bigcup [qx - \text{proj}[\text{recta}(o, a) \mid qx] \mid x, Q_0] = \pi/4$$

Puncto  $qx$  de P·0, si  $x$  varia et sume omni valore reale, genera « tractoria », evolvente de catenaria. Recta  $(o, a)$ , de que in P·01, es « asymptoto ». Puncto  $o + ia$  que es « vertice » de catenaria, es « cuspid » pro tractoria.

P·3·4 Si nos uni cum filo puncto  $qx$  ad puncto  $o + xa$ , que describe recta  $(o, a)$ , tunc filo es semper longo 1, et puncto  $qx$  move se in directione de filo. Unde vocabulo ori.

**Catenaria** A.I. (Jac. Bernoulli Ac. Er. a. 1690), F. chainette, D. Kettenlinie.  $\subset$  catenari(o) + -a (indice de feminine; intellige « linea »).

catenario (L. a. + 50 circa) = de catena.  $\subset$  catena + -rio.

catena A.I., A. chain, F. chaîne, H. cadena, D. kette.

**Tractoria** (Huygens, Joh. Bernoulli).  $\subset$  trah(e) + -tor + -ia

## §7 Sinusoide.

Hp§1 .  $p = [(o + ax + ia \sin x) \mid x, q] . x \varepsilon q . \supset$ .

$$\cdot 1 \quad n \varepsilon \mathbb{N} . \supset . [S_m(o + n\pi a)] px = p(2n\pi - x) .$$

$$\{ \text{Sym} [\text{recta}(o + (2n+1)\pi a/2, ia)] \} px = p[(2n+1)\pi - x]$$

$$\cdot 2 \quad \text{Transl}(2\pi a) px = p(2\pi + x) .$$

$$\text{Transl}(\pi a/2) (o + ax + ia \cos x) = p(\pi/2 + x)$$

$$\cdot 3 \quad Dpx = a + ia \cos x \quad . \quad D^2 px = -ia \sin x$$

$$\cdot 4 \quad \text{Mod } Dpx = \sqrt{1 + \cos^2 x}$$

$$\cdot 5 \quad o + (x - \text{tr}) \varepsilon \text{recta} Tpx$$

- 6  $Cc\,px = px - ia(1+icx)(1+cx^2)/sx$   
 ·7  $Rcp\,x = (1+cx^2)\sqrt{3/2}/sx$   
 ·8  $\text{Arc}(p, \Theta\pi/2) = S[\sqrt{1+cx^2}|x, \Theta\pi/2] = S[\sqrt{sx^2+2cx^2}|x, \Theta\pi/2]$   
 ·9  $x \in \Theta\pi \supset \text{Area} \bigcup [(o+xa)^{-}pv|x', \Theta x] = S(s, \Theta x) = 1-cx$   
 ·10  $\text{Area Med } p' \Theta\pi = 2$   
 ·11  $\text{Volum} \bigcup \{\mu(2\pi oaa)[(o+xa)^{-}px]|x', \Theta\pi/2\} = \pi^2/4$   
 ·12  $\text{area} \bigcup \{\mu(2\pi oaa)px|x', \Theta\pi/2\} = \pi[\sqrt{2} + \log(1+\sqrt{2})]$   
 « Linea sinuum » (Wallis), « Cycloidis socia » (Roberval).  
 Omni puncto  $o + \pi\alpha$  es centro de symmetria.  
 Sinusoide habe infinito centro, et infinito axi de symmetria.  
**Sinusoides**, voce internationale.  $\subset$  sinus + -oide.

## §8 Tangentoide

- Hp§1 .  $p = [(o+ax+ia \operatorname{tng} x)|x, -\pi/2 \pi/2] \cdot x \in -\pi/2 \pi/2 \supset$   
 ·0 (Sym  $o$ ) $px = p(-x)$   
 ·1  $Dpx = a + ia, cx^2$   
 ·2  $o + a + ia \in \text{rectaTp}0 \quad o + ax - as(2x)/2 \in \text{rectaTp}x$   
 ·3  $Ccpx = px + ia(1+i(cx^2)(1+cx^2))/s(2x)$   
 ·4  $Rcp\,x = (1+cx^2)\sqrt{3/2}/[s(2x)cx^2]$   
 $x \in \theta\pi/2 \supset$   
 ·5  $\text{Area} \bigcup [(o+xa)^{-}pv|x', \Theta x] = S(tx|x, \Theta x) = -\log cx$   
 ·6  $\text{Volum} \bigcup \{\mu(2\pi oaa)[(o+xa)^{-}px]|x', \Theta x\} = \pi(tx-x)$

## §9 Curva de luce

- Hp§1 .  $p = [(o+xa+ia \log \cos x)|x, 0-\pi/2] \cdot x \in 0-\pi/2 \supset$   
 ·1  $Dpx = a - iatx \quad D^2px = -ia \operatorname{cr}^2$   
 ·2  $\text{mod } Dpx = \operatorname{cr}$   
 ·3  $Ccpx = px - ia - atx$



$$\cdot 4 \quad Rcp x = /cx$$

$$\cdot 5 \quad \text{Area } \bigcup [px - (o + xa) | x' 0 - \pi/2] = S(\log c, \Theta \pi/2) = (\pi/2) \log 2$$

$$\cdot 6 \quad x \in \Theta \pi/2 \cdot \bigcup. \text{Arc}(p, \Theta x) = S(c, \Theta x) = \log t(\pi/4 + x/2)$$

Trajectoria de radio de luce in atmosphæra, si densitate varia secundo formula de barometro, temperatura constante.

Es «catenaria æquiresistente». Vide Cesàro a.1905, p.214.

### §10 Spira mirabile

$$\text{Hp} \S 1. h \in \mathbb{Q}. p = [o + ae^{\sqrt{(h+i)x}} | x, q] \cdot x \varepsilon q \cdot \bigcup.$$

$$\cdot 0 \quad h > 1 \cdot \bigcup. \lim(p, q, -\infty) = o$$

$$\cdot 1 \quad Dpx = (h+i)(px-o) \quad . \quad D^2px = (h+i)^2(px-o)$$

$$\cdot 2 \quad \text{recta} Tpx = \text{recta}[px, (h+i)(px-o)] \\ \{ \text{DESCARTES a.1638, } OEuvres, \text{éd. Tannery t.2 p.360 } \}$$

$$\cdot 3 \quad Ccpx = px + iDpx = o + hiae^{\sqrt{(h+i)x}} = o + hi(px-o)$$

$$\cdot 4 \quad Rcp r = \text{mod } Dp r = e^{hx} \sqrt{1+h^2}$$

$$\cdot 5 \quad x \in 2\Theta \pi \cdot \bigcup. \text{Area } o^{\neg} p^{\neg} \Theta x = [e^{\sqrt{(2hx)-1}}] \cdot (4h)$$

$$\cdot 6 \quad y, z \varepsilon q. y < z \cdot \bigcup. \text{Arc}(p, y^{\neg} z) = \sqrt{1+h^2} S(e^{hx} | x, y^{\neg} z) = \sqrt{1+h^2} (e^{hz} - e^{hy}) / h$$

$$\cdot 7 \quad \text{Arc}(p, x-Q) = e^{hx} \sqrt{1+h^2} / h$$

{ TORRICELLI, a.1640; vide LORIA, LinceiR. s.5 t.6 a.1897 }

{ JAC. BERNOULLI, *Acta Eruditorum*, a.1692, voca curva «Spira mirabilis... quoniam enim semper sibi similem eandem Spiram gignit, utcumque volvatur, evolvatur, radiet... Libenter Spiram hanc tumulo meo juberem incidi cum epigrapho: *Eadem mutata resurgo* ».

«Spirale logarithmica» Joh. Bernoulli.

P.O. o es «puncto asymptotico».

**Spira** I.. G. *σπίρα*, A.D.F. spire, H. espira.

**Spirale** non L. classico, L. de Bernoulli, D.F.I., A spiral, H espiral, R. spirali-naja.  $\subset$  spira  $\div$  -le

**Mirabile** I.. A.F.H. ad mirable.

§11 Spirale de ordine  $m$ 

Hp§1 .  $m \in \mathbb{Q} \setminus 0$ .  $p = [(o + x^m e^{ix} a) | x, \mathbb{Q}]$  .  $x \in \mathbb{Q}$  .  $\supset$ .

·1  $o - x^{m+1} e^{ix} a / m \in \text{rectaT} p x$  .  $o + m x^{m-1} e^{ix} a \in \text{rectaN} p x$

·2  $m \in \mathbb{Q}$  .  $x \in 2\theta\pi$  .  $\supset$ .  $\text{Area } o^- p^+ \theta x = x^{2m+1} / [2(2m+1)]$

·3  $Cc p x = p x + x^{m-1} (m^2 + x^2) / (m^2 + m + x^2) \times (m + ix) e^{ix} a$

·4  $y \in x + \mathbb{Q}$  .  $\supset$ .  $\text{Arc}(p, x^- y) = S[x^{m-1} \sqrt{(m^2 + x^2)} | x, x^- y]$

## §12 Spirale de Archimede

Hp§1 .  $p = [(o + x e^{ix} a) | x, \mathbb{Q}]$  .  $x \in \mathbb{Q}$  .  $\supset$ :

·1  $Dp x = (1 + ix) e^{ix} a$  .  $D^2 p x = (2i - x) e^{ix} a$

·2  $o - x^2 i e^{ix} a \in \text{rectaT} p x$  ·3  $o + i e^{ix} a \in \text{rectaN} p x$

·4  $x \in 2\theta\pi$  .  $\supset$ .  $\text{Area } o^- p^+ \theta x = x^3 / 6$

{ ·2-·4 ARCHIMEDE *Περί Ἑλίκων* P20, P28 }

·5  $x \in \mathbb{Q}$  .  $\supset$ .  $\text{Arc}(p, \theta x) = S[\sqrt{1+x^2} | x, \theta x] =$   
 $\{ x \sqrt{1+x^2} + \log[x + \sqrt{1+x^2}] \} / 2$

{ ROBERVAL, a.1643; WALLIS a.1655, vide LoriaB. a.1903 p.3 }

·6  $Cc p x = p x + i(1+x^2) Dp x / (2+x^2) =$   
 $o + [x + i(1+x^2)] / (2+x^2) e^{ix} a$

·7  $Re p x = (1+x^2) \sqrt{3/2} / (2+x^2)$

§13 Spirale de ordine  $-1$ 

Hp§1 .  $p = [(o + e^{ix} a / x) | x, \mathbb{Q}]$  .  $x \in \mathbb{Q}$  .  $\supset$ :

·0  $\lim[d[ p x, \text{recta}(o + ai, a)] | x, \mathbb{Q}, 0] = 0$

·01  $\lim(p, \mathbb{Q}, \infty) = o$

·1  $Dp x = (ix - 1) e^{ix} a / x^2$  .  $D^2 p x = (2 - x^2 - 2ix) e^{ix} a / x^3$

·2  $o + i e^{ix} a \in \text{rectaT} p x$

·3  $Cc p x = p x + i(1+x^2) Dp x / x^2 = o - [x^{-2} + i(x^{-2} + x^{-4})] e^{ix} a$

·4  $Re p x = (1+x^2) \sqrt{3/2} / x^3$

·5  $\text{Area } o^- p^+ y z = (1/y - 1/z) / 2$

$$^6 \quad y, z \in Q \quad y < z \quad \supset.$$

$$\text{Arc}(p, y^{-}z) = S[\sqrt{1+x^2} \cdot x^2 \mid x, y^{-}z] =$$

$$4[2\log[x + \sqrt{1+x^2}] - \sqrt{1+x^2}/x] \mid x; y, z\}$$

« Spiralis hyperbolica », ita vocato per Joh. Bernoulli, a.1710 (Opera omnia t.1 p.480). Recta in P.0 es « asymptoto ».

Puncto o es « asymptotico ».

#### §14 Cochleoides

$$\text{Hp}\S 1 \quad p = [(o + e^{ix} s x \cdot x a) \mid x, q \cdot t0] \quad x \in q \cdot t0 \quad \supset.$$

$$^0 \quad p x = (i(o + e^{ia} \mid z, 2\theta x)$$

$$^1 \quad o + a e^{2ix} \in \text{recta } T \quad p x$$

$$^2 \quad \Sigma \mid \text{Area}[o^{-} p' n \pi^{-}(n+1)\pi] \mid n, N_0\} = \pi/4$$

Loco de barycentros de arcu de circulo  $0^{-}2x$ .

**Cochlea** L.  $\subset$  G κόχλιο-ς.  $\supset$  I chiocciola, F coque.

**Cochleoides**  $\subset$  cochlea — a + -oide

#### §15 Sinus-spirale

$$\text{Hp}\S 1 \quad m \in Q \quad p = [o + a e^{ix} (\sin m x) \mid (1/m)] \mid x, \theta \pi/m\} \quad x \in \theta \pi/m \quad \supset.$$

$$^1 \quad D p x = e \mid [(m+1)ix] a (\sin m x) \mid (1/m-1) \\ = (p x - 0) e \mid (m i x) \mid \sin m x$$

$$^2 \quad D^2 p x = [e \mid (m i x) - m e \mid (-m i x)] D p x \sin m x$$

$$^3 \quad C c p x = p x + i(D p x) \cdot (m+1)$$

$$^4 \quad R c p x = (\sin m x) \mid (1/m-1) \cdot (m+1)$$

$$^5 \quad \text{Area } o^{-} p' \theta \pi/m = (2/m) S[\sin z \mid (2/m)] \mid z, \theta \pi/2]$$

$$^6 \quad \text{Arc}(p, \theta \pi/m) = (2/m) S[\sin z \mid (1/m-1)] \mid z, \theta \pi/2]$$

De la Goupillière, AnnN. a.1876 p.97.

^1 « Angulo de tangente cum radio vectore es  $m x$  ».

^2 « Radio de curvatura vale normale polare diviso per  $m+1$  ».

Pro  $m=1$  curva es circulo: pro  $m=-1$  recta: pro  $m=2$  « lemniscata de Jac. Bernoulli ». Pro  $m=-2$  hyperbola. Pro  $m=1/2$  cardioide. Pro  $m=-1/2$  parabola.

## §16 Cycloide

\* 1. Hp§1 .  $p = [(o+xa+e^{ix}ia) | x, q] . x \varepsilon q . \supset :$

·0  $p(2\pi+x) = px+2\pi a$

·1  $n \varepsilon n . \supset . \text{Sym recta}(o+n\pi a, ia)px = p(2n\pi-x)$

·2  $Dpx = a(1-e^{ix}) = -2\sin(x/2)iae^{ix/2} . D^2px = -e^{ix}ia$

·3  $x \varepsilon 2\theta\pi . \supset . \text{mod } Dpx = 2\sin(r/2)$

·4  $o+xa-ia \varepsilon \text{rectaT } px . o+xa+ia \varepsilon \text{rectaN } px$

·5  $Ccpx = px+2iDpx = (o+2ia)+(x-ic^{ix})a$   
 $= p(\pi+x)+2ia-\pi a$

·6  $x \varepsilon 2\theta\pi . \supset . \text{Rcp}r = 4\sin(r/2)$

·7  $\text{Area Med}(p' 2\theta\pi) = 3\pi$

{ ROBERVAL a.1634; vide LORIA a.1902 p.461 }

·8  $x \varepsilon 2\theta\pi . \supset . \text{Arc}(p, \theta x) = 8[\sin(x/4)]^3$

{ WREN a.1650; vide WALLIS, *Opera*, t.1 p.538. }

·9  $\text{Arc}(p, 2\theta\pi) = 8$

$o+ia+2n\pi a$  es cuspide,  $o-ia+(2n+1)\pi a$  es vertice. Omni recta $(o+n\pi a, ia)$  es axi.

\* 2. Hp§1 .  $h \varepsilon Q . p = [(o+xa+he^{ix}ia) | x, q] . \supset .$

·1  $Dpx = a(1-he^{ix}) . D^2px = -he^{ix}ia$

·2  $\text{mod } Dpx = 1+h^2-2h\cos r$

·3  $o+xa+ia \varepsilon \text{rectaN } px$

·4  $\text{Area}[(o+hia) \text{---} p' 2\theta\pi] = \pi h^2 + 2\pi h$

·5  $Ccpx = px+(1+h^2-2h\cos x)iDpx/(h^2-h\cos x)$

·6  $\text{Arc}(p, 2\theta\pi) =$

$S\sqrt{[(1-h)^2cx^2 + (1+h)^2sx^2] | x, 2\theta\pi} \{ \text{PASCAL t.3 p.441} \}$

Cycloide cum punctos duplo si  $h > 1$ , et punctos de flexu si  $h < 1$ .

**cycloide**, nomen dato per Galileo a. 1599. F. cyclorde, A. cycloid,

I. cicloide, R. tsicloida.  $\subset$  cyclo + -ide.

cyclo G. κύκλος, A.F. cycle, D. cyclus, R. tsicl', H.I. cielo. = circulo

$\subset$  E. qeql, A. wheel, S. c'acra = rota.

## §17 Evolvente de circulo

$$\text{Hp}\S 1 . p = [(o + ae^{ix} - xae^{ix}) \mid x, q] . x\varepsilon q . \supset .$$

$$\cdot 0 \quad Dpx = xae^{ix}$$

$$\cdot 1 \quad Ccpx = o + ae^{ix}$$

$$\cdot 2 \quad x\varepsilon Q . \supset . \text{Arc}(p, \Theta x) = x^2/2$$

$$\cdot 3 \quad \text{Area} \bigcup [(o + ae^{ix}) \cap px \mid x^2 \Theta x] = x^3/6$$

$$\cdot 4 \quad \text{proj}(\text{rectaT } px)o = o - xiae^{ix}$$

Podaria de evolvente de circulo relato ad centro es spirale de Archimede.

**Evolvente** D.I., A. evolvent.  $\subset$  e (=ex) + volve (p.379) + -nte.

## §18 Asteroide

$$\text{Hp}\S 1 . p = [o + (3e^{ix} + e^{-3ix})a \mid x, q] . \supset .$$

$$\cdot 0 \quad p(2\pi + x) = px \qquad \cdot 01 \quad px = o + 4[(cx)^2 + i(sx)^2]a$$

$$\cdot 1 \quad Dpx = 3i(e^{ix} - e^{-3ix})a = -6ae^{-ix}\sin 2x$$

$$\cdot 2 \quad x\varepsilon \Theta\pi/2 . \supset . \text{mod } Dpx = 6\sin 2x$$

$$\cdot 3 \quad \text{rectaT } px = [o + 4(cx)^2(cx - 3sx)a + 4(sx)^2(sx + 3cx)ia]z'q \\ qx = o + 4acx . rx = o + 4iasx . \supset .$$

$$\cdot 4 \quad qx, rx \varepsilon \text{rectaT } px$$

$$\cdot 5 \quad m\varepsilon q . \supset . mqx + (1-m)rx = o + 4[macx + (1-m)iasx]$$

$$\cdot 6 \quad d(qx, rx) = 4$$

$$\cdot 7 \quad Ccpx = px - iDpx = o + 2(3e^{ix} - e^{-3ix})a \\ = o + 2e^{i(\pi/4)}p(x - \pi/4)$$

$$\cdot 71 \quad x\varepsilon \Theta\pi/2 . \supset . \text{Re}px = 6\sin 2x$$

$$\cdot 8 \quad x\varepsilon \Theta\pi/2 . \supset . \text{Arc}(p, \Theta x) = 6S(\sin 2x \mid x, \Theta x) = 3(1 - \cos 2x)$$

$$\cdot 81 \quad \text{Arc}(p, \Theta\pi/2) = 6$$

$$\cdot 9 \quad \text{Area } o \cap p' \Theta x = 3[x - (1/4)\sin 4x]$$

$$\cdot 91 \quad \text{Area } o \cap p' \Theta\pi/2 = 3\pi/2$$

$$\cdot 10 \text{ Volum } \bigcup_i \mu(2\pi oaa)[[o+4(\omega)^2a]^-px]|x, \Theta\pi/2\} = 2^{10}\pi/(3 \times 5 \times 7)$$

$$\cdot 11 \text{ area } \bigcup \mu(2\pi oaa)px|x, \Theta\pi/2\} = 96\pi/5$$

$n\epsilon 0 \cdots 3 \rightarrow p(n\pi/2)$  es cuspide . recta $[(o,ae\backslash(in\pi/4)]$  es axi.

Puncto considerato in P.5 describe ellipsi, de semi-axi  $4ma$ ,  $4(1-m)ia$ .

P.7 « Evoluta de asteroide es asteroide ».

**Asteroides** A.D.F.H.I.R.,  $\subset$  G. ἀστεροειδής.  $\subset$  aster + -o- + -ide.

Aster G. ἀστήρ, ἀστέρ-ι.  $\supset$  astr-o-nom-ia A.D.F.H.I.R. ...

$\subset$  E. ster  $\supset$  L. stella ( $\subset$  ster-ula), A. star, D. ster-n.

### §19 Epicycloide

\* 1. Hp§1 .  $m \in N_1 + 1$  .  $p = [(o + me^{ix}a + e^{mix}a)|x, q] \cdot xeq \rightarrow$ .

$$\cdot 0 \quad k \in 0 \cdots (m-2) \rightarrow$$

$$\text{Sym recta}\{o, ae\backslash[k\pi i'/(m-1)]\} px = p[2k\pi/(m-1) - x]$$

$$\cdot 1 \quad Dpx = mia(e^{ix} + e^{mix}) = 2mia e\backslash[(m+1)ix/2] \cos[(m-1)x/2]$$

$$\cdot 11 \quad x \in \Theta\pi'/(m-1) \rightarrow \text{mod } Dpx = 2m \cos[(m-1)x/2]$$

$$\cdot 2 \quad o + (m-1)e^{ixa} \in \text{recta} N px \quad . \quad o + (m+1)e^{ixa} \in \text{recta} Tpx$$

$$\cdot 3 \quad \text{proj}(\text{recta} Tpx) o = o + (m+1)(e^{ix} + e^{mix})a/2$$

$$\cdot 4 \quad x \in \Theta\pi/(m-1) \rightarrow \text{Arc}(p, \Theta x) = [4m/(m-1)] \sin[(m-1)x/2]$$

$$\cdot 5 \quad \text{Arc}[p, \Theta\pi'/(m-1)] = 4m'/(m-1)$$

$$\cdot 6 \quad \text{Arc}(p, 2\Theta\pi) = 8m$$

$$\cdot 7 \quad x \in \Theta\pi'/(m-1) \rightarrow \text{Area}(o^-p'\Theta x) = [m(m+1)/2]\{x + [(m-1)] \sin[(m-1)x]\}$$

$$\cdot 8 \quad \text{Area } o^-p'\Theta\pi'/(m-1) = m(m+1)\pi/[2(m-1)]$$

$$\cdot 9 \quad \text{Area } o^-p'2\Theta\pi = \pi m(m+1)$$

$$\begin{aligned} \cdot 10 \quad Ccpx &= px + 2iDp.c/(m+1) \\ &= o + [(m-1)/(m+1)](mae^{ix} - e^{mix}a) \\ &= o + [(m-1)/(m+1)]e\backslash[-\pi i'/(m-1)] \} p[x + \pi/(m-1)] - o \end{aligned}$$

Curva generato per puncto de circumferentia de radio 1 que se evolve supra alio circumferentia fixo de radio  $m-1$ .

Pro  $m=2$  « cardioide ».

Pro  $m=3$  « caustica per reflexione de radios paralelo in circumferentia ».

Pro  $m=-1$ , « recta ». Pro  $m=-3$  « asteroide ».

\* 2. Hp§1 .  $h, k \varepsilon q . m \varepsilon Q . n \varepsilon m - Q .$

$$p = [(o + h e^{miz} a + k e^{niz} a) | x, q] . x \varepsilon q . \supset .$$

$$\cdot 1 \quad \text{recta} N p x = [o + h(1 + m z) e^{miz} a + k(1 + n z) e^{niz} a] | z' q$$

$$\cdot 2 \quad o + k(1 - n/m) e^{niz} a, \quad o + h(1 - m/n) e^{miz} a \varepsilon \text{recta} N p x$$

$$\cdot 3 \quad h = k . \supset . p x = o + 2h \cos[(m - n)x/2] e^{[(m + n)ix/2]} a$$

$$\cdot 31 \quad h = -k . \supset . p x = o + 2h \sin[(m - n)x/2] e^{[(m + n)ix/2]} i a$$

$$\cdot 4 \quad m h = \pm n k . \supset . C c p x = p x + 2i D p x / (m + n)$$

$$x \varepsilon \theta \pi / (m - n) . \supset .$$

$$\cdot 5 \quad \text{Arc} [p, \theta \pi / (m - n)] =$$

$$/ (m - n) S \{ \sqrt{[(m h + n k)^2 c x^2 + (m h - n k)^2 s x^2]} | x, \theta \pi \}$$

$$\cdot 6 \quad m h = n k . \supset . \text{Arc}(p, \theta x) = 4 h m \sin[(m - n)x/2] / (m - n)$$

$$\cdot 61 \quad m h = -n k . \supset . \text{Arc}(p, \theta x) =$$

$$4 h m \{ 1 - \cos[(m - n)x/2] \} / (m - n)$$

$$\cdot 7 \quad \text{Area}(o^- p' \theta x) =$$

$$(m h^2 + n k^2) x / 2 + [h k (m + n) \sin(m x - n x)] / (2 m - 2 n)$$

Pertine ad genere «epicycloidale». Si  $h = \pm k$ , vocare «rosa», D rhodonee.

Si  $m h = \pm n k$  es «epicycloide proprio», secundo P1.

Si  $m = -n = 1$ , ellipsi.  $m = 1$ ,  $n = 2$ , limace de Pascal.

## §20 Limace de Pascal

$$\text{Hp§1} . m \varepsilon Q . p = [o + (c x + m) e^{ix} a | x, q] . x \varepsilon q . \supset .$$

$$\cdot 0 \quad p(2\pi + x) = p x$$

$$\cdot 1 \quad p x = o + a/2 + (m e^{ix} + e^{2ix}/2) a$$

$$\cdot 2 \quad [\text{Sym recta}(o, a)] p x = p(2\pi - x)$$

$$\cdot 3 \quad D p x = (e^{ix} + m) e^{ix} i a . D^2 p x = -(2e^{ix} + m) e^{ix} a$$

$$\cdot 4 \quad \text{recta} N p x = [o + (p x - o)(1 + z) + z i s x e^{ix} a | z' q]$$

$$\cdot 5 \quad o - i s x e^{ix} a \varepsilon \text{recta} N p x$$

$$\cdot 6 \quad C c p x = o + [1 + m^2 + 2m c x + m e^{ix} (s x)^2] a / (2 + 3m c x + m^2)$$

$$\cdot 7 \quad \text{Area } o^- p' 2\theta \pi = \pi/2 + \pi m^2$$

$$\cdot 8 \quad \text{Arc}(p, 2\theta \pi) = 4 S \{ \sqrt{[(1 + m) s x]^2 + [(1 - m) c x]^2} | x, \theta \pi / 2 \}$$

Puncto  $p$  describe conchoide de circulo de centro puncto  $o+a/2$ , et de radio  $/2$ , relato ad  $o$ , et ad segmento  $m$ . Es podaria de circulo de centro  $o+a$  et de radio  $m$ . Es epicycloide. Pro  $m=1$ , curva es cardioide.

**Límace** L.F., I. lumaca, A.L. limax, F. limaçon.  $\subset$  lim(o) + -acc.  
Nomen dato ad curva per Roberval, CR. a. 1708 p. 78.  
limo H.I., F. limon.  $\subset$  E. limo (p.161)  $\supset$  A. loam lime, D. lehm leim.

## §21 Cardioide

Hp§1 .  $p = [o + (cx+1)e^{ix} | x, q] . x \varepsilon q . \supset$ .

$$\cdot 0 \quad p(2\pi+x) = px$$

$$\cdot 1 \quad px = o + 2[c(x/2)]^2 e^{ix} a$$

$$\cdot 2 \quad qx = o + 2cx e^{ix} a . \supset . \text{Proj}(\text{recta} T q x) o = p(2x)$$

$$\cdot 3 \quad \begin{aligned} Ccp x &= o + 2a/3 + 2[s(x/2)]^2 e^{ix} a/3 \\ &= o + 2a/3 - [p(x+\pi) - o]/3 \end{aligned}$$

$$\cdot 4 \quad \text{Area } o-p'\theta x = [3x + sx(4+cx)]/4$$

$$\cdot 5 \quad \text{Area } o-p'2\theta\pi = 3\pi/2$$

$$\cdot 6 \quad x \varepsilon \theta\pi . \supset . \text{Arc}(p, \theta x) = 4s(x/2)$$

$$\cdot 7 \quad \text{Arc}(p, 2\theta\pi) = 8$$

Puncto  $p\pi=o$  es cuspid.

P-3 « Evoluta de cardioide es cardioide ».

Cardioide es « epicycloide », « sinus-spirale », « conchoide de circulo », « podaria de circulo », « caustica per reflexione in circulo », « inverso de parabola relato ad foco ».

**Cardioide** (Castiglioni, Phil.T. a.1741)  $\subset$  cardia - a + -oide.

cardia G καρδιά || L corde.  $\supset$  L cor, F coeur, H cor-azon, I cuore.  
|| A heart, D herz, R serd-tse.

## §22 Cissoide de Diocle

Hp§1 .  $p = [o + (sx)^2 e^{ix} a / cx | x, -\pi/2 - \pi/2] . x \varepsilon -\pi/2 - \pi/2 . \supset$ .

$$\cdot 1 \quad [\text{Sm recta}(o, a)] px = p(-x)$$

$$\cdot 2 \quad \text{Lim}\{d[p, x, \text{recta}(o+a, ia)] | x, -\pi/2 - \pi/2, \pi/2\} = 0$$

$$\cdot 2 \quad Dpx = [/(cx)^2 - e^{2ix}] ia \quad \cdot 31 \quad D^2 px = 2iDpx + 2e^{ix} a (cx)^2$$



$$\cdot 4 \quad o + s x e^{i x} [1 + (c x)^2] i a \in \text{recta} N p x$$

$$\cdot 5 \quad C c p x = p x + [3(c x)^2 + 1] i D p x / [6(c x)^2]$$

$$\cdot 6 \quad \text{Area } (o + a) - p'(-\pi/2 - \pi/2) = 3\pi/4 \quad \{ \text{WALLIS t.1 p.545 } \}$$

L.D.F.I. *Cissotide*, A. cissoid, R. tsissoida.

G  $\kappa\iota\sigma\sigma\text{-}\epsilon\iota\delta\eta\text{-}\varsigma$  = hederi-forme.  $\subset$  cisso (= || L. hедера) + -ide.

### §23 Podaria

$$o \in p . k \in \text{Intv} . p \in p F k . q = [\text{proj}(\text{recta} T p x) o \mid x, k] . x \in k .$$

$$D p x \in v \text{-} i 0 . D^2 p x \in v . \supset$$

$$\cdot 1 \quad q x = p x + [(o - p x) \times U D p x] U D p x$$

$$\cdot 2 \quad D q x = \text{Imag}(D^2 p x / D p x) [q x - \text{proj}(\text{recta} N p x) o]$$

$$\cdot 3 \quad (o + p x) / 2, \text{proj}(\text{recta} N p x) o, \text{proj}(\text{plan} N p x) o \in \text{plan} N q x$$

Dato puncto fixo  $o$ , et puncto mobile  $p$ , functione de varabile in intervallo  $k$ , nos voca  $q x$  projectione super tangente ad  $p$  in  $x$  de  $o$ .

Puncto  $q$  describe « podaria, relato ad  $o$ , de linea  $p$  ».

Podarias de epicycloides es rosas.

**Podaria**, F. podaire (Laurent, non in vocabulario).

$\subset$  G. pod- (= || L. pede) + L. -aria. (Vide caten-aria).

Aliquo scriptore non ama vocabulo hybrido « podaria » composito ex duo elemento de lingua differente, et ute forma minus diffuso in Mathematica sed multo in Musica :

L.H.I. **Pedale**, F. pédale, A.D. pedal, R. pedalī.  $\subset$  ped(e) + -ale.

L. pede, F. pied, H. pié, I. piede.  $\supset$  A.D.F.H.I.R. ped-ale ex-ped-itione

G. pod- ποδ-ί  $\supset$  A.D.F.H.I.R. anti-pode poly-po pod.agra.

E. pod, S pad, A foot, D fuss. (R. pada-tī = cade).

### §24 Conchoide

$$o \in p . k \in \text{Intv} . p \in (p \text{-} i o) F k . l \in Q . q = \{ [p x + l U (p x - o)] \mid x, k \}$$

$$x \in k . \supset . \text{plan}[o, l(p x - o)] \wedge \text{plan} N p x \supset \text{plan} N q x$$

$$\{ \text{DESCARTES a.1637 Œuvres, t.6, p.323 } \}$$

$q$  describe « conchoide de  $p$ , cum « polo » in  $o$ , et « regula »  $p'k$ .

**Conchoide** L.scientifico, A conchoid, F conchoïde, I concoide.

$\subset$  concha — -a + -oide.

concha L  $\subset$  G κόγχη, H concha, F conque, coqu-ille, I conch-iglia.

## §25 Conchoide de Nicomede

Hp§1.  $m \in \mathbb{Q}$ .  $p = \{[o + (/cx + m)e^{ix}a] | x, (-\pi/2)^-(\pi/2)\}$ .

$x \in \text{Variab } p \rightarrow$ :

·0  $[\text{Sym recta}(o, a)]px = p(-x)$

·1  $Dpx = [/(cx)^2 + me^{ix}]ia$

·2  $o + e^{ix}sx/(cx)^2ia \in \text{recta}Npx$

·3  $\lim |d[px, \text{recta}(o + a, ia)]|x, \text{Variab } p, \pm \pi/2\} = 0$

·4  $x \in \Theta\pi/2 \rightarrow$ .

$\text{Area } o^-p^+\Theta x = tx/2 + m \log[t(\pi/4 + x/2)] + m^2x/2$

Puncto  $p$  describe conchoide de recta  $(o + a, ia)$ , relato ad  $o$ .

## §26 Helice

$o \in p$ .  $a, b, c \in v$ .  $a^2 = b^2 = c^2 = 1$ .  $a \times b = b \times c = c \times a = 0$ .

$r, h \in \mathbb{Q}$ .  $u = b/a$ .  $p = [(o + re^{ux}a + hxc) | x, q]$ .  $x \in q \rightarrow$ .

·1  $o + re^{ux}a - rxue^{ux}a \in \text{recta}Tpx$

·2  $o + hxc \in \text{recta}Npx$

·3  $Ccpx = px - e^{ux}(h^2 + r^2)a/r = o - e^{ux}h^2a/r + hxc$

·4  $y \in x + Q \rightarrow \text{Arc}(p, x^-y) = (y - x)\sqrt{(r^2 + h^2)}$

$r$  vocare « radio de helice »,  $2\pi h$  « passu »,  $h$  « passu reducto ».

L. *Helice*, G. *ἑλίκη*, F.H. *héllice*, L.A.D. *helix*, I. *elice elica*.

## §27 Inversione

$k \in \text{Cls}'q$ .  $k \supset \delta k$ .  $p \in pFk$ .  $o \in p-p'k$ .

$q = \{[o + (px - o)/(px - o)^2] | x, k\}$ .  $x \in k \rightarrow$ :

·1  $Dqx = \{Dpx - 2[U(px - o) \times Dpx]U(px - o) / (px - o)^2\}$

·2  $Dpx \in v - \iota 0 \rightarrow (UDpx + UDqx) \times (px - o) = 0$

·3  $Ccpx \in p - \iota o \rightarrow Ccqx \in \text{recta}(o, Ccpx)$

Nota. Vide tractatione diffuso de curvas praecedente, et de alio, in *G. Pagliero, Applicationes de Calculo infinitesimale*, Torino, Paravia a.1907.

§28  $\gamma$ 

$$\cdot 0 \quad \gamma = \lim \{ \Sigma / (1 \cdots n) - \log n \} | n \quad \text{Df}$$

$$\cdot 1 \quad n \in N_1 \cdot \supset \cdot \Sigma / (1 \cdots n) - \log n > \gamma > \Sigma / [1 \cdots (n+1)] - \log n$$

$$\cdot 2 \quad \gamma = 0 \cdot$$

57721 56649 01532 86060 65120 90082 40243 10421 59335 93992  
 35988 05767 23488 48677 26777 66467 09369 47063 29174 67495  
 14631 44724 98070 82480 96050 40144 86542 83622 41739 97644  
 92353 62535 00333 74293 73377 37673 94279 25952 58247 09491  
 60087 35203 94816 56708 53233 15177 66115 28621 19950 15079  
 84793 74508 569 ...

Pro  $n$  vergente ad  $\infty$ , summa de primos  $n$  termine de serie harmonico (pag. 223 P23·1) verge ad  $\infty$ , ut  $\log n$ . Differentia verge ad limite finito, que vocare  $\gamma$ .

Numero  $\gamma$  habe in analysi maximo importantia, post numeros  $\pi$  et  $e$ . Vocare « constante de Eulero ».

Euler, PetrC., a.1734-35 t.7 p.156 indica illo per  $C$  et per  $O$ ; Mascheroni per  $A$ . Signo  $\gamma$ . (que non occurre in Euler, et ne in Mascheroni) es adoptato per *Encyclopädie*, et plure Auctore.

Euler, ibid. calcula  $E(10^6 \gamma)$ , post  $E(10^{10} \gamma)$  in a.1744 CorrM. t.1 p.283; et  $E(10^{15} \gamma)$  in PetrNC. a.1769 t.14 I p.154.

Mascheroni, a.1790 calcula  $E(10^{19} \gamma)$

Gauss, a.1812 *Werke*, t.3 p.154 " " 23 "

Nicolai, " " " " 45 "

Glaisher, LondonP. a.1871 t.19 p.54 " " 100 "

Adams, " " a.1878 t.28 p.88 " " 263 "

$$\cdot 3 \quad \gamma = \Sigma N_1^{-2}/2 - \Sigma N_1^{-3}/3 + \dots = \Sigma \{ (-1)^n (\Sigma N_1^{-n}/n) | n, N_1+1 \}$$

$$\cdot 4 \quad \gamma = \Sigma \{ \Sigma (N_1+1)^{-n} (n-1)/n | n, N_1+1 \}$$

} 3·4 EULER PetrNC. a.1769 p.154 {

$$\cdot 5 \quad 1-\gamma = \Sigma \{ \Sigma (N_1+1)^{-n}/n | n, N_1+1 \}$$

} EULER PetrA. a.1781 t.5 II p.45 {

$$\cdot 6 \quad e \nmid \gamma = \Pi \{ (e \nmid n) (1+n) | n, N_1 \}$$

$$\cdot 7 \quad \gamma = -S(e^{-x} \log x | x, Q)$$

$$\cdot 8 \quad a \in N_1 \cdot n \in N_1+1 \cdot \supset \cdot \Sigma (1 \cdots a) \varepsilon \log a + \gamma + \varepsilon/(2a) +$$

$$\Sigma [(-1)^r B_r (2r a^{2r}) | r, 1 \cdots (n-1)] + \theta (-1)^n B_n/(2n a^{2n})$$

} EULER PetrNC. a.1769 t.14 I p.153 {

## §29 COMPLEMENTO SUPER NUMEROS COMPLEXO.

\* 1.

E u

$$\cdot 0 \quad n \in N_1 \cdot \supset \cdot Cn = Cxn \quad \text{Def}$$

$$\cdot 1 \quad \text{»} \cdot x \in Cn \cdot r \in 1 \cdots n \cdot \supset \cdot E_r x = x_r \quad \text{Def}$$

$$\cdot 1 \quad \text{»} \cdot u, v \in \text{Cls}'Cn \cdot u \supset v \cdot r \in 1 \cdots n \cdot \supset \cdot E_r u \supset E_r v$$

$$\cdot 2 \quad \text{»} \cdot u \in \text{Cls}'Cn \cdot \lambda u = u \cdot r \in 1 \cdots n \cdot \supset \cdot \lambda E_r u = E_r u$$

Nos abbrevia in  $Cn$ , « campo ad  $n$  dimensione », numero complexo de ordine  $n$ .

Dato numero naturale  $n$ , et complexo  $x$  de ordine  $n$ , (vide p. 144), si  $r$  indica uno ex numeros inter 1 et  $n$ , tunc  $E_r x$ , lege: « elemento vel coordinata de loco  $r$  de  $x$  », indica ipso  $x_r$ . Signo  $E$  es signo de præfunctione (p. 73). Tunc, si  $u$  es classe de complexos,  $E_r u$  indica coordinatas de loco  $r$  de complexos  $u$  (p. 77).

Si classe  $u$  continere in  $v$ , et coordinatas de loco  $r$  de  $u$  continere in coordinatas de  $v$ . Si classe  $u$  es clauso, et classe de suo coordinatas de loco  $r$ , es clauso.

$$\cdot 3 \quad n \in N_1 \cdot x \in Cn \cdot \supset \cdot mx = \text{mod} x \quad \text{Def}$$

$$\cdot 4 \quad n \in N_1 \cdot \supset \cdot u_n = Cn \wedge x \exists (mx < 1) \quad \text{Def}$$

Nos abbrevia symbolo  $\text{mod}$  in  $m$ .

$u_n$  indica complexos de ordine  $n$ , de modulo minore de 1, vel « sphaera ad  $n$  dimensione, de centro puncto zero, et de radio 1 ».

$$\cdot 5 \quad n \in N_1 \cdot u \in \text{Cls}'Cn \cdot \supset \cdot \lambda u = Cn \wedge x \exists [r \in Q \cdot \supset \cdot \exists u \wedge (x + r u_n)] \quad \text{Defp}$$

Classe limite  $\lambda$  de dato classe  $u$ , jam definito supra (pag. 139 pro numeros reale, citato in pag. 145 P4 pro complexos), pote es expresso per novo symbolo  $\lambda u$ :  $\lambda u$  es classe de complexos de ordine  $n$ , et  $x$  tale que, pro omni radio  $r$ , semper existe elemento de classe  $u$ , in sphaera de centro  $x$  et de radio  $r$ .

\* 2.

$$\begin{aligned} \cdot 0 \quad n \in N_1 \cdot f \in \text{Cls}' \text{Cn } F N_0 : r \in N_0 \cdot \bigcup_r \mathfrak{A} f r \cdot l' m f r \in Q \cdot \lambda f r = f r \cdot \\ \cdot f(r+1) \supset f r : \bigcup_r 1 \text{ Cn } \wedge x \exists \{ r \in 1 \cdots n \cdot \bigcup_r x_r = 1, [l' E_r \wedge f p \wedge \\ x \exists \{ s \in 1 \cdots (r-1) \cdot \bigcup_s z_s = x_s \} \mid p' N_0 \} \} \in \bigcap f' N_0 \end{aligned}$$

$$\cdot 1 \quad \text{Hyp} \cdot 0 \cdot \bigcup \cdot \mathfrak{A} \bigcap f' N_0$$

Dato numero naturale  $n$ , si  $f$  es classe de complexos de ordine  $n$ , functione de numeros  $0, 1, 2, \dots$ ; vel si  $f0, f1, f2, \dots$  es successione de classes de complexos de ordine  $n$ ; et si pro omni valore de indice  $r$ , semper:

classe  $f r$  existe, vel non es vacuo,

es limitato, vel limite supero de modulos de  $f r$  es finito,

es clauso, vel classe limite de  $f r$  coincide cum se ipso,

et classe  $f(r+1)$  sequente  $f r$  es parte de  $f r$ ,

tunc P.1 dice que existe elemento commune ad omni classe  $f r$ , et in modo plus præciso, P.0 dice que uno elemento commune  $x$  es ita determinato:

Sume numero  $p$ , considera classe  $f p$ , suo coordinatas primo  $E_1' f p$ , suo limite supero  $l' E_1' f p$ , varia  $p$  in campo de numeros, et sume limite infero de limites supero; isto es  $x_1$ , primo coordinata de  $x$ .

Sume in  $f p$  individuos que habe ut primo coordinata  $x_1$ , et opera in modo analogo super coordinatas secundo; resulta secundo coordinata de  $x$ . Et ita continua. Isto elemento  $x$  es commune ad omni classe  $f p$  pro omni numero  $p$ .

Dem.

Si  $n=1$ , theorema sume forma:

$$f \in \text{Cls}' q F N_0 : r \in N_0 \cdot \bigcup_r \mathfrak{A} f r \cdot l' m f r \in Q \cdot \lambda f r = f r \cdot f(r+1) \supset f r : \bigcup_r 1, [l' f s] [s' N_0] \in \bigcap f' N_0$$

Isto theorema es simile ad theorema super existentia de classe limes (Lm) de omni successione de quantitates, exposito in pag. 213, Prop. 2.1.4; et uno es reductibile ad altero. Demonstratione que seque et propositiones (1)(2)(3)(4) es analogo ad Dem. de pag. 213, et ad Prop. correspondentes.

$$\text{Hp} \cdot m, s \in N_0 \cdot \bigcup \cdot f(m+s) \supset f m \cdot \bigcup \cdot l' f(m+s) \leq l' f m \quad (1)$$

In hypothesi dato si  $m$  et  $s$  numeros, tunc  $f(m+s)$  es parte de  $f m$ , nam primo classe seque secundo de  $s$  loco.

Ergo, limite supero de primo classe es minore aut æquale, de limite supero de secundo. Resulta ex applicatione de operatione  $l'$ , secundo regula pag. 116 Prop. 11.3.

$$m \varepsilon N_0 . (1) \supset . 1.[l'fs \ s'N_0] = 1.[l'f(m+s) | r'N_0] \quad (2)$$

Ergo limite infero de valores sumpto per  $l'fs$ , ubi  $s$  sume omni valore numerico, æqua limite infero de valores sumpto per  $fs$ , ubi  $s$  varia de  $m$  in post.

$$m \varepsilon N_0 . (2) \supset . 1.[l'fs \ s'N_0] \varepsilon \lambda 1'[f(m+s) | s'N_0] \quad (2')$$

Ergo limite infero dicto, es valore limite de limites supero de classes  $f(m+s)$ , ubi varia  $s$ ; nam limite infero (1.) de classe es valore limite (2) de classe, secundo pag. 140 Prop. 1.5.

$$m, s \varepsilon N_0 \supset . l'f(m+s) \varepsilon \lambda f(m+s) . \lambda f(m+s) = f(m+s) . f(m+s) \supset fm \supset . l'f(m+s) \varepsilon fm \quad (3)$$

Dato duo numero  $m$  et  $s$ , tunc limite supero de classe  $f(m+s)$  es valore limite  $\lambda$  de classe  $f(m+s)$ ; ce classe es clauso, et suo classe limite coincide cum  $f(m+s)$ , que continere in  $fm$ . Ergo limite supero de  $f(m+s)$  es uno ex valores de  $fm$ .

$$m \varepsilon N_0 \supset . l'f(m+s) | s'N_0 \supset fm \quad (3')$$

Ergo, dato  $m$ , classe de limites supero de classes  $f(m+s)$ , ubi varia  $s$ , continere in  $fm$ .

$$m \varepsilon N_0 . (2') . (3') \supset . 1.[l'fs \ s'N_0] \varepsilon \lambda fm . \lambda fm = fm \supset . 1.[l'fs \ s'N_0] \varepsilon fm \quad (4)$$

Nunc, per Prop. (2'), limite infero considerato in theorema es limite  $\lambda$  de valore considerato in (3'), que continere in  $fm$ ; ergo illo limite infero es elemento de omni classe  $fm$ ; quod es theorema demonstrando.

Dem. pro  $n=2$ .

$$g = E_1'fr \ r \supset : g \varepsilon \text{Cls}'q \ F N_0 : r \varepsilon N_0 \supset r . \exists gr . l'mgr \varepsilon Q . \lambda gr = gr .$$

$$g(r+1) \supset gr \supset . x_1 \varepsilon \cap E_1'fs | s'N_0$$

In vero, si nos voca  $g$  classe de primo coordinatas de  $fr$ , ubi varia  $r$ , tunc  $g$  es successione de classe de quantitates; et pro omni indice  $r$ , ce classe existe, es limitato, clauso, et omni classe continere in præcedentes. Ergo, per theorema in casu  $n=1$ , quantitate vocato  $x_1$  es elemento commune ad omni  $gr$ .

$$h = E_2'fr \wedge z_3(z_1=x_1) | r \supset : r \varepsilon N_0 \supset . \exists hr . l'mhr \varepsilon Q . \lambda hr = hr . h(r+1) \supset hr \supset . x_2 \varepsilon \cap E_2'fr \wedge z_3 \ z_1=x_1 | r'N_0$$

Nunc, si nos voca  $h$  classe de secundo coordinatas de elementos de  $fr$ , que habe ut primo coordinata  $x_1$ ,  $h$  es novo successione de classes de quantitates; omni classe es non vacuo, limitato, clauso, et continere in præcedentes. Ergo quantitate vocato  $x_2$  es commune ad omni  $hr$ .

$$r \varepsilon N_0 \supset . \exists fr \wedge z_3(z_1=x_1) \wedge z_3(z_2=x_2) \supset . \exists fr \wedge z_3(z=x) \supset . x \varepsilon fr$$

Si nos elimina signos  $\cap$ , E, resulta: si  $r$  es numero, tunc existe elemento in  $fr$  que habe ut primo coordinata  $x_1$ , et ut secundo  $x_2$ , vel que es æquale ad  $x$ , id es,  $x$  es elemento commune ad omni  $fr$ .

In modo simile, pro omni valore de  $n$ .

*Nota.*

Theorema P2.1 es ab aliquo auctore demonstrato ut seque:

Divide toto spatio ad  $n$  dimensione in cubos de latere 1.

Tunc existe aliquo cubo, que habe proprietate que, pro omni valore de  $r$ , aliquo elemento de classe  $f^r$  es commune ad isto cubo. Divide isto cubo in novo cubos de latere  $1/2, 1/4, 1/8, \dots$ ; semper existe aliquo cubo partiale, que habe idem proprietate. Resulta successione de cubos, de latere vergente ad 0; ergo cubo verge ad puncto limite, que satisfac thesi de theorema.

Isto typo de demonstratione occurre in Bolzano, a.1817, Cauchy, *Cours d'Analyse*, a.1821 note 3 (Euvres s. 2, t. 3 p. 378), et sæpe in Weierstrass. Vide MA. t. 23 p. 455.

In isto demonstratione occurre elige, in numero infinito de vice, cubo inter plure cubo; quod non lice, si nos non da lege generale de electione. Vide infra, §30 P4.1. Ergo nos da lege de electione, et nos scribe expressione de puncto limite, in Prop. 2.1; id es pro demonstratione de existentia de classe, nos da expressione de uno individuo que pertine ad classe.

$$\cdot 2 \text{ Hyp.1 } \cdot \supset. \lambda \cap f^{\cdot} N_0 = \cap f^{\cdot} N_0$$

Classe commune ad omni classe de successione  $f^0 f^1 f^2 \dots$  considerato in Prop. 1, es clauso.

$$\text{Dem. } n \in N_0 \cdot \supset. \cap f^{\cdot} N_0 \supset f^n \cdot \supset. \lambda \cap f^{\cdot} N_0 \supset \lambda f^n \supset f^n \quad (1)$$

$$(1) \cdot \supset. \lambda \cap f^{\cdot} N_0 \supset \cap f^{\cdot} N_0 \cdot \supset. P$$

$$\cdot 21 \text{ } n \in N_1 \cdot f \in \text{Cls}' Cn F N_0 : r \in N_0 \cdot \supset. \exists f^r \cdot l' m f^r \varepsilon Q \cdot$$

$$\lambda f(r+1) \supset f^r \cdot \supset. \exists \cap f^{\cdot} N_0$$

Dem.

$$P.1 \cdot \supset. \exists \cap \lambda f^{\cdot} N_0 \quad (1)$$

$$r \in N_0 \cdot \S \lambda \text{ (pag.139) } P.1 \cdot \supset. f(r+1) \supset \lambda f(r+1) \supset f^r \quad (2)$$

$$(2) \cdot \supset. \cap f(r+1) | r^{\cdot} N_0 \supset \cap \lambda f(r+1) | r^{\cdot} N_0 \supset \cap f^{\cdot} N_0 \cdot$$

$$\cap f(r+1) | r^{\cdot} N_0 = \cap f^{\cdot} N_0 \cdot \supset. \cap \lambda f^{\cdot} N_0 = \cap f^{\cdot} N_0 \quad (3)$$

$$(1) \cdot (3) \cdot \supset. P$$

Theorema P.1 ad nos occurre (§30 P5.1.2) sub forma:

$$\cdot 3 \text{ } n \in N_1 \cdot f \in \text{Cls}' Cn F Q : h \varepsilon Q \cdot \supset_h \cdot \exists f^h \cdot l' m f^h \varepsilon Q \cdot$$

$$h, k \varepsilon Q \cdot h < k \cdot \supset_{h,k} \cdot \lambda f^h \supset f^k \cdot \supset. \exists \cap f^{\cdot} Q$$

Si  $f$  es classe de complexos de ordine  $n$ ; functione de quantitates positivo; et si pro omni valore de quantitate positivo  $h$ , classe  $f^h$  es non vacuo et limitato, et si pro omni  $h < k$ , classe limite de  $f^h$  continere in  $f^k$ , tunc existe elemento commune ad classes  $f^h$ , pro omni valore de  $h$ .

Dem.  $g = [f(1/n) | n, N_1] \supset: g \in \text{Cls}'Cn F N_1 : r \in N_1 \supset: \exists gr \cdot l' m gr \in Q$ .  
 $ig(r+1) \supset gr : h \in 0 \supset: g \in 1/h + 1 \supset fh \supset g \in 1/h :$   
 $P2 \cdot 21 \supset: \exists \bigcap g' N_1 \cdot \bigcap g' N_1 = \bigcap f' Q \supset: P$   
 Tribue ad  $h$  valores 1,  $1/2$ ,  $1/3$ , ..., et es in casu de P.1.

Theorema P2.1, fundamentale in plure theoria de Analysis, pote sume vario forma:

·4  $n \in N_1 \cdot f \in \text{Cls}'Cn F N_0 : r \in N_0 \supset: \exists fr \cdot l' m fr \in Q$ .  
 $f(r+1) \supset fr \supset: \exists \bigcap (\lambda fs | s' N_0)$

Si nos tace conditione que classe  $fr$  es clauso, tunc existe elemento commune ad classes limite de classes dato.

·5  $n \in N_1 \cdot f \in \text{Cls}'Cn F N_0 : r \in N_0 \supset: \exists fr \cdot f(r+1) \supset fr \supset: \exists \bigcap (\lambda fs | s, N_0)$

Nos supprime hypothesis que classes de successione es limitato; suffice scribe  $\lambda$  (classe limite generale), in loco de  $\lambda$  (classe limite finito). Vide pag. 139.

·6  $n \in N_1 \cdot f \in (\text{Cls}'Cn \neg \bigwedge) F N_0 \supset: \exists \bigcap [\lambda \bigvee (s + N_0) | s' N_0]$

Nos elimina hypothesis que omni classe contine sequentes; tunc nos considera signo  $\bigcup$  de summa, in sensu logico, de classe que sequet classe de loco  $s$ .

·7 Hyp ·6  $\supset: Lmf = \bigcap [\lambda \bigcup f'(s + N_0) | s' N_0]$  Def

Classe que figura in secundo membro de P.5 vocare « limes » ( $Lm$ ) de successione  $f$ . Si omni classe de successione consta ex uno solo individuo, resulta ut casu particolare Def. de p. 211 P.1.0, pro quantitates reale; definitione generale jam occurre in Geometria pag. 237 P.7.4, et es adoptato in pag. 331, pro definitione de figura tangente. Tunc Prop. sume forma:

·8 Hyp ·6  $\supset: \exists Lm f$   
 analogo ad p. 213 Prop. 2.4, pag. 231 Prop. 40.4, pag. 331 Prop. 68.3.

·9  $n \in N_1 \cdot w \in \text{Cls}'\text{Cls}'Cn : u \wedge v \in w \Rightarrow u \in w \wedge v \in w : u \in w$ .  
 $l' m u \in Q \supset: \exists \lambda u \wedge x \exists [v \in Q \supset: x + v \wedge u \in w]$

Dem.  $f = \bigcup [(n + \theta F 1 \dots n) 2s \wedge w \wedge z \in (\exists \lambda v) | s, N_0] \supset: \exists \bigcap f' N_0$  (1)  
 $Hp(1) \cdot x \in \bigcap f' N_0 \cdot r \in Q \supset: x \lambda u \cdot x + r \wedge u \in w$

Es dato numero naturale  $n$ . Nos considera  $w$ , que es classe de classes de complexos de ordine  $n$ ; id es,  $w$  es proprietate de classes de complexos (non es proprietate de individuos de classe).

Nos dice que ce proprietate es distributivo, quando, si summa in sensu logico de duo classe  $u$  et  $v$  habe proprietate  $w$ , tunc uno ex classes  $u$  et  $v$  habe proprietate  $w$ ; et viceversa, si uno ex classes  $u$  et  $v$  habe proprietate  $w$ , tunc summa de duo classe habe idem proprietate.



Nunc, si aliquo classe  $u$  habe proprietate  $w$  et es limitato, tunc existe aliquo individuo in classe limite de  $u$ , et  $x$  tale que, si nos fixa ad arbitrio radio  $r$ , sphaera de centro  $x$  et de radio  $r$  habe proprietate  $w$ .

In vero, figura composito ex cubos de latere  $1/2^s$ , que es  $w$ , et que habe aliquo puncto commune cum  $u$ , ubi varia numero integro  $s$ , habe proprietates dicto in P·0; ergo existe elemento commune ad omni figura, pro omni  $s$ . Nunc, si nos voca  $x$  elemento commune, illo satisfac thesi.

Præsente forma de theorema P2·1 occurre in G. Cantor, *Ueber unendliche Punktmannichfaltigkeiten*, Math. Ann. t. 13 a. 1884 p. 454.

Exemplo. Propositione « classe  $u$  contine infinito individuos » es proprietate de classe  $u$ , distributivo; ergo si  $u$  es classe cum infinito individuos, et es limitato, tunc existe elemento  $x$ , prope  $u$ , tale que omni sphaera de centro  $x$  contine infinito individuos de classe  $u$ . Vide p. 141 Prop. 5·1.

Alio applicationes de proprietate distributivo es in meo libro a. 1893 t. 2 p. 48.

✱ 3.

Dg (derivata generale)

·0  $n \in N_1 \cdot u \in \text{Cls}'q \cdot f \in \text{Cn } F u \cdot x \in u \delta u \cdot \supset$

$\text{Dg } fx = \text{Lm}[D(f;x,y) | y, u, x]$

Def

Dato functione  $f$ , complexo de variabile reale, in hypothesi de definitione de derivata (pag. 275 P1·2, pag. 284 P15), tunc  $\text{Dg } fx$ , lege « derivata generale de  $f$ , pro valore  $x$  », indica classe limes (Lm) de ratione incrementale de  $f$ , pro valores  $x$  et  $y$ , dum varia  $y$ , in campo ubi es definito  $f$  et verge ad  $x$ .

Classe limes (Lm) es definito in pag. 230 P40, pag. 235 P51, et supra p. 413 P2·7.

Ergo omni functione complexo de variabile reale, pro valore  $x$  in campo de variabilitate de functione, et in suo campo derivato, habe semper derivata generale, que es classe non nullo.

Operatione D es ligato ad Dg, ut lim ad Lm (p. 214 P3·0):

·1 Hyp·0  $\cdot \supset \cdot \text{Df } x = \cdot \text{Dg } fx$

id es, si classe  $\text{Dg } fx$  consta ex uno solo individuo, illo es derivata de  $fx$ .

Regulas de derivatione subsiste cum paucio modificatione, si nos substitue Dg ad D, vel Lm ad lim.

·2 Hyp'0 .  $g \in Cn F u$  . l'm Dg  $fx$ , l'm Dg  $gx \in Q$  .  $\supset$ .

$$Dg [(fx+gx) | x, u]x \supset Dg fx + Dg gx$$

Si derivatas generale de duo functione es limitato, tunc derivata generale de summa continere in summa de derivatas. Vide §D p.279 P5·1, §Lm p.217 P6·2.

·3 Hyp'0 .  $g \in Cn F u$  . D  $gx \in q$  .  $\supset$ .

$$Dg [(fx \times gx) | x, u]x = fx \times Dgx + gx \times Dg fx$$

Si uno factore habe derivata in sensu proprio, tunc derivata generale de producto es dato per regula jam explicato in p.280.

·4 Hyp'0 .  $\supset$ . Dg mod  $fx \supset \pm \theta$  mod Dg  $fx$

·5  $u \in Cls'q$  .  $u \supset \delta u$  .  $n \in N_1$  .  $f \in Cn F u : x \in u$  .  $\supset_x$ . Dg  $fx \supset q$   
:  $\supset$ .  $f \in cont$

Si  $u$  es classe de quantitates, condensato (p.160), vel que continere in derivata, et si  $f$  es complexo de ordine  $n$ , functione definito in campo  $u$ ; et si pro omni valore  $x$  in campo  $u$ , derivata generale de  $fx$  es classe de quantitates (finito), tunc functione  $f$  es continuo. Vide pag. 279 P3·3.

·6  $a, b \in q$  .  $a = b$  .  $n \in N_1$  .  $f \in Cn F a \neg b$  .  $\supset$ .

$$(fb-fa)/(b-a) \in Medio \cup Dg f' a \neg b$$

Theorema de valore medio (pag. 288 pro functione reale, pag. 312 pro functione complexo) sume forma:

Si  $f$  es complexo de ordine  $n$ , functione definito de variabile ab  $a$  ad  $b$ , tunc suo ratione incrementale, pro valores  $a$  et  $b$ , es medio inter classe de classes de derivata generale de  $f$ , in intervallo dato.



## Demonstratione.

In vero, nos nosce positione  $gx = a$  de puncto mobile; ergo es noto suo velocitate  $Dgx = f(gx, x)$ ; vel es noto puncto successivo de  $gx$ , vel puncto ad distantia infinitesimo. Noto novo puncto, es determinato suo velocitate, vel tertio puncto successivo ad secundo; et ita continua.

Isto demoustratione, vel explicatione, plus aut minus diffuso, occurre in libros de Analysis ab Euler, *Institutiones calculi integralis*, a. 1768, t. 1 p. 493, usque ad Lacroix a. 1810 p. 2.

Sed in illo tempore, vocabulo « infinitesimo » non es definitio. Cauchy defini « infinitesimo » ut « quantitate variabile que verge ad 0 »; et isto definitione es secuto hodie in generale (et si aliquo puncto mane obscuro, et existe alio interpretatione). Ergo Cauchy a. 1840, *Exercices* p. 327, evolve demonstratione præcedente ut seque: Integra per approximatione æquatione dato, et transi ad limite. Analysis de demonstratione pone in evidentia plure propositione intermedio, non exposito in modo explicito ab auctores. Isto analysi, vel demonstratione completo, es multo longo.

Nos indica per B solutione approximato de æquatione dato, vel solutione cum errore minore de quantitate positivo  $h$ ; et in P2-3 nos stude proprietates de B. Nos voca A limite de B, quando errore  $h$  verge ad 0; et in Prop. 4-5 nos stude proprietates de A; P7 da expressione explicito de functione que satisfac æquatione dato.

Nam demonstratione de propositione existentielle « existe aliquo  $a$  » semper consta ex constructione, per symbolos de Analysis et de Logica (vel per lingua commune), de aliquo elemento  $x$  in classe  $a$ , secundo regula pag. 12 Prop. 2.1.

\* 2.

B

Hyp P1  $\supset$ : $\forall y \in (x + \omega_1, s) \neg x \cdot k \in Q \supset$ .
$$B(a, x, y, k) = Cn \wedge b \exists \exists (a + r \omega_n) F(x \neg y) \wedge g \exists [gx = a \cdot gy = b : \\ z \in x \neg y \supset_x \cdot Dg g \exists \supset f(gz, z) + k \omega_n]$$

Def

In hypothesis de theorema supra enunciato, si  $y$  es valore

in intervallo de  $x-s$  ad  $x+s$ , differente de  $x$ , et si  $k$  es quantitate positivo, tunc signo  $B(a, x, y, k)$ , lege « valores de solutiones de æquatione dato, que i ex  $a$ , de  $x$  ad  $y$ , cum errore minore de  $k$  » indica omni complexo  $b$  tale que existe complexo  $g$  sumente valores in sphæra de centro  $a$  et radio  $r$ , functione definito de variabile in intervallo  $x \overline{y}$ , que pro valores  $x$  et  $y$  de variabile sume valores  $a$  et  $b$ , et que pro omni valore  $z$  in intervallo  $x \overline{y}$ , satisfac æquatione differentiale dato cum errore minore de  $k$ ; id es, derivata generale de  $gz$  continere in  $f(gz, z)$ , plus complexo de modulo minore de  $k$ .

\*1  $k \in Q \supset B(a, x, x, k) = a$  Def

Si  $y=x$ , classe  $B$  es reducto ad solo elemento  $a$ .

\*2 Hyp 0 .  $b \in B(a, x, y, k) \supset a \in B(b, y, x, k)$

\*3 » .  $z \in x \overline{y} . c \in B(a, x, z, k) . b \in B(c, z, y, k) \supset b \in B(a, r, y, k)$

\*4 » . » .  $b \in B(a, x, y, k) \supset \exists B(a, x, z, k) \wedge B(b, y, z, k)$

\*5 » .  $h \in Q \supset B(a, x, y, k) \supset B(a, x, y, k+h)$

\* 3. Hyp P1  $\supset$ :

\*1  $y \in x \overline{+tu_1} . k \in Q \supset \exists B(a, x, y, k)$

Si  $y$  es valore in intervallo ab  $x-t$  ad  $x+t$ , et  $k$  es quantitate positivo, tunc classe  $B(a, x, y, k)$  non es vacuo, id es existe functione, dato in intervallo  $x \overline{y}$ , que pro valore  $x$  de variabile sume valore  $a$ , et que satisfac æquatione differentiale dato, cum errore minore de  $k$ .

Dem.

$k \in Q \supset \exists (h', h'') \ni h', h'' \in Q : y, z \in x \overline{+tu_1} . m(y-z) < h' . b, c \in a \overline{+ru_1} . m(b-c) < h'' \supset_{y, z, b, c} m[f(c, z) - f(b, y)] < k$  (1)

In vero, functione  $f(b, y)$  es continuo in campo clauso considerato pro  $b$  et pro  $y$ ; ergo habe continuitate uniforme (pag. 239 Prop. 1.3), id es. nos pote determina duo quantitate positivo  $h'$  et  $h''$  in modo que, si  $y$  et  $z$  es duo valore arbitrario in intervallo de  $x-t$  ad  $x+t$ , sed differente in valore absoluto minus que  $h'$ , et si  $b$  et  $c$  es duo valore in sphæra de centro  $a$  et de radio  $r$ , differente inter se in valore absoluto minus que  $h''$ , semper differentia inter valores de functione  $f(c, z)$  et  $f(b, y)$  es minore, in valore absoluto, de  $k$ .

$k \in Q$ .  $h', h'' \in$  ut supra.  $p \in N_1$ .  $p >$

$g^2 (gx = a :$

$q \in 0 \dots (p-1)$ .  $x_q = x + qt/p$ .  $z \in \theta t/p$ .

$\supset: g \in C_n F(x + t u_1) : z \in x + s u_1 \supset$

Si  $k, h', h''$  habe valore ut in propo  
vallo de  $x - t$  ad  $x + t$  in  $2p$  partes :

.....  $x + 2t/p, x - t/p, x, x - t/p, x +$   
 $g$ , definito in intervallo de  $x - t$  ad

$gx = a$ . Si nos nosce valore de  $g$   
ubi  $q$  es uno ex numeros de 0 ad  $p$ .

in intervallo sequente, es definito ut

et in modo analogo in intervallo de  $gx_q + z$

Nos elige  $p$  ita magno, ut interval

Tunc functione  $g$  es definito in tot

satisfac æquatione differentiale dato,

Nam functione  $g$  es definito pro v.

intervallo de  $x_0 = x$  ad  $x_1 = x + t/p$ .

nunc mod  $f(gx_0, x_0) \leq l$ ; ergo

vel pertine ad nostro campo de va

functione  $g$  in intervallo de  $x_1$  ad

pertine ad campo de variabilitate. E

nito in toto intervallo de  $x - t$  ad  $x$

Nunc si nos considera aliquo valo

partiale, ibi functione  $g$  hanc deriva

$z < t/p < h$ ,  $g(x_q + z) - gx_q = z f(gx_q$

Ergo  $m[f(gx_q + z), x_q + z] - f(gx_q$

æquatione, cum errore minore de  $k$ .

In omni puncto de divisione  $x_q$ .

intervallo ante puncto, altero in int

conditione. Ergo derivata generico

(1). (2)  $\supset$ . P

2  $h, k \in Q$ .  $p \in \theta_1$ .  $q \in \theta_1$ .  $r \in m_1$

$q \times [m f(a, x) + h + k] < p$ .

$B(a, x, y, k) \supset a + (y - x) f(a, x)$

Dato duo quantitate positiv

nore de  $l$ , in modo que limit

rentias  $f(c, z) - f(a, x)$ , ubi  $c$  var

radio  $p$ , et  $z$  varia in intervallo de centro  $x$  et de semi-amplitudine  $q$ , es minore de  $h$ , et que producto de  $q$  per modulo de  $f(a, x)$  plus  $h$  plus  $k$  es minore de  $p$ ; et si  $y$  es valore in intervallo de  $x - q$  ad  $x + q$ , tunc classe B, pro elementos  $a, x, y, k$ , continere in sphæra de centro  $a + (y - x)f(a, x)$ , et de radio  $h + k$ .

Dem.

$$\begin{aligned} g\varepsilon(a + pu_n)F x^-y . gx = a : z\varepsilon x^-y \supset Dg\,gz \supset f(gz, z) + ku_n \supset \\ : \quad \quad \quad Dg\,gz \supset f(a, x) + hu_n + ku_n : \\ \S 29\,P3.3 \supset gy \varepsilon a + (y - x)[f(a, x) + (h + k)u_n] \end{aligned} \quad (1)$$

Si  $g$  es functione definita in intervallo de  $x$  ad  $y$ , que sume valores in sphæra de centro  $a$  et de radio  $p$ ; que pro valore  $x$ , sume valore  $a$ ; et que pro omni valore in intervallo de  $x$  ad  $y$  satisfac æquatione differentiale dato, cum errore minore de  $k$ ; tunc pro omni valore  $z$  in intervallo  $x^-y$ , derivata de  $g$  differ de  $f(a, x)$  de quantitate minore de  $h + k$ . Unde, per theorema de valore medio,  $gy$  es in sphæra de centro  $a + (y - x)f(a, x)$  et de radio  $(y - x)(h + k)$ .

$$\begin{aligned} b\varepsilon B(a, x, y, k) . g\varepsilon(a + pu_n)F x^-y . gx = a . gy = b : \\ z\varepsilon x^-y \supset x . Dg\,gz \supset f(gz, z) + ku_n : \\ v = [m(gz - a) - p \mid z, x^-y] \supset v\varepsilon(q F x^-y)\text{cont} . vx = -p < 0 \end{aligned} \quad (2)$$

$$\text{Hp}(2) . x'\varepsilon x^-y : z\varepsilon x^-x' \supset z . vz < 0 \supset$$

$$: \quad \quad \quad . gz \varepsilon a + pu_n : (1) \supset . m(gx' - a) < q \times [m f(a, x) + h + k] < h \supset vx' < 0 \quad (3)$$

Nunc si  $b$  es uno ex valores de  $B(a, x, y, k)$ , et si nos determina  $g$ , complexo sumente valores in sphæra de centro  $a$  et de radio  $r$ , functione definita in intervallo de  $x$  ad  $y$ , que pro valores  $x$  et  $y$  sume valores  $a$  et  $b$ , et que in intervallo de  $x$  ad  $y$  satisfac æquatione differentiale cum errore minore de  $k$ ; nos demonstra que valores de  $g$  es in sphæra de centro  $a$  et de radio  $p$ . Nam nos voca  $v$  functione mod  $gz - a - p$ , ubi varia  $z$ , in campo  $x^-y$ ; tunc  $v$  es quantitate reale, functione continuo in intervallo de  $x$  ad  $y$ , que pro  $x$  sume valore negativo; et es tale que si in interno de aliquo intervallo  $x^-x'$ , es semper negativo, resulta etiam negativo pro extremo  $x'$ .

$$\begin{aligned} x, y \varepsilon q . x = y . v\varepsilon(q F x^-y)\text{cont} . vx < 0 \therefore x'\varepsilon x^-y : z\varepsilon x^-x' \supset x . vz < 0 \\ \supset x' . vx' < 0 \therefore z\varepsilon x^-y \supset x . vz < 0 \end{aligned} \quad (4)$$

$$\text{Hp}(2) . (3) . (4) \supset z\varepsilon x^-y \supset x . vz < 0 \supset g\varepsilon(a + pu_n)F x^-y . (1) \supset . b\varepsilon a + (y - x)[f(a, x) + (h + k)u_n] \quad (5)$$

Ergo (per Prop. 2.1 de pag. 239, transformato), illo es semper negativo in toto intervallo; id es valores de  $gz$  es semper in sphæra de centro  $a$  et radio  $p < r$ ; unde, per P.1,  $gy = b$  satisfac conditione scripto.

(5). Elim  $g$ . Oper  $b\varepsilon$   $\supset$  P

Si nos elimina  $g$ , que existe in hypothesi scripto, et nos opera per  $b\varepsilon$ , resulta theorema.

$$\cdot 3 \quad h, k \in Q . y \in x + tw_1 . \supset . \lambda B(a, x, y, h) \supset B(a, x, y, h+k)$$

Dato duo quantitate positivo  $h$  et  $k$ , et  $y$  in intervallo de centro  $x$  et amplitudo  $2t$ , tunc classe limite de  $B$ , pro errore  $h$ , continere in  $B$ , pro errore  $h+k$ .

Dem.

$$\begin{aligned} & b \in \lambda B(a, x, y, h) . p \in Q . z \in x^- y . l' m[f(b+pu_n : z^- y) - f(b, y)] < k/3 . \\ & (y-z) \times [m f(b, y) + h + k] < p . c \in B(a, x, y, h) . m(c-b) < k(y-z)/3 : P \cdot 2 . \\ & \supset . B(c, y, z, h) \supset c + (z-y)[f(b, y) + (h+k/3)u_n] . c \in b + (z-y)k/3 u_n . \supset . \\ & B(c, y, z, h) \supset b + (z-y)[f(b, y) + (h+2k/3)u_n] \end{aligned} \quad (1)$$

Si  $b$  es valore limite de classe  $B(a, x, y, h)$ , et si nos determina quantitate positivo  $p$ , et valore  $z$  in intervallo de  $x$  ad  $y$ , in modo que limite supere de modulus de differentia inter valore de  $f'$  pro valores in sphaera de centro  $b$  et radio  $p$ , et in intervallo  $x^- y$ , et  $f(b, y)$ , es minore que  $k/3$ , et in modo que  $y-z$  multiplicato per  $m[f(b+pu) + h+k]$  es minore de  $p$  (et semper lice determinatione de  $p$  et de  $z$ ), et si nos sume valore  $c$  in campo  $B(a, x, y, h)$ , que differ de limite  $b$  minus que  $k(y-z)/3$  (quod lice), tunc, per propositione praecedente,  $B(c, y, z, h)$  continere in  $c + (z-y)[f(b, y) + (h+k/3)u_n]$ ; vel, per relatione inter  $b$  et  $c$ , continere in  $b + (z-y)[f(b, y) + (h+2k/3)u_n]$ .

$$\begin{aligned} \text{Hp}(1) . P \cdot 2 \cdot 4 . \supset . \supset B(a, x, z, h) \wedge B(c, y, z, h) . (1) . \supset . \\ \supset B(a, x, z, h) \wedge [b + (z-y)[f(b, y) + (h+2k/3)u_n]] \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \text{Hp}(1) . d \in B(a, x, z, h) \wedge [b + (z-y)[f(b, y) + (h+2k/3)u_n]] . \\ g = [d + (b-d)(u-z)/(y-z)] u . z^- y . \supset : gz = d . ggy = b : \\ u \in x^- y . \supset u . D_y g u = (b-d)/(y-z) \in [f(b, y) + (h+2k/3)u_n] . \supset : \\ m[D_y g u - f(gu, u)] < h+2k/3+k/3 = h+k \end{aligned} \quad (3)$$

Si literas serva valore praecedente, existe valore commune ad classes  $B$  de  $x$  ad  $z$ , et de  $y$  ad  $z$ ; sed secundo classe continere in classe supra scripto, ergo, si nos sume aliquo valore  $d$  in classe  $B$ , de  $x$  ad  $z$ , et tale que  $m[(d-b)/(z-y) - f(b, y)] < h+2k/3$ , et si nos voca  $g$  functione lineare, que pro valores  $z$  et  $y$  de variable  $u$  sume valores  $d$  et  $b$ , isto functione satisfac aequatione differentiale cum errore minore de  $h+k$ .

$$\text{Hp}(3) . \supset . b \in B(d, z, y, h+k) . d \in B(a, x, z, h) . \supset . b \in B(a, x, y, h+k) \quad (4)$$

Ergo  $b$  pertine ad classe  $B$ , ex  $d$ , de  $z$  ad  $y$ , pro errore minore de  $h+k$ ; sed  $d$  pertine ad classe  $B$ , ex  $a$ , de  $x$  ad  $z$ , cum errore minore de  $h$ , ergo cum errore minore de  $h+k$ ; ergo  $b$  es valore de solutione de aequatione dato que i ex  $a$ , de  $x$  ad  $y$ , cum errore minore de  $h+k$ .

$$(4) . \text{Elim } p, z, c, d . \text{ Oper } b \supset . P$$

Si ex (4) nos elimina literas  $p, z, c, d$ , que figura in hypthesi et non in thesi, et que representa elementos existente per hypothesis de theorema, et si nos opera per  $b \supset$ , resulta Proq.



\* 4.

A

Hyp P1  $\supset$ :

$$\cdot^0 \quad y \in x + w_1 t \supset A(a, x, y) = \bigcap [B(a, x, y, k) \mid k \in Q] \quad \text{Def}$$

In hypothesis de Prop. 1, super  $f, a, x, r, t$ , tunc, si  $y$  es in intervallo de  $x - t$  ad  $x + t$ , nos pone  $A(a, x, y) =$  parte commune ad omni classe  $B(a, x, y, k)$ , ubi varia  $k$ , et sume valores positivo.

$$\cdot^1 \quad A(a, x, x) = ia \quad [P \cdot 0 \cdot P2 \cdot 1 \supset P]$$

$$\cdot^2 \quad \text{Hyp} \cdot 0 \cdot b \in A(a, x, y) \supset a \in A(b, y, x) \quad [P2 \cdot 2 \supset P]$$

$$\cdot^3 \quad \text{Hyp} \cdot 0 \supset \lambda A(a, x, y) = A(a, x, y) \quad [\S 29 P2 \cdot 2 \supset P]$$

$$\cdot^4 \quad \text{Hyp} \cdot 0 \cdot \exists x \neg y \cdot c \in A(a, x, z) \cdot b \in A(c, z, y) \supset b \in A(a, x, y) \quad [P2 \cdot 3 \supset P]$$

\* 5 $\cdot$ 1 Hyp P4 $\cdot$ 0  $\supset \exists A(a, x, y)$ 

In hypothesis supra scripto, existe aliquo individuo in classe  $A(a, x, y)$ .

Dem.

$$k \in Q \cdot P3 \cdot 1 \supset \exists B(a, x, y, k) \cdot B(a, x, y, k) \supset a + r w_n$$

$$\cdot \quad h \in Q \cdot P2 \cdot 5 \supset \lambda B(a, x, y, h) \supset B(a, x, y, k)$$

$$\S 29 P2 \cdot 3 \supset \exists \bigcap B(a, x, y, k) \mid k \in Q \supset P$$

In vero, pro omni  $k$ , classe  $B$  existe; et si  $h < k$ , classe limite de  $B$  pro  $h$  continere in  $B$  pro  $k$ ; ergo, per propositione de § præcedente, existe elemento commune ad omni  $B$ .

$$\cdot^2 \quad \text{Hyp} \cdot 1 \cdot b \in A(a, x, y) \cdot \exists x \neg y \supset \exists A(a, x, z) \wedge A(b, y, z)$$

Dem.

$$k \in Q \cdot \text{Def } A \supset b \in B(a, x, y, k) \quad (1)$$

$$k \in Q \cdot \beta k = B(a, x, z, k) \cdot \beta' k = B(b, y, z, k) \cdot (1) \cdot P2 \cdot 4 \supset \exists \beta k \wedge \beta' k \quad (2)$$

$$\text{Hp}(2) \cdot h \in Q \cdot h < k \cdot \S 1 \text{ (p.140)} P1 \cdot 4 \cdot P3 \cdot 3 \supset \lambda(\beta h \wedge \beta' h) \supset \lambda \beta h \wedge \lambda \beta' h$$

$$\lambda \beta h \supset \beta k \cdot \lambda \beta' h \supset \beta' k \supset \lambda(\beta h \wedge \beta' h) \supset \beta k \wedge \beta' k \quad (3)$$

$$(2) \cdot (3) \cdot \S 29 P2 \cdot 3 \supset \exists \bigcap (\beta h \wedge \beta' h \mid h \in Q)$$

$$\bigcap (\beta h \wedge \beta' h \mid h \in Q) \supset (\bigcap \beta' Q) \wedge (\bigcap \beta' Q) = A(a, x, z) \wedge A(b, y, z) \supset P$$

$$\cdot^3 \quad h \in Q \supset \exists \theta t \wedge k \exists [y \in x + k w_1 \supset y \cdot$$

$$A(a, x, y) \supset a + (y - x)[f(a, x) + h w_n]$$

$$[P3 \cdot 2 \supset \exists \theta t \wedge k \exists [y \in x + k w_1 \supset B(a, x, y, h/2) \supset a + (y - x)[f(a, x) + h w_n \wedge A(a, x, y) \supset B(a, x, y, h/2)] \supset P]$$

\* 6.

$$\cdot 1 \quad n \in N_1 . u \in \text{Cls}'Cn . \supset . \omega u = \iota Cn \cap xz \{ r \in 1 \cdots n . \supset . x_r = \iota E_r' u \wedge z \{ s \in 1 \cdots (r-1) . \supset . z_s = x_s \} \} \quad \text{Def}$$

$$\cdot 2 \quad n \in N_1 . u \in \text{Cls}'Cn . \exists u . \iota m u \in Q . \lambda u = u . \supset . \omega u \in u$$

In P7 nos debe elige uno individuo in classe determinato, que contine plure individuo; et hoc per numero infinito de vice. Forma de ratiocinio, ubi occurre electione de elemento arbitrario, per numero infinito de vice, se praesenta in plure libro; observatione que isto electione non es licito, occurre in meo articulo de MA. t. 37 p. 210, et alibi. Vide RdM. t. 8 p. 145;

Jourdain, *Quarterly Journal* a. 1907 p. 352,

Zermelo MA, a. 1908 t. 65 p. 111, etc. etc.

Ergo nos da lege, que, ad omni classe satisfaciens aliquo conditione, fac corresponde individuo in ce classe.

·1 Si  $n$  es numero, et  $u$  es classe de complexos de ordine  $n$ , tunc  $\omega u$  indica illo complexo  $x$  tale que suo primo coordinata  $x_1$  aequa limite supero de primo coordinatas de individuos de  $u$ ; suo secundo coordinata aequa limite supero de secundo coordinatas de individuos de classe  $u$ , que habe ut primo coordinata  $x_1$ ; et in generale, suo coordinata de indice  $r$  vale limite supero de coordinatas de individuos de classe  $u$ , que habe omni coordinata praecedente aequale ad coordinata jam determinato de  $x$ .

·2 Si classe  $u$  es existente, vel non vacuo, et limitato et clauso, tunc  $\omega u$  indica individuo in classe  $u$ .

Dem. pro  $n = 2$ .

$$\text{Hp } \supset . E_1' u \in \text{Cls}'q . \exists E_1' u . \iota m E_1' u \in Q . \lambda E_1' u = E_1' u . \supset .$$

$$x_1 = \iota E_1' u \in E_1' u . \supset . \exists u \wedge y \{ y_1 = x_1 \} \quad (1)$$

$$(1) . u_1 = u \wedge y \{ y_1 = x_1 \} . \supset . \exists u_1 . u_1 \supset u . \lambda u_1 = u_1 . \supset .$$

$$x_2 = \iota E_2' u_1 \in E_2' u_1 . \supset . \exists u_1 \wedge y \{ y_2 = x_2 \} . \supset . \exists u \wedge y \{ y_1 = x_1 . y_2 = x_2 \} . \supset . \exists u \wedge y \{ y = x \} . \supset . x \in u$$

Si nos considera successione composito ex classes aequale ad  $u$ , tunc limite de successione es ipso classe  $u$ . In isto casu, theorema de §29 P2.0 determina uno individuo in classe  $u$ , que es ipso  $\omega u$ . Sed nos praefere demonstratione directo de theorema.

$$\cdot 3 \quad m \in N_0 . \supset . Z_m = x + (y - x)(0 \cdots 2^m) / 2^m \quad \text{Def}$$

$$\cdot 4 \quad Z = \bigcup (Z_m | m \in N_0) \quad \text{Def}$$

\* 7.

Hyp P1 .  $y \in x + w, t . b \in A(a, x, y) . g = \iota (Cn F x \neg y) \wedge g z$   
 $\{ g x = a . g y = b :$   
 $m \in N_0 . z \in Z_{m+1} = Z_m . z_1 = z - (y - x) 2^{m+1} . z_2 = z + (y - x) 2^{m+1} .$   
 $\bigcup . g z = \omega [A(g z_1, z_1, z) \wedge A(g z_2, z_2, z)] :$   
 $z \in x \neg y - Z . \bigcup . g z = \iota \bigcap [A(g u, u, z) | u \in Z] \{$   
 $\bigcup . g \in Cn F x \neg y . D g = [f(g z, z) | z, x \neg y]$

Si  $n, a, x, f, r, t$  habe sensu ut in Prop. 1, si  $y$  es valore in intervallo de  $x - t$  ad  $x + t$ , et  $b$  es complexo in classe  $A(a, x, y)$ , et si nos determina  $g$ , complexo functione definito in intervallo de  $x$  ad  $y$ , per conditiones sequente:

Pro variabile  $= x$  et  $y$ ,  $g$  sume valores  $a$  et  $b$ .

Si nos divide intervallo de  $x$  ad  $y$  in duo parte æquale, et pone  $z = x + (y - x)/2$ , tunc existe classe commune ad  $A(gx, x, z)$  et  $A(gy, y, z)$ ; sume in isto classe individuo  $\omega$ ; isto es valore de  $gz$ . Nos divide intervallo partiale in novo partes; ita functione  $g$  es definito pro omni valore de classe  $Z$ ; vel pro omni puncto de divisione de intervallo  $x \neg y$  in numero potestate de 2, de partes æquale.

Si  $z$  es in intervallo  $x \neg y$ , sed non es aliquo puncto de divisione, tunc  $gz$  es elemento commune ad omni classe  $A(gu, u, z)$ , ubi  $u$  sume omni valore in classe  $Z$ .

Tunc  $g$  es in realitate complexo functione dato in intervallo  $x \neg y$ , vel conditiones scripto defini functione, et  $g$  satisfac æquatione differentiale dato.

Dem.

(a)  $z \in Z_0 . \bigcup . gz \in Cn$   
 $[ z \in Z_0 : \supset : z = x . \vee . z = y : gx = a . gy = b : \supset Ths ]$

Si  $z$  es uno ex extremos de intervallo  $x \neg y$ , tunc  $gz$  es complexo determinato.

(a')  $z, z' \in Z_0 . \bigcup . gz' \in A(gz, z, z')$   
 $[ z, z' \in Z_0 : \supset : z = x . z' = y . \vee . z = y . z' = x . \vee . z = z' = x . \vee . z = z' = y : P4.2 . P4.1 : \supset P ]$

Et, si  $z$  et  $z'$  es extremos (coincidente aut non),  $gz'$  pertine ad classe  $A$  de  $gz$ ; nam hoc significa aut  $b \in A(a, x, y)$ , quod es hypothesi; aut  $a \in A(b, y, x)$ , quod resulta ex hypothesi per P4.2; aut  $a \in A(a, x, x)$ , aut  $b \in B(b, y, y)$ , quod resulta ex P4.1.

$$\begin{aligned}
 (\beta) \quad & m\epsilon N_0 : z\epsilon Z_m . \supset_x . gz \epsilon Cn : z, z' \epsilon Z_m . \supset_{x,x'} . gz' \epsilon A(gz, z, z') \\
 & :\supset : z\epsilon Z_{m+1} . \supset_x . gz \epsilon Cn : z, z' \epsilon Z_{m+1} . \supset_{x,x'} . gz' \epsilon A(gz, z, z') \\
 & [ z\epsilon Z_{m+1} \wedge Z_m . z_1 = z - (y-x)/2^{m+1} , z_2 = z + (y-x)/2^{m+1} . \supset \\
 & z_1, z_2 \epsilon Z_m . \supset . gz_2 \epsilon A(gz_1, z_1, z_2) . \supset [A(gz_1, z_1, z_2) \cap A(gz_2, z_2, z)] ] \epsilon Q . \\
 & P3 \cdot 3 . \S 1 \text{ (pag.140)} P1 \cdot 41 . \supset . \lambda[ \begin{array}{ccc} & I'm[ & \\ & " & \\ & " & \end{array} ] \epsilon Q . \\
 & P6 \cdot 2 . \supset . \omega[ \begin{array}{ccc} & " & \\ & " & \end{array} ] \epsilon Cn \\
 & . \supset . gz \epsilon Cn . gz \epsilon A(gz_1, z_1, z) . gz \epsilon A(gz_2, z_2, z) \\
 & u\epsilon Z_m \cap x^- z . \supset . gz_1 \epsilon A(gu, u, z_1) . gz \epsilon A(gz_1, z_1, z) . \supset . gz \epsilon A(gu, u, z) \\
 & u\epsilon Z_m \cap x^- y . \supset . gz_2 \epsilon \begin{array}{ccc} " & " & \\ & z_2 & \end{array} \supset . \begin{array}{ccc} " & " & \\ & z_2 & \end{array} \supset . \begin{array}{ccc} " & " & \\ & z_2 & \end{array} \\
 & u\epsilon Z_m . (2) . (3) . \supset . gz \epsilon A(gu, u, z) \\
 & z, z' \epsilon Z_{m+1} \wedge Z_m . z'' \epsilon Z_m \cap x^- z' . \supset . gz'' \epsilon A(gz, z, z'') . gz' \epsilon A(gz'', z'', z') \\
 & . \supset . gz' \epsilon A(gz, z, z') \\
 & (1) . (5) . \supset . P
 \end{aligned}$$

Si functione  $g$  es definito pro punctos de divisione de intervallo  $x-y$  in  $2^m$  partes, et semper, si  $z$  et  $z'$  es punctos de divisione,  $gz'$  es  $A$  de  $gz$ ; tunc functione  $g$  es etiam definito pro punctos de divisione successivo, et satisfac idem conditione.

In vero, si  $z$  es puncto de divisione in  $2^{m+1}$  partes, distincto ab punctos de divisione in  $2^m$  partes, et si nos voca  $z_1$  et  $z_2$  punctos de classe  $Z_m$  que contine  $z$ , tunc  $gz_2$  es A de  $gz_1$ ; ergo classe commune ad A ex  $gz_1$ , ab  $z_1$  ad  $z$ , et ad A ex  $gz_2$ , ab  $z_2$  ad  $z$ , es non vacuo, limitato, clauso; ergo operatione  $\omega$  da individuum determinato in classe.

(2)(3)(4)(5) demonstra secundo parte de theorema.

$$(7) \quad z \in Z \supset, g z \in Cn \quad : \quad z, z' \in Z \supset, g z' \in A(gz, z, z')$$

$$[ \quad (a), (a'), (b), \text{Inductione} \supset, P \quad ]$$

Ergo, pro omni puncto de divisione de intervallo  $x^-g$  in partes, in numero arbitrario, semper es determinato  $g$ , et omni valore de functione  $g$  es A de omni alio, pro variabiles in campo  $Z$ .

[illegible]

(1) 2. 7. 18

Nunc nos demonstra que pro omni valore de intervallo de  $x$  ad  $h$ , functione  $g$  es determinato.



## \* 9.

Hyp P1.  $\text{l'm} \bigcup \text{Dg}_1 f(a + r u_n : x + t u_1) \varepsilon Q . g, g' \varepsilon \text{Cn F}(x + t u_1) .$

$$g x = g' x = a . \text{Dg} = [f(g z, z) | z, x + t u_1] .$$

$$\text{Dg}' = [f(g' z, z) | z, x + t u_1] . \supset . g = g'$$

Ad hypothesi Prop. 1, nos adde novo conditione. Considera  $f(a, x)$  ut functione de suo primo elemento; et fac suo derivata.

Isto derivata es derivata partiale, indicato per  $D_1 f(a, x)$ , in pag. 328. Sed  $a$  es complexo; ergo nos es in casu de pag. 330, et  $D_1 f(a, x)$  repræsenta substitutione de ordine  $n$ , id es substitutione expresso per matrice que habe pro elementos derivatas partiale de  $n$  coordinatas de  $f$  pro  $n$  coordinatas de  $a$ .

Pro majore generalitate, nos non suppose existentia de derivatas; ergo nos considera derivata generale, supra definito.

Nos adde conditione que limite supero de modulo de omni valore in classes de derivata generale de  $f$ , pro primo elemento, ubi duo variable varia in compos dato in Prop. 1, es finito. Hoc significa que omni derivata generico partiale de coordinatas de  $f$  pro coordinatas de  $a$ , es minore de quantitate determinabile. Id es,

$$m[f(d, u) - f(d', u)] / m(d - d')$$

pro omni systema  $d, d' \varepsilon a + r u_n, u \varepsilon x + t u_1$ ,  
habe limite supero finito.

Tunc, si  $g$  et  $g'$  es duo functione, que habe idem valore  $a$  pro variable  $= x$ , et ambo satisfaciende æquatione differentiale dato, illo es semper identico.

Id es esiste uno, et uno solo complexo functione definito in intervallo de  $x - t$  ad  $x + t$ , que pro variable  $= x$ , sume valore  $a$ , et que satisfac æquatione differentiale dato.

Dem.

Hp.  $p = \text{l'm} \bigcup \text{Dg}_1 f(\dots) . d, d' \varepsilon a + r u_n . u \varepsilon x + t u_1 . \supset .$

$$m[f(d, u) - f(d', u)] \leq p \times m(d - d') \quad (1)$$

Hp(1) .  $u \varepsilon x + \theta t . \supset . \text{Dg } m(gu - g'u) \supset m(\text{Dgu} - \text{Dg}'u) - Q_0$

$$\supset m[f(gu, u) - f(g'u, u)] - Q_0$$

$$\supset p \times m(gu - g'u) - Q_0$$

$$\supset . [\text{Dg } m(gu - g'u) - p \times m(gu - g'u)] \times e\mathcal{N}(-pu) \supset -Q_0$$

$$\supset . \text{Dg } [m(gu - g'u) \times e\mathcal{N}(-pu) | u, x + \theta t] u \supset -Q_0$$

$$\supset . \Delta [ \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad | u; x, u ] \leq 0$$

$$\supset . m(gu - g'u) \times e\mathcal{N}(-pu) \leq 0 . \supset . m(gu - g'u) = 0$$

$$\supset . gu = g'u \quad (2)$$

$$(2) \supset P$$

In vero, si nos voca  $p$  limite supero de modulus de derivata-substitutione de  $f$ , pro primo elemento, in toto campo supra considerato de duo elemento, limite supero que es finito, tunc  $\text{mod}(gu-g'u)$ , ubi varia  $u$ , es nullo pro  $u=x$ , et suo derivata generale es classe de valores minore de  $p \times \text{mod}(gu-g'u)$ . Ergo isto functione satisfac in-æquatione differentiale lineare, simile ad æquatione differentiale lineare, tractato in pag. 323.

Nos tracta in-æquatione in modo analogo.

Multiplica per  $e^{-pu}$ , resulta functione que habe derivata generale negativo aut nullo; ergo suo incremento es negativo aut nullo; sed pro  $u=x$ , functione es nullo; ergo illo, que non sume valores negativo, es semper nullo; id es, pro omni valore de  $u$ , es  $gu=g'u$ ; quod significa  $g=g'$ .

\* 10.

Exemplo.

$$1 \quad f \in \text{qFq} \cdot Df = [3(fx) \wedge (2/3) \mid x, q] \text{ .} =.$$

$$f = (a0 : q) \text{ .} \text{ .}$$

$$\exists q \wedge a \exists f = (a0 : a - Q_0) \cup [(x-a)^3 \mid x, a+Q_0] \text{ .} \text{ .}$$

$$\exists q \wedge a \exists f = [(x-a)^3 \mid x, a-Q_0] \cup (a0 : a+Q_0) \text{ .} \text{ .}$$

$$\exists (a,b) \exists [a,b \in q \cdot a \geq b \cdot f = [(x-a)^3 \mid x, a-Q_0] \cup (a0 : a-b) \cup [(x-b)^3 \mid x, b+Q_0] \text{ .}$$

Omni  $f$ , functione reale de variabile reale, que pro omni  $x$ , satisfac æquatione

$$Df x = 3(fx) \wedge (2/3),$$

aut es semper nullo,

aut es nullo de  $-\infty$  usque ad aliquo valore finito  $a$ , et de isto valore in post, habe forma  $(x-a)^3$ ,

aut habe forma  $(x-a)^3$  pro valores de  $-\infty$  ad  $a$ , et es nullo de  $a$  ad  $+\infty$ ,

aut de  $-\infty$  ad valore finito  $a$  habe forma  $(x-a)^3$ , de  $a$  ad valore maiore  $b$ , es nullo, et de  $b$  ad  $+\infty$  habe forma  $(x-a)^3$ .

Ergo existe infinito functione, que satisfac æquatione differentiale et que pro valore arbitrario  $a$ , sume valore 0.

$$2 \quad f \in \text{qFq} \cdot Df = [4x^3(fx) \cdot [x^4 + (fx)^2] \mid x, q] \text{ .} =.$$

$$\exists q \wedge c \exists f = [c \pm \sqrt{c^2 + x^4} \mid x, q] \text{ .}$$

Omni solutione de æquatione differentiale scripto in primo membro habe forma scripto in secundo, ubi  $c$  es constante arbitrario.

Si per  $c > 0$  nos sume radicale cum signo  $-$ , et per  $c < 0$ , radicale cum signo  $+$ , resulta solutiones, in numero infinito, que satisfac conditione  $f0=0$ .

$Df x$  es dato ut functione continuo de  $x$  et  $f x$ , si ad expressione, pro  $x=0$ ,  $f x=0$ , nos tribue ut valore suo limite 0.

*Historia.*

Cauchy, *Exercices* a.1840 p.327, demonstra theorema P1 et P9, in hypothesisi de existentia et continuitate de  $D_1f$ , id es, de derivatas partiale de coordinatas de  $f$  pro coordinatas de  $a$ .

Lipschitz, *Ann. di Mat.* a.1868 p.288, BD. a.1876 p.149, expone theorema æquivalente ad P9.

Me habet reducto in symbolos demonstratione in:

Démonstration de l'intégrabilité des équations différentielles ordinaires, MA. a.1890 t.37 p.182. Vide :

TorinoA. a.1886, AnnN. a.1892 p.289.

G. Mie, MA. a.1893 t.43 p.553.

Encyclopædie t.2 p.197.

Ex demonstratione resulta que, pro existentia de solutione, sufficit que functione  $f$  es continuo.

Demonstratione in pag. 416-428 es reproductione de demonstratione nunc citato, post aliquo reductione de ratiocinio et de scriptura.

Ch. de la Vallée-Poussin, BruxellesM. t.47 a.1893, et

C. Arzelà, BolognaM. t.5 a.1935 p.225, t.6 a.1896 p.131, demonstra que in hypothesisi de continuitate de  $f(a,x)$  pro  $a$ , et integrabilitate pro  $x$ , classe B verge ad limite  $\Lambda$ .

W. F. Osgood, Monatsh. t.9 a.1898 p.322 demonstra que solutione de æquatione differentiale es univoco, non solo in hypothesisi de Prop. 9, sed et si 
$$m[f(d,u)-f(d',u)] / m[(d'-d) \log m(d'-d)]$$
 vel 
$$" / m[(d'-d) \log m(d'-d) \log \log m(d'-d)]$$
 etc., ubi  $d, d', u$  varia in campos indicato in Prop. 9, habet limite supero finito.

Univocitate subsiste et in alios casu. P. ex. æquatione  $Dgx = f(gx)$ , si  $f$  non es nullo, habet solutione unico, ut resulta ex P11-2, et nullo hypothesisi es facto super derivata de  $f$ .

Vide: Bliss, *The solutions of differential equations...*, Annals of Math. s.2 t.6 a.1905 p.49.

Bolza, AmericanT. a.1906 t.7 p.464.

## \* 11.

\*1  $u \in \text{Intv} . f \in (qFu) \text{cont} . x_0 \in u . y_0 \in q . \supset :$   
 $g \in qFu . Dg = f . g x_0 = y_0 . \equiv . g = [y_0 + S(f; x_0, x)] | x, u \}$

Dem. §S p.343 P12-1  $\supset$  P

Si  $f$  es functione reale, definito in intervallo  $u$ , et continuo, et es dato duo quantitate  $x_0$  et  $y_0$ , tunc omni functione  $g$  definito in intervallo  $u$ , que pro valore  $x_0$  sume valore  $y_0$ , et





$$\text{1. } g \in \mathcal{QFq} \supset: \\ f \in \mathcal{QFq} \text{ . } Df = (gx \times fx \mid x, q) \text{ .} =. f = [f0 \in \mathcal{NS}(g; 0, x) \mid x, q]$$
$$Df x = g x \times f x,$$

$f(x) = f(0) + \int_0^x g(t) dt$  integrale de  $g$ , de 0 ad  $x$ ,

Dein.

$$\begin{aligned}
Df &= [(gx \times fx) \cdot x, q] \quad ::= \quad xsq \cdot \neg x \cdot Dfx = gx \times fx \\
& ::= \quad \text{»} \quad : [e \vdash S(g; 0, x)] \times (Dfx - gx \times fx) = 0 \\
& ::= \quad \text{»} \quad D : [e \vdash S(g; 0, x)] \times fx \cdot x, q : x = 0 \\
& ::= \quad \text{»} \quad J : [e \vdash S(g; 0, x)] \times fx \cdot x, 0 : x = 0 \\
& \vdash \quad e \vdash S(g; 0, x) \times fx = f0 \\
& ::= \quad \text{»} \quad fx = (f0) \times e \vdash S(g; 0, x) \\
& ::= \quad f = [f0 \times e \vdash S(g; 0, x) \cdot x, q]
\end{aligned}$$

In vero, transporta in primo membro, et multiplica per  $e^{-S(g;0,x)}$ ; primo membro fi derivata de expressione scripto; unde incremento de functione es nullo, vel valore de functione vale suo valore pro  $x=0$ ; unde nos deduce valore de  $f.x$ , et infine functione  $f$ .

2.  $g, h \in \mathbf{qFq} \cdot \supset: f \in \mathbf{qFq} \cdot \text{Df} = [(gx \times fx + hx) | x, q] \cdot =.$   
 $f = \{ \mathbf{eF}(S(g; 0, r) [f \mathbf{0} + S] \{ \mathbf{eF} - S(g; 0, r) \} \times h x | x; 0, r') | x, q \}$   
 } LEIBNIZ A. Erud. a. 1694 Math. S. t. 5 p. 313 {

$$Df(x) = g(x) \times f(x) + h(x)$$

vocare in  $f$  «equatione differentiale lineare». Si  $gx$  es constante, et  $h.r$  es nullo, resulta æquatione considerato in p.323.

Calcolo de functione  $f$ :  $x \in q \rightarrow \exists x. Df.x = qx \wedge x \neq hx$

**Transporta :**  $x \in q \rightarrow \bigcup_x . Df x - g.x f x = h x$

Moltiplica per  $e^{-S(g;0,x)}$ :

$$x \vDash q \rightarrow \bigcup_x . D[e \Vdash S(g; 0, x) \times f x | x, q] x = e \Vdash S(g; 0, x) \times h x$$

Integra ab 0 ad  $x$ :

$$x \in q . \supset_x . e \Vdash -S[g; 0, r] \times f x - f 0 = S[e \Vdash -S[g; 0, r] \times h x | x; 0, x]$$

Trahe  $fx$ :

$$x \in q \rightarrow \exists x . fx = e \wedge S(q; 0, x) \wedge f0 + S[e \wedge \neg S(q, 0, x) \times hx|x; 0, x]$$

Unde nos deduce  $f =$  secundo membro, ubi varia  $x$  in campo de numeros reale.

\*3  $g, h \in \mathbf{q} \mid \mathbf{q} \mid m \in \mathbf{q} \neq 0 \Rightarrow f \in \mathbf{q} \mathbf{F} \mathbf{q} \mid Df = [g \cdot x \times f \cdot x + h \cdot x (f \cdot x)^{m-1}] \cdot x \cdot \mathbf{q} \mid$   
 $\Rightarrow [ (f \cdot x)^{-m} \cdot \mathbf{q} \mid m S(g; 0, x) - m S(h \cdot x \times \mathbf{q} \mid m S(g; 0, x) \cdot x; 0, x) \mid$   
 $\mid x, \mathbf{q} \mid \in (\mathbf{q} \mathbf{F} \mathbf{q}) \text{const}$

} JAC. BERNOULLI AErud. a.1695 p.553; JOH. BERNOULLI  
 Opera t.1 p.175 }

Æquatione in functione  $f$ :

$$Df \cdot x = g \cdot x \times f \cdot x + h \cdot x (f \cdot x)^{m+1} \text{ pro omni } x,$$

vocare « æquatione differentiale de Bernoulli », nam tractato per ce fratres.

*Solutio.* Divide per  $f \cdot x^{m+1}$ ; æquatione fit  
 $(f \cdot x)^{-m-1} Df \cdot x = (g \cdot x (f \cdot x)^{-m} + h \cdot x$   
 vel  $D f \cdot x^{-m} = -m g \cdot x f \cdot x^{-m} - m h \cdot x$   
 que es æquatione differentiale de forma 2. si nos sume  $f \cdot x^{-m}$  ut functione.

\*4  $n \in \mathbf{N}_1 \mid a \in \text{Subst } n \mid h \in \text{Cn } f \cdot \mathbf{q} \Rightarrow f \in \text{Cn } \mathbf{F} \mathbf{q} \mid Df =$   
 $[a f \cdot x + h \cdot x \cdot x, \mathbf{q}] \Rightarrow f = [e^{ax}] f \cdot 0 + S[e^{-ax} h \cdot x \mid x; 0, x] \mid x, \mathbf{q} \mid$

Si  $n$  es numero naturale, et  $a$  es substitutione de complexos de ordine  $n$ , et  $h$  es complexo de ordine  $n$  functione de numeros reale, tunc functione  $f$  complexo de variabile reale, que pro omni  $x$  satisfac æquatione

$$Df \cdot x = a(f \cdot x) + h \cdot x$$

es dato per formula scripto.

Casu  $h \cdot x = 0$  es tractato in pag. 327 P65.

Dem.  $[(u \mid \mathbf{q}) \mid g] \cdot \mathbf{P} \cdot 2 \supset \mathbf{P}$

\*5  $n \in \mathbf{N}_1 \mid u \in (\text{Subst } n \mathbf{F} \mathbf{q}) \text{cont} \mid a \in \text{Cxn} \mid \Rightarrow x \in \text{Cxn } \mathbf{F} \mathbf{q} \mid$   
 $Dx = u \cdot x \cdot x \cdot 0 = a \Rightarrow x = \Sigma [ \mid S(u \cdot x; 0, z) \mid z \mid \mid x \mid^r \mid r, \mathbf{N}_0 ] a$

$n$  es numero naturale.  $u$  es substitutione de ordine  $n$  functione continuo de variabile reale.  $a$  es numero complexo de ordine  $n$ . Nos considera  $x$ , numero complexo de ordine  $n$  functione de variabile reale, que satisfac æquatione  $Dx = u \cdot x$ , id es systema de  $n$  æquationes inter variables reale:

$$\begin{aligned} Dx_1 &= u_{11}x_1 + u_{12}x_2 + \dots + u_{1n}x_n \\ Dx_2 &= u_{21}x_1 + u_{22}x_2 + \dots + u_{2n}x_n \\ &\vdots \\ Dx_n &= u_{n1}x_1 + u_{n2}x_2 + \dots + u_{nn}x_n \end{aligned}$$

Si  $a$  es valore de  $x$ , respondente ad valore 0 de variabile, tunc valore de  $xz$  respondente ad valore  $z$  de variabile =

$$a + S(ua; 0, z) + S[uS(ua; 0, z)|z; 0, z] + \\ S\{uS[uS(ua; 0, z)|z; 0, z]|z; 0, z\} + \dots$$

id es,  $xz$  es summa de serie. Primo termine es  $a$ . Pone  $a$  in loco de  $x$  in secundo membro de æquatione dato, et integra de 0 ad  $z$ ; resulta secundo termine. Pone secundo termine in loco de  $x$  in secundo membro de æquatione dato et integra de 0 ad  $z$ ; resulta tertio termine; et ita continua.

In generale, si  $r$  et  $w$  es duo termine successivo de serie de  $x$ , vel  $rz$  et  $wz$  es duo termine successivo de serie de  $xz$ , resulta:

$$wz = S(uv; 0, z), \text{ vel } w = S(uv; 0, z) | z,$$

et  $w$  es functione de  $r$ :

$$[S(uv; 0, z)|z]|r.$$

Dem.

$$xz \text{ eq. } m = \max \text{ mod } u^r \theta z. \quad x = \Sigma[|S(uv; 0, z)|z]|v; r | r, N_0]a \quad \square. \\ \text{mod } rz \leq \Sigma[mr \text{ (mod } r | r! | r, N_0)] \text{mod } a = e \{ (m \text{ mod } z) \text{mod } a \}. \\ Dx = \Sigma[u | S(uv; 0, z)|z]|v; r-1 | r, N_1]a = \\ u \Sigma[|S(uv; 0, z)|z]|v; r | r, N_0]a = ux$$

In vero, si  $z$  es valore de variabile, et  $m$  es maximo inter valores de modulo de substitutione  $u$  pro valores inter 0 et  $z$ , et si nos voca  $x$  summa de serie considerato, tunc ee serie, pro valore  $z$  de variabile habe suo termines non majore de termines de serie que exprime  $e \{ m z \} a$ , que es convergente. Unde serie considerato es convergente.

Derivata de primo termine de serie  $x$  vale 0. Derivata de secundo termine vale primo termine multiplicato per  $u$ . Derivata de tertio vale secundo multiplicato per  $u$ . Et ita porro. Unde  $Dx = ux$ .

Functio  $x$  es evolutio in serie semper convergente, ope « integrationes successivo » vel « approximationes successivo ».

Methodo de approximationes successivo occurre in Astronomia, ab longo tempore. Cauchy expone theorema præcedente in casu particulare (Moigno *Traité* t.2 p.702). Coquë JdM. a.1864 t.9 p.185, et Fuchs AdM a.1870 t.4 p.36 extende ad alios casu. Me enuntia illo in generale in;

TorinoA. a.1887, MA. a.1888 t.32 p.450, TorinoA. a.1897. Vide: *Encyclopädie* t.2 p.199.

M. Bôcher, *AmericanT.* a.1902 t.3 p.196.

Picard JdM. t.6 a.1890 p.145 da novo applicationes de theorema.

## §31 INTEGRALE ELLIPTICO.

$$\begin{aligned}
 & \cdot 1 \quad a, b \in \mathbb{Q} . n = (a^2 - b^2) / (a^2 + b^2) . \supset . S[\sqrt{(a^2 c x^2 + b^2 s x^2)} | x, 2\theta\pi] = \\
 & 2\pi \sqrt{(a^2 + b^2) / 2} \{ 1 - 4^{-2} n^2 - \sum [n^{2r} (4r)^{-2} \Pi[1 - (4s)^{-2} | s, 1 \dots (r-1)] | r, N_1 + 1 \} \\
 & = 2\pi \sqrt{(a^2 + b^2) / 2} \{ 1 - n^2 4^{-2} - n^4 8^{-2} (1 - 4^{-2}) - \\
 & \quad n^6 12^{-2} (1 - 4^{-2}) (1 - 8^{-2}) - n^8 16^{-2} (1 - 4^{-2}) (1 - 8^{-2}) (1 - 12^{-2}) - \dots \\
 & = 2\pi \sqrt{(a^2 + b^2) / 2} \{ 1 - 0.625n^2 - 0.146n^4 - 0.064n^6 - 0.036n^8 - \dots \} \\
 & \} \text{ EULER, PetrNC. t.18 a.1773 p.71 (edito a.1774)}
 \end{aligned}$$

Integrale considerato vocare « integrale elliptico de secundo specie »; vide p.392 P4-2-5

Si  $a > b$ , et si nos pone  $\sin y = \sqrt{(a^2 - b^2)} / a =$  « eccentricitate », vel  $\cos y = b/a$ , tunc perimetro de ellipsi de semi-axi  $a$  et  $b$  vale  $4Ey$ , ubi  $Ey$  es dato per tabula sequente :

TABULA DE $Ey = S[\sqrt{1 - (\sin y)^2 (\sin x)^2}]   x, \theta\pi/2\}$										
$y =$	$0^\circ$	$5^\circ$	$10^\circ$	$15^\circ$	$20^\circ$	$25^\circ$	$30^\circ$	$35^\circ$	$40^\circ$	$45^\circ$
$Ey =$	1.570	1.567	1.558	1.544	1.523	1.498	1.467	1.432	1.393	1.350
$y =$	$50^\circ$	$55^\circ$	$60^\circ$	$65^\circ$	$70^\circ$	$75^\circ$	$80^\circ$	$85^\circ$	$90^\circ$	
$Ey =$	1.305	1.258	1.211	1.163	1.119	1.076	1.040	1.012	1.000	

$$\begin{aligned}
 & \cdot 2 \quad a, b \in \mathbb{Q} . c = (a+b)/2 . d = \sqrt{(ab)} . \supset . \\
 & S[\sqrt{(acx)^2 + (bsx)^2}] | x, \theta\pi/2\} = S[\sqrt{(ccx)^2 + (dsx)^2}] | x, \theta\pi/2\} \\
 & \} \text{ LAGRANGE TorinoM. a.1784 t.2; (Euvres t.2 p.272}
 \end{aligned}$$

Integrale dato es « integrale elliptico de primo specie ».

Gauss t.3 p.360, voca  $\pi/S[\sqrt{(acx)^2 + (bsx)^2}] | x, \theta\pi/2\}$  « Arithmetisch-geometrisches Mittel » inter  $a$  et  $b$ . Ce medio ne varia si nos substitue ad  $a$  et  $b$  valore medio arithmetico et geometrico de illos.

$$\begin{aligned}
 & \cdot 3 \quad a, b \in \mathbb{Q} . \supset . S[s(2r) \sqrt{(asx)^2 + (bsx)^2}] | x, \theta\pi/2\} = \\
 & 2(a^2 + ab + b^2) / 3(a+b)
 \end{aligned}$$

## §32 PRODUCTO DE DUO SERIE.

$$\begin{aligned}
 & a, b \in \text{q'f } N_0 . \Sigma(\text{mod } a, N_0) , \Sigma(\text{mod } b, N_0) \in \mathbb{Q} . \supset . \\
 & \Sigma(axb, N_0) = S[\Sigma(a_r e^{irx} | r, N_0) \times \Sigma(b_s e^{-isx} | s, N_0)] | x, 2\theta\pi\} / (2\pi) \\
 & \} \text{ PARSEVAL a.1805 ParisSE. t.1 p.639; IdM. a.1894 p.196} \\
 & [ \text{Hp} . \supset . S[\Sigma(a_r e^{irx} | r, N_0) \times \Sigma(b_s e^{-isx} | s, N_0)] | x, 2\theta\pi\} \\
 & = S\Sigma[a_r b_s e^{(r-s)ix} | r, s, (N_0 : N_0)] | x, 2\theta\pi\} \\
 & = \Sigma[a_r b_r S[e^{r-six} | x, 2\theta\pi\} | (r, s), (N_0 : N_0)] = \Sigma(a_r b_r 2\pi | r, N_0) ]
 \end{aligned}$$

## §33 FUNCTIONE DE VARIABLE IMAGINARIO.

$$1 \quad r \in \mathbb{Q}, f, Df \in \mathcal{Q}' F[\mathcal{Q}' x \pmod{x \leq r}] \cdot x \in \mathcal{Q}' \cdot \pmod{x < r} \cdot \bigcup. \\ fx = \frac{1}{(2\pi)} S[re^{it} f(re^{it}) (re^{it} - x) | t, 2\theta\pi]$$

Si  $f$  es functione imaginario de variable imaginario, cum derivata, pro omni valore de variable de modulo minore, aut æquale ad  $r$ , id es in circulo de radio  $r$ , si  $x$  indica valore interno ad circulo, tunc formula exprime  $fx$  ope integrale extenso ad circumferentia de circulo.

$$2 \quad \text{Hp } 1 \cdot n \in \mathbb{N}_1 \cdot \bigcup. D^n f x = n! (2\pi) S[re^{it} f(re^{it}) / (re^{it} - x)^{n+1} | t, 2\theta\pi]$$

$$3 \quad \text{Hp } 1 \cdot \bigcup. fx = \sum [x^n D^n f 0 / n! | n, N_0] \\ \} 1-3 \text{ CAUCHY a.1841, } \text{œuvres s.1 t.6 p.348 \}$$

Hp de continuitate de  $Df$  ne es necessario. Vide

Goursat, AM. t.4 a.1884 p.197-200.

Pringsheim, AmericanT. a.1901 p.413.

## §34 SERIE DE FOURIER.

$$1 \quad f \in \mathcal{Q}' F 2\theta\pi \cdot \text{Arcu}(f, 2\theta\pi) \in \mathcal{Q} \cdot g r = \\ S(f, 2\theta\pi) / (2\pi) + \sum S[fz \cdot e(nz - nr) | z, 2\theta\pi] | n, N_1 \{ \pi \cdot \bigcup. \\ x \in 2\theta\pi \cdot \bigcup. gx = [\lim(f, 0^+ x, x) + \lim(f, x^- 2\pi, x)] / 2 : \\ g0 = g(2\pi) = [\lim(f, 2\theta\pi, 2\pi) + \lim(f, 2\theta\pi, 0)] / 2$$

Si  $f$  es functione reale definito in intervallo de 0 ad  $2\pi$ , et ibi suo variatione (indicato per Arcu in p.371 P47) es finito, et si nos voca  $gx$  serie scripto, tunc, si  $x$  es interno ad intervallo considerato,  $gx$  æqua valore medio arithmetico inter limites de  $f$ , pro variable tendente ad  $x$ , per valores minore, aut majore de  $x$ .

$\}$  FOURIER ParisM. a.1807; a.1822 p.212:

« Ces théorèmes conviennent à toutes les fonctions possibles, soit que l'on en puisse exprimer la nature par les moyens connus de l'analyse, soit qu'elles correspondent à des courbes tracées arbitrairement ».

Hypothesi de « variatione limitato » es in Jordan.

$$2 \quad f \in \mathcal{Q}' F 2\theta\pi \cdot f(2\pi) = f0 \cdot \text{Arcu}(f, 2\theta\pi) \in \mathcal{Q} \cdot x \in 2\theta\pi \cdot \bigcup. \\ fx = \sum [e^{rix} S(e^{-ri} f z | z, 2\theta\pi) | r, n]$$

$f$  indica numero imaginario functione de variable reale in intervallo  $0^- 2\pi$ . Functione sume valores æquale in extremos

de intervallo, et suo variatione es limitato. Tunc  $f(x)$  es summa de serie scripto. Si nos repræsenta numeros imaginario per punctos in plano,  $f(x)$  repræsenta puncto mobile. Motu de puncto  $a$ ,  $e^{ix}$  vocare « motu harmonico ». Ergo omni motu periodico es summa de motus harmonico.

·3  $h \in \mathbb{Q}$ .  $0 < h \leq \pi/2$ :  $f \in \mathcal{C}^1(\theta h)$ . Arcu( $f$ ,  $\theta h$ )  $\in \mathbb{Q}$ :  $\sup$ .

$\lim S[(f(x) \sin nx) / \sin x] |x, \theta h| |n = \pi/2 \lim(f, \theta h, 0)$

{ DIRICHLET a.1829 JfM. t.4; Werke t.1 p.127:

« Quelle que soit la fonction  $f(\beta)$ , pourvu qu'elle reste continue entre les limites 0 et  $h$  ( $h$  étant positive et tout au plus égale à  $\frac{\pi}{2}$ ), et qu'elle croisse, ou qu'elle décroisse depuis la première de ces limites jusqu'à la seconde, l'intégrale  $\int_0^h f(\beta) \frac{\sin i\beta}{\sin \beta} d\beta$  finira par différer constamment de  $\frac{\pi}{2} f(0)$  d'une quantité moindre que tout nombre assignable, lorsqu'on y fait croître  $i$  au delà de toute limite positive ».

·4 Hp ·3.  $k \in \theta h$ .  $\sup \lim S[(f(x) \sin nx) / \sin x] |x, k-h| |n = 0$

{ DIRICHLET id. p.128 }

### §35 LIMITE DE INTEGRALE.

·1  $u \in \text{Cls}' \mathbb{Q}$ .  $u = \delta u$ .  $a \in u$ .  $v \in \text{Intv}$ .  $f \in [\mathbb{Q} f(u, v)] \text{cont}$ .  $\sup$ .

$\lim S[f(x, y) | y, v] |x, u, a = S[f(a, y) | y, v]$  Comm(lim, S)

$u$  es classe de quantitates, perfectio;  $a$  es puncto in  $u$ ;  $v$  es intervallo;  $f$  indica quantitate reale functio continuo de systema de duo variabile, uno in campo  $u$ , altero in intervallo  $v$ . Tunc si nos integra  $f(x, y)$  pro  $y$ , in intervallo  $v$ , limite de integrale, ubi  $x$  varia in  $u$  et verge ad  $a$ , vale integrale, ubi in loco de  $x$  nos pone  $a$ . Exprime proprietate commutativo de operationes limite et integrale.

Dem.  $x \in u$ . §S P18·1.  $\sup \text{mod}[S[f(x, y) | y, v] - S[f(a, y) | y, v]] \leq$

$$S[\text{mod}[f(x, y) - f(a, y)] | y, v] \quad (1)$$

$h \in \mathbb{Q}$ . §cont P1·3.  $\sup \mathbb{Q} \mathbb{Q} k \exists x \in u. \text{mod}(x - a) < k. y \in v. \sup_{x, y}$

$$\text{mod}[f(x, y) - f(a, y)] < h \quad (2)$$

$h \in \mathbb{Q}$ . (1) · (2).  $\sup \mathbb{Q} \mathbb{Q} k \exists x \in u. \text{mod}(x - a) < k. \sup_x$

$$\text{mod}[S[f(x, y) | y, v] - S[f(a, y) | y, v]] < h \times \text{Longr} \quad \sup. P$$

In vero, modulo de differentia de integrales de  $f(x, y)$  et de  $f(a, y)$  es minore de integrale de modulo de differentia  $f(x, y) - f(a, y)$ .

Nunc, dato quantitate positivo  $h$ , causa theorema de continuitate uniforme (pag. 239), lice determina alio quantitate positivo  $k$ , ut pro omni

valore de  $x$  in  $u$ , differente de  $a$  minus que  $k$ , in valore absoluto, et pro omni valore de  $y$  in  $v$ , differentia  $f(x,y) - f(a,y)$  habe modulo inferiore ad  $h$ .

Tunc, modulo de differentia de duo integrale es minore que  $h$  multiplicato per longore de intervallo de integratione; ce producto es parvo ad arbitrio; unde seque theorema.

$$\cdot 2 \quad \text{Hp} \cdot 1 \quad \supset \cdot S[f(x,y) | y, v] | x \in (qfu) \text{cont} \quad [P \cdot 1 \supset P]$$

Ergo, integrale de functione continuo de systema de duo variabile, facto pro uno, es functione continuo de altero.

Nos suppose continuitate composito de  $f(x,y)$ . Non suffice suo continuitate in sensu diviso, pro  $x$ , et pro  $y$ .

Exemplo de integrale discontinuo (pag. 355 P22.1):

$$a \in \mathbb{Q} \supset \cdot S[a/a^2 + x^2 | x, q] = \pi$$

Si  $a < 0$ , integrale =  $-\pi$ ; ergo es functione de  $a$  discontinuo pro  $a=0$ .

$$\text{Lm}[a/a^2 + x^2] (x, a), (q; q), (0, 0) = q \cup i \pm \infty$$

Classe limes de functione integrando, si varia dyade  $(x, a)$  in campo de dyades de quantitate, et verge ad dyade  $(0, 0)$ , es classe totale de quantitates finito et infinito. Functione integrando non es continuo in  $(0, 0)$ .

Integrale (pag 361 P34.1)  $a \in \mathbb{Q} \supset \cdot 1/\pi S[\sin(ax) | x | x, q] = \text{sgn} a$  es functione discontinuo de  $a$ . Campo de integratione es infinito.

$$\cdot 3 \quad (n \in \mathbb{N}_1 \cdot u \in \text{Cls}' C u) | (u \in \text{Cls}' q) \S \S \text{ P51}$$

Definitione de extremos oscillatorio, dato in pag. 374, pro functione reale de variabile reale, subsiste pro functione reale de variabile complexo.

$$\cdot 4 \quad u \in \text{Cls}' q \cdot a \in \mathbb{P} u \cdot v \in \text{Intv} \cdot f \in \text{qf}(u; v) \cdot \forall f'(u; v), \exists f''(u; v) \in \mathbb{Q} \\ \supset \cdot \max \text{Lm}[S[f(x,y) | y, v] | x, u, a] \leq S'[f'(a,y) | y, v] \\ \min \text{Lm}[S[f(x,y) | y, v] | x, u, a] \geq S'[f''(a,y) | y, v]$$

Si  $u$  es classe de quantitates,  $a$  es valore, finito aut non, in classe derivata de  $u$ ,  $v$  es intervallo,  $f$  es functione reale de duo variabile, uno in  $u$ , altero in  $v$ , cum limites supero et infero finito, tunc classe limes de integrale es inter integrales supero et infero de extremos oscillatorio (que P.3 defini pro functiones de duo variabile) de functione  $f$  pro  $(a,y)$ , ubi varia  $y$  in  $v$ . Si ce duo integrale coincide, existe limite de integrale dato, æquale ad valore commune de illos.

Si  $f$  es summa de primos  $x$  termine de serie, et termines depende de  $y$ , resulta novo conditione pro integrabilitate de serie, plus generale de regula in pag. 364, P40. Vide:

Osgood, *Non-uniform convergence and the Integration of Series Term by Term*, American J. t.19 a.1896 p.155.

Richardson, American B. a.1907 p.431.



## §36 DERIVATA DE INTEGRALE.

$$u, v \in \text{Intv} \cdot f \in qF(u; v) \cdot D_x f \in qF(u; v) \text{ cont} \cdot y \in v \cdot \supset \cdot \\ D[S[f(x, y) | x, u] | y, v] = S[D_x f(x, y) | x, u]$$

Comm(D, S)

Si  $f$  es functione de duo variable in intervallos  $u$  et  $v$ , cum derivata pro  $y$  continuo, tunc derivata pro  $y$  de integrale pro  $x$  de  $f(x, y)$ , æqua integrale pro  $x$  de derivata pro  $y$  de  $f(x, y)$ .

Dem.

$$\begin{aligned} a, x \in u \cdot \supset \cdot D[S[f(x, y) | x; a, x] | x, u] &= f(x, y) \\ \supset \cdot D(D[S[f(x, y) | x; a, x] | x, u] | y, v) &= D_y f(x, y) \\ \supset \cdot D(D[S[f(x, y) | x; a, x] | y, v] | x, u) &= D_x f(x, y) \\ \supset \cdot D[S[f(x, y) | x; a, x] | y, v] &= S[D_x f(x, y) | x, a, x] \end{aligned}$$

Sume integrale inter duo limite  $a$  et  $x$ . Tunc derivata pro  $x$  de integrale pro  $x$  de  $f(x, y)$  vale  $f(x, y)$ . Vide pag. 348 P12-1. Ergo derivata pro  $y$  de derivata pro  $x$  de integrale pro  $x$  vale derivata pro  $y$ . Commuta derivatas (pag. 329 P-4) : Derivata pro  $x$  de derivata pro  $y$  de integrale pro  $x$  vale derivata pro  $y$ . Integra : Derivata pro  $y$  de integrale pro  $x$  vale integrale pro  $x$  de derivata pro  $y$ .

## §37 COMMUTATIONE DE INTEGRATIONES.

$$u, v \in \text{Intv} \cdot f \in [qf(u; v)] \text{ cont} \cdot \supset \cdot S[S[f(x, y) | x, u] | y, v] = \\ S[S[f(x, y) | y, v] | x, u]$$

Dem.

$$\begin{aligned} a, x \in u \cdot \supset \cdot D(S[S[f(x, y) | x; a, x] | y, v] | x, u) &= \\ S(D[S[f(x, y) | x; a, x] | x, u] | y, v) &= S[f(x, y) | y, v] \cdot \supset \cdot P \end{aligned}$$

Sume integrale pro  $x$  ab  $a$  ad  $x$ . Tunc derivata pro  $x$  de integrale pro  $y$  de integrale pro  $x$  vale integrale pro  $y$  de derivata pro  $x$  de integrale pro  $x$ , id es vale integrale pro  $y$ . Integra pro  $x$ , et resulta propositione.

Si hypothesis non es satisfacto, commutatione de integrales pote es non licito. Exemplo (Cauchy a.1814 (Œuvres t.1) :

$$\begin{aligned} S[S[(y^2 - x^2)/(x^2 + y^2)^2 | x, 0] | y, 0] &= +\pi/4 \\ \text{» » » » } | y, 0] | x, 0] &= -\pi/4 \end{aligned}$$

Vide alios theorema in :

O. Stolz, Grundzüge der Differential- und Integralrechnung, t.3 a.1899.



Functione  $f$  es « definito », representato per symbolo  $F$ ; ergo nos pote loque de campo de variabilitate de  $f$  (vide p.80): Variab  $f = Cn$ .

Si in idea de functione ( $f$ ) non es implicito suo campo de variabilitate, ut es casu commune in Analysis, nos pone definitiones sequente:

\* 2.  $n \in N_1, u \in \text{Cls}'Cn, l' \text{ mod } u \in Q, f \in \text{qf}u, l' \text{ mod } f'u \in Q \quad \bigcup$

·0  $S(f, u) = S[(f, u) \cup (l'0 : Cn - u)]$  Df

·1  $S' \mid S \text{ P} \cdot 0 \quad S, \mid S \text{ P} \cdot 0$

Si  $u$  es classe de complexos de ordine  $n$ , vel campo in spatio ad  $n$  dimensione, et es limitato; et si  $f$  es quantitate functione dato in campo  $u$ , et limite supero de valores absoluto de  $f$  in campo  $u$  es finito, tunc:

$S(f, u)$ , « integrale de functione  $f$ , in campo  $u$  » es integrale de illo functione definito, que in campo  $u$  vale  $f$ , et in campo de complexos non  $u$  vale 0. In modo analogo pro integrales supero et infero.

Integrale in campo ad  $n$  dimensione vocare « integrale multiplo de ordine  $n$  ». Plure theorema super integrales simpliciter mane pro integrale multiplo:

§S (p.341) P3·2 (p.342) P4·1·2 (p.343) P7·0·1·2 (p.346) P·3·4·5  
(p.347) P9 (p.348) P10·1·2 (p.373) P51·1

P6·0 (p.344) sume forma (vide P3):

$r, w \in \text{Cls}'u, S(\lambda r \wedge \lambda w) = \bigwedge \bigcup S'(f, r \cup w) = S'(f, r) + S'(f, w)$

\* 3. Hyp P2  $\bigcup$ .

·0  $Su = S(l'1 : u) \quad S', S, \mid S \text{ P} \cdot 0$  Df

Si, ut in P2,  $u$  es classe de complexos de ordine  $n$ , limitato, integrale de functione que habet valore constante 1 in campo  $u$ , (et 0 ex  $u$ ) responde ad volumen (p.379) pro spatio geometrico. Me indica illo cum notatione  $Su$  « integrale de campo  $u$  ». Si illo non existe, tunc nos considera integrales, supero et infero.

·1  $S'u - S_l'u = S'am'u$

Responde ad P48·3 (pag.373).



$$\begin{aligned} \supset. S : S' [f(x, y) | x, Cp] | y, Cq : &\leq s'(f, h) \\ \supset. S' : S' [ & \qquad \qquad \qquad : \leq S' f \end{aligned}$$

Sume  $h$  quantitate positivo,  $r$  successione de  $p$  integro,  $s$  successione de de  $q$  integro. Tunc

$$[(r + \Theta_p)h : (s + \Theta_q)h]$$

repræsentat cubo ad  $n = p + q$  dimensione de basi ad  $p$  dimensione et de altitudine ad  $q$  dimensione.

Sume  $y$  in altitudine de ce cubo. Integrale  $f(x, y)$  ubi  $x$  varia in basi es minore de dimensione de basi  $h^p$  per limite supero de valores de  $f(x, y)$  ubi  $x$  varia in basi; ergo es minore de  $h^p$  per limite supero de valores de  $f(x, y)$  ubi  $x$  varia in basi, et  $y$  in altitudine. .

Integra pro  $y$  in altitudine; integrale iterato es minore de producto de duo dimensione  $h^q \times h^p = h^n$ , per limite supero de valores de  $f$  in cubo.

Summa pro  $r$  et  $s$ :

Integrale iterato es minore de summa, indicato (pag.417) per  $s'(f, h)$ .

Sume limite infero pro  $h$ ; resulta theorema.

### \* 5.1

$m, n \in \mathbb{N}_1$ ,  $f \in C_m F C_n$  . l' mod  $x \exists (fx = 0) \in Q$  . l' mod  $f' C_n \in Q$  .  $\supset$ .  
 $Sf = \iota Cx m \wedge \exists z \{ h \in Q . \supset h^n \sum [\text{Med} f' | h(p + \Theta_n)] | p, n F 1 \dots n \}$   
Df

Si  $f$  es numero complexo de ordine  $m$  functione de complexos de ordine  $n$ , integrale supero et infero non habet sensu. Tunc pro defini integrale, fixa quantitate positivo  $h$ , parvo ad arbitrio, et divide spatium ad  $n$  dimensione in cubos de latere  $h$ . Forma summa de valores medio (Med) de functione in totos cubo, et multiplica per  $h^n$ , volumen de cubo. Si existe uno et uno solo valore  $z$  pertinente ad ce summas,  $z$  es integrale quæsito.

$$2 \quad a \in \text{Subst } n . \supset. S a' \Theta = \text{mod Dtrm } a$$

Si  $a$  es substitutione de complexos de ordine  $n$ , vel homographia (pag.148), tunc volumen de parallelepipedo que responde in homographia  $a$  ad cubo de latere 1 vale modulo de determinante de homographia.

$$3 \quad m, n \in \mathbb{N}_1 . u \in \text{Cls}' C_n . \text{l' mod } u \in Q . g \in C_n F u \text{ sim .}$$

$$Dg \in (\text{Subst } n) F u \text{ cont . } f \in C_m f(g'u) . S(f, g'u) \in C_m . \supset.$$

$$S(f, g'u) = S(fg, x \times \text{mod Dtrm } Dg, x | x, u)$$

LAGRANGE BerlinM. a.1773, pro  $n=3$ ;

JACOBI a.1833. JfM. t.12 p.1, Werke t.3 p.233:

Sint  $\xi_1, \xi_2, \dots$  datae functiones quaelibet variabilium  $c_1, c_2, \dots$ , habetur:

$$d\xi_1 d\xi_2 \dots = \left( \sum \pm \frac{\partial \xi_1}{\partial c_1} \frac{\partial \xi_2}{\partial c_2} \dots \right) dc_1 dc_2 \dots \dots$$

Si  $u$  es campo ad  $n$  dimensione limitato, et si  $g$  es correspondentia simile inter complexos  $u$  et alios complexo, que habe derivata, substitutione de complexos de ordine  $n$ , ut es definito in pag. 330, continuo, et si  $f$  es complexo de ordine arbitrario  $m$  functione de campo  $g'u$ , id es in campo imagine de  $u$  in repræsentatione  $g$ , et es integrabile, tunc integrale de  $f$  in campo  $g'u$  vale integrale de  $fgx \times \text{mod Determinante } Dgx$ , ubi varia  $x$ , in campo  $u$ .

Dtrm  $Dg$  dicere « determinante Jacobiano ».

\* 6.

vet S

·1  $u \in \text{Cls}'p . l'm(u-u) \in Q . f \in qf'u . l'mf'u \in Q . \supset .$   
 $S(f,u) = \{ q \cap z\{o \in p . i,j,k \in v . i^2=j^2=k^2=1 . i \times j = j \times k = k \times i = 0 .$   
 $h \in Q . \supset_{o,i,j,k,h} . z \in h^3 \Sigma \} \text{Med} f' u \cap [o+(x+\theta)hi+(y+\theta)hj+(z+\theta)hk .$   
 $\{(x,y,z), (x,y,z)\} \cap x,y,z \in n . \mathfrak{A} u \cap [o+(x+\theta)hi+(y+\theta)hj+(z+\theta)hk] \}$   
 Def

Si  $u$  es classe de punctos, vel figura, et si distantia inter duo puncto de  $u$  habe limite supero finito, vel si figura  $u$  non se extende ad infinito, et si  $f$  es functione reale dato in campo  $u$ , et limite supero de suo valores absoluto es finito, tunc nos defini integrale de functione  $f$ , in campo  $u$  ut seque.

Sume puncto-origine  $o$ , tres vectore-coordinato  $i,j,k$  unitario et orthogonale, et quantitate positivo  $h$ . Divide toto spatio in cubos de forma  $o+(x+\theta)hi+(y+\theta)hj+(z+\theta)hk$ , ubi  $x,y,z$  es numero integro, positivo aut negativo.

Considera classe de valores medio inter valores sumpto per  $f$  in parte de campo  $u$  que es in cubo præcedente. Summa ce classes, ubi varia  $x,y,z$ , et sume omni terna de valores tale que cubo correspondente habe aliquo puncto commune cum  $u$ .

Si existe uno et uno solo quantitate  $z$ , que pertine ad classe præcedente, pro omni electione de elementos  $o,i,j,k,h$ , illo  $z$  es  $S(f,u)$ .

·2 Hyp'1 .  $\supset . S'(f,u) = \{ z \in \mathfrak{A} (o,i,j,k,h) \mathfrak{A} [o \in p . i,j,k \in v . i^2=j^2=k^2=1 . i \times j = j \times k = k \times i = 0 . h \in Q . z = h^3 \Sigma \} f' u \cap [o+(x+\theta)hi+(y+\theta)hj+(z+\theta)hk] \} (x,y,z)$ , ut in P'1 { Def

·3  $(S, l', l) \mid (S', l, l') \text{ P'2}$

Def

·4 (pnt, vct, Cx) | q P·1

In modo analogo pote es definitio integrale supero, et integrale infero. Definitione P·1 de integrale proprio subsiste si  $f$  es puncto, aut vectore, aut complexo, functione in campo  $u$ .

·3 Hyp·1 .  $o \in p . i, j, k \in v . i^2 = j^2 = k^2 = 1 . i \times j = j \times k = k \times i = 0$   
 $\bigcup S(f, u) = S[f(o + xi + yj + zk) | (x, y, z), (x, y, z) \in (x, y, z) \in q .$   
 $o + xi + yj + zk \in u]$

\* 7·1  $u \in \text{Cls}'p . l'm(u-u) \in Q . o \in p . \bigcup$

$S\{ \text{area}(\lambda u) \wedge x \exists [d(x, o) = r] | r, Q\} \geq \text{Volum}'u \geq \text{Volum}_u \geq$   
 $S\{ \text{area in } u \wedge x \exists [d(x, o) = r] | r, Q\}$

Volumen de figura  $u$  pote es calculato ut seque. Centro in puncto ad arbitrio  $o$ , nos imagina superficie de sphæra de radio  $r$ . Integrale infero de area suo sectione cum figura limite de  $u$ , volumen externo, volumen interno, et integrale supero de area sectione cum figura interno ad  $u$ , ubi varia  $r$ , et sume omni valore positivo, es disposito per ordine de magnitudine. Si primo et ultimo integrale coincide, valore commune es volumen de figura. Solido es decomposito in stratos sphaerico.

·2  $o \in p . u \in \text{Cls}'p . \bigcup$  Ths P·1

Decompositione in stratos cylindrico (*tunicæ cylindræ* de Kepler a.1615 t.4 p.584).

$c \in p . h \in Q . u \in \text{Cls}'p . \bigcup$ :

·3  $\text{arc } u \in Q . \bigcup \text{arc} [\text{Homot}(c, h)'u] = h \text{ arc } u$

·4  $\text{area } u \in Q . \bigcup \text{area} [\text{Homot}(c, h)'u] = h^2 \text{ area } u$

·5  $\text{Volum } u \in Q . \bigcup \text{Volum} [\text{Homot}(c, h)'u] = h^3 \text{ Volum } u$

} CAVALIERI a.1635 l.2 P15, P17:

« Omnes figurae planae similes sunt inter se in dupla ratione linearum, sive laterum homologorum, earundem.

Omnia similia solida sunt in tripla ratione linearum, vel laterum homologorum, quae sunt in eorundem homologis figuris ».

·6  $u \in p . o \in a . r \in Q . u \in \text{Cls}'p \wedge x \exists [d(x, a) = r] . \text{area } u \in Q . \bigcup$   
 $\text{Volum}(o' u) = r \times \text{area } u / 3$

Volumen de projectione de area  $u$  in superficie de cylindro ab puncto de axi vale radio per area de  $u$ , diviso 3.

$$\cdot 7 \quad o \varepsilon p . a, b, c \varepsilon v \cdot t 0 . \bigcup . \text{area} \{ (o + Qa + Qb + Qc) \\ = \text{ang}(a; b, c) + \text{ang}(b; c, a) + \text{ang}(c; a, b) - \pi \\ \} \text{ HARRIOT, a.1603; LoriaB. a.1902, p.1:}$$

« Inveni rationem accuratam mensurandi superficies sphaericorum 18: sep. 1603.

« Et est talis; Adde simul omnes angulos trianguli in superest fac numeratorem ad 360. Dico quod illa fractionis haemisphaerii quae continet triangul: vel tot gradus magno quot sunt in numeratore et a polo illius circuli drantes terminantes illos gradus dico quod hoc triangulo sphaerico praedicto ».

GIRARD, a.1629 fol.38v; CAVALIERI, a.1632

Dato puncto  $o$ , et tres vectore  $a, b, c$ , non in figura commune ad triedro  $o + Qa + Qb + Qc$ , in vertice  $o$ , et de lateres parallelo ad  $a, b, c$ , et sphaera de centro  $o$  et de radio 1, id est ad sphaerico, vale summa de angulos de triangulo differentia vocare « excessu sphaerico » de triangulo.

$$\ast \quad 8 \cdot 1 \quad o \varepsilon p . i, j, k \varepsilon v . i^2 = j^2 = k^2 = 1 . i \times j = j \times k = k \times i = 1 \\ a, b, c \varepsilon Q . a \leq b \leq c . \bigcup . \text{Volum} \{ (o + x_1 i + x_2 j + x_3 k) | \\ [(x_1/a)^2 + (x_2/b)^2 + (x_3/c)^2 \leq 1] \} = 4\pi abc/3$$

$$\cdot 2 \quad \text{Hp} \cdot 1 . E(a, b, c) = \text{area} \{ (o + x_1 i + x_2 j + x_3 k) | \\ [(x_1/a)^2 + (x_2/b)^2 + (x_3/c)^2 \leq 1] \} . E_1(a, b, c) = 4\pi ab . \\ 4\pi b(a+c)/2 . E_2(a, b, c) = 4\pi(ab+ac+bc)/2 . \\ E_1(a, b, c) \leq E(a, b, c) \leq 2E_1(a, b, c) . E(a, b, c) \\ 4/15 \pi b(a-c)^2/c \leq E(a, b, c) - E_2(a, b, c) \leq$$

Volumen et area de ellipsoide; vide LinceiR. a.1890 s. 1  
Ugo Dainelli, BattagliniG. a.1878 t.16, p.291 da 1  
ximato de area.

$$\cdot 3 \quad o \varepsilon p . a, b \varepsilon v . \text{mod} a = \text{mod} b = 1 . a \times b = 0 \\ \text{Volum} p \wedge x \exists [d(x, o) < 1 . d[x, \text{recta}(o + a/2, b)] < \\ \text{area} p \wedge x \exists [ \quad \quad \quad = 1 . \quad \quad \quad < \\ \text{area} p \wedge x \exists [ \quad \quad \quad < 1 . \quad \quad \quad = \\ \text{arc} p \wedge x \exists [ \quad \quad \quad = 1 . \quad \quad \quad = /2 ] = S[\sqrt{c^2 - a^2}] \\ \} \text{ VIVIANI, Vide ActaErud. a.1692 p.274 \}$$

Dato puncto  $o$ , et duo vectore unitario et  $o$  tunc nos considera solido loco de punctos quae



que uno, vel in sphaera de centro  $o$  et de radio 1, et que dista ab recta que i per puncto  $o+a$  2, et es paralelo ad  $b$ , minus que 1/2, vel es in cylindro de dato axi. Tunc formula exprime volumen de solido, area de sphaera interno ad cylindro, area de cylindro interno ad sphaera, et arcu de curva intersectione de cylindro cum sphaera.

\* 9.

## CENTRO DE GRAVITATE.

•0  $u \in \text{Cls}'p$ .  $\text{I'm}(u-u) \in Q$ .  $f \in qfu$ .  $S(f,u) \in q=0$  . $\supset$ .

$$G(f,u) = S[(f \cdot x) \cdot x \mid r, u] \cdot S(f,u)$$

Def

Si ad omni puncto  $x$  de figura limitato  $u$  responde numero  $fx$ , que nos voca « densitate de figura in puncto  $x$  », tunc barycentro, vel centro de gravitate de figura  $u$ , cum densitate  $f$ , indicato per  $G(f,u)$ , vale integrale de puncto  $x$ , cum massa  $fx$ , ubi  $x$  varia in campo  $u$ , diviso per massa totale de figura, que nos suppose non nullo.

•1  $u \in \text{Cls}'p$ .  $\text{I'm}(u-u) \in Q$ .  $\text{Volum } u \in Q$  . $\supset$ .

$$G(u) = G(1 : u) = S(\text{idem}, u) \cdot \text{Volum } u$$

Def

« barycentro de solido homogeneo  $u$  ».

•2  $u \in \text{Cls}'p$ .  $\text{I'm}(u-u) \in Q$ .  $\text{Volum } u = 0$  . $\supset$ .

$$G(u) = \lim[G(p \wedge x \exists [d(x, u) < h] \mid h, Q, 0)]$$

Def

« barycentro de superficie et de linea », es barycentro de stratu de spissore infinitesimo  $2h$ , vel de filo de sectione infinitesimo de radio  $h$ , circa superficie aut linea dato.

•3  $a, b \in p$  . $\supset$ .  $G(a-b) = (a+b) / 2$

•4  $o \in p$ .  $u, r \in v$  . $\supset$ .  $G(o+\theta u+\theta r) = o+(u+r)/2$

Barycentro de parallelogrammo super vetice  $o$  et vectores  $u$  et  $r$ .

•5  $a, b, c \in p$  . $\supset$ .  $G(a-b-c) = (a+b+c) / 3$

Barycentro de triangulo, ut figura, es barycentro de vertices.

•4 •3 ARCHIMEDE *Kérrga βωγων* P 10, 14.

•6  $a, b, c, d \in p$  . $\supset$ .  $G(a-b-c-d) = (a+b+c+d) / 4$

•7  $o \in p$ .  $r \in Q$ .  $i \in v$ .  $mi = 1$  . $\supset$ .

$$G(p \wedge x \exists [(x-o) \times i > 0 \cdot (x-o)^2 < r^2] = o+3ri/8$$

Barycentro de semisphaera de centro  $o$ , radio  $r$ , secundo vectore  $i$ .

$$\begin{aligned} \cdot 8 \quad a \varepsilon p_3 \cdot u \varepsilon \text{Cls}' a \cdot \text{Area } u \varepsilon Q \cdot i \varepsilon v \cdot \bigcup. G(u + \theta i) &= G u + i/2 \\ \cdot 9 \quad \text{»} \quad \text{»} \quad \text{»} \quad \text{»} \cdot o \varepsilon p \cdot \bigcup. G(o - u) &= (o + 3Gu)/4 \end{aligned}$$

GALILEI, *dialoghi* t. 13 p. 283 :

Cujuslibet coni, vel pyramidis centrum gravitatis axem dividit, ut pars ad verticem reliquæ ad basin sit tripla.

### \* 10. MOMENTO DE INERTIA.

$$\cdot 1 \quad u \varepsilon \text{Cls}' p \cdot f \varepsilon qF u \cdot a \varepsilon p \cup p_1 \cup p_2 \cdot \bigcup.$$

$$\text{Inertia}(f, u, a) = S\{f x [d(x, a)]^2 \mid x, u\}$$

Df

« momento de inertia pro puncto aut axi aut plano  $a$ , de figura  $u$ , cum densitate  $f x$  in puncto  $x$  ».

{ EULER a. 1765; a. 1790 p. 166 :

« *Momentum inertiae* corporis respectu cujuscumque axis est summa omnium productorum, quæ oriuntur, si singula corporis elementa per quadrata distantiarum suarum ab axe multiplicentur ».

$$\cdot 2 \quad u \varepsilon \text{Cls}' p \cdot f \varepsilon qf u \cdot S(f, u) \varepsilon q - t0 \cdot a \varepsilon p \cdot \bigcup.$$

$$\text{Inertia}(f, u, a) = \text{Inertia}(f, u, G(f, u)) + d[a, G(f, u)]^2 S(f, u)$$

$$\cdot 3 \quad \text{Hp} \cdot 2 \cdot i \varepsilon v - t0 \cdot \bigcup, \text{Inertia}(f, u, a + qi) =$$

$$\text{Inertia}(f, u, G(f, u) + qi) + d[a, G(f, u) + qi]^2 \times S(f, u)$$

{ EULER id. p. 168 :

« Si... detur momentum inertiae respectu cujuscumque axis per centrum inertiae corporis transeuntis, momentum inertiae respectu alius cujusvis axis illi paralleli superat illud producto ex massa in quadratum distantiae hujus axis a centro inertiae ».

$$\cdot 4 \quad \text{Hp} \cdot 2 \cdot \bigcup. \exists(i, j, k) \exists [i, j, k \varepsilon U \cdot v - t0 \cdot i \times j = j \times k = k \times i = 0 :$$

$$h \varepsilon U \cdot v - t0 \cdot \bigcup_h. \text{Inertia}(f, u, a + qh) =$$

$$(h \times i)^2 \text{Inertia}(f, u, a + qi) +$$

$$(h \times j)^2 \text{»} \text{»} \text{»} j) +$$

$$(h \times k)^2 \text{»} \text{»} \text{»} k) ]$$

{ EULER id. p. 176 {

Euler p. 175, voca « axi principale de inertia » rectas  $a + qi$ , ...  $a + qk$ .

$$\cdot 5 \quad o \varepsilon p \cdot r \varepsilon Q \cdot i \varepsilon v - t0 \cdot \bigcup.$$

$$S\{[d(x, o + qi)]^2 \mid x, p \wedge r \exists [d(x, o) \leq r]\} = 8\pi r^5/15$$

$$S\{(x - o)^2 \mid x, p \wedge r \exists [d(x, o) \leq r]\} = 4\pi r^5/5$$

## \* 11.

## VARIATIONE DE INTEGRALE

1.  $f, D_1 f, D_2 f, D_3 f, D_4 f, D_5 f, D_6 f, D_7 f \in qF(q; q; \Theta) \text{ cont.}$

$u, D_1 u, D_2 u, D_3 u \in qF(\Theta; \Theta) \text{ cont. } y \in \Theta \supset$

$D[S]f[u(x, y), D_1 u(x, y), x] | x, \Theta | y, \Theta | y$

$= A[D_2 f[u(x, y), D_1 u(x, y), x] \times D_3 u(x, y) | x; 0, 1]$

$+ S[D_1 f[u(x, y), D_1 u(x, y), x] - D_1 D_2 f[u(x, y), D_1 u(x, y), x] | x, \Theta | x] \times D_3 u(x, y) | x, \Theta]$

$f$  es quantitate reale functio continuo de tres variabile, que nos infra voca  $u, u', x$ . Variabile  $u$  et  $u'$  sume omni valore reale, et  $x$  varia in intervallo determinato, per exemplo de 0 ad 1. Nos suppose existentia et continuitate de omni derivata de  $f$  que occurre in calculo sequente. Nos substitue ad  $u$  functio reale de duo variabile  $x$  et  $y$ , ambo in intervallo de 0 ad 1; et ad  $u'$  derivata de  $u$  pro  $x$ . Nos suppose continuitate de  $u$ , et de suo derivatas que occurre in calculo.  $y$  indica aliquo valore in intervallo  $\Theta$ .

Nos considera integrale de  $f$  de variables  $u(x, y)$ , de suo derivata pro  $x$ , et de  $x$ , ubi integrale es pro variabile  $x$ , in intervallo de 0 ad 1; illo depende de valore de  $y$ . Derivata pro  $y$  de integrale praecedente, vale summa de duo quantitate:

1°. fac derivata de  $f(u, u', x)$ , pro  $u'$ ; multiplica per derivata de  $u(x, y)$  pro  $y$ ; et calcula incremento si  $x$  varia de 0 ad 1.

2°. fac differentia inter duo quantitate A et B:

A: deriva  $f(u, u', x)$  pro  $u$ .

B: deriva  $f(u, u', x)$  pro  $u'$ ; considera  $u$  et  $u'$  ut functiones de  $x$ , et deriva pro  $x$ . Multiplica differentia A—B per  $D_2 u(x, y)$ , et integra pro  $x$ , in intervallo  $\Theta$ .

Variabile  $y$ , pro que nos deriva integrale, vocare « parametro ». Derivata de  $u$  pro  $y$ , et derivata de integrale, in ce casu, sume nomen de « variatione ».

Dem.

$D[S, f \dots | x, \Theta | y, \Theta | y] = S[D[f \dots | y, \Theta | y] | x, \Theta |$

$= S[D_1 f \dots \times D_2 u \dots + D_2 f \dots \times D_2 D_1 u \dots] | x, \Theta |$

$= S \dots + D[D_2 f \dots \times D_2 u \dots | x, \Theta | x - D[D_2 f \dots | x, \Theta | x \times D_2 u \dots] | x, \Theta |$

$= A[D_2 f \dots \times D_2 u \dots | x; 0, 1] + S[D_1 f \dots - D_1 D_2 f \dots | x, \Theta | x] \times D_2 u \dots | x, \Theta |$

In vero, derivata pro  $y$  de integrale pro  $x$  de  $f(u, u', x)$  vale (pag. 438) integrale pro  $x$  de derivata pro  $y$  de  $f$ , et per regula de derivatione de

functione composito (p. 329), vale integrale de derivata pro  $u$  de  $f$  per derivata pro  $y$  de  $u$ , plus derivata pro  $u'$  de  $f$  per derivata pro  $y$  de  $u'$ .

Nunc, per regula de derivata de producto, et per commutatione de derivationes (p. 329), secundo termine vale derivata pro  $x$  de producto de derivata pro  $u'$  de  $f$  per derivata pro  $y$  de  $u$ , minus derivata pro  $x$  de derivata pro  $u'$  de  $f$ , multiplicato per derivata pro  $y$  de  $u$ .

Integra; primo et tertio termine mane invariato; in secundo,  $S$  pro  $x$  de  $D$  pro  $x$  vale incremento de functione, unde theorema seque.

$$\begin{aligned} & \cdot 2 \quad a, b \in q. f, D_1 f, D_2 f, D_3 D_1 f, D_3 D_2 f \in qf(q; a \overline{b}) \text{ cont. } y, Dy \in \\ & (qFa \overline{b}) \text{ cont. } S[f(yx, Dyx, x)|x, a, b] = \max S[f(gx, Dgx, x)|x, \\ & a, b] \mid g' \ gx \} g, Dg \in qFa \overline{b} \text{ cont. } ga = ya. \quad gb = yb \} \supset. \\ & \{ D_1 f(yx, Dyx, x)|x, a \overline{b} \} = D \{ D_1 f(yx, Dyx, x)|x, a \overline{b} \} \\ & \quad \} \text{ EULER a.1744 p.42:} \end{aligned}$$

« Si  $Z$  fuerit functio ipsarum  $x, y$  et  $p$  [ $x, yx, Dyx$ ] determinata, ita ut sit  $dZ = Mdx + Nd y + Pd p$ ; invenire inter omnes curvas eidem abscissæ respondentem, eam in qua sit  $\int Z dx$  maximum vel minimum.

Solutio: ... Aequatio pro curva quæsitâ... erit...  $N - \frac{dP}{dx} = 0$ . »

Nos considera  $S[f(yx, Dyx, x)|x; a, b]$ , ubi  $y$  es functio reale definito in intervallo  $a \overline{b}$ , et  $f$  es functio reale de tres variable, cum derivatas que occurre in calculo. Si in loco de  $y$  nos pone plure functione  $g$ , que coincide cum  $y$  pro valore extremo  $a$  et  $b$ , integrale sume plure valore. Si valore de integrale respondente ad functio  $y$  es maximo inter valores de integrale respondente ad omni functio  $g$ , tunc derivata de  $f(yx, Dyx, x)$ , facto pro  $y, x$ , ut si  $Dy, x$  et  $x$  es constante, vale quod resulta, si nos deriva  $f$  pro  $Dy, x$ , ut si  $y, x$  et  $x$  es constante, et postea deriva pro  $x$ , que occurre implicito in  $y, x$  et in  $Dy, x$ , et explicito in tertio loco.

Dem.

$$f_1 = D_1 f(yx, Dyx, x)|x. \quad f_2 = D_2 f(yx, Dyx, x)|x.$$

$$h = (x-a)(1-x)(f_1 x - Df_2 x)|x.$$

$$g = S[f(yx + thx, Dyx + tDh, x)|x; a, b]|t \supset.$$

$$h_0 = h_1 = 0. \quad g_0 = \max h|q \supset. \quad Dg_0 = 0.$$

$$Dg_0 = S[(1-x)(f_1 x - Df_2 x)^2|x; a, b] \supset. \quad f_1 - Df_2 = (a \overline{b})$$

In vero, nos voca  $f_1$  et  $f_2$  derivatas partiale de  $f$  pro primo et secundo variabile respondente ad valores  $y, x$ , quando varia  $x$ , et nos considera valore de integrale respondente ad functio  $gx = yx + thx$ , ubi  $hx = (x-a)(b-x)(f_1 x - Df_2 x)$ . Illo depende de parametro  $t$ . Pro  $t=0$ , functio  $g = y$ , et integrale fi maximo. Ergo derivata de illo vale 0. Derivata, secundo P-1, vale  $S[(x-a)(b-x)(f_1 x - Df_2 x)^2|x; a, b]$ , que es nullo solo quando  $f_1 x - Df_2 x = 0$  pro omni valore de  $x$  in intervallo de integratione.

## \* 12.

## VARIATIONE DE ARCU.

$$\begin{aligned}
 & \cdot 1 \quad p \in pF(\Theta; \Theta) \cdot D_1 p, D_1^2 p, D_1 p \in (vF\Theta) \text{cont.} \cdot y \in \Theta \cdot \supset \\
 & D\{\text{Arcu}[p(x, y)] | x, \Theta\} \mid y, \Theta \{y = D[S[\text{mod} D_1 p(x, y) | x, \Theta] | y, \Theta] y \\
 & \quad = S[D[\text{mod} D_1 p(x, y) | y, \Theta] | x, \Theta] \\
 & \quad = S[UD_1 p(x, y) \times D_1 D_1 p(x, y) | x, \Theta] \\
 & = S[D_1[UD_1 p(x, y) \times D_1 p(x, y)] - [D_1[UD_1 p(x, y)] \times D_1 p(x, y)] | x, \Theta] \\
 & = A[UD_1 p(x, y) \times D_1 p(x, y) | x, \Theta] \\
 & - S[\text{curvatura}[p(x, y) | x] \cdot x \times D_1 p(x, y) \times \text{mod} D_1 p(x, y) | x, \Theta]
 \end{aligned}$$

Si  $p$  es puncto mobile, functio de variabile  $x$  et de parametro  $y$ , tunc variatione de arcu descripto per puncto, id es, derivata pro  $y$  de arcu descripto ab  $p(x, y)$  dum varia  $x$ , vale incremento de projectione super tangente de variatione de extremos de arcu, minus integrale de producto interno de vectore-curvatura de curva per variatione de puncto, per valore absoluto de derivata de puncto.

In vero, arcu vale integrale de modulo de derivata de  $p$  pro  $x$  (p. 370 P·3); ergo  $D$  pro  $y$  de arcu, vel  $D$  pro  $y$  de  $S$  pro  $x$ , vale (p. 438)  $S$  pro  $x$  de  $D$  pro  $y$  de mod. de  $D$  pro  $x$  de  $p$ . Calcula derivata de modulo (p. 285 P16·3; commuta derivationes. Tunc uno termine es integrale pro  $x$  de derivata pro  $x$ , que vale incremento de functione. Secundo termine es expresso per curvatura de curva (p. 318 P49).

Nos pote etiam deduce ce theorema de P11·1; nos præfer demonstratione directo.

$$\begin{aligned}
 & \cdot 2 \quad u \in \text{Cls}' p \cdot p \in uF\Theta \cdot \text{Arcu}(p, \Theta) = \min \{ \text{Arcu}(q, \Theta) \mid q' (uF\Theta) \\
 & \quad \wedge q3(q0 = p0 \cdot q1 = p1) \} \cdot x \in \Theta \cdot a \in \text{Tang}(u, px) \cdot \supset \\
 & (a - px) \times \text{curvatura } px \leq 0
 \end{aligned}$$

Si  $u$  es figura, et  $p$  puncto mobile in  $u$ , et si arcu descripto per  $p$  es minimo inter arcus que pote es descripto per puncto  $q$ , mobile in  $u$ , que habe commune extremos cum præcedente, tunc vectore-curvatura de  $px$  fac angulo recto aut obtuso cum omni vectore  $a - px$ , ubi  $a$  es puncto arbitrario de figura tangente ad  $u$  in  $px$ .

Vectore  $a - px$ , ubi  $a$  es puncto arbitrario de figura tangente ad  $u$  in  $px$  vocare « variatione virtuale » de puncto.

Si figura  $u$  es superficie regulare, id es, es loco de punctos que satisfac ad Hp de p.332 §D P70, tunc habe in omni suo puncto plano tangente, et omni vectore in plano tangente es variatione virtuale de puncto.

Linea inter duo puncto de superficie, et de longore minimo, vocare «geodætica», nam occurre in Geodæsia.

Ergo vectore-curvatura vel normale principale, de geodætica es normale ad superficie.

{ JOH. BERNOULLI t. 4, p. 108 }

**geodaetica**, A geodetical, D geodätische, F géodésique, I geodetica.

⊂ G ge = Terra. Vide : geometria, pag. 202.

+ -o-, litera de unione in G. Vide p. 202.

+ dæ-, G δαίε = divide.

+ -tico (vide : aritme-tico p. 65) — -o

+ -a (p. 21 N. 37), intellige : linea.

**geodaesia**, G γεωδασία, A geodesy, D Geodäsie, F géodésie, HI geodesia, R geodeziá. = divisione de Terra.

·3  $f \varepsilon qFp \cdot Df \varepsilon (vFp) \text{cont} \cdot x \varepsilon pF(\Theta:\Theta) \cdot D_1x, D_1^2x, D_1x \varepsilon vF(\Theta:\Theta) \text{cont} \cdot r \varepsilon \Theta \cdot \supset \cdot D[S[f x(u,v) \times \text{mod} D_1x(u,r) | u, \Theta] | r, \Theta] v = A[f r(u,r) U D_1x(u,r) \times D_1x(u,r) | u; 0, 1] + S[\{[\text{comp} \perp D_1x(u,r)] Df x(u,r) - f x(u,v) \text{curvatura}[x(u,r) | u, u] \} \times D_1x(u,r) \text{mod} D_1x(u,r) | u, \Theta]$

·4  $f \varepsilon qFp \cdot Df \varepsilon (vFp) \text{cont} \cdot x \varepsilon pF\Theta \cdot D.x, D^2x \varepsilon vF\Theta \cdot S[(fxt \times mDxt) | t, \Theta] = \max \{S[(fyt \times mDyt) | t, \Theta] | y' (pF\Theta) \wedge y3 (y0 = x0 \cdot y1 = x1 \cdot Dy \varepsilon vF\Theta) \} \cdot t \varepsilon \Theta \cdot \supset \cdot (\text{cmp} \perp Dxt) D(f, xt) = fxt \times \text{curvatura} xt$

Si  $f$  es quantitate functione de positione puncto, vel potentiale (p.334), que habe ut derivata vectore functione continuo de puncto, et si  $x$  es puncto functione dato de tempore in aliquo intervallo, p. ex.  $\Theta$ , et si integrale de potentiale  $fxt$  per valore absoluto de velocitate, dum varia  $t$  in dato intervallo es maximo inter valores de idem integrale respondente ad omni alio motu  $y$ , que pro extremos de tempore coincide cum  $x$ , tunc pro omni valore de tempore  $t$ , sempre componente normale ad curva de vectore-derivata de  $f$  in puncto  $xt$  æqua  $fxt$  per vectore-curvatura de linea  $xt$ .

P. ex. si  $f\alpha$  es pretio per metro lineare de constructione in puncto  $x$ , de ferro-via, et si puncto  $x$  describe linea tale que pretio de constructione de ferrovia per linea  $x$  es minimo inter pretios respondente ad omni alio via  $y$ , cum extremo identico ad priore, tunc, in omni puncto  $xt$  de linea, componente normale ad linea de vectore derivata de pretio, vale pretio multiplicato curvatura de via. Id es, curvatura de via æqua componente normale de derivata de logarithmo de pretio.

### § 39. SUBSTITUTIONE DE VECTORES

\* 1.0  $H = (vFv)lin$  Df

H, lege « homographia », indica « vectore functione lineare de vectores », vel « substitutione de vectores ». Symbolo « lin » es definitio in pag. 148. Satisfac conditiones :

$a \in H . u, v \in V . h \in \mathcal{D}$ .

1  $au \in V . a(u+v) = au + av . a(hu) = h(au)$

Conditiones 1 et 2 es scripto in definitione. Conditione 3 seque de definitione de « lin », sed non de 1 et 2.

Si  $i, j, k$  es vectore non complanare, id es  $iajak = 0$ , et si  $i' = ai, j' = aj, k' = ak$  es vectores respondente in functione  $a$ , tunc  $a$  pote es scripto (pag. 149) :

$$a = (i', j', k') / (i, j, k),$$

ut ratione de duo triade de vectores correspondente.

Substitutione de vectores, ut substitutione de complexos de ordine 3, habe tres invariante.

Determinante de  $a$ , vel invariante de gradu 3, pote es definitio ut ratione de duo trivectore (parallelepipedo) correspondente. Ergo nos sume tres vectore  $x, y, z$  non complanares:

$$x, y, z \in V . xayaz = 0,$$

et considera ratione

$$(ax \ a \ ay \ a \ az) / (xayaz).$$

Si nos varia  $x, y, z$  et tribue ad illos omni triade de valores non complanare, ratione præcedente habe valore constante, determinante de substitutione  $a$ :

$$\begin{aligned} \cdot 2 \quad \text{Dtrm } a &= \mathfrak{I}[(ax \ a \ ay \ a \ az) / (xayaz)] (x, y, z)' (x, y, z) \\ &\quad (x, y, z \in V . xayaz = 0) \end{aligned} \quad \text{Dfp}$$

Si  $h$  es quantitate reale, determinante de substitutione  $a+h$  es expresso (vide pag. 151 Prop. 5.4) per:

$$\cdot 3 \quad \text{Dtrm}(a+h) = \text{Dtrm}a + h\text{Inv}_3a + h^2\text{Inv}_2a + h^3$$

Coefficientes de  $h$  et de  $h^2$  es invariantes de gradu 2 et 1 de  $a$ . Nos deduce definitiones possibile de ce invariantes:

$$\cdot 5 \quad \text{Inv}_3a = D[\text{Dtrm}(a+h)|h, q]0 \quad \text{Dfp}$$

$$\cdot 6 \quad \text{Inv}_2a = (1/2)D^2[\text{Dtrm}(a+h)|h, q]0 \quad \text{Dfp}$$

Si nos evolve  $\text{Dtrm}(a+h)$  cum regula  $\cdot 3$ , post facile reductione, nos deduce alio definitione possibile:

$$\cdot 7 \quad \text{Inv}_3a = \eta[(axaayaaz + ayaazax + azaaxay)/(xayaz) | (x, y, z), ' \text{ ut in P} \cdot 2 \quad \text{Dfp}$$

$$\cdot 8 \quad \text{Inv}_2a = \eta[(axayaaz + ayaazax + azaaxay)/(xayaz) | (x, y, z), ' \text{ etc.} \quad \text{Dfp}$$

Ex tres invariante, illo de secundo gradu habe pauco applicatione. Determinante occurre sæpe in Geometria. Invariante de primo gradu, vel « invariante » es de uso continuo in Physica-Mathematica. Me indica illo cum signo plus breve:

$$\cdot 9 \quad Sa = \text{Inv } a \quad \text{Df}$$

Lege  $Sa$  « scalare de  $a$  ». Vocabulo « scalare » es de Hamilton; vide pag. 186. Hic habe usu plus generale, nam nos applica illo ad omni substitutione de vectores in spatio, et non solo ad quaterniones, que es substitutiones speciale.

$$\ast \quad 2. \quad i, j, k \in v. \quad iajak = 0. \quad u \in qf(1 \cdots 3; 1 \cdots 3). \quad a = (u_{11}i + u_{12}j + u_{13}k, u_{21}i + u_{22}j + u_{23}k, u_{31}i + u_{32}j + u_{33}k) \cdot (i, j, k) \cdot \supset.$$

$$\cdot 1 \quad Sa = u_{11} + u_{22} + u_{33}$$

$$\cdot 2 \quad \text{Inv}_3a = u_{11}''_{22} - u_{12}''_{21} + u_{22}''_{33} - u_{23}''_{32} + u_{33}''_{11} - u_{13}''_{31}$$

$$\cdot 3 \quad \text{Dtrm}a = \text{Dtrm}[u_{11}, u_{12}, u_{13}; u_{21}, u_{22}, u_{23}; u_{31}, u_{32}, u_{33}]$$

Si  $i, j, k$  es vectore non complanare, et si  $u$  es quantitate functione de duo indice que ambo sume valores 1, 2, 3, et si nos voca  $a$  substitutione que ad tres vectore dato fac corresponde functiones lineare de illos, cum coefficientes  $u$ , tunc formulas præcedente exprime invariantes de  $a$ , ope 9 numeros  $u$ , que vocare « coordinatas » de substitutione.



\* 3.

V

$$\cdot 0 \quad a \in H \supset Va = \vee x \wedge x \in [u, v \in V \supset (au) \times v - (av) \times u = xauv/\psi]$$

Df

Dato homographia  $a$ , tunc, si  $u$  et  $v$  es vectore, quantitate  $(au) \times v - (av) \times u$  es functione lineare de  $u$  et de  $v$ , et functione alterno de  $(u, v)$ . In generale, omni functione lineare et alterno de duo vectore  $u$  et  $v$ , es functione lineare de bivectore  $uav$ .

In nostro casu, expressio es reductibile ad ratione de trivectore  $xauav$  ad trivectore unitario (pag. 196); ubi  $x$  es vectore que depende de  $a$ .

Nos indica vectore  $x$  per  $Va$ , lege « vectore de substitutione  $a$  ». Ita nos producit coincidentia cum notationes de Hamilton.

$$\cdot 1 \quad a, b \in (VFV)lin \supset V(a+b) = Va + Vb \quad S(a+b) = Sa + Sb$$

Operationes  $S$  et  $V$  super substitutiones es distributivo pro summa.

$$\cdot 2 \quad \text{Hyp P2} \quad i^2 = j^2 = k^2 = 1 \quad i \times j = j \times k = k \times i = 0 \supset$$

$$Va = (u_{22} - u_{33})i + (u_{31} - u_{13})j + (u_{12} - u_{21})k$$

Expressio de  $Va$  per coordinatas orthogonale de  $a$ .

$$\cdot 3 \quad u \in V \supset V[I(ua x) | x, v] = 2u$$

$$S \text{ ----- } = 0$$

$$\text{Inv} \text{ ----- } = u^2$$

$$\text{Dtrm} \text{ ----- } = 0$$

Si  $u$  et  $x$  es vectore,  $uax$  es bivectore; suo indice  $I(ua x)$  es vectore (vide pag. 198), dicto « velocitate de vectore  $x$ , in motu rotatorio representato per vectore  $a$  ». Motu hic considerato es relativo ad vectores. Si nos introduce origine  $o$ , resulta casu particulare de velocitate et de motu considerato in pag. 269.

$$\cdot 4 \quad 2a = D[(au \times u) | u, v] + [I(Va)au | u, v]$$

Si  $u, v$  es vectore, exprime identitate

$$2(au) \times v = [(au) \times v + (av) \times u] + [(au) \times v - (av) \times u],$$

id es, decompone functione bilineare  $2(au) \times v$  in functione symmetrico et in functione alterno de duo vectores.

Ergo omni homographia es summa de derivata de functione de secundo gradu  $(au) \times u$ , plus velocitate de rotatione.

Primo parte, que habe vectore  
tione vocato « dilatatione ». Punctos  
constante, forma superficie de secu

\* 4.

Nos habe definitio, in pag. 330,  
aut complexo de ordine  $m$ , function  
secundo JACOBI et GRASSMANN.

Si complexo variabile es p. ex. d  
tione, tunc derivata es functione li

$$(D_1 u, D_2 u, I$$

que habe ut elementos derivatas par

Si functione  $u$  es quantitate real  
scalare » secundo HAMILTON, et vari  
tore, vel puncto, tunc derivata de  
in pag. 334.

Si  $u$  es vectore functione de vec  
tione de puncto,  $vFp$ , vel puncto  
tunc  $Du$  es substitutione de vecto  
et  $VDu$ .

Nomenclatura et notationes super ente  
in differente Auctores, ut semper fi in o  
idem tempore ad Auctores que tracta the  
tationes non depende solo de substitutio  
modo speciale, de differente campo ubi

Si  $u$  es functione de puncto de coordi  
quaternione coordinato (vide p.200). Han

$$r = iD_1 + jD_2$$

Derivata de Grassmann a. 1862, pot

$$D = (D_1, D_2$$

Si  $u$  es numero, vel si  $u$  es functione

$$Fu = -I$$

$Du$ , jam vocato « parametro different  
habe accepto ab Maxwell a. 1871 nom  
ligato ad A. « slip » = « gradi, es lubri  
manico, parallelo ad Teutonico « schleit  
de Indo-Europæo, que habe productio I.  
« gradiente » nomen adoptato ab nume  
citate, et reducto ad symbolo « grad  $u$

Si  $u$  es vectore functione de puncto, tunc  $\nabla u$  de Hamilton es quaternione, que habet 4 coordinatas et non coincide cum  $Du$  de Grassmann, que habet 9 coordinatas, id est 9 derivatas partiales de 3 coordinatas de vectore functione pro 3 coordinatas de puncto variabile. Sed subsiste relationes sequente:

$SDu = -\nabla \cdot u$  de Hamilton = -convergentia de  $u$ , secundo Maxwell = divergentia de  $u$ , secundo Clifford a. 1878, nomen adoptato per Electricistas, et reducto ad symbolum «  $\text{div } u$  ».

$\nabla u = \nabla \times u$  de Hamilton, = « curl », « versione » de Maxwell = « rotatione » de Clifford, nomen adoptato ab Electricistas, et reducto ad symbolum «  $\text{rot } u$  ».

\* 5.  $m, n \in \text{qFp} \cdot u, r \in \text{vFp} \cdot \supset$ .

$$\cdot 0 \quad SD mu = mSDu + Dm \times u$$

$$\cdot 1 \quad VD mu = mVDu + I(Dm)au$$

$$\cdot 2 \quad SD I uav = u \times VDv - r \times VDu$$

$$\cdot 3 \quad D^2 m \in \text{HFp} \text{ cont. } p \in p \cdot \supset \cdot VD^2 mp = 0$$

$$\cdot 4 \quad SD VD u = 0$$

$$\cdot 5 \quad SD^2(mn) = mSD^2n + nSD^2m + 2(Dm) \times (Dn)$$

Vide Heaviside, *Electromagnetic Theory* a. 1893 p. 195, 201.

Indicationes historico et bibliographico de praesente § es tracto ex:

C. Burali-Forti e R. Marcolongo, *Per l'unificazione delle notazioni vettoriali*, Palermo R. a. 1907 t. 23 p. 324, Nota I, et sequentes.

$$\cdot 6 \quad a \in p \cdot x \in p \cdot a \cdot \supset \cdot SD^2[1/d(r, a) | x, p] x = 0$$

$$\cdot 7 \quad a \in p_1 \cdot x \in p \cdot a \cdot \supset \cdot SD^2 \log d(r, a) | x, p] x = 0$$

\* 6. INTEGRALE DE LINEA ET DE SUPERFICIE.

Si  $u$  es vectore functione de puncto, vel  $u$  es « campo vectoriale » et si  $p$  es puncto functione de uno variabile  $x$ , in intervallo  $h$ , tunc

$S[(u \times p) \times Dp x | x, \Theta] =$  labore de fortia  $u$ , vel  
 $=$  circuitatione de vectore  $u$ , pro linea descripto per  $p$ , in intervallo  $h$  (Heaviside).

Si  $p$  es puncto functione de duo numero, in duo dato intervallo  $h$  et  $h$ , tunc

$$S[up(x,y) \alpha D_1 p(x,y) \alpha D_2 p(x,y) \mid (x,y), h:k] \\ = \text{fluxu de vectore } u, \text{ trans superficie } (p, h:k).$$

$$\begin{aligned} \cdot 1 \quad u \in \text{vFp} \cdot Du \in \text{HFp cont. } a, b, c, d \in q \cdot p \in \text{pF}(a \frown b : c \frown d) \cdot \\ D_1 p, D_2 p, D_1 D_2 p \in \text{vF}(a \frown b : c \frown d) \text{ cont. } \supset. \\ \Delta \{ S[up(x,y) \times D_2 p(x,y) \mid y; c, d] \mid x; a, b \} \\ - \Delta \{ S[up(x,y) \times D_1 p(x,y) \mid x; a, b] \mid y; c, d \} \\ = S; D S[up.. \times D_2 p.. \mid y; c, d] \mid x; a, b \} \\ - S; D S[up.. \times D_1 p.. \mid x; a, b] \mid y; c, d \} \\ = S; S [(Dup.. D_1 p..) \times D_2 p.. + up.. D_1 D_2 p.. \mid y; c, d] \mid x; a, b \} \\ - S; S [(Dup.. D_2 p..) \times D_1 p.. + up.. D_2 D_1 p.. \mid x; a, b] \mid y; c, d \} \\ = S; S [(Dup.. D_1 p..) \times D_2 p.. - (Dup.. D_2 p..) \times D_1 p.. \mid x; a, b] \mid y; c, d \} \\ = S \{ S [VDup(x,y) \alpha D_1 p(x,y) \alpha D_2 p(x,y) / \psi \mid x; a, b] \mid y; c, d \} \\ \} \text{STOKES, Cambridge University Calendar a.1854} \} \end{aligned}$$

Si  $u$  es campo vectoriale, et si  $p$  es puncto functione de duo numero, primo in intervallo de  $a$  ad  $b$ , secundo in illo de  $c$  ad  $d$ , tunc circuitatione de vectore  $u$  pro perimetro de superficie de  $p$ , in ordine  $(a,c)$   $(b,c)$   $(b,d)$   $(a,d)$ , vale fluxu de vectore de derivata de  $u$ , id es fluxu de rotatione de  $u$ , trans superficie de  $p$ . Transforma integrale pro perimetro in integrale pro superficie.

Dem. resulta ex calculo. Incremento de functione inter duo limite vale integrale de suo derivata (p.349 P12.2). Commuta derivata cum secundo integrale (p.438), commuta integrationes et derivationes. Differentia de duo termine es nullo. Differentia que remane, per definitione de vectore de homographia, habe valore scripto.

$$\begin{aligned} \cdot 2 \quad u \in \text{vFp} \cdot Du \in \text{HFp cont. } p \in \text{pF}(\Theta : \Theta : \Theta) \cdot D_1 p, D_2 p, D_3 p, \\ D_1 D_2 p, D_1 D_3 p, D_2 D_3 p \in \text{vF}(\Theta : \Theta : \Theta) \text{ cont. } \supset. \\ \Delta \{ S[(up \alpha D_2 p \alpha D_3 p)(x,y,z) \mid \psi \mid y; 0,1 \mid x; 0,1] \mid z \} \\ + \Delta \{ S[(up \alpha D_3 p \alpha D_1 p) \mid z \mid x \mid y \mid \psi \mid y; 0,1 \mid x; 0,1] \mid z \} \\ + \Delta \{ S[(up \alpha D_1 p \alpha D_2 p) \mid x \mid y \mid z \mid \psi \mid y; 0,1 \mid x; 0,1] \mid z \} \\ = SS \{ (Dup D_1 p) \alpha D_2 p \alpha D_3 p + Dup D_2 p \alpha D_3 p \alpha D_1 p + \\ (Dup D_3 p) \alpha D_1 p \alpha D_2 p / \psi, \Theta : \Theta : \Theta \} \\ = S \{ (SDup)(D_1 p \alpha D_2 p \alpha D_3 p) \mid \psi, \Theta : \Theta : \Theta \} \\ \} \text{OSTROGRADSKY, Mém. Ac. Petersb. t.1 p.39, a.1828} \} \\ \} \text{GAUSS a.1840, Werke t.5 p.195} \} \end{aligned}$$

Si  $u$  es campo vectoriale, et si  $p$  es puncto functione de tres variable in dato intervallos, p. ex.  $\Theta, \Theta, \Theta$ , tunc fluxu de de vectore  $u$  trans sex superficie que limita parallelepipedo curvilineo descripto per  $p$ , id es sex superficie descripto per  $p(x, y, z)$ , ubi singulo variable sume valores 0 et 1, vale integrale de divergentia (SD) de  $u$ , in volumen campo de  $p$ .

Transformatione de integrale pro superficie de solido  $p(\Theta: \Theta: \Theta)$  in integrale pro solido.

\* 7.  $c \in \text{Cls}'p \supset$ .

1.  $c \in \text{cont}_1 := x, y \in c \supset x, y \in (cF\Theta) \text{cont} \wedge h_3(h_0=x, h_1=y) \text{ Df}$

Classe de punctos, vel figura,  $c$ , vocare «continuo de ordine 1», vel «continuo lineare» vel «continuo», si nos pote uni duo suo puncto arbitrario per linea continuo  $h$  in figura  $c$ .

2.  $c \in \text{cont}_2 := f, g \in (cF\Theta) \text{cont} \cdot g_0=f_0 \cdot g_1=f_1 \supset_{f,g} \{ [cF(\Theta: \Theta)] \text{cont} \wedge h_3[h(x, 0)|x, \Theta]=f \cdot [h(x, 1)|x, \Theta]=g : y \in \Theta \supset_y [h(x, y)|x, \Theta] = (f, \Theta] \} \text{ Df}$

Figura  $c$  vocare «continuo de ordine 2», vel «continuo superficiale» vel «acyclico», si, dato duo linea  $f$  et  $g$ , in  $c$ , cum extremos commune, nos pote uni ee duo linea per serie continuo de lineas, formante superficie in  $c$ , cum extremos commune cum  $f$ .

3.  $c \in \text{cont}_3 := f, g \in [cF(\Theta: \Theta)] \text{cont} \cdot [g, (\Theta] \wedge (\Theta: \Theta] = [f, (\Theta] \wedge (\Theta: \Theta)] \supset_{f,g} \{ [cF(\Theta: \Theta: \Theta)] \text{cont} \wedge h_3[h(x, y, 0)|(x, y), \Theta: \Theta]=f \cdot [h(x, y, 1)|(x, y), \Theta: \Theta]=g : z \in \Theta \supset_z [h(x, y, z)|(x, y), (\Theta] \wedge (\Theta: \Theta)] = [f, (\Theta] \wedge (\Theta: \Theta)] \} \text{ Df}$

Figura  $c$  vocare «continuo de ordine 3», si dato duo superficie in  $c$ , cum peripharia commune, semper lice uni duo superficie cum serie continuo de superficie in  $c$ , cum peripharia commune cum praecedentes

4.  $\text{Medr} = c \supset c \in \text{cont}_1 \wedge \text{cont}_2 \wedge \text{cont}_3$

Si omni puncto medio inter  $c$  pertine ad  $c$ , id es, si figura  $c$  es convexo, tunc es continuo de omni ordine.

·3  $o \in p . i \in v \cdot i0 . a, b \in Q . a > b . u = p \wedge x \exists [(x - o) \times i = 0 .$

$d(x, o) = a] \cdot \supset . p \wedge x \exists [d(x, u) < b] \varepsilon \text{cont}_1 \wedge \text{-cont}_1 \wedge \text{cont}_1$

Si nos voca  $u$  circumferentia de centro puncto  $o$ , et de radio  $a$ , tunc anulo vel toro formato de punctos que dista de  $u$  minus que  $b < a$ , es continuo de ordine 1 et 3, et non de ordine 2.

·6  $o \in p . a \in Q . \supset . p \wedge x \exists [d(x, o) > a] \varepsilon \text{cont}_1 \wedge \text{cont}_1 \wedge \text{-cont}_1$

Solido ex sphaera de centro  $o$  et radio  $a$ , es continuo de ordine 1 et 2, et non de ordine 3.

·7  $a, b \in (\text{Cls}'p) \text{cont}_1 . \exists a \wedge b \cdot \supset . a \wedge b \varepsilon \text{cont}_1$

\* 8·1  $c \in (\text{Cls}'p) \text{cont}_1 . u \in v Fc . V D u = (i0:c) .$

$f, g \in (cF\theta) \text{cont}_1 . f0 = g0 . f1 = g1 \cdot \supset . S[uf \times Df, \theta] = S[ug \times Dg, \theta]$

Si figura  $c$  es continuo superficiale, si ad omni puncto de campo  $c$  responde vectore, vel fortia  $u$ , et si vectore de derivata de  $u$  es semper nullo in campo  $c$ , tunc  $S(uf \times Df, \theta)$ , que vocare « labore » de fortia  $u$ , quando puncto de applicatione  $f$  sume motu arbitrario, non varia si nos muta trajectory de puncto, servato suo extremos. In ce casu  $uf \times Df$  vocare « differentiale exacto », et campo  $c$  « irrotationale ».

·2  $c \in (\text{Cls}'p) \text{cont}_1 . u \in v Fc . S D u = (i0:c) . f, g \in [cF(\theta:\theta)] \text{cont}_1$

$[f, (i0u1:\theta) \wedge (\theta:i0u1)] = [g, (i0u1:\theta) \wedge (\theta:i0u1)] \cdot \supset .$

$S[uf \alpha D_f f \alpha D_g f, \theta:\theta] = S[ug \alpha D_g g \alpha D_g g, \theta:\theta]$


Si campo  $c$  es continuo de ordine 3, et si ad omni suo puncto responde vectore  $u$ , et si scalare de derivata de  $u$  es semper nullo in  $c$ , tunc si puncto  $f$  describe superficie,  $S[uf \alpha D_f f \alpha D_g f, \theta:\theta]$ , jam vocato « fluxu de  $u$  trans superficie », non varia si nos muta superficie, servato perimetro. In ce casu, functio  $u$ , vel distributione de vectore  $u$ , vocare « solenoidale ».

**solenoidale** (Maxwell, A treatise on Electricity and Magnetism, Oxford a.1881 p. 20) indica motu de liquido secundo canales impermeabile.

$\sqsubset$  solenoide — -e + -ale.

**solenoides** = in forma de tubo.  $\sqsubset$  solen + -o + -ide.

solen, G  $\sigma\omega\lambda\acute{\iota}\nu$  = canale, tubo.



# INDICE

DE FASCICULO I ET II.

I. Logica-Mathematica			Cfr		
Symbolo	Nomen	pag.	ord	ord	
$=$	aequalitate	3	!	factoriale	52
$\supset$	deductione	3	C	combinationes	52
$\wedge$	conjunctione	3	mlt	minimo multiplo commune	53
$\varepsilon$	individuo	4	Dvr	maximo divisore commune	53
Cls	Classe	4	Np	numero primo	58
;	systema	6	mp	max. potestate	63
$\exists$	« que »	9	$\Phi$	indicatore	64
-	negatione	10			
$\vee$	disjunctione	10			
$\exists$	existe	12			
$\wedge$	nullo	12			
$\iota$	aequo	13			
$\iota$	« to, illo »	13			
II. Arithmetica.				III. Algebra.	
+	plus	27	f	functio	73
$N_0$	numero	27	j	correspondentia	73
0 1 2 ... 9 X		29	sim	simile	73
$\times$	multiplicato	32	rcp	reciproco	73
$\uparrow$	potestate	34	idem	identitate	73
Cls'	classe de	36		variabile	77
$N_1$	numero naturale	37	'	de	77
$>$	majore	37	:		79
... intervallo discontinuo		38	F	functio definitio	79
-	minus	44	$\cap$	productio logica	82
/	diviso	45	$\cup$	summa »	82
num	numero de	46	n	numero integro	83
max	maximo	46	mod	modulo	94
min	minimo	47	sgn	signo	94
quot	quoto	48	R	rationale positivo	95
rest	resto	48	r	rationale	100
			E	« entier »	102
			$\beta$	fractio	102
			dt	denominatore	102
			nt	numeratore	102
			$\eta$	fractio proprio	104
			Q	quantitate positivo	105





$\cos^{-1}$	anti-cosinu	261
$\text{tng}^{-1}$	anti-tangente	261
ang	angulo	264
Rotat	rotatione	268
vel	velocitate de corpore	269
$\mu$	motu	269
Fc	fractio continuo	270

## VI. Calculo differentiale.

$\Delta$	incremento	273
D	derivata	273
interp(olante)		306
intero (functio)		308
rectaT	recta tangente	313
planN	plano normale	314
planO	plano osculatore	315
rectaN	normale princip.	316
rectaB	binormale	316
Ax	axi de curva	316
Ce	centro de curvatura	316
Re	radio de curvatura	316
curvatura		318
torsio		318
Tang	figura tangente	331

## VII. Calculo integrale.

$S'$	integrale supero	341
$S_i$	integrale infero	341
$S$	integrale	341
Arcu		370
Long, Long'	Long	372
long	long-ore	373
Area		377
Volum		379
area		384
arc		386

## VIII. Theoria de curvas ET COMPLEMENTO.

Parabola	389
Ellipsi	391
Hyperbola	392
Parab. de vario ordine	394
Linea exponentiale	394
Catenaria Tractória	395
Sinusoide	396
Tangentoide	397
Curva de luce	397
Spira mirabile	398
Spirale de ordine $m$	399
Spirale de Archimede	399
Spirale de ordine $-1$	399
Cochleicoide	400
Sinus-spirale	400
Cycloide	401
Evolvente de circulo	402
Asteroide	402
Epicycloide	403
Limace de Pascal	404
Cardioide	405
Cissoide de Diocle	405
Podaria	406
Conchoide	406
Conchoide de Nicomede	407
Helice	407
Inversione	407
$\gamma$ Constante de Euler	408
Dg derivata generale	414
Æquatione differentiale	416
Integrale multiplo	439
G centro de gravitate	446
Inertia (momento de)	447
Variatione de integrale	448
H homographia	452





---

**Revista de Mathematica** per G. PEANO — Tomo 1,  
anno 1891, L. 8 - Tomo 2, anno 1892, L. 8 -  
- Tomo 3, anno 1893 L. 8 - Tomo 4, anno 1894  
L. 8 - Tomo 5, anno 1895, L. 8 - Tomo 6, anno  
1896-99, L. 8 - Tomo 7, anno 1900-1901, L. 8 -  
Tomo 8, anno 1902-1907, L. 8.

**Formulaire Mathématique.** — Introduction, a. 1894, L. 2 -  
Tome 1, a. 1895, L. 6 - Tome 2, a. 1899, L. 8 -  
Tome 3, a. 1901, L. 8 - Tome 4, a. 1903, L. 10.

**Formulario Mathematico.** — Tomo 5, fasciculo 1, L. 12.  
Id. fasciculo 2, » 8.


---

*Apud* **Fratres Bocca**, Librarios-Editores, TORINO.

---











This book should be returned to  
the Library on or before the last date  
stamped below.

A fine is incurred by retaining it  
beyond the specified time.

Please return promptly.

~~MAR 15 1971~~

33/S  
**Canceled**  
MAR 22 1971 H

B-26-48



3 2044 102 938 529